Historic, Archive Document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.

SHOUT
SHARE
IT

Blumen = Zeitung.

Herausgegeben
von
Friedrich Häßler
in Weißenſee (Thüringen).

Stolzen biet' ich Hahnenkämme,
Armen biet' ich Münzen an,
Stachelbeer' den Rezenſenten,
Den Soldaten Löwenzahn,
Ringelblumen den Schmarotzern,
Tulpen jedem dummen Wicht,
Immortellen meinen Freunden,
Liebchen ein Vergißmeinnicht.

Caſtelli.

Sechster Jahrgang.

1833.

Weißenſee, in Thüringen,
gedruckt und verlegt bei Fr. Häßler 1833.

56306

Inhalts-Verzeichniß der Blumen-Zeitung.

Sechster Jahrgang. 1833.

MAY 22 1897

I.

Beſchriebene Pflanzen.

Acacia conspicua. Seite 101.
Acacia grandiflora. Seite 142.
Alstroemeria acutifolia. Seite 114.
Amaryllis fulgida. Seite 93.
Ananas bracteata. Seite 101.
Argemone Barkleyana. Seite 2.
Aster Parisinus. Seite 197.
Begonia heracleifolia. Seite 86.
Begonia incarnata. Seite 6.
Cactus alatus. Seite 7.
Cactus funalis. Seite 7.
Calceolaria arachnoidea. Seite 9.
Calceolaria floribunda. Seite 37.
Calceolarien, 30 beſchriebene Sorten. S. 153. 161. 169.
Cereus hybridus. Seite 131.
Cleome spinosa. Seite 203.
Collomia coccinea. Seite 193.
Costus Pisonis. Seite 190.
Dendrobium speciosum. Seite 78.
Epiphyllum Ackermanni. Seite 6.
Epiphyllum articulatum, Seite 7.
Fuchsia conica. Seite 73.
Fuchsia gracilis, F. decussata. Seite 81. 89.
Francoa sonchifolia. Seite 58. 66.
Helianthemum vulg. fl. fusco semipl. Seite 170.
Helianthemum vulg. venustum. Seite 130.
Hypericum linarioides. Seite 185.
Lathyrus californicus. Seite 137.
Liatris spicata. Seite 97.
Lubinia atropurpurea. Seite 69.
Magnolia altissima. Seite 56.
Magnolia discolor, M. obovata, M. purpurea. Seite 57. 73.
Malope grandiflora. Seite 170.
Nemophylla phacelioides. Seite 129.
Nolana atriplicifolia. Seite 171.
Pelargonien, neue, bei Lemon in Paris. Seite 141. 149. 157. 163. 207.
Penstemon ovatus. Seite 105.
Phlox reflexa. Seite 190.
Podolepis angustifolia. Seite 105.
Podolepis gracilis. Seite 198.
Prunus mahaleb nana. Seite 86.
Raflesia Arnoldi. Seite 60. 67.
Rhododendron arboreum. Seite 1. 41. 92.
Rhipsalis grandiflorus. Seite 7.
Rhipsalis salicarnoides. Seite 30.
Rosa Adelaide v. Orleans. Seite 113. 130.
— beng. Bourbon Desprez. Seite 164.
— bracteata. Marie Leonida. Seite 60.
— felicite perpetue. Seite 113. 130.
— Nois. Desprez. R. N. flava. Seite 157.
— Nois. d'Andrezelle. Seite 164.
— Triomphe de Bollwiller. Seite 189.
Russelia multiflora. Seite 42.
Salpiglossis atropurpurea. Seite 20.
Salvia involucrata. Seite 177.
Selago dendata. Seite 69.
Senecio venustus. Seite 61.
Silene compacta. Seite 129.
Thunbergia grandiflora. Seite 121.
Tropaeolum majus, var. nov. Seite 150.
Verbena melindres. Seite 2.
Xiphidium albidum. Seite 173.

II.

Culturangaben, Culturverſuche, Anfragen und Antworten in Bezug auf dieſen Gegenſtand.

Anfrage: die Anzucht der Roſen aus Samen betreffend. Seite 46.
Anfrage: die Gewinnung von keimfähigen Samen betreffend. Seite 172.

Anfrage, blumiſtiſche. Seite 181.
Anfrage: das Keimen der Samen von Paſſionsblumen betreffend. Seite 189.
Balſaminen, gefüllte, zu erhalten. Seite 64.
Bemerkungen, einige, über die Levkojen ꝛc. S. 4. 11. 18.
Bemerkungen über die Behandlung der Orangeriebäume in Töpfen. Seite 5. 38. 45. 67.
Bemerkungen über Georginen. Seite 19. 27.
Bemerkungen über Lupinus Cruiksch, mutabilis fermis. Seite 35.
Berichtigung über dieſelben. Seite 172.
Bemerkungen, erläuternde, über die gefüllten Georginen, mit Angabe ꝛc. Seite 37. 43. 49. 57.
Bemerkungen über die Cultur des Cyclamen persicum. Seite 91.
Bemerkungen über das Düngen der Topfgewächſe mit Knochenmehl. Seite 121.
Bemerkungen über das Sitzenbleiben der Hyazinthen. Seite 177. 186.
Bitte um Nachricht über die Bedachung der Rieſenhortenſie zu Ballenſtedt. Seite 189.
Blumenbefruchtung, über. Seite 180.
Cacten, eine Vermehrungsart derſelben. Seite 206.
Calceolarien, Mittheilungen über dieſelben. Seite 75.
Calceolarien, über. Seite 138. 145.
Camellien zu treiben. Seite 207.
Cultur einiger Amaryllis-Arten. Seite 29.
Cultur der Aurikeln. Seite 91.
Cultur, über die, der Camellien. Seite 59. 65. 75.
Cultur der Georginen in den Flottbecker Baumſchulen. Seite 124.
Cultur der Parkinsonia aculeata und Princiana pulcherrima. Seite 100. 197.
Cultur der Pelargonien. Seite 60. 68. 77. 85.
Erziehung der Eriken, Rhododendren, Melaleuken ꝛc. aus Samen. S. 140. 148. 156. 162. 171. 178. 187. 194. 203.
Georginen, Mittheilungen darüber. Seite 84.
Georginen, Vermehrung derſelben durch Pfropfen in die Wurzelknollen. Seite 99.
Georginen, Anzucht derſelben in kleinen Gärten. Seite 139. 147. 155. 162.
Gewächſe, einjährige, Vermehrung derſelben durch Stecklinge. Seite 128.
Haideerdepflanzen, Einiges über Acclimatiſirung und Behandlung derſelben. Seite 2. 10. 36. 44. 50. 92. und Extrablatt hinter Seite 104.
Hyazinthen in Kohlrabiköpfen oder rothen Rüben zu treiben. Seite 206.
Levkoje, Sommer-, Verſuche mit derſelben, um gefüllt blühende Stöcke zu erhalten. S. 108. 116. 125. 194.
Methode, die Blumenknollen und Zwiebeln auf den Rabatten ꝛc. Seite 7.
Myrthe, Beitrag zur Behandlung derſelben im Winter. Seite 53.
Nelken-Durchwinterung. Seite 100. 131.
Nelken, Blüthezeit derſelben hinauszuſchieben. S. 166.
Nelken einzuſchneiden, neue Art. Seite 187.
Ranunkeln, Erziehung derſelben aus Samen. S. 39.
Roſen, hochſtämmige, über die Anzucht derſelben. Seite 12. (22.) 28.
Schwämme, Vertilgung derſelben in Lohbeeten. S. 192.
Volkamerien, große Dolden davon zu gewinnen. S. 63.
Zwerg-Chryſanthemum zu erhalten. Seite 182.

III.

Allgemeine Gegenſtände für Blumiſtik und Gartenweſen.

Abſtammug, über die, der Pflanzennamen. Seite 195.
Ameiſen zu vertilgen. Seite 76.
Anfrage, die Gartennelke betreffend. Seite 197.
Anwendung gebrannter Mauerziegel in Gärten. S. 136.
Beantwortung der Anfrage nach Pflanzen zu Bekleidung einer Laube. Seite 61. 76. 204.
Beſtimmung und Eintheilung der pimpinellblättrigen Roſen. Seite 13.
Blick auf den neueſten Zuſtand des Gartenweſens in den k. k. öſtreichiſchen Staaten. Seite 74. 82. 89. 98. 106. 115.
Blumen, neue und ſeltene, bei F. A. Haage jun. in Erfurt. Seite 201.
Cacten-Tauſch-Anerbieten. Seite 51.
Drosera rotundifolia. Seite 188.
Methode, Glashäuſer durch Ausdünſtung von Vieh zu erwärmen. Seite 40.
Mittel gegen Inſekten und Würmer. Seite 8.
Mittel gegen Erdflöhe. Seite 167.
Mittel, drei, gegen Inſekten ꝛc. Seite 48.
Namen, ſyſtematiſche, der merkwürdigſten Pflanzen ꝛc. (Fortſetzung.) Seite 5. 39. 46. 54. 68. 78. 94. 110. 126. 133. 142. 150. 158. 164. 173. 182. von Alaternoides bis Ammi.
Pflanzengruppen, immer grün bleibende. Seite 181.
Pflanzennamen, über unrichtig geſchriebene. Seite 196.
Pflanzen-Tauſch-Anerbieten. Seite 32.
Preisaufgaben. Extrablatt hinter Seite 104.
Sämereien von Blumenpflanzen. Extrablatt hinter Seite 104.
Tauſch-Anerbieten. Seite 109. 116. 126. 132. 144. 160. 166. 183. 196.
Veratrum nigrum, eigenthümliche Erſcheinung daran. Seite 205.

IV.

Varietäten.

Ausdünſtung der Pflanzen. Seite 56.
Auszug aus dem Briefe eines deutſchen Botanikers. Seite 63.
Berichtigung. Seite 96. 168. 192.
Betrug der herumziehenden Blumenzwiebelhändler. Seite 188.
Cacten der Alten. Seite 8.
Cactus peruvianus, hohes Alter. Seite 120.
Cereus speciosissimus mit 200 Blumen. Seite 103.
Cheirostemon platanoides. Seite 166.
Cochenille auf Cacten. Seite 112.
Federnelken-Liebhaberei in England. Seite 160.
Fenſter, neue, für Gewächshäuſer. Seite 56.

Garten, der botaniſche, zu Neapel. Seite 8.
Garten zu Padua. Seite 8.
Gartenkunſt der Chineſen. Seite 55. 80. 96.
Merkwürdige Erſcheinung von gefüllt. Bartnelken. S. 28.
Montezuma speciosissima. Seite 184.
Nelkenſammlungen, die vorzüglichſten. Seite 40.
Nelkenfreunde, Anzeige für dieſelben. Seite 184.
Notizen, blumiſtiſche, aus:
- Aloſt. Seite 104.
- Antwerpen. Seite 104.
- Aurich. Seite 15. 23.
- Berlin. Seite 30. 39. 62. 64. 70. 72. 79. 86. 95. 10. 102. 103. Extrabl. hinter S. 104. 117. 127. 134. 135. 142. 150. 158. 165. 174. 183. 191. 198. 207.
- Bern. Seite 191.
- Bollweiler. Seite 16. 21. 55. 63. 79. 96. Extrabl. hinter S. 104. 112. 120. 128. 136. 144. 160. 176.
- Brüſſel. Seite 95. 96.
- Caſſel. Seite 143.
- Cöln am Rhein. Seite 79.
- Dresden. Seite 16. 46. 175.
- Duisburg am Rhein. Seite 14. 22. 64. 120.
- Erfurt. Seite 208.
- Freiburg. Seite 83.
- Fuße, vom, des Thüringer Waldes. Seite 200.
- Gent, aus. Seite 96.
- Gotha. Seite 111. 118.
- Hamburg. Seite 23. 112. 159.
- Havannah. Seite 144.
- Kirdorf. Seite 83.
- Langenſalza. Seite 32.
- Lüttich. Seite 104.
- Nantes. Seite 62. 208.
- Nauſitz. Seite 54.
- Niederrhein, vom. Seite 87.
- Oldenburg, aus. Seite 8.
- Pankow bei Berlin. Seite 64.
- Paris. S. 95. 104. 143. 151. 159. 192. 199. 208.
- Petersburg. Seite 62. 165. 176. 199.
- Potsdam. Seite 70.
- Prag. Seite 199.
- Schönbrunn. Seite 144. 152. 166. 176. 183. 191.

Notizen, blumiſtiſche, aus:
- Schweidnitz. Seite 206.
- Weimar. Seite 63. 71. 165.
- Weißenſee. Seite 64.
- Wien. Seite 47. 62. 71. 87. 95. 103. 119. 127. 135. 143. 151. 159. 165. 176. 208.
- Wildeck. Seite 151.

Pantanus utilis auf der Pfaueninſel geblüht. S. 64.
Pflanzenreichthum. Seite 48.
Pflanzen, neue. Seite 136.
Paeonia Moutan, große. Seite 120.
Rhodiola rosea. Seite 64.
Roſen-Sammlung von W. Keller in Duisburg. Seite 17. 25.
Roſen, neue. Seite 33.
Rosa du Roi. Seite 144.
Uncidum bicornatum. Seite 184.
Vegetation auf den Bergen von Java. Seite 48.
Viola tricolor, Anekdote. Seite 109.

V.

Bibliographie über Blumiſtik.

Baumann, Gebrüder, in Bollweiler, Preisverzeichniß der vorräthigen Gewächſe ꝛc. Seite 184.
Blumiſt, der deutſche. Seite 160.
Booth, James, und Söhne, Verzeichniß der im Freien ausdauernden Bäume ꝛc. Seite 168.
Bouché, P. Fr., Naturgeſchichte der ſchädlichen und nützlichen Inſekten ꝛc. Seite 112.
Dietrich, Dr. F. G. Vollſtändiges Lexikon der Gärtnerei und Botanik. 3r Band. Seite 40.
Dietrich, Dr. F. G. Der Wintergärtner. Seite 40. 192.
Finkh, Dr. F. L., und G. F. Ebner. Der Blumengärtner. 2r Jahrg. 4tes, 5tes, 6tes Heft. S. 80.
Otto, Fr., und Alb. Dietrich. Allgemeine Gartenzeitung. Seite 64.
Pott, E. v. Buch der Geheimniſſe für Gartenliebhaber. Seite 152.
Reider, E. v. Annalen der Blumiſterei. 7r und 8r Band. Seite 31.
Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den königl. preuß. Staaten. 18te Lief. Seite 88.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt=Aemter, Zeitungs=Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto=Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. I. Weißenſee, (in Thüringen). Januar 1833. VI. Jahrg.

Beſchreibung u. Cultur ſchönblühender Glashaus= und Stuben=Pflanzen.

Rhododendron arboreum. Smith. Baumartige Schneeroſe. Roſenbaum. Alpenbalſam.

Gehört zur 10. Cl. 1. Ordn. (Decandria. Monogynia) des Linn. Syſt. und zur Familie Rhodoraceae. Jussieu.

In ihrem Vaterlande Nepal erlangt dieſe prächtige Schneeroſe eine Höhe bis zu 24 Fuß und eine Stärke des Stammes bis zu 24 Zoll. Man findet ſie auf der Bergkette, welche die Ebene von Hindoſtan von dem Himalaya=Gebirge trennt, beſonders in Eichenwäldern. Der Stamm iſt mit einer bräunlich=grauen, riſſigen, faſt korkartigen Rinde bekleidet. Die Aeſte ſind unregelmäßig abſtehend, gebogen, nur an den Spitzen grün und hier mit 10 — 12 genähert beiſammenſtehenden, faſt quirlförmigen Blättern beſetzt. Die Blätter ſtehen horizontal oder abwärts gebogen, auf ſtarken, runden, kaum halbzolllangen Blattſtielen; ſie ſind länglich=lanzettförmig, ſpitz, ganzrandig, lederartig, glatt, oben dunkelgrün, unten mit einem dichten, ſilberfarbigen Ueberzuge bekleidet; die größten ſind gegen 6 Zoll lang und über 1 1/2 Zoll breit. Unmittelbar oberhalb dieſer Blätter entſpringen die wohlriechenden, carmoiſinrothen Blüthen aus einer großen eiförmigen Knoſpe, deren Schuppen gelblich und mit weißen ſeidenartigen Haaren beſetzt ſind. Die 10 — 12 dicht beiſammen ſtehenden Blüthen bilden ein anſehnliches Köpfchen. Der Blüthenſtiel iſt kaum 3 Linien lang und gleich dem ſehr kleinen, ſtumpf=zahnigen Kelche weißlich und weichhaarig. Die ſchöne dunkelcarmoiſinrothe Blumenkrone iſt 1 1/2 Zoll lang, glockenförmig mit 5=lappigem, ſtumpfem, feingekerbtem und wolligem Saum; im Innern ſind auf der nach oben gekehrten Seite ſchwarze Punkte und an der Baſis befinden ſich 5 ſackförmige mit Nectar gefüllte Falten. Die 10 Staubfäden ſind einwärtsgebogen und aufſteigend, von ungleicher Länge, ſo daß die 3 längſten die Narbe erreichen, welche glatt und weiß, und ſo lang als die Blumenkrone iſt. Die bräunlich=gelben Staubbeutel ſitzen auf dem Rücken an; der Samenſtaub iſt weiß. Der eiförmige, weißfilzige, zehneckige Fruchtknoten iſt zehnfächerig und enthält viele ſehr kleine Eierchen. Der Griffel iſt glatt, weißlich, mit kopfförmiger, purpurrother Narbe. Die Blüthezeit fällt bei den in den Gewächshäuſern überwinterten Pflanzen an das Ende April und in den Mai. (Beſchluß folgt.)

Beſchreibung und Cultur einiger noch nicht allgemein bekannten und einiger neuen Zierpflanzen.

(Mitgetheilt von Hrn. J. W. Boſſe, Herzogl. Oldenburgiſchem Hofgärtner zu Oldenburg.) (Fortſetzung.)

15) Argemone Barclayiana Graham. Der Stengel und die Blätter dieſer neuen Species ſind mit abſtehenden weichen und ſpitzen Nadeln beſetzt. Die Blätter graugrün, mit weißen Rippen und Adern, halbgefiedert, länglich, mit dornig=gezähnten Einſchnitten. Die Blumen ſchön, blaßgelblich=weiß, etwa 2 1/2″ im Durchmeſſer groß. Das Vaterland kenne ich nicht. — Sie iſt jährig, blühet vom Juni bis Herbſt, und wird der Same hier im Anfang April's in's Miſtbeet geſäet; die jungen Pflanzen ſetze ich theils in Töpfe, theils im Mai ins freie Land.

16) Verbena melindres Lodd. Bot. Cab. Dieſe Art iſt in Hinſicht ihrer brennend=hochrothen, in kurzen, oben flachen Aehren ſtehenden Blüthen die ſchönſte ihrer Gattung, und ſowohl für das Zimmer und Glashaus, als auch vom Mai bis October für das freie Land, eine der vortrefflichſten Zierpflanzen. Der Stengel hat lange, ſchwache Aeſte, iſt kurz behaart und faſt ſtrauchartig. Die Blätter ſind lanzettförmig, zugeſpitzt, grob geſägt, an der Baſis faſt keilförmig, mit kurzen Härchen bekleidet, 1 1/2 — 2″ lang. Die Aehren am Ende der Aeſte. — Dieſe Pflanze iſt in Buenos=Ayres einheimiſch, und blüht vom Frühling bis Spätherbſt. — Man pflanzt ſie in fette, mit etwas Sand gemiſchte Miſtbeet= oder lockere Gartenerde, durchwintert ſie bei 4 — 6° Wärme, und hält ſie mäßig feucht. — Am ſchönſten blühet ſie, wenn man ſie im Mai in's Freie auf eine warme Rabatte oder auf ein kaltes Miſtbeet pflanzt; hier legen ſich die untern Zweige ſelbſt ab, wodurch ſie außer durch Stecklinge leicht vermehrt werden kann. (Fortſetzung folgt.)

Einiges über Acclimatiſirung und Behandlung der Heideerdepflanzen. (Fortſetzung.)

(Eingeſandt vom Hrn. Freiherrn von Pfeffenrath, Herzogl. Sächſ. Kammerherr zu Saalfeld.)

Dieſe faſt größtentheils ausländiſchen Pflanzen, ſind mehr oder weniger bei uns (in Frankreich) ſchon acclimatiſirt, oder doch fähig es zu werden, und trotzten bisher unſern kälteſten Wintern, wenn auch eine kleine Zahl derſelben einer leichten Bedeckung bedarf. Man findet damit angeſtellte Verſuche im Großen in unſern Parks und Zuchtgärten. Wir haben daher ſchon die Beweiſe vom Gelingen der Acclimatiſirung, und es iſt nur nöthig das zu vermehren, was bisher nur einzeln vorkam. Die höchſten Gebirge Europa's, die bis jetzt noch überſchwemmten Strecken des mitternächtlichen Amerika, die Ufer des Pontus Euxinus, die Bergwände des Kaukaſus, die Ebenen von Sibirien, die noch undurchdrungenen Gegenden des Nepaul, die unzugänglichen Provinzen China's, das Vorgebirge der guten Hoffnung ꝛc. ernähren herrliche Pflanzenmaſſen: und geſetzt auch, daß in ihren urſprünglichen Standorten eine offene freie Alpenlage ihnen eigen wäre, oder daß ſie eine feuchte Luft und ſumpfigen Torfboden vorziehen, gedeihen ſie bei uns doch am beſten an einer mitternächtlichen geſchützten Lage.

Dieſe große Pflanzenclaſſe beſteht aus majeſtätiſchen hohen Bäumen, dichten Sträuchen und niedrigen Stauden, von lebhafter Farbe. Alle dieſe Pflanzen eignen ſich zur Parkſcenerei: und man kann eben ſo große Pflanzengruppen mit ihnen bilden, als wie mit unſern Gebüſchen. Große Maſſen dieſer Pflanzen werden ſich mit dem beſten Erfolg an Gebüſche von Zierbäumen und Sträucher anlehnen, die man bei uns bisher zur Landſchaftsgärtnerei benutzte.

Denke man ſich einheimiſche und exotiſche Waldbäume zweckmäßig und ſchön gegen einander ſituirt und gruppirt, ſo werden dadurch ganz neue und herrliche Effecte hervorgebracht; bei Zuſammenſtellungen dieſer Art, wo Zierde, Reichthum, Lebhaftigkeit des Colorits, kräftige Schattirungen ſich mit den harten Tönen (Tinten?) des Bildes zweckmäßig vereinigen, ſo wird unfehlbar der Eindruck auf Auge und Seele gleichwürkend und gleich groß ſein. Hieraus kann man wohl ſchon ſchließen, welche ſchöne Parthieen ein wiſſenſchaftlicher Landſchaftsgärtner, durch zweckmäßige Benutzung der verſchiedenen Nuancen im Bau, in der Belaubung und im Colorit der Pflanzen ſchaffen, und welche Menge von Gegenſtänden eine reiche Natur ſeinem ſchöpferiſchen Pinſel verſchaffen kann. Auch könnte man mit Recht den Landſchaftsgärtner, Landſchaftsmaler nennen.

Die Pflanzen aber von denen hier die Rede, und die noch nicht lange erſt bei uns eingeführt ſind, beginnen jetzt erſt die Pflanzenbeete unſerer Handelsgärtner und Pflanzenliebhaber zu verlaſſen, um ſich mit den Scenen maleriſcher Anlagen zu vermiſchen, wo ſie doch nur in kleinen Gruppen oder gar einzeln ſituirt, als Seltenheiten vorkommen. Sie ſind theuer, weil ſie ſelten ſind, bis jetzt noch niemand daran dachte, ein großes Etabliſſement zu errichten, wo ſie ihrer Natur gemäß erzogen werden könnten. Auf dieſe Weiſe verhindert die Theuerung deren Produktion und Abſatz, während doch eine ſtärkere Conſumtion derſelben zu vielen Beobachtungen führen würde. (Fortſ. folgt.)

Einige erläuternde Bemerkungen über die Levkojen unter Hindeutung des Entſtehens der Füllung der Blumen.

Mitgetheilt von Hrn. Chriſt. Deegen aus Köſtritz.

Es hat wohl keine Pflanze ſich eines ſo allgemeinen und ſtets ſteigenden Beifalls einer langen Reihe von Jahren hindurch zu erfreuen gehabt, als dieſe, durch ihre Farben-Schönheit und Vielfältigkeit, Spendung eines vortrefflichen Wohlgeruchs und ziemlich leichte Cultur, allen Blumenfreunden gleich ſich empfehlende Gartenzierpflanze. Sie iſt eben ſo ein freundlicher und ergötzlicher Schmuck des kleinſten Fenſtergärtchens des ärmſten Dorfbewohners, welcher zur Erlangung einiger dergleichen Pflänzchen, gern ſeine mühſam errungenen Paar Dreier zum Gärtner in die nahe Stadt, oder des Ortes trägt, wenn ihm nur verſichert wird, einige gefüllte Blumen gebende darunter zu haben; ſo wie im prächtigſten Zier-Garten großer und reicher Beſitzer, welche die Quellen kennen oder aufſuchen, ſich Saamen mit den gewünſchten Eigenſchaften kommen laſſen, um ſich und andere Beſucher des Gartens an den Anblick und Geruch ganzer mit Levcojen beflanzter Beete oder Rabatten, zu erfreuen.

Die Reize und Annehmlichkeiten der Levcoje und der allgemeiner werdende Beifall, ingleichen, die häufigen Klagen vieler Levcojenfreunde über Mißgeſchick bei Aufbringung der Pflänzchen, verbunden mit der Dunkelheit über das Entſtehen der Stöcke mit gefüllten Blumen, gab ſchon ſeit vielen Jahren, Cultivateurs, ſpeculirenden und uneigennützigen Levcojenfreunden Veranlaſſung, ihre Cultur-Verſuche und die erlangten Reſultate, namentlich in Hinſicht der Erzielung ſolchen Saamens, welcher häufig Stöcke mit gefüllten Blumen bringt, in Schriften mitzutheilen. Davon habe ich geleſen, „Grotians Garten-Beluſtigung; Dreyßig und Claus über die Cultur der Levcojen. Theil's Levcoyen-Gärtner; Meſſers und Lechners Caſtration der Levcojen. — Ohnerachtet in den meiſten dieſer Schriften, hinſichtlich der Cultur, Erfahrungen niedergelegt ſind, ſo kann ich meiner Ueberzeugung nach, die Culturmethoden der Levkojen-Cultivateurs, Dreißig und Claus, als die allgemein anwendbarſte, zunächſt empfehlen und ebenſo denjenigen Dillettanten, die ein Vergnügen darinnen finden, ſich ihren wenigen Samenbedarf ſelbſt zu erziehen, dasjenige Verfahren guten Samen zu erlangen anrühmen, welches obige Herren Claus und Dreyßig in ihren Schriften vorgeſchlagen haben, inſofern örtliche Verhältniſſe, wie ſie weiter unten geſagt ſind, vereint mit wirken und unter der Vorausſetzung, daß der hierzu zu verwendendende Levkojen-Same die Eigenſchaft gefüllte Stöcke zu geben ſchon an ſich hat, und daher aus ſolchen Händen, welche derartigen Samen führen, entnommen und ſolcher alle 3 — 4 Jahre wiederholentlich angeſchafft und erneuert wird. (Fortſ. folgt.)

Bemerkungen über die Behandlung der Orangeriebäume in Töpfen.

(Vom Hrn. Hofgärtner J. Moos zu Weimar).

Welcher Blumenfreund hätte nicht gerne einige Orangenbäumchen unter ſeinen Topfgewächſen? Sieht man ein ſolches Bäumchen in geſundem Zuſtande mit Blüthen oder Früchten, ſo wird man durch die Lieblichkeit deſſelben bewogen, ſich dergleichen anzukaufen. Leider aber dauert die Freude in den meiſten Fällen nicht lange und gewöhnlich verlieren die Bäumchen mit den Blüthen und Früchten ihr geſundes Grün und ſtehen bald mit gelben Blättern zum Verdruß ihrer Beſitzer da. Hierdurch vergeht nun Manchem die Luſt dergleichen anzuziehen, meinend, daß ſich das Orangenbäumchen nicht für die Stubengärtnerei eigne; dem iſt aber nicht ſo, man behandele ſie nur auf folgende Art und ſie werden gewiß die darauf verwendete Mühe lohnen.

Ein Hauptbedürfniß um geſunde Orangenbäumchen zu erziehen iſt die dazu erforderliche Erde, welche man am beſten erhält, wenn man zwei Theile lehmige Raſenerde, einen Theil reinen Kuhdünger, einen Theil Lauberde und einen Theil Flußſand zuſammen ſetzt. Man muß ſich nothwendig dieſe Erde ſelbſt präpariren; denn ſich dergleichen aus großen Gärten zu verſchaffen, iſt ſehr mißlich, weil der Gärtner, der eine gute Erde beſitzt, ſie auch gegen Bezahlung nicht gerne abgibt; oft aber iſt auch der Gärtner mit den Beſtandtheilen ſeiner Erde ſelbſt nicht bekannt.

Die Erde muß vor dem Gebrauch erſt einige Jahre alt und auch in dieſer Zeit oft umgeſetzt ſein.

(Fortſetzung folgt.)

Syſtematiſche Namen der merkwürdigſten Pflanzen-Gattungen und Arten, ihr Genitiv ꝛc.

Mitgetheilt von L. aus T.

(Fortſetzung.)

Alaternoīdes (Clutia) L. Schmalblättrige Clutie.

Von dem unten beſchriebenen Alaternus und εἶδος, εος, τὸ, die Geſtalt, das Anſehen. Dieſes griechiſche Wort bildet mit ſehr vielen Nennwörtern neue Beiwörter, welche eine Aehnlichkeit mit dem durch das Nennwort ausgedrückten Gegenſtande anzeigen. Obiger Pflanzenname bezeichnet alſo eine Clutie, welche mit dem Alaternus Aehnlichkeit hat. Die Penult. iſt nicht kurz, ſondern lang und zwar wegen des Diphthongs ει, analogiſch wie θεοειδὴς, corsoīdes, dendroīdes.

Uebrigens wird auch die Aehnlichkeit bezeichnet mit ago, ἀντὶ, elus, ἶσος, ὅμοιος, ὄψις und ψευδῶς.

Alaternus (Rhamnus) L. i. foem. Immergrüner Wegdorn, Steinlinde.

Dieſes Wort wird gewöhnlich abgeleitet von alternus, a, um, wechſelweiſe ſtehend, weil die ſchönen, immergrünen Blätter ſo beſchaffen ſind. Steinlinde heißt dieſer Strauch wegen der Aehnlichkeit ihrer Blätter mit denen der Linde. Die Benennung Wegdorn hingegen bezieht ſich eigentlich auf den R. catharticus L. den Kreuzdorn, welcher mit Dornen verſehen iſt und an Wegen, auch Zäunen wild wächſt, denn R. Alaternus iſt ohne Dornen. Fortſ. folgt.)

Aus der Revue horticole.

Neue oder wenig bekannte Pflanzen.

Begonia incarnata. P. II.

Unter dieſem Namen kultivirt man eine ſchöne Begonie, die in Braſilien einheimiſch ſein ſoll, im Pflanzen-Garten zu Paris. Sie treibt mehrere buſchige Stengel, welche kleinfingerdick, dickfleiſchig, brüchig, an den Gelenken angeſchwollen, glatt, braunröthlich und 2 — 4 Fuß hoch ſind, die man aber bis zu ihrer Blüthezeit kaum ohne Schaden aufrecht erhalten kann. Die Blätter ſind 3 — 4 Zoll lang, länglich-lanzettförmig, zugeſpitzt, an den Rändern gewimpert, ungleich gezähnt, die jungen Blätter oberhalb haarig, auf beiden Flächen glänzend und außerordentlich ſchief, d. h. der eine ihrer beiden Halbdurchmeſſer iſt viel länger und weniger breit als der andere, was übrigens auch bei den meiſten andern Begonien beobachtet wird. Der Stiel iſt walzenförmig, 2 Zoll lang, mit lanzettförmigen, abfallenden Stützen verſehen. Die Blüthen ſind zart roſa- oder fleiſchfarbig, groß und zahlreich, in weiten Trauben an der Spitze der Zweige und in den Winkeln der obern Blätter ſtehend. Sie halten ſich lange Zeit bis in den Herbſt, und dauern gewiß auch den Winter hindurch, wenn man die Pflanze im Warmhauſe in Heideerde oder andrer ſandiger Erde, ſparſam befeuchtet hält. Ihre Vermehrung durch Stecklinge erfolgt ſo leicht, daß es unnöthig iſt, noch davon zu ſprechen.

Neue Cacteen.

Epiphyllum Ackermanni Haw.

Eine ſehr ſchöne Art, ähnlich dem Epiphyll. speciosum (Cactus speciosus), von welchem ſie ſich durch die prächtigen ſcharlachrothen Blüthen unterſcheidet, die eben ſo groß ſind, wie beim Cereus speciosissimus. Sie war durch Hr. Ackermann von Mexiko nach London geſchickt worden, blühte zuerſt bei Hr. Tate, und war in dem Botanical Register, im Juni 1830 von Hr. Haworth beſchrieben und abgebildet worden, aber die Abbildung ſtellt bei Weitem nicht die Geſtalt, den Glanz und die Größe der Blüthe dar. In Paris beſitzt ſie Hr. Lemon noch einzig und allein, aber er hat ſie ſchon dergeſtalt vermehrt, daß er einer großen Anzahl Liebhaber Exemplare ablaſſen kann. Seit dem 18ten April hatte er mehrere davon in Blüthe und wahrſcheinlich hat noch ein großer Theil während des Sommers geblüht.

Die Stengel ſind flach oder blätterartig, 12 bis 18 Zoll lang, 2 Zoll breit, ſtumpf, an den Rändern mit großen ſägeförmigen Zähnen, aus deren Winkelabſchnitten die Sproſſen oder Blüthen hervorkommen. Der Fruchtknoten iſt glatt, winklich, länglich, mit abſtehenden rothen Schuppen beſetzt. Das Blumenrohr iſt gleichfalls mit rothen Schuppen bedeckt, die um ſo viel größer, als ſie mehr aufwärts gerichtet ſind, es wird 4 bis 5 Zoll lang und erweitert ſich endlich in 25 bis 30 länglich-lanzettförmige, ſtachelſpitzige Abſchnitte von ſchön ſcharlachrother Farbe.

Die Staubgefäße ſind in verſchiedener Höhe in dem Blumenrohre angeheftet und neigen ſich auf die untern Blumenblätter, die Fäden ſind am Grunde weiß, gegen die Spitzen roth; die Staubbeutel ſind purpurviolett und ſpäter mit weißlichem Staube bedeckt, wodurch ſie einen roſafarbenen Teint erhalten. Der Griffel, gleichfalls roth, endigt ſich in 8 oder 10 fadenförmigen Narben. Die Frucht dieſer ſchönen Blume habe ich noch nicht geſehen, aber nach Hr. Harworth's Angabe, hat ſie die Größe eines Taubeneies, iſt glatt und dunkel purpur glänzend. Die Cactus-Freunde mußten es Hr. Lemon Dank wiſſen, daß er dieſe ſchöne Pflanze in Frankreich eingeführt und für den Handel hinreichend vermehrt hat. Man kultivirt ſie leicht im mäßig warmen Glaßhauſe.

Epiphyllum articulatum Dec. Cactus alatus Sw.

Dieſe Art iſt bei Weitem nicht ſo ſchön als Epiph. Ackermanni und verdient kaum einen Platz in den Sammlungen der Cactus-Freunde. Ihr Stengel beſteht aus blätterartigen Gelenken, die 3 bis 4 Zoll lang, 2 Zoll breit und an den Rändern ausgezackt ſind; aus dieſen Zacken kommen die kleinen, weiß-gelblichen, flachen, nur 9 bis 10 Linien breiten Blüthen hervor. Nach Swartz iſt die Frucht eine kleine ſchwarze Beere. Dieſe Pflanze iſt in Jamaika einheimiſch, verlangt bei uns einen Stand im Warmhauſe. Sie blühte im Pflanzengarten im Monate März. In England wird ſie ſeit 1818 kultivirt.

Rhipsalis grandiflorus Hort. Brit. Caotus funalis S. S.

Alle Arten der Gattung Rhipsalis haben walzenförmige, gelenkartige Stengel, bei einigen dünner als eine Schreibefeder, bei andern ſtärker als ein kleiner Finger, hängend oder ausgeſchweift. Dieſe Art iſt eine von denen, welche die ſtärkſten Stengel haben und ſich am beſten aufrecht halten. Aus den obern Theilen derſelben kommen die ſeitenſtändigen, einzelnſtehenden, weißen, 8 bis 9 Linien breiten, ſehr zahlreichen Blüthen hervor, die nicht aller Pracht ermangeln. Sie iſt dem Pflanzengarten durch den Prinz Salm-Dyk überſandt worden, und blühte im letztvergangnen März. Ihr Vaterland iſt mir unbekannt; man hält ſie im Warmhauſe. (Fortſetzung folgt.)

Methode die Blumen-Knollen und Zwiebeln auf den Rabatten in den Gärten zu pflanzen und zu ſchützen.

(Von M. W. Semour.)

Nachdem die Plätze auf den Rabatten für jeden Knollen oder für jede Zwiebel beſtimmt ſind, entfernt man daſelbſt die Erde ungefähr 6 Zoll tief, und erſetzt dieſe durch andre gute, für dieſe Pflanzen geeignete Blumenerde. Man nimmt nun Ringe von gebranntem Thon, die 3 bis 4 Zoll hoch, und dem obern Theile eines Blumentopfs ähnlich ſind; *) von dieſen gebraucht man für jede Pflanze einen, und ſenkt ihn ſo tief ein, daß die Erde 2 Zoll hoch darüber geht; dann füllt man den Ring mit der obengenannten guten Erde und pflanzt in dieſe die Knollen oder Blumenzwiebeln ein.

Bei dieſer Methode ſind die Knollen und Blumenzwiebeln vor den zufälligen Verletzungen durch die Handwerkzeuge der Gärtner (Spaten, Hacke, Harke, geſichert; die gute Blumenerde vermiſcht ſich nicht mit der auſſerhalb des thönernen Rings befindlichen gewöhnlichen Gartenerde; die Blumenzwiebeln verlieren ſich nicht, man findet ſie ſehr leicht, wenn auch ihre Blätter und Stengel verwelkt und abgefallen ſind, wenn man ſie aufnehmen und verpflanzen will.

Dieß Verfahren iſt gerade nicht mehr neu, ich habe es in mehrern kleinen Gärten in Frankreich in Anwendung bringen ſehen, aber es verdient allgemein verbreitet zu werden.

Varietäten.

Oldenburg. (Anzeige für Blumenfreunde.) Im Großherzogl. Schloßgarten hieſelbſt iſt eine anſehnliche Auswahl der ſchönſten, theils neueſten, Topfgewächſe und Landblumen (als Roſen, gefüllten Georginen, Anemonen, Ranunkeln, Blumenzwiebeln, Stauden, neue prachtvolle Amaryllis-Baſtarde und dergl. mehr), ſo wie auch alle Arten (viele neue) der ſchönſten, ächten und friſchen, Blumenſämereien gegen baare Zahlung oder ſichere Zahlungs-Anweiſung zu haben. Die Cataloge darüber für 1833 ſind auf frankirte Briefe gratis bei Unterzeichnetem zu haben.

J. Boſſe Großherzogl. Hofgärtner.

Der Cactus der Alten iſt eine ganz andere Pflanze, als welche wir jetzt mit dieſem Namen belegen. Bei Theophraſt wird damit eine dornige Pflanze aus Sicilien bezeichnet, man glaubt die Artiſchoke. Man wählte nur, nachdem man die Pflanzengattung, welche jetzt den Namen Cactus führt, in Amerika aufgefunden hatte, der damaligen Sitte gemäß, einen Namen aus den alten Schriftſtellern für dieſelbe; ſo wie man eben daher auch den Namen Opuntia entlehnte, den Plinius einer Pflanze giebt, von welcher er als ſehr auffallend bemerkt, daß unmittelbar aus dem Blatt die Wurzel ſich bilde und ſo die Pflanze entſtehe, eine Beſchreibung, die weit genauer auf Bryophyllum calycinum, als auf eine Cactusart paßt.

Der Königl. botaniſche Garten zu Neapel unter Tenorês Direction enthält meiſtens nur neapolitaniſche Gewächſe, und iſt nur in dieſer Ruckſicht dem Botaniker wichtig. Das Klima zu Neapel gehört keineswegs zu dem günſtigen für den Gartenbau. Plötzlich kommt im Herbſt ſtarker Froſt von den hohen Appenninen, und tödtet alle zärtlichen Gewächſe, welche ſich im Freien befinden; im Jahre 1828 waren alle großen und ſtarken Orangenbäume bei Sorrento erfroren.

Der Garten zu Padua. einer der älteſten in Europa, iſt merkwürdig durch die Größe der Stämme ausländiſcher Bäume, worin ihn kein anderer übertrifft.

Als Mittel gegen Inſekten auf Topfgewächſen und gegen Würmer in Blumentöpfen wird ein Aufguß von kochendem Waſſer auf friſche Wallnußblätter empfohlen, der erkaltet angewendet wird und zugleich als Düngmittel wirkt.

Ein reicher Bierbrauer zu London, Namens Barclaey der im November 1831 geſtorben iſt, beſaß zu Bury Hill bei London einen vortrefflichen botaniſchen Garten voll der ſeltenſten Gewächſe und beſonders ausgezeichnet durch viele Madagascar-Pflanzen.

Hierbei zwei Beilagen, und zwar: 1) von Hrn. Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt und Hrn. Friedrich Rauſche in Tonndorf. — 2) Preisverzeichniſſe von Hrn. Chriſtian Deegen zu Koſtritz.

---

*) Ziemlich weite Blumentöpfe ohne Boden leiſten die nehmlichen Dienſte. Zum Schutz und zum leichtern Auffinden guter Blumenzwiebeln und Knollen auf den Rabatten, z. B. von Fritillaria imperialis fl. sulphureo, — fol. argent., etc., habe ich dieß Verfahren ſchon ſeit längerer Zeit angewendet. Anmerkg. des Ueberſetzers.

Beilage zu Nro. 1. der Blumenzeitung 1833.

Das neue Gemüſe- und Blumen-Samen-Verzeichniß für 1833 liegt zur Ausgabe bereit. Daſſelbe enthält 1136 verſchiedene Samen und Sortiments. Unter den Gemüſeſamen dürfte der ſchwarze Blumenkohl aus Sicilien noch am wenigſten bekannt u. verbreitet ſein, er iſt leicht zu cultiviren, gut von Geſchmack und ſeine dunkle Farbe verwandelt ſich beim Abbrühen in eine ſchöne grüne; das Loth hiervon koſtet 1 Rß., es werden aber auch 1/2 und 1/4 Lothe abgegeben.

Bei den Blumenſamen befinden ſich abermals viele neue und ſchöne, zum Theil wirklich prachtvolle Sommergewächſe, Stauden und Topfpflanzen, unter denen ich nur folgende nenne:

A. ⊙ Sommergewächſe oder einjährige Pflanzen.

Ageratum mexicanum, blaues Ageratum, eine ſehr hübſche und zierende Pflanze, welche bis Ende October blüht, à Priſe 3 gr.
Beta brasiliensis, braſilianiſcher Mangold in 3 Sorten, mit ſcharlachrothen, carmeiſin und goldgelben bemalten Blättern à Sorte 2 gr. (Die Samen hiervon werden ins freie Land gelegt und die Pflanzen gegen den Herbſt in Töpfe geſetzt.)
Centaurea americana, amerikaniſche Flockenblume, großblumig, ſelten und ſchön, 4 gr.
Elychrisum bracteatum, flor. albo, glänzende Strohblume mit weißen Blumen, eine ganz neue prächtige Erſcheinung, 6 gr.
Impatiens Balsamina, neue engl. rothe 1/2 Fuß hohe Zwerg-Balſaminen, ſehr gefüllt und ſchön, 10 Körner 6 gr.
Chrysanthemum carinatum, Varietät mit gelben Blumen, ſchön, 2 gr.
Lupinus mutabilis, veränderliche Lupine, blau, weiß und gelb, prachtvoll, 3 Körner 4 gr.
Senecio elegans, flor. pleno atropurpureo, ſchwarzrothgefülltes Kreuzkraut, ſehr ſchön, 3 gr.
Trachymene coerulea, blaue Trachymene, prachtvolle Doldenblume, 6 gr.
Zinnia elegans, ſchöne Zinnie mit blaßrothen Blumen, 2 gr.
„ „ „ „ mit dunkelrothen Blumen, 2 gr.
„ „ „ „ mit ganz weißen Blumen, neu, 4 gr.
„ „ „ „ mit brennend ſcharlachrothen Blumen, eine der herrlichſten Sommerblumen, 6 gr.

B. ♃ Perennirende Blumenſamen.

Amöbium alatum, geflügelte Amöbie, neue Immortelle, 3 gr.
Campanula tomentosa, filzige Glockenblume, ſehr ſchön, 3 gr.
Chelone barbata, bärtige Schildblume, 2 gr.
Corthusa Mathioli, europäiſche Corthuſe, 3 gr. (Zwei alte aber noch immer ſehr ſchöne Zierden.)
Delphinium bicolor, zweifarbiger Ritterſporn, ſehr ſchön, 3 gr.
„ grandiflorum flor. albo, großblumiger, weißer Ritterſporn, 4 gr. (Beide neu und ſehr ſchön.)
Escholtzia californica, Eſcholtzie aus Californien, eine der prachtvollſten Stauden, blüht auch im erſten Jahre aus Samen, 4 gr.
Lathyrus latifolius, flor. albo, weißblühende Bouquetwicke, neu und ſchön, 4 gr.
Penstemon elegans, ſchöne Bartfaden, 3 gr.
Penstemum atropurpurpureum, dunkelrother Bartfaden, ſehr hübſch, 2 gr.
Primula cortusoides, ſchönſte Primel, 3 gr.
Pulmonaria paniculata, rispentragendes Lungenkraut, ſehr ſchön, 4 gr.

C. Topf-Gewächſe.

♄ K Andromeda buxifolia, buxbaumblättrige Andromede, ſeltene und prachtvolle Pflanze, 12 gr.
♃ W Calandrinia grandiflora, großblumige Calandrinie, neu und ſchön, kann auch ins Freie gepflanzt werden, 4 gr.

♄ K Calceolaria arachnoidea, überſponnene Pantoffelblume, purpurviolett, prachtvoll, 8 gr.
„ bicolor, zweifarbige, weiß mit gelb und großblumig, 10 gr.
♃ „ tricolor, dreifarbige, gelb, braun und violett, ſelten und einzig ſchön, 12 gr.
♃ Cactus Echinocactus Ottonis, ſchöne kugelförmige Fackeldiſtel mit großer Blume, 6 gr.
♃ Campanula pyramidalis, flor. albo, weiße pyramidenförmige Glockenblume, ganz neu und ſehr ſchön, 4 gr.
⊙ Celosia pyramidalis, Pyramiden-Hahnenkamm, alle Blumenzweige proliſiren, ſehen dann moosartig aus, und gewähren einen prächtigen Anblick, 4 gr.
♄ K Eccremocarpus scaber, rauhe Hängefrucht, eine ſehr ſchöne Schlingpflanze aus China, 4 gr.
♄ K Maurandia Barkleyana, Barkley's neue großblumige Maurandie, prachtvoll, 4 gr.
♄ Hablitzia tamnoides, eine 15 Fuß hohe rankende Pflanze, 4 gr.
⊙ Nemophylla phaceloides, bohnenartige Nemophylle, neu und ſchön, 3 gr.
♄ K Nicotiana glauca, graugrüner Tabak aus Chili, empfiehlt ſich ſowohl durch ſeinen herrlichen Wuchs als auch durch ſeine Blüthe, 3 gr.
⊙♂ Salpiglossis atropurpurea, ſchwarzbrauner Salpigloſſis, 6 gr.
„ picta, bemalte, 6 gr.
„ staminea flor. albo, 3 gr.
(Drei prachtvolle und ſehr zierende Sommergewächſe, bei guter Pflege laſſen ſie ſich auch überwintern.)
♃♄ Lophospermum scandens, eine dem Eccrocarpus ähnliche, ſehr prachtvolle Kletterpflanze, 6 gr.
♄ K Pultenea cuneata, ſehr hübſch, 3 gr.
⊙ Nolana atriplicifolia, meldenblättrige Schellenblume, neu und ſchön, 4 gr.

Das vorerwähnte Verzeichniß ſteht jedem Gartenfreund gratis, ſo wie die hier bemerkten Blumenſamen für beigeſetzte Preiſe zu Dienſten.

Erfurt, im Dezember 1832.

Friedrich Adolph Haage jun.

An Blumenfreunde.

Meine Verzeichniſſe vom Jahr 1832 ſind noch gültig für das Jahr 1833, und bemerke ich dabei nur noch, daß ich nunmehr in den Stand geſetzt bin, von meinen Sommerlevkojen-Samen, viertel, halbe und ganze Lothe ablaſſen zu können und zwar das Loth zu 2 Rß 15 Sgr. (12 ggr.) Preuß. Courant, melirt à Loth 10 Sgr (8 ggr.) Er beſteht in 17 Sorten engliſch, 13 Sorten engliſch mit Lackblatt, 15 Sorten halbengliſch, 4 Sorten halbengliſch mit Lackblatt. 18 Sorten Aſtern à Loth 1 Rß 15 Sgr (12 ggr.), 5 Sorten Zwerg-Aſtern, 1000 Körner 20 Sgr (16 ggr.), als blaßroth mit weiß, mit blaßrothem Band, dunkelroth mit weißem Rand, dunkelroth.

Blumen- und Gartenfreunde, welche mich auf dieſe hier vorſtehende Sämerei mit Ihren gütigen Aufträgen beehren, bitte ich die Beſtellung ſo bald wie möglich franco einzuſenden. Die Aechtheit und Güte des Samens kann ich einem jeden verſichern.

Um deutliche Unterſchriften und Angabe des Wohnorts wird höflichſt noch gebeten.

Tonndorf bei Weimar, am 4. Januar 1833.

Friedrich Rauſche, Handelsgärtner.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto-Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. II. Weißenſee, (in Thüringen). Januar 1833. VI. Jahrg.

Der Durchlauchtigſten Herzogin und Frau, Frau Maria, Hoheit, Herzogin von Sachſen-Coburg und Gotha, zur Feyer des Höchſten Einzugs in Gotha, in tiefſter Ehrfurcht überreicht von dem thüringer Gartenbau-Vereine zu Gotha. (31. Dezember 1832.)

Ein Garten auf des Südens Wunderflur,
Ein Garten in der Mythe frühen Tagen
Hat goldne Heſperidenfrucht getragen
Und bot ſie dar der holden Schönheit nur.

Doch in des Nordens rauherer Natur
Sind wir entfremdet jenen heitern Sagen,
Und unſre Blumen, unſre Bäume ragen
Nur auf des Fleißes, auf der Mühe Spur!

Und die wir längſt ſchon **Deiner** Ankunft harrten,
Wir reichen **Dir** aus vaterländ'ſchem Garten
Nur bleiche Aepfel, die wir ſorglich warten.

Das Beſte, **Fürſtin**, werde **Dir**, der Holden —
Doch golden hier ſind Früchte nur u. Dolden,
Wenn ſchöne Morgenröthen ſie vergolden!

Wir bringen nichts vom Lande der Garonne
Und von Italiens ewiggrünem Hain,
Und nichts von jenen Hügeln dort am Rhein,
Wo Traubenblut durchglüht des Winzers Tonne.

Doch, Herrin, laß an Deines Blickes Wonne
Die armen Heimathäpfel ſich erfreun
Und ihrer Pfleger emſigen Verein: —
Und ſchön ſind dann die Früchte unſrer Sonne!

Ein Garten Dir und Deinem hohen Gatten
Mit Sonne, Duft und Frucht und grünem Schatten,
Blüh' hier **Dein** Lebensgang auf Blumenmatten! —

Und lange ſtrahl' in **Deinem** Heiligthume
Mit **Deiner** Frauentugend edlem Ruhme
Du ſelbſt uns eine königliche Blume!

Beſchreibung und Cultur einiger noch nicht allgemein bekannten und einiger neuen Zierpflanzen.

(Mitgetheilt von Hrn. J. W. Boſſe, Herzogl. Oldenburgiſchem Hofgärtner zu Oldenburg.) (Fortſetzung.)

17) Calceolaria arachnoidea Lodd. Bot. Cab. Die ſpinnwebenartige Pantoffelblume gehört zu den ſchönſten der bis jetzt bekannten Arten. Der 2 — 3′ hohe, äſtige ſtrauchartige Stengel iſt gleich den Blättern mit einer weißen, wolligen Bekleidung, gleichſam wie mit einem dichten Spinnengewebe, verſehen. Die Blätter ſind ſtiellos, am Stengel aufrecht, verkehrt eirund-länglich, bis zur Baſis hin allmählich ſtark geſchmälert, ſtumpf, theils undeutlich gezähnelt, meiſtens ganzrandig, 2 — 3′′ lang. Die ſchönen dunkelvioletten (der äußern Form nach einem Spinnenkörper nicht unähnlichen) Blumen erſcheinen in langſtieligen End-Afterdolden im Juni und Juli. — Man pflanzt ſie in ſandgemiſchte, nahrhafte Lauberde oder Miſtbeeterde, in keinen ſehr großen Topf, legt auf den Boden des Topfes einen halben Zoll hoch groben Kies, durchwintert ſie im Zimmer oder Glashauſe bei 6 — 8° Wärme und giebt ihr im Winter ſehr mäßig Waſſer, im Frühlinge aber reichliche Luft. — Sie iſt übrigens keinesweges ſehr zärtlich, und gedeihet vortrefflich im freien Lande, wenn man ſie, wie Verbena melindres, zu Ende Mai oder Anfangs Juni dahin verpflanzt; auch macht ſie hier viele Seitenzweige, durch welche man ſie im Juli ſehr leicht noch vervielfältigen kann. Sie blühet im Freien auch zum zweitenmale, wenn man die erſten Blüthenſtengel (die indeß oft reifen Samen liefern, den man im April in's warme Miſtbeet und in den Topf ſäen kann) nach dem Verblühen gekürzt hat. (Fortſetzung folgt.)

Einiges über Acclimatiſirung und Behandlung der Heideerdepflanzen. (Fortſetzung.)

(Eingeſandt vom Hrn. Freiherrn von Pfeffenrath, Herzogl. Sächſ. Kammerherrn zu Saalfeld.)

Ein 2tes Hinderniß, das ſich der Vermehrung dieſer großen Pflanzenklaſſe entgegenſtellt, iſt der Mangel an Heideerde, um im Großen ſolche Anlagen vornehmen zu können; jedoch iſt dieſes kein abſolutes Hinderniß, ſondern hängt nur von Localitäten ab, als: die zu große Entfernung des Terrains, wo ſolche in Menge zu finden iſt, theils von dem Boden ſelbſt, in den man pflanzen will. Die beſte Heideerde iſt die, welche ſich in ſandigen Gründen bildet, am Abhang leicht bewachsner Bergwände, wo die Heidepflanze vorherrſchend iſt.

Die langſame Zerſetzung der Blätter von der Erica vulgaris, und die noch langſamere Zerſtörung ihrer zahlreichen verwachſenen Aeſte, die theils verfaulen oder verkohlen, ohne ſich leicht zu zertheilen, bilden eine ſchwammige, elaſtiſche ſich weich anfühlende Maſſe, welche lange das Waſſer in ihren kleinſten Theilchen (Molecules) hält, für die es eine leichte Anziehung hat, und durch die feinſte Verwachſung dringt. Wenn dieſe Erde gut verarbeitet und bereitet wird, eignet ſie ſich beſonders zuträglich zum Keimen der Samen und zur Entwickelung der Pflanzen, theils weil ſie die Feuchtigkeit leicht annimmt und hält, theils als Wärme-Halter und wegen ihrer reichen Quantität Humus. Im Großen angewendet, zeigt ſie erſt recht ihre Vortheile. Man bereitet zu großen Anlagen einen eignen Boden aus ihr, der in Gruben von beliebiger Ausdehnung von 2 Fuß Tiefe eingelegt wird. (Fortſ. folgt.)

Einige erläuternde Bemerkungen über die Levkojen unter Hindeutung des Entſtehens der Füllung der Blumen. (Forſetzung.)

Mitgetheilt von Hrn. Chriſt. Deegen aus Köſtritz.

Als eifriger Blumenfreund wird man leicht darauf hingeführt, anzunehmen daß die widernatürliche Bildung einer Pflanze — hier die Füllung der Blumen — auch von ſonderbaren oder widernatürlichen Wirkungen entſtanden ſein müſſe. — Und ſo ſind muthmaßlich, durch dieſe Idee und durch örtliche Verhältniſſe, welche auf die Erzeugung vorzüglichen Levcojen-Samens zufällig günſtigen Einfluß hatten, auch die Herren Meſſer und Lechner verleitet worden, die Caſtration der Levcojen-Blüthen zu empfehlen, um dadurch Samen zu erlangen, welcher blos Stöcke mit gefüllten Blumen geben ſollte. Aus meinen ſeit 18 Jahren unternommenen mannichfaltigen Cultur-Verſuchen, iſt mir die Ueberzeugung geworden, daß die Füllung der Blumen durch Caſtration der Blüthen nicht erlangt wird. Das von Lechner ſpäterhin vorgeſchlagene Ringeln der Levcojen-Stöcke oder Aeſte, iſt reiner Unſinn. —

Die Füllung entſteht aus vorſchreitender Cultur im Einklang der darauf im Verhältniß günſtig wirkenden Elemente, als: Erde, Waſſer, Wärme, Standort, auf dem natürlichſten Wege.

Da, wo dieſe Verhältniſſe günſtig vorhanden ſind, wird es dem aufmerkſamen Blumenfreund leicht werden, den beſten Levcojenſamen alljährlich und vieljährig hintereinander ächt zu erziehen und unter ſolchen Verhältniſſen genießt auch der, mit der Cultur zu Erlangung guten Samens noch ganz Unbekannte öfters den Vorzug, ausgezeichneten Samen in freiem Lande, ſo wie in Töpfen gleich ächt, zu erhalten.

Da, wo ſie theilweis fehlen, wird der Erfolg ſtets unſicher ſein, und wo ſie ganz abgehen, oder entgegen ſind, wird es der Kenntniß oder der Kunſt ſchwerlich gelingen ein erfreuliches Reſultat herbeizuführen.

Bei der erzielten Vervielfältigung ſchöner Sorten und Farben gewinnen auch die Herbſt- oder Spätſommer-Levcojen allgemeinere Aufnahme, um ſo mehr, als ſie zur Nachflor der Sommer-Levcojen bei gleichzeitiger Ausſaat mit denſelben, nicht nur benutzt werden können, wo ſie vom Auguſt an bis der Winter alle Gartenfreuden endet, durch ihre größern meiſt ſchöngebauten, vielzweigigen und dennoch niedrigen Stöcke eine wahre Zierde ſind, und zum Abſchneiden für die Blumenvaſen einen unerſchöpflichen Reichthum gewähren, zu einer Zeit, wo ſchon manche Lieblingspflanze ihr Daſein geendet; ſondern ſie gewährten auch bei einer ſpätern Ausſaat im Monat Mai und dann verpflanzt „behandelt“ und zur Zeit in Blumentöpfe eingeſetzt, wie Winterlevcojen, eine vortreffliche, unausgeſetzte Winter- und Frühjahrsflor im kalten Hauſe, wie im Stubengarten. (Beſchluß folgt.)

Ueber die Anzucht hochſtämmiger Roſen.

(Mitgetheilt vom Hrn. Ludwig Donauer, Herz. S. Cobg. Goth. Fürſtl. Thurn u. Tax. Poſtmeiſter in Coburg.)

In Nro. 26 der Blumenzeitung v. J. unter der Rubrik „Ueber die Anzucht hochſtämmiger Roſen in Töpfen“ geſchieht der, für alle Roſenfreunde höchſt intereſſanten Abhandlung des K. Cammerherrn Herrn Grafen von Hagen auf Möckern über Roſen-Cultur, insbeſondere, über den günſtigen Erfolg einer ungemein raſchen Methode der Anzucht hochſtämmiger Roſenſtöcke in Töpfen, mit vollem Recht ehrenvolle Erwähnung und wird zugleich bemerkt, ob dieß Verfahren auch bey den Garten-Roſen anwendbar ſey? Darüber mangeln noch Erfahrungen.

Durch die Preuß. Staatszeitung, welche den Auszug der Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den K. Pr. Staaten 16te Lieferung S. 121, enthielt, auf obige Abhandlung aufmerkſam gemacht, wagte ich es, mich ſogleich an Herrn Grafen von Hagen zu wenden, und mir von ihm einige nähere Angaben über dieſes Verfahren zu erbitten, worauf mir derſelbe mit der größten Loyalität und zuvorkommendſten Güte, die Abſchrift ſeines Berichts an den Gartenbau-Verein in Berlin mitzutheilen geruhte.

In Ermangelung eines eigenen Gewächshauſes theilte ich dieſen höchſt intereſſanten Bericht, einigen, für neue Erfindungen und Fortſchreitung der Kunſt empfänglichen Gärtnern mit, und hatte das Vergnügen, in dem Garten des Herrn Cammerherrn und Regierungsraths v. Erffa zu Ahorn, durch den fleißigen und geſchickten Gärtner Brückner, obiges Verfahren, als höchſt empfehlenswerth, ſchnell ausgeführt zu ſehen.

Mit den Garten-Roſen machte ich aber ſelbſt in den Jahren 1831 und 1832 viele Verſuche, welche über alles Erwarten belohnend ausfielen.

Ich wählte aber zur Unterlage, wegen den bereits bemerkten Urſachen weniger die wilden Hambutten Rosa canina *) ſondern meiſtens die Frankfurter Roſe Rosa Frankfurtensis **) und die Mai-Roſe, Rosa majalis ***) auch Zimmt-Roſe, welche beide ſehr ſchöne hohe einjährige Triebe machen, und vorzüglich letztere eine ſaftige Rinde hat. Auf dieſe ſetzte ich in der Mitte bis Ende März die Reiſer von der Prinsecse Charlotte, Blondine, Great Mogul, Light purple, favorite purple, Carmine brillante, ſämmtliche Roſen aus Claremont, ferner: Rosa unica, Rosa grande Pompadour, Rosa amoena, Rosa Mahecka, Rosa holoseric. nigricans, dann einfache und gefüllte Moos-Roſen; welche alle im nämlichen Jahre, und zum Theil mit viel ſchöneren und größern Blumen, als am Mutterſtock blühten. Von einem ſchönen Exempl. R. unica, welches ich aus der bekannten vorzüglichen Roſen-Sammlung des Herrn Hofgärtner Wimmer in Schlitz bei Fulda nebſt mehreren Sorten Theae erhielt, wurden alle Reiſer, welche beim Einſchneiden abfielen, zur Veredlung benutzt und mehrere erfreuten mich mit 10 — 15, eines ſogar mit 21 herrlichen Blumen, wovon ſich die Mitglieder des hieſigen Garten-Vereins mit Vergnügen überzeugten. (Beſchluß folgt.)

---

*) vid Roessig Bd. 1. 5tes Heft Tab. 21.

**) vid „ „ Bd. 1. 3tes Heft Tab. 11.

***) ibid. „ „ Bd. 1 1tes Heft Tab. 3.

Beſtimmung und Eintheilung der pimpinellblättrigen Roſen. *)

Rosa pimpinellifolia. Linné. R. spinosissima. Lindley. R. scotica. Miller. R. borealis. Trattnick. R. collina. Schrank. Pimpinellblättrige Roſe.

(Die Kelchzipfel einfach und kurz; die Afterblätter blattſtändig; die Griffel frei; die Stengel 2 bis 4 Fuß hoch, mit einer Menge ſteifer, grader Stacheln, von ungleicher Länge beſetzt; die Stacheln an den ältern Zweigen abfallend; die Blättchen glatt; die Blumen ſtehen einzeln.)

Stengel: niedrig mit kriechenden Wurzeln, kurze ſteife Aeſte.

Stacheln: dichtſtehend, ungleichlang, grade, zuweilen gebogen, ſelten keine. Auf den ältern Zweigen gewöhnlich abfallend.

Blätter: naheſtehend, unbehaart, mit gewöhnlich 7 ebenen, faſt runden, glatten, einfach gezähnten, kleinen Blättchen.

Blattſtiel: glatt oder ſeidehaarig, ſtachlich.

Afterblätter: blattſtändig bleibend.

Blumenſtand: meiſtens einzeln. **Blumenſtiel:** nackt, ſeidig oder drüſig, ohne Deckblätter. **Fruchtknoten:** eiförmig oder rund. **Kelchzipfel:** ungetheilt, kurz. **Blumenkrone:** taſſenförmig, nicht groß. **Griffel:** frei. **Vaterland:** England und Schottland. Faſt allgemein verbreitet. **Stand und Pflege:** freies Land, ohne Schutz, ſonniger Stand. Vermehrt ſich durch Wurzelſchoſſe. **Blüthezeit:** Juni. **Bemerkungen:** Dieſe Claſſe hat zu vielen Synonymen Veranlaſſung gegeben. Pimpinellifolia und spinosissima, die nur Spielarten von einander ſind, ſind hier nach dem Beiſpiel mehrerer Naturforſcher vereint.

Spielarten: in 4 Hauptabtheilungen A. B. C. D. und 75 Spielarten.

A) R. pimpinellifolia vulgaris. (Linné.) Die Stengel 2 bis 3 Fuß hoch. Die Blumenkrone 1 bis 1½ Zoll breit. Sehr viele, zuweilen krumme Stacheln. 24 Spielarten; ſie unterſcheiden ſich durch die Farbe und Füllung der Blumen, als:

1) R. pimp. vulgar. simplex, alba, einfache weiße. 2) — carnea, fleiſchfarbige. 3) — rosea, roſenfarbige. 4) — rubra, rothe. 5) — purpurea, purpurfarbige. 6) — violacea, violette. 7) — lutea, gelbe. 8) — variegata, verſchiedenfarbige, (geſtreifte, geſcheckte, marmorirte.)

9) — 16) R. pimp. vulg. semiplena (halbgefüllte) alba, — carnea, — rosea, — rubra, — purpurea, — violacea, — lutea, — variegata.

17) — 24) R. pimp. vulg. plena (gefüllte) alba, — carnea, — rosea, — rubra, — purpurea, violacea — lutea, — variegata.

B) R. pimpin. pumila. (Scotica. Miller.) Die Stengel 10 bis 15 Zoll hoch. Die Blumenkrone ungefähr ¾ Zoll breit. Viele grade Stacheln von ungleicher Länge. Alle Theile verkleinert. 24 Spielarten, auf dieſelbe Weiſe unterſchieden wie bei A.

C) R. pimp. grandiflora. Die Stengel 3 bis 4 Fuß hoch. Die Stacheln ungleich, wenig gebogen, ſehr ſpitzig, röthlich. Die Blumenkrone 2 Zoll breit. 24 Spielarten, unterſchieden wie bei A.

D) R. pimp. inermis. (De Launay.) Die Stengel 3 bis 5 Fuß hoch. Faſt keine Stacheln, nur wenige an den jungen Zweigen. Die Blumenkrone 1½ bis 2 Zoll breit. 3 Spielarten. Nur einfache Blumen.

73) R. p. inermis, carnea. Mit fleiſchfarbnen Blumen.
74) „ „ „ rosea. „ roſafarbnen „
75) „ „ „ rubra. „ rothen „ .

Varietäten.

Duisburg am Rhein, den 14. Januar 1833. (Auszug aus einem Schreiben von Hrn. Keller daſelbſt.) Ich ſtehe wohl mit 10 der beſten und redlichſten Roſenpflanzer mehrerer Länder in ſteter Verbindung, woher mir dann auch das jährlich erſcheinende Neue und Ausgezeichnete gleich mitgetheilt wird, das ich mir, des anfangs hohen Preiſes ungeachtet, anſchaffe, dagegen aber mehreres alte werthlos gewordene, was mir und andern nicht mehr gefällt, abſchaffe. Aus einer Menge deutſcher Roſen-Verzeichniſſe ſehe ich mit Verwunderung, daß man ſeit einigen Jahren, wo doch ſo vieles Neue und Schöne erſchienen, bei dem alten ſtehen geblieben und nicht mit der Zeit fortgeſchritten iſt. Hr. Fr. A. Haage in Erfurt, der jetzt eine artige Sammlung beſitzt, macht davon eine Ausnahme. Der Mann hat recht, daß er beſonders die ausgezeichneten Landroſen, die ſich doch nicht ſo leicht vermehren wie die Monats-Roſen, nicht für ſolche Preiſe verkauft, wie viele andere ihre Rummelroſen. Welch eine Menge Monats- und Noiſetteroſen erblickt man jetzt in einigen deutſchen Catalogen ſo gar mit zwei und drei verſchiedenen Namen für eine und dieſelbe Sorte, bald franzöſiſch, bald deutſch, dann Monats- und Noiſetteroſen wie Kraut und Rüben durcheinander geworfen, und unter dieſen Roſen giebt es jetzt ſehr viele, welche ganz ohne Werth ſind. Die große Pflanzenfabrik von Soulange Bodin in Paris hat beſonders dazu beigetragen, daß eine Menge werthloſer Monats- und Noiſetteroſen zu Spottpreiſen nach Deutſchland gebracht ſind, mir wurden ſie zu 1000 Stück angeboten. Die Nachläſſigkeit der Arbeiter in dieſem großen ſo gerühmten Inſtitut ging ſo weit, daß man mir bei einem kleinen Verſuche den ich früher gemacht habe, außer vielen total falſchen Sorten ſogar mehrere oculirte Roſenſtämme ſandte, deren ſchwache Oculationen in dem ſtrengen Winter in Frankreich ganz erfroren waren, und die mir dennoch im Frühjahr geſandt wurden. Was Hr. Soulange in der Revue horticole bei Gelegenheit der Camellien über die Roſen ſagt, iſt wohl beſonders auf die Topfroſen zu beziehen, denn man kann annehmen, daß ¾ derſelben ohne Werth ſind, was bei den Landroſen, beſonders den neuen, nicht der Fall iſt. Oft werden in der Revue horticole neue Roſen erwähnt, die man im Vergleich mit vielen andern Namen, eigentlich ganz mit Stillſchweigen übergehen ſollte. Camellien ſoll es nach der Revue horticole nur 120 geben, und doch liegen Verzeichniſſe vor mir, wo z. B. zu Bollwiller 180 benannt ſind. Daß ausgezeichnete und redliche franzöſiſche Roſenpflanzer ihre Verzeichniſſe, die nur Gutes enthalten, verkleinert haben ſollten, habe ich noch nicht gefunden; wohl bemerkte ich viele alte werthlos gewordene, auch die Menge der ſchlechten Pimpinel-Roſen nicht mehr darin, dagegen ſind dieſe aber durch viele neue erſetzt. Gebr. Baumann führen in ihrem großen Pflanzenverzeichniß eine Auswahl der ſchönſten Sorten Roſen an. Es ſind allerdings viele ſchöne dabei, ich habe aber, unter mehrern von ihnen erhaltenen, einigen Sorten gänzlich den Abſchied gegeben, ſelbſt vornehmen Perſonen z. B. Graf Camaldoli, Regina Isabella, Koechlin und mehreren anderen ohne Werth. Manche ihrer Roſen ſind falſch benannt und einige Farben derſelben irrig beſchrieben. Unter der Rubrik rosa chinensis befinden ſich Hybriden, Theeroſen, Monats-Roſen in bunter Miſchung durch einander geworfen, zwiſchen den Noiſetteroſen giebt es Sempervirens-Roſen und bengaliſche Hybriden, die alle ſehr von einander verſchieden ſind, dagegen giebt's bengaliſche Hybriden zwiſchen den galliſchen, auch perpetuelle, und galliſche zwiſchen den bengaliſchen Hybriden. Wie ſoll einer das was er ſucht herausfinden, wenn er nicht ein genauer Kenner iſt. Gebr. Baumann als große Botaniker kennen das alles recht gut, es wird aber bei der unermeßlichen Pflanzung überſehen, und nicht geachtet.

---

*) Im Auszuge aus: C. Selbſtherr. „Die Roſen, in 25 Gruppen und 95 Arten. Breslau. 1832.“

(Fortſetzung folgt.)

Aurich in Oſtfriesland, am 4. Jan. 1833.

Meine, zu Anfange des März v. J. erfolgte Verſetzung an das hieſige Königl. Gymnaſium, welche ich Ihnen gemeldet habe, konnte meiner Pflanzen-Kultur für den Augenblick nur nachtheilig ſein; denn es war mir unmöglich, in dieſer Jahreszeit meine Lieblinge mit mir zu nehmen. Dabei gereichte es mir einigermaßen zum Troſte, dieſelben in guten Händen vorläufig zurücklaſſen zu können, um ſo mehr, da ihre Zahl ſich durch einen öffentlichen Verkauf des weniger Werthvollen ſehr verringert hatte. Kurz nach der Ankunft meiner Familie, welche mir zu Ende des März folgte, kamen auch meine Pflanzen zu Waſſer in eniem offenen Boote hier an. — Aber welch einen Anblick boten ſie dar! Faſt Alles war — erfroren. Das Wetter war nämlich damals bei Tage ſehr mild und freundlich, während es des Nachts 5 Grad fror. Obgleich nun meine Freunde in Leer mit großer Sorgfalt die Verpackung beſorgt hatten, ſo war doch ein ſolcher Fall nicht vorherzuſehen; auch wäre Schutz kaum möglich geweſen. Dazu kam noch, daß ich meine Amtswohnung, an welcher gebaut wurde, erſt im Junius beziehen konnte; ich mußte daher ſuchen, ſo gut es ſich thun ließ, das, was noch gerettet werden konnte, theils in einer ziemlich gut gelegenen Stube vorläufig unterzubringen, theils und vorzüglich aber den Treibhäuſern einiger hieſigen Blumenfreunde zu übergeben. Beinahe mein ganzes Cacten-Sortiment war vernichtet, ſo daß mir nur ungefähr 40 Species übrig blieben. Aber, ſo wie nach dem gewöhnlichen Sprichwort jedes Unglück von einem Glücke begleitet zu ſein pflegt, ſo ging es auch mit mir; denn in den erſten Tagen des April erhielt ich, in Folge meiner Tauſch-Anerbietungen in Ihrer trefflichen Blumenzeitung, ſchon ein ſehr freundliches Schreiben vom Herrn Amts-Ober-Voigt Ruperti zu Herzberg am Harze, welcher mir auch ſpäterhin, ungeachtet der Anzeige meines Unglückes und daß ich vorläufig nichts würde wieder anbieten können, ein vorzügliches Sortiment Cacten überſandte. Aehnliches geſchah im October vom Herrn Fabrikanten und Kaufmann Jördens aus Dresden; und ich ſage hiermit beiden Männern für eine ſo freundliche, uneigennützige Güte auch öffentlich hierdurch meinen beſten Dank. Es wird mir eine große Freude ſein, im bevorſtehenden Frühlinge dieſen Dank auch durch die That zu bezeigen. Doch warum ſoll ich die Geduld Ihrer verehrten Leſer durch die Erzählung ſo wenig erfreulicher Vorfälle mißbrauchen? Ich füge lieber noch das an, was ich während des vorigen Sommers zu beobachten Gelegenheit gehabt habe, wie unbedeutend es auch iſt.

C. Siedhof,
Conrector am Königl Gymnaſium.

(Beſchluß folgt.)

(Auszug aus einem Schreiben.) Bollwiller, im oberrheiniſchen Departem. den 25. Dec. 1832. Die 3 erſten Lieferungen der Bollwiller Camellienſammlung liegen zum Abſenden bereit; auch die 4te Lieferung nähert ſich ihrer Vollendung und wird mehrere der ſchönſten Prachtblumen enthalten. Die minder ſchönen Sorten werden nicht einzeln ſondern gruppenweiſe zu mehrern Varietäten auf einem Blatte erſcheinen; die Abbildungen werden immer vervollkommnet, und wir hoffen daß dieſe Arbeit als eins der ſchönſten Prachtwerke, jeden Kenner befriedigen wird. Mit der 4ten Lieferung werden die Species und Varietäten der Camellien geordnet erſcheinen, was nunmehr, da wir wohl die reichhaltigſte Camellien-Sammlung beſitzen, leichter als früher ausführbar iſt. Unſre Camellien fangen bereits an zu blühen und die Flor verſpricht ſehr reichlich und ſchön zu werden. Außer den in beiliegendem Verzeichniſſe*) befindlichen 250 Arten, wobei ſich freilich das eine oder andere synonymen befinden kann, haben wir hier noch ungefähr 40 Sorten aus eignen gewonnenen Samen. Die mehrſten ſind im Habitus verſchieden. Eine beſondre Erſcheinung darunter iſt eine 2-lappige, die, wenn ſie ſich in dieſem Zuſtand erhält, was wir noch nicht wohl verſichern können, im Reich der Flora viel Aufſehen machen wird. Auch haben wir directe aus Sidney in Neu-Holland, und von den auſtraliſchen Inſeln bezogene Samen, ſeltener ſchöner Hovea, Robinia, Acacia, und beſondre Banksien und Dryandren — die mit in unſerm Cataloge pro 1833 und 1834 erſcheinen werden.



Gebr. Baumann.

Dresden, den 25. Januar 1833. Zu bevorſtehendem Frühjahre empfiehlt ſich Unterzeichneter mit Gewächshauspflanzen, wobei Cactus und Camellien in großer Auswahl, mit den neueſten prachtvollen engliſchen, franzöſiſchen, zwerg- und anemonenblüthigen Georginen, mit den neueſten Staudengewächſen, Luſtgehölzen, Obſtorangerie, großfrüchtigen engl. Stachelbeeren, 31 Sorten Erdbeeren, 1000 Sorten Blumenſamen, wobei alles Neue und Schöne beſonders ins Gefüllte fallender Levcojen, Gemüſeſamen, hochſtämmiger und Strauch-Roſen, Topfroſen in großer Sortirung ſo wie mit allen andern Gegenſtänden der Gärtnerei, zu den billigſten Preiſen. Auf portofreie Briefe werden die Verzeichniſſe unentgeldlich ausgegeben von Ernſt Wilhelm Wagner, Handelsgärtner in Dresden.

(Hierbei 3 Beilagen. 1) und 2) Verzeichniſſe von Hrn. J. C. Grimm in Gotha, 3) von Hrn. Fr. W. Wendel in Erfurt.)

---

*) Soll nächſtens mitgetheilt werden. D. Redact.

Verzeichniss

von allen Arten

Gemüse-, Garten-, Gras-, Acker- und Holz-Saamen,

welche besonders echt und zu nachstehenden billigen Preisen zu haben sind

bei

Johann Caspar Grimm,

Neudietendorfer Commissions-Handlung in Gotha.

Bis August 1833 gültig.

Kohl-Saamen.

No.		gl.	kr.
1	Blumenkohl, großer, früher, asiatischer . . à Loth	8	—
2	— — — cyprischer	7	—
3	— — — englischer	7	—
4	— — später, capischer	7	—
5	— — — englischer	7	—
6	— — — holländischer . . .	3	—
7	— — — schwarzer, aus Sicilien, sehr delikat, beim Abbrühen verwandelt sich die dunkle Farbe in eine schöne saftgrüne à Prise	3	—
8	Broccoli oder Spargelkohl, weißer . . . à Loth	2	—
9	— — violetter	2	—
10	— — grauer oder römischer	2	—
11	Meer- oder Seekohl, crambe maritima, sehr delikat	3	—
12	Kraut oder Kopfkohl, erfurter, großes, weißes . .	1	6
13	— — — kleines, frühes, festes	1	6
14	— — — rothes, niedriges, frühes Salat-	1	6
15	— winnigstädter, großes, weißes, spitziges . .	1	6
16	— ulmer, kleines, weißes, frühes, extra . . .	1	6
17	— — großes, spätes, Centner-	2	—
18	— — blutrothes Salat-	1	6
19	— Butter- oder Carminat-	2	—
20	— yorkisches, allerfrühestes, weißes, spitziges .	2	—
21	— holländisches, frühes, weißes	1	6
22	— — klein., schwarzroth., rund., früh.	2	—
23	— — blutroth., großes, frühes, Salat	2	—
24	— — — — spätes . .	1	6
25	— braunschweiger, größtes, weißes	1	6
26	— mehlerisch, frühes, großes, weißes, extra . .	1	6
27	— nägelstädter, großes, weißes	1	6
28	— Zuckerhut, früher, weißer, sehr schön . . .	2	—
29	— ordinäres Weißkraut	1	—
30	Wirsing oder Börskohl, großer, gelber, Winter- .	1	6
31	— ulmer, niedriger, früher, extra	1	6
32	— ulmer, halbfrüher	1	6
33	— — größter, später	1	6
34	— wiener, niedriger, früher, Kreide-	2	—
35	— utrechter, ganz gelber, früher	2	—
36	— grüner, krauser	1	—
37	Kohl, brüßler, Sprossen- oder Rosen-	1	6
38	— französischer, bunter, Plumage-	1	6
39	— grüner, krauser, Federkohl, sehr delikat . .	1	—
40	— hoher, brauner, krauser, Winter-	1	—
41	— — grüner, — —	1	—
42	— niedriger, — — —	—	9
43	— — brauner, — —	—	9
44	— — blauer, — —	1	—
45	— großer, engl., Schnitt (Blumenkohlblatt) extra	—	8
46	— Schnitt- oder Frühlings-	—	6
47	Glaskohlrabi, wiener, niedrige, ganz frühe, weiße .	2	—
48	— — — — — blaue .	2	—
49	— englische, frühe, weiße	1	6
50	— — — blaue	1	6
51	Oberkohlrabi, große weiße aufs Feld	—	9
52	— — blaue — —	—	9
53	Kohlrüben oder Erdkohlrabi, große, weiße, runde .	—	9
54	— — — gelbe, — extra	1	—

Wurzel- und Rüben-Saamen.

No.		gl.	kr.
55	Carotten, holländ., ganz frühe, kurze rothe z. Treib.	—	9
56	— hornsche, ganz frühe, lange rothe . . .	1	—
57	— harlemer dunkelrothe extra	1	—
58	— braunschweiger, frühe, feine rothe . . .	1	—
59	Möhren, erfurter, lange, rothgelbe	—	9
60	— braunschweiger rothe lange	—	6
61	— saalfelder blaßgelbe	—	6
62	Wurzeln: Cichorien, beste, glatte, kurze	—	9
	lange	—	9
64	— Haber	1	—
65	— Pastinak	—	6
66	— Petersilien, lange	—	9
67	— — frühe, dicke Zucker- . . .	1	—
68	— Rapontica- oder Salat- (delikat) . .	1	—
69	— Storzoner-	1	—
70	— Sellerie, großer, holländischer, Knoll, extra	1	—
71	— — — leipziger, glatter, Knoll-	1	6
72	— — krausblättriger oder gefüllter .	1	6
73	— feine Zucker-	1	—
74	Rüben, holländische, weiße, runde frühe Mai- . .	—	9
75	— — gelbe, — — — . .	—	9
76	— echte kleine teltower	1	—
77	— — — märkische	1	—
78	— weiße, lange Herbst- oder Buckel- . . .	—	6
79	— gelbe, lange bollfelder	—	9
80	— schwarze runde, delikat	1	—
81	Kerbelrüben, Scandix bulbosum, sehr delikat . .	4	—
82	Runkelrüben, lange, über sich wachsende, rothe à Pfd.	5	—
83	— — — — — gelbe à Pfd.	7	—
84	— runde, gelbe, — . . . à Pfd.	7	—
85	— weiße, Zucker- — . . . à Pfd.	6	—
86	Blutrothe Salatrüben zum Einmachen . . à Loth	—	6
87	Beißkohl oder Mangold	—	6

Salat-Saamen.

No.		gl.	kr.
88	Salat, Steinkopf-, gelber, früher, fester, weiß Korn	2	—
89	— — grüner, — — schwarz — (vorzüglich gut auf Frühbeete, auch fürs freie Land)	2	—
90	— arabischer, großer, gelber Kopf-, braun Korn	1	6
91	— asiatischer, großer, gelber, weiß Korn . .	2	—
92	— — — — braun —	1	6
93	— gelber Prinzenkopf, braun Korn	1	6
94	— — — weiß — extra . .	1	6
95	— Schwedenkopf, weiß Korn	1	6
96	— — braun —	1	6
97	— Mohrenkopf, braun Korn, extra	1	6
98	Salat, Forellen, großer, bunter, weiß Korn . . .	1	6
99	— — — — schwarz — . . .	2	—
100	— — engl., kleiner, blutrother, extra .	3	—
101	— großer, gelber Berliner, braun Korn . . .	1	6
102	— — — Nonpareil, weiß Korn, extra	2	—
103	— Prahl- oder Dauer-	2	—
104	— harlemer Blankopf	2	—
105	— Mogul oder Friesbude	2	—
106	— bester, dauernder Winter-	2	—
107	— Melange der besten Sorten	1	—
108	— Stechsalat, früher, gelber, weiß Korn . .	1	—
109	— — — — braun — . .	1	—
110	Endivien, großer römischer Bindsalat	2	—
111	— krause Sommer-	1	—
112	— von Natur gelbe, englische Sommer- .	2	—
113	— glattblättrige Winter-	1	6
114	— krausblättrige	1	—
115	— ganz große Escurial-	2	—
116	Rabinzchen oder Feldsalat	—	6

Zwiebel-Saamen.

No.		gl.	kr.
117	Zwiebeln, erfurter, runde, blaßrothe Kopf- . . .	1	—
118	— holländische, gelbe, süße, runde . . .	2	—
119	— gelbe, längliche Birn-	1	6
120	— holländische, blutrothe, runde, harte . .	2	—
121	— — silberweiße, runde, extra . .	2	—
122	— spanische, rothe Pflanz-	2	—
123	— — weiße —	2	—
124	— feine weiße Winter-	1	6
125	Porre oder Lauch, Sommer-	1	—
126	— — dicker Winter-	1	6

Steckzwiebeln.

No.		gl.	kr.
127	Steckzwiebeln, getrocknete, mehrere Sorten 100 St.	3	—
128	— gelbe Birn- . . . . . 100 —	4	—
129	— ägyptische, über sich tragende Luftzwiebeln, sehr zart im Geschmack . 10 St.	3	—
130	— Rocambol . . . . 100 —	6	—
131	— Knoblauch . . . . 100 —	4	—
132	— Chalotten, deutsche . . . 100 —	4	—
133	— — große, dänische 25 —	6	—
134	— Perlauch oder Pickazwiebeln zum Einmachen . . . . 100 St.	6	—

Radies- und Rettig-Saamen.

No.		gl.	kr.
135	Radies, holländische, runde, weiße Monats- à Loth	1	—
136	— — — rothe —	1	—
137	— — — rosenrothe	1	—
138	— — lange weiße	1	—
139	— — — dunkelrothe	1	—
140	— — — rosenrothe	1	—
141	— vorstehende Sorten melirt	1	—
142	Rettig, erfurter, langer, schwarzer Winter- . .	1	—
143	— — runder, — —	1	—
144	— halbfrüher wiener, gelber Sommer- . .	1	—
145	— schwarzer runder Sommer-	1	—
146	— rothschaliger Herbst-	1	—
147	— weißer langer	1	—

Küchenkräuter.

No.		gl.	kr.
148	Astragalus baeticus, Stragel-Kaffee . . . à Pfd.	4	—
149	Angelika oder Engelwurzel . . . . . à Loth	2	—
150	Basilikum, großer	1	6
151	— kleiner krauser	2	—
152	Bohnen- oder Pfefferkraut	1	—
153	Boretsch oder Gurkenkraut	2	—
154	Cardobenedicten	—	9
155	Dill	—	6
156	Fenchel, gewöhnlicher	—	6
157	— großer, süßer Anies	1	—
158	Gartenkresse, einfache	—	6
159	— gefüllte	—	9
160	Kerbel, gewöhnlicher	—	6
162	— krausblättriger	—	9
163	— großer, spanischer, wohlriechender . . .	1	—
164	Ysopp	1	—
165	Erdmandeln	1	—
166	Lavendel oder Spicke	1	—
167	Löffelkraut	1	—
168	Majoran, französischer edler	1	6
169	Citronenmelisse, feine	2	—
170	Petersilie, einfache	—	6
171	— gefüllte krause, besonders schön . . .	1	—
172	Pimpinell	1	—
173	Portulack, gelber	1	6
174	— grüner	1	—
175	Rosmarin	3	—
176	Salbei	1	6
177	Sauerampf	1	—
178	Spinat, englischer Gemüse-, Rumex patientia .	—	9
179	— — größter . . . . à Pfd.	6	—
180	— rundblättriger . . . . à Pfd.	4	—
181	— langblättriger . . . . à Pfd.	3	—
182	— neuseeländischer, Tetragonia expansa à Lth.	1	—
183	Thymian	1	6
184	Weinraute	2	—

Kern-Sorten.

No.		gl.	kr.
185	Artischocken, große rothe	2	6
186	Cardy, spanische	1	6
187	Gurkenkern, mittellange grüne	1	—
188	— lange grüne Schlangen-, extra . . .	2	—
189	— — weiße — —	2	—
190	— hallische, mittellange grüne	1	6
191	— große grüne westindische	3	—
192	— lange grüne zum Treiben	2	—
193	Gurkenkern, größte, 18—20 Zoll lange, grüne Schlangengurken auf Mistbeete . . . . . à Prise	2	—
194	— lange, ganz weiße, oft 4 Pfd. schwer à Prise	2	—
195	— lange blaßgrüne, sehr große . . à Prise	2	—
196	— allerfrüheste, volltragende, z. Treib. à Prise	2	—
197	Spargelkern, weiße darmstädter . . . . . à Lth.	1	—
198	Saflor	—	6
199	Sonnenblumen	—	6
200	Kürbis, Pomeranzen . . . . à Prise	1	—
201	— grüner, länglicher, ohne Ranken	1	6
202	— großer Herkuleskeulen	1	—
203	— Füll- oder Farsier . . . . . . à Prise	1	—
204	— Flaschen-	1	—
205	— Türkenbund	1	—
206	— gelber Apfelsinen-, sehr schön	1	—
207	— großer Birn-	1	—
208	— ganz kleiner Birn-	1	—
209	— kleiner Stachelbeer-	1	6
210	— Igel- oder Weberkarden-, sehr hübsch . .	2	—
211	— kleine Sorten in niedlichen Formen à Loth	1	—
212	— große Sorten	2	—

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

No.		gl.	kr.
213	Kürbis, Benincasa cerifera . . . . . . à Prise	2	—
214	— Cucurbita melopepo reticulata, allergrößter Melonen-, 150—200 Pfd. schwer à Prise	1	—
215	— Cucurbita glauca, grauer Melonen- . .	1	6
216	— — Ceratocera-, Waschfleisch- . .	1	—
217	— — vegetable Marrow, engl. Schmeer-, wird wie Spargel bereitet	1	—
218	— Cucurbita, großer glatter Centner- . .	1	—

Zier-Kürbisse.

No.		gl.	kr.
219	Paraplui- oder Schirm-Kürbis, gelber und weißer .	2	—
220	Derselbe mit Warzen, grün gestreift	2	—
221	Aschgrauer runder Kürbis aus der Barbarei . .	1	—
222	Gurken-Kürbis, 3—4 Fuß lang, hat scharfe Ecken	1	—
223	Schlangen-Kürbis 4—5 Fuß lang und nur 3—4 Zoll dick, sehr schön	2	—
224	Kronen-Kürbis, gestreifter	1	—
225	Orange-Champignon	2	—
226	Gelber und grüner Wirsing-Kürbis	2	—
227	Blaßgelber Zwiebel-Kürbis	2	—
228	Grüner Zitzen-Kürbis	1	6
229	Gelber — —	1	6
230	Orangegelber Widderhorn-Kürbis	2	—
231	Eiförmiger gelber	1	6
232	Melonenkern, Melange in vielen Sorten . . .	2	—
233	— kleine runde Tiger-Melone, gut von Geruch	1	6
234	— Wachsmelone, groß und schön . .	2	—
235	— grüne echte Schlangen-Melone, sehr schön . . . . à Prise	1	6
236	— gelbe echte Schl.-Mel., sehr schön .	1	6
237	— kugelförmige Tiger-Melone extra .	1	6
238	— große schwarze Kantelupe . . .	1	6
239	— große Silber-Kantelupe	1	6
240	— graue Sarepta-Melone, sehr delicat	2	—
241	— Angurin oder Wasser-Melone . .	1	6
242	— Bonillae, sehr delikat	1	6
243	— Türkenbund-Melone	1	6
244	— astrachanische, sichelförmige Netz-Melone, delicat	1	6
245	— grüne Barbareske	1	6
246	— ganz frühe Trauben-Melone . .	1	6
247	— späte, mit weißem Fleische . . .	1	6
248	— ein Sortiment von 24 verschied. Sort.	18	—

Zucker-Erbsen,

welche mit der Schaale gegessen werden.

No.		gl.	kr.
249	englische, frühe, weißblühend . . . . . . à Pfd.	5	—
250	große, wohlschmeckende Nonpareille	7	—
251	holländische, große, späte, weiße	5	—
252	große, späte, schwarzkeimige	5	—
253	große grüne	5	—
254	niedrige frühe Krup-	4	—
255	— späte —	4	—
256	ganz niedrige, ½ Fuß hoch	6	—

Schaal-Erbsen,

welche ausgekneifelt werden müssen.

No.		gl.	kr.
257	allerfrüheste, volltragende Mai-	3	—
258	frühe Blau-	4	—
259	späte —	4	—
260	große grünbleibende	4	—
261	grünbleibende Caper	4	—
262	große Fontanelle	4	—
263	ulmer, volltragende, niedrige	4	—
264	erfurter, große, frühe Klunker, sehr süß und schön	2	—
265	Gold- oder Wachs-, sehr delikat	3	—
266	graue Capuziner-	4	—
267	englische Marrowfat, delikat	6	—
268	frankfurter, volltragende, sehr schön	6	—
269	Spargelerbsen	8	—

Stangen-Bohnen.

No.		gl.	kr.
270	extra breite, 1 bis 1½ Fuß lange Schwert- . . .	8	—
271	zweite Sorte große Schwert-	6	—
272	bunte Schwert-, sehr tragbar und schön	4	—
273	große, bunte, arabische, rothblühende	4	—
274	große, weiße, arabische, weißblühende	4	—
275	bunte Spargel- oder Eier-, extra	4	—
276	kleine Prinzeß-, zum Salat delikat	6	—
277	feine weiße Zucker-, ganz ohne Fasern, sehr schön .	8	—
278	kleine bunte Gold- oder Eckel-	6	—
279	extra, engl. weiße Zucker-Brechbohnen	7	—
280	— — gelbe — —	4	—

No.	à Pfd.	gl.	pf.
281	feine englische, weißschalige, extra	5	—
282	rothe, runde Kirsch- oder Dukaten-	6	—
283	gelbe, schweizer, Zucker	5	—

Buschbohnen.

284	frühe weiße Schwert-	4	—
285	frühe schwarze amerikanische Neger-Zucker-	3	—
286	frühe blaßgelbe	3	—
287	neue gelbe Pariser	8	—
288	frühe bunte	3	—
289	frühe gelbe Zucker sehr schön	4	—
290	rothbunte Zucker- oder Speck-	3	—
291	schwarzbunte Zucker-	4	—
292	weiße, weißschalige Zucker-	6	—
293	große weiße langschalige Nieren-	4	—
294	ganz frühe niedrige	6	—
295	frühe gelbe Prinzeß-	4	
296	schwarze halbhohe, trägt überflüssig	6	

Garten- oder Puffbohnen.

297	gewöhnliche, sehr tragbar	2	—
298	größte weiße Windsore	3	—
299	englische, purpurrothe	3	—
300	grüne Mailänder	4	—
301	niedrige frühe, Mazagan, zur Einfassung	3	—
302	englische dunkelrothe schöne	12	—

Oekonomie-Saamen.

303	Anis	6	—
304	Bilsenkraut	12	—
305	Canariensaamen	2	—
306	Coriander	3	—
307	Hanfsaamen	3	—
308	Mohn, blauer	4	—
309	— weißer	3	—
310	Siebenzeiten, Foenum graecum	4	—
311	Ackerspargel, spergula arvensis	6	—
312	Kardendistel, dipsacus fullonum	7	—
313	Waid zum Indigo, isatis tinctoria, 100 Pfd. 21 Thlr.	6	—
314	große Hellerlinsen	3	—
315	Türkischer Waitzen	4	—

Die vorzüglichsten Futtergräser

zum Anlegen der Kunstwiesen.

316	Agrostis capillaris, Haarstraußgras	5	—
317	— stolonifera, Fioringras, sehr ergiebig	6	—
318	Aira caespitosa, Rasenschmele	5	—
319	Avena elatior, französisches Raigras	6	—
320	— flavescens, Goldhafer	7	—
321	Bromus arvensis, Roggentrespe	3	—
322	— sterilis, Futtertrespe	5	—
323	Dactylis glomerata, Knaulgras, ein sehr einträgliches Futtergras für alles Vieh, besonders für die Pferde, welche es sehr lieben; es ist sehr leicht anzubauen und sehr ergiebig	5	—
324	Festuca elatior, Wiesenschwingel	5	—
325	— fluitans, Manna oder Schwadegras	9	—
326	— ovina, Schafschwingel	8	—
327	— rubra, rother Schwingel	7	—
328	Hedysarum onobrychis, Esparcell-Klee	3	—
329	Holcus lanatus, Honiggras	5	—
330	Lolium perenne, englisches Raigras	6	—
331	Medicago falcata, weißer Wunderklee	9	—
332	— sativa, blauer oder ewiger Klee	[illegible]	
333	— lupulina, Hopfen-Klee	[illegible]	
334	Myagrum sativum, Leindotter	4	—
335	Phleum pratense, Thimothiengras	8	—
336	Phalaris canariensis, Canariengras	3	—
337	Poa pratensis, Wiesenrispengras	10	—
338	Urtica dioica, große Brennnessel	6	—
339	Trifolium melilotus officinalis, gelber Steinklee	3	—
340	— pratense, spanischer rother Kopfklee	6	—
341	Eine Mischung der vorzüglichsten Futtergräser für Hornvieh	3	—
342	Eine dergl. für Pferde	3	—
343	Eine dergl. für Schaafe	3	—
344	Eine dergl. zum Ausbessern der Wiesen	3	—

Wald- und Holzsaamen.

345	Acer campestre, gemeiner Ahorn	2	—
346	Amygdalus dulcis, gute Mandeln 100 St.	18	—
347	Betula alba, weiße Birke, extra à Pfd.	2	—
348	— alnus, Erlen	3	—
349	— — incana, weiße Erlen	10	—
350	Carpinus betulus, Hainbuche	2	—
351	Fraxinus excelsior, gemeine Esche	2	—
352	Juniperus communis, Wachholder	1	6
353	Pinus abies, weiße Tanne	3	—
354	— balsamea, Balsamtanne	—	—
355	— canadensis, canadische Fichte	—	—
356	— cembra, Zirbelkiefer à Pfd.	20	—
357	— strobus, Weimuthskiefer à Lth.	1	—
358	— montana, Krummholzkiefer à Pfd.	—	—
359	— sylvestris, gemeine Kiefer	12	—
360	— larix, der Lerchenbaum	16	—
361	— picea, die Rothtanne oder Fichte	4	—
362	Prunus avium, wilde Süßkirsche	3	
363	— — gute Kirschkern	4	—
364	Pirus communis, Birnkern	8	—
365	— malus, Apfelkern	8	—
366	Robinia pseudo-acacia, Acazien	10	—
367	Ulmus campestris, Ulme	—	—
368	Maulbeere, weiße à Lth.	3	—
369	— schwarze	3	—
370	— rothe	3	—

Blumenzwiebeln.

371	100 Stück Anemonen, beste gefüllte in vielen Farben 2 Thlr.	12	—
372	100 — Ranunkeln, voll gefüllte in vielen Farb. 1 Thlr.	8	—

No.		gl.	pf.
373	100 Stück Ranunkeln, teutsche, in Rummel	18	—
374	12 — Türkische Ranunkeln, rothe Romana	8	—
375	12 — — — gelbe Merveilleuse	8	—
376	Gefüllte tragbare Tuberosen, große . . . 1 St.	2	—

Nelken-Senker.

377	12 Stück ausgezeichnet schöne Nelken mit Namen und Charakteristik . . 2 Thlr.	12	—
378	100 — in eben so viel Sort. mit Namen 16 —	16	—
379	12 — in 12 Sorten ohne Namen . 1 —	—	—
380	100 — in eben so viel Sorten . . 8 —	—	—
381	12 — schöne Landnelken	9	—
382	12 — sehr schöne Bartnelken	8	—
383	12 — — — Carthäuser-	8	—
384	12 — — — chinesische	8	—
385	12 — schöne Federnelken (Dianthus plum. minimus)	12	—
386	12 — gefüllte schöne Pechnelken	12	—
387	12 — fleischrothe Sammt Nelken	8	—
388	12 — dunkelrothe — —	8	—

Nelken-Saamen.

389	100 Körner in 100 Sorten, extra . . 1 Thlr.	8	—
390	100 — in schönen diversen Sorten	18	—
391	100 — von schön gefüllten Landnelken	4	—
392	12 — großblumige sehr schöne Luiker Aurikeln, 1te Sorte . 1 Thlr.	12	—
393	12 — dergl. 2te Sorte	20	—
394	12 — dergl. 3te —	12	—
395	100 — in Rummel, zur Einfassung . 2 Thlr.	6	—
396	1 Prise Saamen von den großblum. Aurikeln, extra	6	—
397	1 — — von allen Sorten melirt	3	—
398	12 Stück sehr schöne engl. in 12 extra Sort. 2 Thlr.	12	—
399	12 — — — — in Rummel . 2 —	—	—
400	100 — in 100 Sorten extra, extra . . 16 —	16	—
401	100 — sehr schöne in Rummel . . 12 —	—	—
402	1 Prise Saamen von wahren englischen Aurikeln	12	—
403	12 Stück reine englische Primeln, sehr schön	12	—
404	12 — in Rummel	6	—
405	100 — — — . 1 Thlr.	—	—
406	1 Prise Saamen von den vorzüglichsten Sorten	3	—

Billige Topf-Pflanzen nach meiner Wahl.

407	12 Stück Amaryllis in 12 schönen Sorten 4 Thlr.	—	—
408	12 — Cannas — 12 — — 3 —	—	—
409	12 — Calceolarien 12 — — 6 —	—	—
410	12 — Camellien — 12 — — 12 —	—	—
411	12 — Cactus — 12 — — 2 —	—	—
412	18 — — — 18 — — 3 —	12	—
413	24 — — — 24 — — 6 —	12	—
414	36 — — — 36 — — 9 —	12	—
415	12 — Ericas — 12 — — 6 —	—	—
416	12 — Fuchsien — 12 — — 5 —	—	—
417	12 — Orangen — 12 — — 5 —	—	—
418	12 — großblumige Pelargonie in 12 schönen Sort. 3 Thlr.	12	—
419	12 — der vorzüglichsten — in 12 schönen Sort. 4 Thlr.	12	—
420	12 — Rosa semperflorens in 12 sch. S. 3 —	—	—
421	12 — — Thea — 12 — — 6 —	—	—
422	12 — — Noisettiana — 12 — — 6 —	—	—
423	12 — — centifolia minor . . . 1 Thlr.	—	—
424	12 — — — dijonensis . . 1 —	6	—
425	100 — — — . . . 2 —	—	—

(Maaßlieb-Rosen kann ich wegen ihrer seltenen Schönheit ganz vorzüglich empfehlen. — Mehrere andere vorzügliche Rosen-Sorten liegen noch bei mir vorräthig, worüber besondere Cataloge zu haben sind.)

426	Ein Sortiment pimpinellifolia von 24 sch. S. 5 Thlr.	—	—
427	— — Rosen für's freie Land in 30 gefüllten schönen Sorten . . 5 Thlr.	—	—
428	— — dergl. Prachtblumen in 12 S. 5 —	—	—
429	— — — — — 12 — 2½ —	—	—
430	12 Stück sehr schöne Centifolien	—	12
431	Ein Sortiment rosa semperflor. et sempervirens in 20 Sorten . . 5 Thlr.	—	—
432	— — nur semperflorens, schönste, in 12 S. 3 Thlr.	—	—
433	100 Stück schöne Rosen mit Namen . . 6 —	—	—
434	100 — dergl. in Rummel . . 3 —	—	—
435	100 — rosa centifolia . . 2 —	—	—

Weinreben

in den besten Sorten mit Namen, die ich jedem Freunde empfehlen kann.

Frühreifende Sorten.

1) Laurenzius, weiß, 3 gl.; 2) dito, blau, 3 gl.; 3) groß, früh, blau, 3 gl.; 4) kleine, 3 gl.; 5) St. Jakobs-Traube 3 gl.; 6) Kiltaner, weiß, 3 gl.; 7) dito, blau, 3 gl.; 8) frühleipziger, 3 gl.; 9) gut, edel, weiß, 3 gl.; 10) dito, gelb, 3 gl.; 11) dito, roth, 3 gl.; 12) dito, blau, 3 gl.; 13) Petersilien-Traube.

Mittelfrühreifende Sorten.

14) Muskateller?, roth, 3 gl.; 15) dito, weiß, 3 gl.; 16) Oesterreicher, weiß, 3 gl.; 17) dito, roth, 3 gl.; 18) Orleanser oder Silvaner, 3 gl.; 19) Dickblau, groß, 3 gl.; 20) Kläfner, blau, 3 gl.; 21) Rolander, 3 gl.; 22) Burgunder, blau, groß, 3 gl.; 23) dito, klein, 3 gl.; 24) Traminer, weiß, 3 gl.; 25) dito, roth, 3 gl.; 26) Reuschlinger, blau, 3 gl.; 27) Hängelin, blau, 3 gl.; 28) Muscat, weiß, 3 gl.; 29) dito, blau, 3 gl.; 30) dito, schwarz, 7 gl.; 31) Aßmannshäuser 3 gl.; 32) Eldinger roth, 3 gl.

Spätreifende Sorten.

33) Tintowein von Monte, 3 gl.; 34) St. Valentiner, roth, 4 gl.; 35) Mohrenkopf, schwarzblau, 6 gl.; 36) Florentiner, blau, 4 gl.; 37) Langrang, weiß, 4 gl.; 38) Ungarischer, blau, 3 gl.; 39) dito, weiß, 4 gl.; 40) dito, roth, 4 gl.

	100 Stück Weinreben ohne Namen in Rummel 4 Thlr.	—	—
436	Spargelpflanzen, 3jähr. 60 St. extra	16	—

Bäume und Sträucher zu Bouquets.

No.		gl.	pf.
437	12 Stück in 12 Sorten mit Namen . . 1 Thlr.	—	—
438	24 — — 24 — — — . . 2 —	12	—
439	30 — — 30 — — — . . 6 —	12	—

Einige Sträucher und Holzarten.

440	Amygdalus nana fl. simpl., Zwergmandelbaum	4	—
441	— dulcis, veredelter Mandelbaum	7	—
442	Aristolochia Sipho, nordamerikanische Osterluzei	8	—
443	Aepfelbäume, veredelte, an Spaliere und in Töpfe	6	—
444	— hochstämmige, tragbar	7	—
445	Aprikosen, hochstämmige	12	—
446	— an Spaliere und in Töpfe	12	—
447	Berberis vulgaris	1	—
448	Birnen, veredelte, in Töpfe, ans Spalier u. Pyramid.	6	—
449	— hochstämmige	7	—
450	Cercis siliquastrum, Judasbaum	4	—
451	Cineraria amelloides, amellenartige Aschenpflanze	4	—
452	Citrus aurantium, Pomeranzen- u. Citronenbäumchen, mit u. ohne Früchte, von 18 gl. bis zu 2 Thlr. 12 gl.		
453	Cestrum Parqui, chilischer Hammerstrauch	6	—
454	Chimonanthus japonicus, japanische Nußpflaume	4	—
455	Corylus maxima, große Lampertus oder Zellernüsse	4	—
456	Cornus mascula, Corneliuskirsche	1	—
457	— alba, dito mit weißer Frucht	1	6
458	Crataegus oxyacantha, rothblüh. Weißdorn, schön, 4—	6	—
459	Ficus carica, Feigenbaum	4	—
460	Fraxinus pendula, Trauer-Esche	6	—
461	— aurea, goldgelbe —	6	—
462	Hedera Helix, Epheu	1	—
463	— quinquefolia, Jungfernwein	3	—
464	Hippophaë rhamnoides, See Kreuzdorn	4	—
465	Juniperus Sabina, Sadebaum	4	—
466	— fol. variegatis, buntblättriger Wachholder	8	—
467	Laurocerasus, Kirschlorbeerbaum . . 4—	8	—
468	Lonicera Caprifolium album, weißer Jelängerjelieber	3	—
469	— sempervirens, scharlachroth	4	—
470	— grata coccineum	3	—
471	— carneum	3	—
472	— rubrum	3	—
473	Lycium europaeum, Bienenbaum	2	—
474	Mespilus cotoneaster, Quittenmispel	5	—
475	— pyracantha, Feuerbusch	6	—
476	Morus alba, weißer Maulbeerbaum	4	—
477	Myrtus communis macrophylla, breitblättrige Myrte 8—	12	—
478	— — microphylla, kleinbl. Myrte 8—	12	—
479	Nerium oleander, rother einfacher . . 6—	8	—
480	— fl. pl., rother gefüllter . . 8—	12	—
481	— fl. albo simpl., einfacher weißer	8	—
482	Pfirsiche ans Spalier und in Töpfe	14	—
483	Pflaumen, veredelte hochstämmige, ans Spal. u. in T.	5	—
484	Pinus Larix, Lerchenbaum	6	—
485	Pyrus malus baccata, kleiner rother Kirschapfel	4	—
486	— — striata, gestreifter Apfel	6	—
487	Populus italica, große italienische Pappel	2	—
488	Prunus Mahaleb, Mahalebkirsche	4	—
489	— padus, Traubenkirsche	4	—
490	— Laurocerasus, Kirschlorbeer . . 4—	6	—
491	Punica Granatum fl. pl., gefüllte Granaten	12	—
492	Rhus cotinus, Perückenbaum	4	—
493	— typhinum, Essigbaum	2	—
494	Robinia hispida, rothblühende	8	—
495	— pendula, hängende	8	—
496	— pseudacacia, gemeine, 8 Fuß hoch	4	—
497	— spectabilis, prächtige neue	14	—
498	— tortuosa, 4—7 Fuß	8	—
499	— viscosa, klebrige, sehr schön	8	—
500	Rubus canadensis, canadische Himbeere	4	—
501	Salix babylonica, Trauerweide, 5—10 Fuß . . 6—	8	—
502	Solanum pseudo-capsicum, Korallenkirschbaum	4	—
503	Viburnum opulus, gefüllter Schneeball	4	—

Pflanzen,

die in Quantitäten, doch nicht unter 50 Stück, zu haben sind.

504	100 Stück Garbe, mehrere Sorten	24	—
505	100 — Schnittlauch	6	—
506	100 — perennirende Aster, alle Arten	18	—
507	100 — gefüllte Maßlieben	12	—
508	100 — Berberizen, junge Sämlinge . . 2 Thlr.	4	—
509	100 — Campanula, mehrere Sorten	20	—
510	100 — Korneliuskirschen, 2—3 Fuß . . 2 Thlr.	4	—
511	100 — Garten-Vergißmeinnicht	18	—
512	100 — Garten-Maiblumen	18	—
513	12 — gefüllte —	12	—
514	100 — Epheu . . 2 Thlr.	4	—
515	100 — weiße gefüllte Nachtviolen . 4 —	—	—
516	12 — rothe — —	16	—
517	100 — wohlriechende Tristis . . 4 Thlr.	—	—
518	100 — Schneeglöckchen . . 1 —	4	—
519	100 — Krausemünze und Pfeffermünze	18	—
520	100 — Johannesäpfel . . 2 Thlr.	8	—
521	100 — große italien Pappeln, 6 Fuß hoch 4 —	12	—
522	100 — — — — 12 — — 8 —	16	—
523	Ananas-Kartoffeln, große, sehr tragbar, 6 Stück	2	—
524	Mandeln — sehr schön 100 —	8	—
525	Violette mit schwarzer Schaale 6 —	1	6
526	Stachys palustris, wie Spargel bereitet delikat, 12 St.	1	6
527	— — größere, sogleich zum Verspeisen	2	—
528	100 Stück große Ananas-Erdbeeren	8	—
529	100 — ohne Ranken —	8	—

Gefüllte Georginen.

Ich erlasse hiervon nach meiner Auswahl:

530 12 Stück 1r Qualität zu 5 Thlr.
531 12 — 2r — — 3 —
532 12 — 3r — — 2 —
533 12 — 4r — — 1½ —

Georginen-Cataloge sind besonders abzulangen.

534 Saamen: 100 Korn Anemonen-Blüthen 1 Thlr.
535 — 100 — extra gefüllte 12 gl.

☞ Die Salat-, Bohnen-, Kohl-, Zwiebel- und Kraut-Sämereien sind zum Theil von Mitgliedern des Vereins gezogen und von Unterzeichnetem als vollkommen keimfähig befunden worden, zum Theil liegen sie noch zur Prüfung vor. Jedenfalls werden die Abnehmer die keimfähig und gut befundenen an den mit dem Vereinsstempel versehenen Paqueten erkennen können.

Gotha, den 16. December 1832.

Der zur Prüfung der Sämereien ernannte
Ausschuß des Thüringer Gartenbau-Vereins.

Bemerkungen.

1) Die Zahlung geschieht in preußischem Courant, oder in Tresor-Scheinen.
2) Ohne Beifügung des baaren Betrags zu jeder Bestellungsnote, kann nichts verabfolgt werden. Es versteht sich jedoch, daß jeder mir bekannte reelle Zahler hier nicht gemeint sein kann.
3) Für Emballage bitte ich eine kleine Vergütung beizulegen; auch bitte mir bei jeder Bestellung zu bemerken: ob ich für fehlende Gegenstände ähnliche andere geben darf, oder ob ich den Betrag dafür zurück schicken, oder auch auf eine anderweitige Bestellung gut schreiben soll? Dieses gilt indessen hauptsächlich von spät eingehenden Aufträgen.
4) Den Betrag für das Gewünschte erwarte ich franco.
5) Die Bestellungen werden der Reihe nach, so wie sie eingegangen, expedirt, und sind desfallsige Erinnerungen überflüssig. Deutliche Unterschrift und genaue Angabe des Wohnorts, sind das erste Mal zur promptern Bedienung erforderlich.
6) Mein Preiß-Courant, worin die Preise per Pfund für diejenigen, welche wieder damit handeln, auf das Billigste gestellt sind, steht auf frankirtes Verlangen zu Diensten.

Gotha, im November 1832.

J. C. Grimm,
correspondirendes Mitglied des thüringischen Gartenbau-Vereins in Gotha und Mitglied der Gartenbau-Gesellschaft zu Frauendorf in Baiern.

Zweiter Catalog

oder

Auswahl der allervorzüglichſten, ſchönſten und neuen

gefüllten

Georginen oder Dahlien,

welche

zu ſehr billigen Preiſen zu haben ſind

bei

Johann Caspar Grimm,

Neudietendorfer Commissions-Handlung in Gotha.

Bis Auguſt 1833 gültig.

Dieſer neue Georginen-Catalog enthält allein nur Blumen von beſonderer Schönheit, vollkommener Füllung, und zum Theil ſeltener Farbenpracht, in 16 Sorten anemonen- und kugelblüthigen-, 60 Sorten niedrigwachſender oder Zwerg-, und 200 Sorten mittelhoch- und hochwachſender Georginen, aus einer Sammlung, welche über 500 Sorten zählt.

Bleibt mir die Wahl überlaſſen, ſo erlaſſe ich aus der ganzen Sammlung, ausſchließlich der anemonenblüthigen: 12 Stück guter Blumen, mit Angabe der Farben zu 1½ Thaler; 12 Stück ſehr ſchöne Sorten, mit Namen zu 2 Thaler; 12 Stück beſſere Sorten, mit Namen zu 3 Thaler; 12 Stück vorzüglich ſchöne Sorten, mit Namen zu 5 Thaler; 12 Stück Prachtblumen, mit Namen zu 8 Thaler; 12 Stück nur neue Prachtblumen, mit Namen zu 10 Thaler; 12 Stück anemonenblüthige, mit Namen zu 6 Thaler; 100 Stück gute Sorten in Rummel zu 8 Thaler.

Saamen von nur vorzüglichen Sorten geſammelt, erlaſſe ich 25 Korn zu 4 gGr., 50 Korn zu 8 gGr., 100 Korn zu 12 gGr. — Von anemonenblüthigen Georginen 20 Korn zu 6 gGr., 40 Korn zu 12 gGr., 80 Korn zu 1 Thaler; woraus man unter angemeſſener Behandlung ſelbſt Vorzügliches erwarten darf.

Bemerkungen.

1. Die Zahlung geſchieht in Preußiſchem Courant oder in Treſorſcheinen.
2. Ohne Beifügung des baaren Betrags zu jeder Beſtellungsnote oder einer ſichern Anweiſung kann nichts verabfolgt werden.
3. Erwarte ich jeden Auftrag portofrei, und bitte ergebenſt, nach Verhältniß der Beſtellung für nothwendige Emballage, Kiſten und dergleichen etwas beizulegen.
4. Die Beſtellungsnote bitte ich auf ein beſonderes Blatt, und nicht in den Brief zu ſchreiben, damit ich es als Beleg wieder zurückſenden kann. Auch kann bei Verſchreibung nur die Nummer des Verlangten und das Quantum angegeben werden. Den Namen und Wohnort aber bitte ich recht deutlich zu ſchreiben.

Anemonenblüthige Georginen.

Nummer.	Fuß=Höhe der Pflanzen.	Zoll=Durchmeſſer der Blumen.		gGr.
1	5	3	Anemonifl. Brown, braunroth	16
2	6	3	- Dicks, blutroth	16
3	5	3	- atrosanguinea, dunkelroth	16
4	5	3	- Tricuspidata, carminroth	16
5	5	4	- Booths, flammende Lachsfarbene	16
6	4	4	- Scabiosaeflora, ſchwarze Scabioſablüthige	16
7	7	4	- Stript Buff, ziegelroth, gelb und braungeſtreift.	16
8	4	4	- purple crimson, ſammt purpur	16
9	5	4	- Painted Lady, lilafarben mit brauner Einfaſſüng	16
10	6	4	- Globe Large Pink, kugelförmige leuchtend roth	16
11	5	3	- - purpurea elegans, - bläuliche	16
12	6	4	- - blood red, kugelförmige blutroth	16
13	6	4	- - Sabine, - gelb röthl.	16
14	6	4	- - Monstrosa - purpurfarbig mit dunkelbraun geſtreift	16
15	6	3	- - feathered light crimson, kugelförmig hellſcharlach.	16
16	6	4	- - Dark red, kugelförmig dunkelroth	16

Niedrigwachsende oder Zwerg-Georginen.

Nummer.	Fuß=Höhe der Pflanzen.	Zoll=Durchmeſſer der Blumen.		gGr.
9	4	4	Imbricata, dunkelſcharlach	8
19	4	4	Emma, blaßroſa mit weiß	8
34	4	1	Lilacina amoena, ſchön lila, gezackt	8
57	4	4	Zelinde, hellgelb mit regelmäßiger Zeichnung, vielbl.	8
70	4	5	Castor und Pollux, orangefarbig	18
84	4	4½	Nouvelle favorite, gelb und roth	12
88	4	4	Coelirosa, violett, krausblättrig	8
93	4	4	Lineus, ſchwefelgelb	12
104	4	4	Orion, orange und gelb	8
105	4	4	Pulchella, ſehr ſchön violett, gezacktblätterig	8
126	4	4	Nulli, ſehr ſchön lila	8
133	4	4	Aurantiaca minor, lebhaft orange gelb, vielbl.	8
139	4	4½	Livius, blaßroth und gelb ſtreifig	8
142	4	4	Lindor, orangefarbig vielbl.	8
144	4	5	Luteola, chamoisfarbig, vielbl.	8
148	4	4	Fulgida nana, lebhaft naſturziumfarbe	12
156	4	4	Pupille, carmoiſinfarbig	8
180	4	4	Dwarf purple, ſchön purpurviolett	8
185	4	6	Grandesse, prachtvoll ſammtbraun vielbl.	12
186	4	4	Amaranthe, amaranth und ponceau.	12
189	4	5	Regina Elisabeth, ſchön ſammt granat braun	12
191	4	5	Fimbriata, ſchön carmoiſin braun	12
206	4	4	Mutabilis, ſehr ſchön carmoiſin, innen braun	12
208	4	4	Lilac pumila, ſehr ſchön zart lila, vielbl.	12
212	4	5	Pourpre imperial, ſehr ſchön ſammt purpur	12
230	4	4½	Buff dwarf, fleiſchfarben, roth ſchattirt, vielbl.	12
233	4	4	Violacea pall. int. lactea, blaß violett innen weiß	12
236	4	4	Odier, ſammt zinnober, vielbl.	12
238	4	4	Lord Cochrane, ſehr ſchön braun purpur, vielbl.	24
252	4	4	Corinna, granat braun, vielbl.	12
254	4	4	Pourpre royal, dunkel ſammt purpur	12
262	4	4½	La Vestale, ſehr ſchön rein weiß	24
265	4	5	Large dwarf lilac, purpur lila	12
268	4	5	Bella, prachtvoll tief amaranth, vielbl.	24
269	4	4	Bellona, prachtvoll ſammt amethyſt, vielbl.	24
273	4	4	English Hero, prachtvoll ſammt carmoiſin purpur, vielbl.	24
274	4	4	Lady Blak, prachtvoll ſammt granat braun, vielbl.	24
276	4	4	Mount Vesuvius, ſammt braun, vielbl.	24
278	4	5	Man of Kent, prächtig carmoiſin purpur	24
282	4	4	Themis, ſehr ſchön kirſch purpur	16
286	4	4	Donna Maria, ſehr ſchön kirſch carmoiſin	16
292	4	4	Héroine, hellroth	12
330	4	5	Bells dwarf yellow, ſehr ſchön ſchwefelgelb	24
331	4	4	Aemula, ſchön braun	12
332	4	6	Marjolin, prächtig granat purpur	12
243	4	5	Pourpre cramoisie prächtig purpur carmoiſin, vielbl.	12
361	4	4	Dark dwarf, rothbraun, vielbl.	16
376	4	3	Turban Zwerg, ſehr ſchön lebhaft ſcharlach vielbl.	24
391	4	6	Royal lilac, prachtvoll lila	24
408	4	4	Pumila, ſehr ſchön violett	8
412	4	4	Pavonina, orangegelb und roth, vielbl.	12
419	4	4	Rouge bandé, roth, regelmäßig hellgelb gerändert	12
420	4	4	Icentia, ſchön dunkelviolett	8
421	4	5	Phoenix, prächtig ſammt ponceau.	24
464	4	4	Fatime, ſehr ſchön citrongelb mit gelben Spitzen.	12
470	4	4	Albinia, rein weiß	12
482	4	4½	Thusnelde, lilafarbig mit violetter Zeichnung	12
484	4	4	Scarlet ranunculus, ſehr ſchön tief ſammt ſcharlach	16
491	3	4½	Pygmaea, ſehr ſchön orangefarben, vielbl.	24

Mittelhohe und hochwachsende Georginen.

Rein weisse.

Nummer.	Fuß=Höhe der Pflanzen.	Zoll=Durchmeſſer der Blumen.		gGr.
1	6	4	Lactea, milchweiß	12
187	6	4½	Blanc satiné, rein weiß	8
209	6	4½	Mountain of Snow, rein weiß	24
211	6	4½	Praecellentissima, zart weiß, in röthlich ſchimmernd	24
241	6	4½	Princesse Caroline, weiß mit zarten roſa Schein	12
299	5½	4	Donna Lisetta, weiß, zuweilen mit lila Schein	16
303	6	4½	Nivalis, weiß mit lila Schein	16
304	7	4	Blanc superbe, rein weiß	12
306	7	4	Donna Cecile, rein weiß	12
386	6	5	Le chevalier, prachtvoll weiß.	12
409	6	4	Anna, weiß, mit gelblichen Schein	16

Weisse mit andern Farben.

Nummer.	Fuß=Höhe der Pflanzen.	Zoll=Durchmeſſer der Blumen.		gGr.
81	6	5	Lilacina alba, lila weiß	8
166	5½	4	Alba rosea, weiß, dunkelroſa ſchattirt	12
234	5½	4	Leopoldine, weiß, die obere Hälfte der Blätter violett getuſcht, innen weiß	24
284	5	4	Rosalinde, Grund weiß, die Spitzen der Blumenblätter regelmäßig lila umſchloſſen	12
370	6	4½	Alba lilacina, weiß mit lila	12
428	7	4	Candida, weiß mit violett geſprenkelt, auch ½ gef.	16
458	6	4	Mollis, weiß mit violett	24
462	6	4½	Striata magnifica, weiß lebhaft roſa geſtreift, innen rein weiß	24

Rosafarbige.

Nummer.	Fuß=Höhe der Pflanzen.	Zoll=Durchmeſſer der Blumen.		gGr.
61	6	4½	Rosalvina, ſehr ſchön roſa und weiß	12
67	7	4	Venusta, ſchön dunkelroſa	8
77	6	4	Maria, roſa und violett geſtreift	8
114	6	5	Tulipana, ſchön roſa mit weißen Spitzen	12
124	6	5	Rosa Formosa, dunkelroſafarben	8
160	5	4	Rosa amoena, dunkelroſa innen weiß	8
170	6	5	Animata, ſehr ſchön roſafarbig	12

Nummer.	Fuß-Höhe der Pflanzen.	Zoll-Durchmeſſer der Blumen.		gGr.
309	5	5	Lady Arden, ſchön dunkelroſa	12
316	5½	5	La demoisselle, ſehr ſchön roſa, innen weiß	24
320	6	4	Rosa nacarat; ſehr ſchön zart roſa, innen weiß	16
321	8	4	- satiné, ſehr ſchön roſa	16
358	6	4	Casimir Delavigne, ſehr ſchön carmin roſa	16
372	6	5	Rose grandiflore, ſehr ſchön roſa mit purpur Schein	12
394	6	5	Pillichody, prachtvoll purpur roſa, weiß ſchattirt	16
398	5	4	Sublata, ſehr ſchön lila roſa.	12

Lilafarbige.

Nummer.	Fuß-Höhe der Pflanzen.	Zoll-Durchmeſſer der Blumen.		gGr.
48	5	4	Lilacina speciosa, ſchön lila	8
147	7	5	Baron v. Maltzahn, ſchön lilafarben	12
182	6	5	Lilas marginé, ſchön zweifarbig lila	8
288	5	4	Gracilis, zart helllila	12
323	6	5	Jessica, ſehr ſchön lila	16

Violette.

Nummer.	Fuß-Höhe der Pflanzen.	Zoll-Durchmeſſer der Blumen.		gGr.
14	5	5	Prinz Friedrich, ſchön dunkelviolett	12
21	6	4	Violette multiflore, violett, vielblumig	8
176	6	5	Langley purple, prächtig violett	12
188	7	5	Duchesse de Glocester, purpur violett	12
197	6	4½	Atalante, ſehr ſchön violett und weißbunt	12
258	5	4	Arta, ſchön violett	8
259	5	4	Ranunculoides, ſchön purpur violett	8
263	6	4	Elisa, violettroth mit hellen Adern	8
455	7	4	Erich, purpur violett	8
471	6	5	Viola, ſehr ſchön lebhaft veilchenblau	12
472	5	5	Laura, prachtvoll dunkel	12
474	6	4	Violette elegant, ſehr ſchön purpur violett	12
487	6	4	Aurelia, ſehr ſchön violett	12

Purpurfarbige.

Nummer.	Fuß-Höhe der Pflanzen.	Zoll-Durchmeſſer der Blumen.		gGr.
43	5	6	Camilla, prachtvoll ſammt purpur	12
90	5	5	Africana, braun purpur	8
192	6	4	Regida, granat purpur	12
199	5½	5	Collvills perfecta, prachtvoll carmoiſin purpur, innen tief braun	24
245	6	5	Purpurea striata, purpurfarbig mit lebhaft hellen Streifen	12
275	6	4	Girardon, braun purpur, vielblumig	12
280	6	5	Chamäleon, purpurfarbig, prächtig regelmäßig lebhaft lila bandirt (vielleicht die ſchönſte, wahrhaft bandirte Georgine)	24
333	8	5	Washington, prachtvoll purpur	12
335	6	5	Thouin, ſammt purpur	12
345	6	4	Henriette Wilhelmine, purpur mit weiß geſtreift	12
402	5	4	Dorilas, dunkelpurpur	8

Braune.

Nummer.	Fuß-Höhe der Pflanzen.	Zoll-Durchmeſſer der Blumen.		gGr.
190	6	4	Grenat d'Orient, granatfarben	12
195	6	5	Empereur d'Autriche, ſammtbraun	16
196	7	5	Coronada, ſehr ſchön ſammtbraun	12
200	6	5	Leopold, ſehr ſchön ſammtbraun	12
251	10	6	Louis Spohr, prachtvoll tief ſammtbraun	16
336	8	5	Brun cramoisie, carmoiſinbraun	12
337	8	4½	Othello, dunkel ſammt braun	12
339	8	5	Brun satiné, prachtvoll ſammtbraun	12
351	7	5	Hercules, prachtvoll ſammtbraun	16
385	7	5	Brun apparent, prachtvoll ſammt rothbraun	12

Nummer.	Fuß-Höhe der Pflanzen.	Zoll-Durchmeſſer der Blumen.		gGr.
400	5	5	Orpheus, ſehr ſchön dunkelbraun	16
439	6	5	Sesostris, prachtvoll dunkel ſammtbraun	12
477	5	4½	Nobla, prachtvoll dunkel ſammtbraun	16
478	5	5	Cornelia, prachtvoll dunkel ſammtbraun	16
488	5	4	Grenada, ſchön granatbraun	12

Carmoisinfarbige.

Nummer.	Fuß-Höhe der Pflanzen.	Zoll-Durchmeſſer der Blumen.		gGr.
32	5	4	Cramoisie, violett carmoiſin	8
86	5	4	Cramoisie superbe, amaranth carmoiſin	8
128	5	4½	Pasta, ſchön ſammtbraun carmoiſin	12
210	6	4½	Beauty of England, prachtvoll ſammt carmoiſin	12
301	7	4½	Archiduc Jean, dunkelſammtroth carmoiſin	12
305	8	5	Rainbow, prachtvoll ſammt carmoiſin	12
381	7	6	Royal sowereign, prachtvoll braun carmoiſin	12
430	5	4½	Cora, ſehr ſchön carmoiſinfarben, innen ſammtbraun	12
451	5	4	Chremesina, ſehr ſchön carmoiſin	12
466	6	5	Sultan, prachtvoll carmin carmoiſin	16
475	5	4½	Uminsky, prachtvoll ſammt carmoiſin	16
479	5	5	Riehl, prachtvoll ſammt braun carmoiſin	24

Carminfarbige.

Nummer.	Fuß-Höhe der Pflanzen.	Zoll-Durchmeſſer der Blumen.		gGr.
79	6	5	Muttata, prachtvoll ſammt carmin	12
87	5	4	Alette, ſammt ponceau carmin	8
136	6	4	Henriette Sonntag, dunkelcarmin	8
249	6	4	Mme. Bilotti, roſa carmin, vielbl.	12
260	5	5	Ludolphus, carmin, roſa orange	12
294	6	5	Gerard, prachtvoll carmin, geſtreift	12
308	8	5	Archiduc Louis, prachtvoll carmin, purpur durchſcheinend	12
437	5	4	Carmin rose, carmin roſa durchſcheinend	12
499	6	5	Josephe, prachtvoll ponceau carmin	12

Dunkelrothe, braunrothe, kupferfarbene.

Nummer.	Fuß-Höhe der Pflanzen.	Zoll-Durchmeſſer der Blumen.		gGr.
15	5	5	Triomphe de Louvain, braunroth	8
36	6	4	Trajanus, kupferroth	8
39	6	6	La Grandeur, dunkelroth	8
52	5	4	Atropunica superba, ſchwärzlich blutroth	12
65	6	5	Diebitsch, blutroth	12
113	5	4	Rubra speciosa, ſammt braunroth	12
145	5½	5	Sartorelli, blutroth und gelb	12
203	6	5	Radiata, ſammt braunroth	12
239	6½	5	Beauty of Hardfort, prachtvoll dunkel ſammtroth	24
240	6	5	Jupiter, ſammt braunroth mit tief geſchlitztem Blatte	16
272	6	4½	Queen of Augusta, prachtvoll ſammt amaranth, vielbl.	24
342	6	5	Duco di san-Christina, prachtvoll ſammt amaranth	24
413	6	5	Hirta, dunkelkupferfarbig	12
496	6	5	Formosissima, prachtvoll dunkelſammtroth	16

Hellrothe.

Nummer.	Fuß-Höhe der Pflanzen.	Zoll-Durchmeſſer der Blumen.		gGr.
22	6	4	Belle rouge, ſchön hellroth	8
95	6	4	Elegans, ſehr ſchön lebhaft ſammtroth	12
121	5	4	Viloresi, ſehr ſchön lebhaft ſammtroth	12
202	5½	4½	Lady Farnborough, ſchön ſammtroth	12
408	6	4	Ardescens, prachtvoll lebhaft roth	12
463	6	4	Rouge velouté, ſchön lebhaft ſammtroth	12
484	5	4	Budley, ſehr ſchön lebhaft ſammtroth	12
486	6	4	Harlequin, ſehr ſchön roth	12

Ponceaufarbige.

Nummer.	Fuß-Höhe der Pflanzen.	Zoll-Durchmesser der Blumen.		gGr.
2	5	4	Arderia, ponceau mit weiß geſtr. Zwiſchenblättchen	12
115	5	4	Coccinea praenitens, ponceau farben	8
173	5	4½	Pietro, ſehr ſchön ponceaufarben	12
214	5	4	Morning star, ſehr ſchön lebhaft ponceau, vielbl.	12
216	8	4½	Charles Pictet, ſehr ſchön ponceau	12
293	6	5	Lindleyana, prachtvoll ſammt braun ponceau	24
356	9	6	Couynard, prachtvoll ponceau und ſammt carmoiſin	16
379	5	4	Brillanta, ſehr ſchön ponceaufarben	8
382	7	5	Diadema, prachtvoll ſammt ponceau	12
390	6	6	Robin, ſehr ſchön braun ponceau	8
434	6	5	Mentor, ſehr ſchön amaranth ponceau	12
448	6	4	Romeo, prachtvoll ſammt ponceau m. carmoiſin Schein	12

Scharlachfarbene.

Nummer.	Fuß-Höhe der Pflanzen.	Zoll-Durchmesser der Blumen.		gGr.
23	6	4	Cardinalis, ſchön lebhaft ſcharlach	8
27	5	5	Coccinea superba, ſehr ſchön dunkel ſcharlach	8
31	6	5	Splendens, prachtvoll lebhaft ſammt ſcharlach	12
47	6	6	Eclipse, ſehr ſchön dunkelſcharlach	8
140	5	4	Canaris, lebhaft dunkelſcharlach	12
167	6	5	Coccinea formosa, dunkelſcharlach	8
169	6	4	Fulgida speciosa, prachtvoll feurig ſcharlach	12
201	6	4½	Scarlet Turban, prachtvoll ſehr lebhaft ſcharlach	24
220	8	4½	Prince de Metternich, ſehr ſchön golden ſcharlach	12
232	7	5	Ecarlat Frey, prachtvoll ſammt ſcharlach	16
307	5½	5	Soulange Bodin, prachtvoll lebhaft ſcharlach	12
313	7	5	Coruscans, lebhaft ſcharlach	12
360	7	4	Le Prince, ſammt ſcharlach ſcheinend	12
385	6	5	Comte de Rouvroy, prachtvoll lebhaft ſcharlach	24
410	6	4½	Avemann, prachtvoll lebhaft ſcharlach	24
468	5	4	Apollinus, ſehr ſchön matt ſcharlach	12
481	6	4	Rumpſini, ſehr ſchön lebhaft ſcharlach	16
483	6	5	Espe, prachtvoll lebhaft ſammt ſcharlach	24

Zinnober- und Nasturciumfarbige.

Nummer.	Fuß-Höhe der Pflanzen.	Zoll-Durchmesser der Blumen.		gGr.
64	5	4½	Johanna, orange zinnober.	8
96	5	4	Maurice, ſehr ſchön zinnoberroth	8
132	5	4	Fulgida, leuchtend zinnober	12
222	6	4½	Crimson Seedling, tief leuchtend zinnober	12
315	6	4½	Prinz Oscar, zart leuchtend zinnober	12
322	6	4	Riegel, ſehr ſchön naſturciumfarben	12
327	6	4	Flora speciosa, ſehr ſchön orange zinnober	12
397	7	5	Saint-Ours, prachtvoll ſammt naſturcium	16
452	6	6	Jessonda, ſehr ſchön dunkel zinnoberfarben	12
494	6	5	Schwediana, prachtvoll lebhaft naſturciumfarben	12

Orangenfarbige.

Nummer.	Fuß-Höhe der Pflanzen.	Zoll-Durchmesser der Blumen.		gGr.
45	5½	5	Isabella, prachtvoll hochorangeroth	12
80	6	6	Soleil d'or, prachtvoll orange und gelb	12
226	6	4½	Aurantiaca superba, ſehr ſchön orange, vielbl.	16
227	7	6	Aurantiaca magnifica. prachtvoll orang	16
228	7	5	Duc d'Orleans, ſehr lebhaft golden orangt	16
279	7	5	Aurantiaca splendens, ſehr ſchön lebhaft orange	8
300	6	4½	Tropeolum novum, ſehr ſchön naſturcium orange	12
350	6	4½	Aurantiaca speciosa, prachtvoll rein ſammt orange	24
355	6	6	Goweri, prachtvoll orange	12
365	7	4½	Orange superbe lebhaft orange und roth	16
435	5	5	Mandarin, prachtvoll orangefarbig mit roth ſchattirt ſehr ſchön lebhaft orange	16
457	7	5	Egmont, ſehr ſchön lebhaft orange	12
460	5	4	Mirabilis (fol. atropurp.), lebh. orangeroth in ganz dunkeln Laube, neu u. merkwürdig	12

Fleiſch- und nankinfarbige.

Nummer.	Fuß-Höhe der Pflanzen.	Zoll-Durchmesser der Blumen.		gGr.
10	7	4½	Nankin, nankinfarben	8
44	6	4	Camelina picta, chamoisfarben mit lila Spitzen	16
55	5	4½	Hermine, nankin mit roth ſchattirt	8
63	6	6	La Victorieuse, nankinfarbig	12
66	5	5	Bijoux de Parade, prachtvoll dunkelchamois	12
205	5½	4	Aurea picta, nankinfarbig und roth, vielbl.	8
264	8	6	Marianne, gelb mit kirſchroth.	8
404	6	1½	Olivata, nankinfarben mit olive Schein	16
411	5	4	Pomone, chamoisröthlich, vielblumig	12
459	5½	6	Armida, prachtvoll nankinfarben	12
485	6	4	Fuscata elegans, angenehm lebhaft nankinröthlich innen goldgelb	12

Goldgelb, ſchwefelgelb, citronengelb.

Nummer.	Fuß-Höhe der Pflanzen.	Zoll-Durchmesser der Blumen.		gGr.
69	6	4½	Geisterholm, weißgelb	16
76	6	5	Martinet, ſchwefelgelb	12
89	5	4½	Hout-Tuyn, hellſchwefelgelb mit roſa Schein	12
110	6	4	Sulphurea speciosa, ſchwefelgelb, vielbl.	12
129	5	6	Sulphurea flavescens, ſchwefelgelb mit nankin Schein	8
154	7	4	D'oré brillante, ſchön citrongelb, nankin Schein	12
221	6	4	Aurea miniata, goldfarben und mennigroth, vielbl.	12
374	6	4½	Florissima elegans, ſehr ſchön lebhaft citrongelb, vielbl.	12
399	6	5	Vittata, prachtvoll lebh. ſchwefelgelb, zuweilen roth geſtr.	16
401	6	4½	Esther, ganz blaßgelb, mit roth lebhaft ſchattirt	12
444	6	4½	Citron pyramide, lebhaft citrongelb mit rothen Spitzen	76
461	6	5	Venus urania, prachtvoll, rein königsgelb	24
476	7	4	Sulphurea picta, ſehr ſchön ſchwefelgelb mit violett und weißen Spitzen	16
490	5	4	Citron superbe, ſehr ſchön lebhaft citrongelb	12

Druck und Papier von Jerome Hotop in Caſſel.

VERZEICHNISS
für das Jahr 1833
von
GEMUESE-, FELD- UND BLUMEN-SAEMEREIEN,
welche jederzeit, beſonders ächt und friſch, zu nachſtehenden billigen Preiſen zu haben ſind
bei
FRIEDRICH WILHELM WENDEL
Kunſt- und Handelsgärtner in Erfurt.

Dieſes Verzeichniß, welches ich mich beehre, Garten-Beſitzern und Blumenfreunden vorzulegen, enthält auch Sortiments von Levcojen, Aſtern, Balſaminen und Ritterſporn-Saamen, womit ich einen jeden reſpectiven Abnehmer verſichern kann, beſonders meine Levcojen, die ſtark ins Gefüllte fallen, ſind ſehr zu empfehlen, da ich ſie mit der größten Mühe und Sorgfalt ſelbſt erziehe.

Die Preiſe ſind nach Preußiſchem Courant, den Thaler zu 24 gute Groſchen gerechnet.

Kohl- und Gemüſeſaamen.

	à Lth		à ℔	
	Gr.	Pf.	Rt.	gr.
Blumenkohl, großer, ſpäter, kapiſcher	8	—	—	—
, , , holländiſcher	4	—	—	—
, , früher, engliſcher	6	—	—	—
, , , cypriſcher	6	—	—	—
Kraut oder Kopfkohl, Erfurter, großes, weißes	2	—	—	—
, , , frühes, rothes	1	6	—	—
, , , kleines, frühes, feſtes	1	—	—	—
, , großer, früher, Braunſchweiger	2	—	—	—
, Zuckerhut, großes	2	—	—	—
, Erfurter, blutrothes, niedriges, frühes Salat, extra	1	6	—	—
, holländ. blutrothes, großes, ſpätes	2	—	—	—
Wirſing oder Börskohl, Erfurter großer ſpäter	1	6	—	—
, grüner, kleiner, ſpäter	1	—	—	—
, Ulmer, ganz früher, niedriger	1	6	—	—
, , halbfrüher	1	6	—	—
, , ſpäter, großer	1	6	—	—
, Wiener, ganz früher, extra	2	6	—	—
Winterkohl, grüner, niedriger, krauſer	—	9	—	—
, brauner	—	9	—	—
Schnitt- oder Frühlingsblattkohl	—	6	—	—
, engliſcher blumenkohlblättriger	—	6	—	—
Glaskohlrabi, Wiener, kleinlaubige, niedrige, frühe, weiße	2	—	—	—
, Wiener, kleinlaubige, blaue	2	6	—	—
, engliſche, frühe, weiße	1	6	—	—
, , , blaue	1	9	—	—
Oberkohlrabi, große, weiße, runde	—	6	—	—
Unterkohlrüben oder Erdkohlrabi, große, weiße				
, gelbe, ſchwediſche, extra				

Küchen-Kräuter.

Anethum, Dill	—	8	—	—
Baſilikum, großer	1	6	—	—
, kleiner, krausblättriger	2	—	—	—
Bohnenkraut oder Saturei	1	—	—	—
Gartenkreſſe, gefüllte krausblättrige	—	6	—	—
, ordinaire	—	8	—	—
Kerbel	—	6	—	—
Lavendel oder Spicke	1	—	—	—
Löffelkraut	1	6	—	—
Majoran, franzöſiſcher, buſchigter	1	6	—	—
Meliſſe, Citronen	1	9	—	—
Peterſilie, einfache, Schnitt	—	6	—	—
, krausblättrige, gefüllte	1	—	—	—
Portulack, gelber	1	6	—	—
, grüner	1	—	—	—
Salbei	1	—	—	—
Spinat, breitblättriger, rundkörniger	—	—	—	4
, langblättriger, ſtachelkörniger	—	—	—	4
Spinat engl. breitblättriger	—	—	—	6
Thymian	1	6	—	—
Weinraute	2	—	—	—

Wurzel- und Rübenſaamen.

Carotten oder Möhren, frühe, holländiſche, kurzſchw.	1	—	—	14
, lange, dunkelrothe, Frankfurter	1	—	—	18
, Erfurter, lange, rothgelbe	1	6	—	10
, Saalfelder, blaßgelbe	—	6	—	8
Peterſilienwurzel, Erfurter lange	1	—	—	—
Sellerie, großer, holländiſcher, Knoll	2	—	—	—
Wurzel, große Paſtinak	1	—	—	—
, Scorzoner oder Schwarz	1	—	—	—
, Rapontica	1	—	—	—
, Cichorien, lange, glatte	—	6	—	8

	à Lth		à ℔	
	Gr.	Pf.	Rt.	gr.
Rüben, lange, weiße Herbſt oder [illegible]	—	6	—	8
, holländiſche runde, weiße Mai	—	8	—	—
, , , gelbe	—	8	—	—
, Teltauer oder Märkiſche	—	9	—	12
, blutrothe Salat oder Beeten	—	6	—	8
Runkel- oder Dickrüben, große, rothe		—	—	5
, gelbe Zucker, zu Kaffee, anſtatt Möhren	6	—	—	—

Salatſorten.

Salat, aſiatiſcher Kopf, braun Kern	2	—	—	—
, großer, arabiſcher, gelber Kopf, braun Kern	2	—	—	—
, aſiatiſcher, gelber Kopf, weiß Kern	1	6	—	—
, großer, bunter Forellen, weiß Kern	1	6	—	—
, engl. kleiner Blutforellen, extra braun Kern	1	6	—	—
, Schwedenkopf, weiß Kern	2	—	—	—
, , extra braun Kern	2	—	—	—
, engl. Prinzenkopf, weiß Kern	2	—	—	—
, ordin. , braun Kern	1	6	—	—
, brauner Mohrenkopf, braun Kern	1	6	—	—
, , Mailänder, gelb Kern	1	—	—	—
, früher, gelber Stech- oder Wirſing	1	—	—	—
, rothbrauner Prahl	1	6	—	—
, großer Forellen, braun Kern	2	—	—	—
, , Monat, weiß Kern	1	6	—	—
Winter-Endivien, glattblättrige	1	6	—	—
, , krausblättrige	1	6	—	—
Sommer-Endivien glattblättrige	1			
, , krausblättrige	1	6	—	—

Zwiebelſorten.

Zwiebel, Erfurter runde, rothe, harte Kopf	1	—	—	—
, lange gelbe Wiener	2	—	—	—
, runde gelbe holländiſche	2	3	—	—
, , blutrothe	2	—	—	—
, , ſilberweiße	2	3	—	—
Porree, dicker, Winter	2	—	—	—

Steckzwiebeln.

Steckzwiebeln, mehrere Sorten	100 Stück	4	—	—	—
, Rokambol	100 ,	4	—	—	—
, Schalotten, gewöhnliche	100 ,	4	—	—	—
, , große däniſche	100 ,	3	6	—	—
, Knoblauch	100 ,	4	—	—	—
, egyptiſche, über ſich tragende, ſehr gut im Geſchmack	10 Stück	4	—	—	—

Radies und Rettig.

Radies, weiße, runde, holländiſche, kurzlaubige	1	—	—	—
, rothe	1	—	—	—
, roſenrothe, runde, extra	2	—	—	—
, lange, weiße, Glas-	2	—	—	—
, , rothe	2	—	—	—
, , roſenrothe	1	—	—	—
Rettig, Erfurter, große, lange, ſchwarze, Winter-	1	6	—	—
, , runde, ſchwarze	1	6	—	—

Kernſorten.

Gurkenkern, Erfurter, mittellange, grüne, volltragende	2	—	—	—
, lange, grüne, Schlangen-	4	—	—	—
, , weiße	4	—	—	—
, Halliſche, lange, grüne	2	—	—	—
Kürbiskern, große	1	—	—	—

	à ℔		à L.	
	Gr.	Pf.	Gr.	Pf.
Spargelkern, Darmſtädter, weiße	1	—	8	—
„ Ulmer	1	—	10	—

Erbsſorten.

Zuckererbſen, engl., frühe, weißblühende	—	—	5	—
„ große, weiße, Remptreuſe, extra	—	—	6	—
„ grüne, blaublühende Säbel-	—	—	5	—
„ frühe, niedrige Zwerg-	—	—	6	—
Kneifel- oder Pahlerbſen, frühe, niedrige Mai-	—	—	5	—
„ Erfurter große, frühe Ranker-	—	—	2	6
„ ſpäte Gold- oder Wachs-	—	—	3	6

Bohnenſorten.

	à ℔		à S	
	Gr.	Pf.	Gr.	Pf.
Stangenbohnen, arabiſche, große, bunte oder Feuer-	—	—	4	—
Stangenbohnen, arabiſche, weiße bunte oder Feuer-	—	—	4	—
„ lange, breite, weiße Schwert-	—	—	5	—
„ „ „ breite	—	—	5	—
„ graue, weißſchalige	—	—	4	—
„ weiße, engl., extra	—	—	6	—
„ kleine, weiße Perl- oder Salat-	—	—	4	—
Buſch- oder Stammbohnen, frühe, runde, gelbe	—	—	4	—
„ „ „ gelbe Zucker	—	—	4	—
„ „ „ ſchwarze, früheſte	—	—	3	—
„ „ „ ſchwarzbunte Zucker-	—	—	4	—
„ „ „ weiße Schwert-	—	—	4	—
„ „ „ kleine weiße Feld-	—	—	2	—
Puffbohnen, große, engl. Windſor-	—	—	4	—
„ ordinaire, große Garten-	—	—	1	—
„ rothblühende	—	—	8	—
„ niedrige Mazagan	—	—	6	—

Auch ſind bei mir ſehr gut veredelte Obſtbäume in den mannichfaltigſten Sorten, und Formen, zu billigen Preiſen zu haben, und k einem jeden reſpektiven Beſteller mit ſchönen Stämmen dienen, da meine Baumſchule mit einer großen Auswahl beſtellt iſt.

* * *

VERZEICHNISS
von
BLUMENSAMEN.

Gefüllte Röhrenaſter

als:

	à Priſe		à Lth.	
	gr.	₰	Rℛ.	gr.
Aſter chinenſis fl. pleno, gefüllte Röhrenaſter			—	12

№ und in folgenden Sorten:

1 Dunkelroth
2 : mit weiß
3 Carmeiſinroth
4 Dunkelblau
5 : mit weiß
6 Blaßroſa
7 : mit weiß
8 Blaßblau
9 Weißgelblich
10 Weißröthlich
11 Fleiſchfarbene frühblühend
12 Aſchgrau
13 Blaßrothe, Band
14 Dunkelrothe, Band
15 Dunkelblaue, Band
16 Blaßblaue, Band
17 Blaßblau mit weiß
18 Aepfelblüthe

	à Priſe		à Lth.	
	gr.	₰	Rℛ.	gr.
Jede Sorte à 100 Körner	2	—		
Das ganze Sortiment obiger 18 Sorten in 18 Priſen. à 100 Körner . . . 1 Rℛ.	4	—		
in 18 Priſen à 50 Körner	20	—		
Das ganze Sortiment melirt	6	—		

Engliſche und halbengliſche Sommer-Levcojen, *Cheiranthus annuus*, welche nur in Priſen *à* 100 Körner abgegeben werden können.

als:

Engliſche Sommer-Levcojen, mit dicht aneinander ſitzenden Blumen.

№
1 Blaßlilla
2 Hellmordorée
3 Kupferbraun
4 Blaßroth
5 Metzgerbraun
6 Dunkelaſchgrau
7 Blaßziegelroth
8 Roſenfarbig
9 Blaßfleiſchfarbig
10 Dunkelmordorée
11 Blaßblau
12 Dunkelcarmin
13 Schwarzbraun
14 Fleiſchfarbig
15 Rothgrau
16 Hellaſchgrau
17 Violett
18 Weiß
19 Dunkelziegelroth
20 Carmoiſin
21 Zimmetbraun
22 Blaßbraun
23 Pfirſigblüthige
24 Kaſtanienbraune.

Engliſche mit dem Lack oder Weidenblatt.

25 Weiß
26 Carminroth
27 Zimmetbraun
28 Violett
29 Fleiſchfarbig
30 Dunkelaſchgrau
31 Dunkelziegelroth
32 Blaßbraun
33 Schwarzbraun
34 Hellblau
35 Rothgrau

Halbengliſche Sommer-Levcojen mit dem gewöhnlichen Blatt.

№ als:
36 Fleiſchfarbig
37 Dunkelaſchgrau
38 Blaßblau
9 Carminroth
Pfirſigblüthe
Blaßziegelroth
Blaßbraun
Zimmetbraun
Hellaſchgrau
Dunkelziegelroth
4 Blaßroth
4 Schwarzbraun
48 Hellmordorée
49 Violett
50 Kaſtanienbraun
51 Carmoiſin
52 Weiß
53 Metzgerbraun

Engliſche Herbſt oder Baſtard-Levcojen.

№ (laſſen ſich auch durchwintern).
54 Weiß
55 Violett
56 Weiß mit Lackblatt
57 Violett mit Lackblatt
58 Blaßroth
59 Dunkelcarmin
60 Blaßblau
61 Carminroth
62 Dunkelziegelroth
63 Hellmordorée
64 Roſenfarbig

Halbengliſche Herbſtlevcojen.

№
65 Carminroth
66 Kaſtanienbraun
67 Carmeiſinroth
68 Dunkelziegelroth
69 Apfelblüthe
70 Blaßblau
71 Weiß
72 Dunkelziegelroth mit Lackblatt
73 Fleiſchfarbig
74 Hellmordorée

	à Priſe		à Lth.	
	gr.	₰	Rℛ.	gr.
In Parthien von 12 ſchönen Sorten, jede Sorte zu 100 Körner	18	—		
von 24 Sorten . . . 1 Rℛ.	12	—		
von 36 . . . 2 Rℛ.	6	—		
Das ganze Sortiment von 74 Sorten, jede Sorte à 100 Körner . . . 4 Rℛ.	—	—		

Cheiranthus Cheiri fl. pleno.

	à Priſe		à Lth.	
	gr.	₰	Rℛ.	gr.
Gefüllter brauner Goldlack à 100 Körner	1	6		
„ dunkelbrauner extra à 100 Körner	3	—		
Violetter einfacher à 100 Körner	2	—		
Alle 3 Sorten in 300 Körner	4	—		

Winter-Levcojen.

(*Cheiranthus incanus.*)

In folgenden, gleich den Sommer-Levcojen ins gefüllte fallende Sorten.

A. Weiß
B. Violett
C. Carminroth
D. Dunkelroſa
E. Carmoiſin
F. Roſenfarbene
G. Blaßroſa
H. Mordorée
I. Blaßblau
K. Weiß mit Lackblatt

	à Priſe		à Lth.	
	gr.	₰	Rℛ.	gr.
Das ganze Sortiment von 10 Sorten à 100 Körner	10	—		
Dieſelben durcheinander	2	—		

Gefüllte hohe Ritterſporn.

(*Delphinium Ajacis, elatior fl. pleno.*)

	à Priſe		à Lth.	
	gr.	₰	Rℛ.	gr.
In 8 Sorten gemiſcht				6

Niedrige gefüllte Ritterſporn.

(*Delphinium Ajacis fl. pleno*)

	à Priſe		à Lth.	
	gr.	₰	Rℛ.	gr.
In 10 Farben melirt				8

№ und in folgenden Sorten.
1 Weiß
2 Blaßlilla
3 Blaßziegelroth
4 Violett
5 Blaßblau
6 Blaßbraun
7 Dunkelziegelroth
8 Aſchblau
9 Milchweiß
10 Leberfarbene

	à Priſe		à Lth.	
	gr.	₰	Rℛ.	gr.
Das ganze Sortiment zu ½ *Lth.* . . . 1 Rℛ.	—	—		
„ „ ¼ *Lth.*	16	—		

Gefüllte Levcojen, Ritterſporn.

(*Delphinium consolida fl. pleno.*)

	à Priſe		à Lth.	
	gr.	₰	Rℛ.	gr.
№ In 6 Sorten gemiſcht				6

1 Weiß
2 Blaßblau
3 Roſenroth
4 Dunkelblau
5 Bunte

	à Priſe		à Lth.	
	gr.	₰	Rℛ.	gr.
Das Sortiment in dieſen 5 Sorten, jede zu ½ *Lth.*	10	—		
: „ ¼	6	—		
Durcheinander	—	—		6

Gefüllte Balſaminen

(*Impatiens Balsamina fl. pleno.*)

№ In folgenden Sorten:
1 Weiß
2 Fleiſchfarben

	à Prſe. ſgr.	₰	à Lth. ſgr.	₰
3 Roſenfarben				
4 Scharlachroth				
5 Carmoiſinroth				
6 Kupferbraun				
7 Scharlachroth mit weiß				
8 Kupferbraun mit weiß				
9 Dunkelblau mit weiß				
10 Carmoiſinroth mit blau und weiß				
11 Roſa mit Carmoiſin				
12 Blaßlila				
13 Dunkellila				
14 [illegible]				
15 Blau, roth und weiß				
16 Weiß und braun punktirt				
17 Blau und weiß				
18 Pfirſichblüthe				
Das ganze Sortiment in obigen Sorten ſortirt zu 100 Körner	4	—		
Das ganze Sortiment v. obig. Sorten zu 25 Körner 1 ℛ	—	—		
„ „ „ 12 „	14	—		
Adonis aestivalis, Sommeradonisröschen	—	6		
„ *autumnalis*, Herbſtadonisröschen	1	—		
Agrostemma coeli rosea, Himmelsröschen	1	—		
Amaranthus bicolor, zweifarbiger Amaranth	1	—		
„ *caudatus*, Fuchsſchwanz	—	6		
„ *cruentus*, dunkelrother dito	1	—		
„ *hypochondriacus*, blaurother dito	2	—		
„ *tricolor*, dreifarbiger dito	1	6		
Anoda dillenii, ſchöne, blaue Anoda	1	6		
Anthemis arabica, arabiſche Camille	1	—		
Aster tenellus, zarte, hellblaue Aſter	1	6		
Blitum virgatum, ruthenförmiger Erdbeerſpinat	1	—		
Browallia elata, hohe, blaublühende Browallie	1	6		
„ „ *fl. albo*, weißblühende	1	6		
Briza maxima, größtes Zittergras	1	—		
Cacalia sonchifolia, Scharlachrothe Cacalie	1	—		
Calendula pluvialis, Regenringelblume	1	—		
„ *hybrida*, Baſtardringelblume, ſchön	1	6		
„ *officinalis*, gefüllte, gemeine	1	—		
Calliopsis bicolor, das ſchöne Mädchen, hübſch	1	6		
Campanula speculum, Venusſpiegel	1	—		
„ „ *fl. albo*, weißer Venusſpiegel	1	6		
„ „ *fl. roseo*, roſenroth Venusſpiegel	1	6		
Capsicum annuum fructo rubro, rothfrüchtiger				
„ „ „ *luteo*, gelbfrücht., ſpan. Pfeffer	1	—		
Catananche lutea, gelbe Raſſelblume	1	—		
Celosia cristata fl. diverse, in mehreren Farben	1	6		
Centaurea Cyanus, Gartenkornblume in vielen Farben	1	—		
„ *moschata*, weiße Biſamblume	1	—		
„ „ *fl. coeruleo*, blaue Biſamblume	1	—		
„ *suaveolens*, gelbe Kornblume	1	6		
Cerinthe major, große Wachsblume	1	—		
Cheiranthus maritimus, Meerlevkoje	1	—		
„ „ *fl. albo*, weiße Meerlevkoje	1	—		
Chrysanthemum carinatum, Goldwucherblume	1	6		
„ *coronarium*, gefüllte gelbe	1	—		
„ „ *fl. albo*, gekrönte, weiße	1	—		
Clarkia pulchella, ſchöne Klarkie	2	—		
„ „ *fl. purp.*, mit dunkeln Blumen, ſehr ſchön	2	—		
Convolvulus bicolor, zweifarbige Trichterwinde	1	—		
„ *tricolor*, dreifarbige	1	—		
Coreopsis Leucanthemum, Leucavelſche Wangenblume	1	—		
Cosmea bipinnata, doppeltgefiederte Cosmea	2	—		
Cynoglossum linifolium, weißes Vergißmeinnicht	—	—	3	—
Datura fastuosa fl. pl. ſchöner Stechapfel	1	—		
„ *Tatula*, blaßblauer	2	—		
Dracocephalum Moldavicum, *fl. albo et coeruleo*, blau und weiße, türkiſche Meliſſe	1	—		
Echium creticum, braunrother Natternkopf, neu und hübſch	1	—		
Elichrysum lucidum, glänzende Goldſonne	1	—		
Erodium gruinum, Reiherſchnabel	1	—		
„ *moschatum*, Biſam-, neu und ſchön	2	—		
Gilia capitata, kopfförmige Gilie	1	6		
Gomphrena globosa fl. albo, weißer Kugelamaranth	1	—		
„ „ *fl. rubro*, rother	1	—		
„ „ *fl. carneo*, fleiſchfarbener	1	—		
Grahamia aromatica, wohlriechende Grahamie	2	—		
Helianthus annuus fl. pl., große gefüllte Sonnenblume	1	—	6	—
„ *nanus fl. pl.* einen Fuß hohe	1	6		
Hibiscus trionum, Stundenbibiskus	1	—		
Iberis amara, weiße, bittere, Schleifenblume	1	—		
„ *umbellata*, doldentragende	1	—		
„ „ *fl. purpurea*, dunkelrothe, ſchön	1	6		
„ *pinnata*, gefiederte	1	6		
Ketmia vesicaria, großblumige Ketmie, ſehr ſchön	2	—		
Ipomoea purpurea fl. diverse, verſchiedenartige Trichterwinden	1	—		
Ipomoea purpurea, fl. diverse. Ein ganzes Sortiment in 12 Farben.	12	—		
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke	—	—	1	6
„ *striatus*, geſtreifte	2	—		
„ *tingitanus*, afrikaniſche	1	—		
„ *zeylanicus*, zeylaniſche	1	—		
In 6 Farben mirirt,	1	—	8	—
Lavatera trimestris fl. albo, weiße, dreimonatliche Lavatere		—	4	6
„ „ „ *fl. rubro*, rothe, dreimonatliche Lavatere		6	4	6
Leonurus nepalensis, Nepaliſche Mutterwurz neu	1	—		

	à Prſe. ſgr.	₰	à Lth. ſgr.	₰
Linaria bipartita, zweitheiliger Frauenflachs	1	—	—	
Lopezia excellarii, ſeltenblühende Lopezia	1	—	—	
Lupinus albus, weiße Lupine	—	—	1	
„ *coeruleus*, blaue	—	—	1	
„ *fl. diverse*, in mehreren Farben à Sorte 4 Körn.	6			
Malope trifida, dreitheilige Malope, ſehr ſchön	1	6		
Malva fragrans, Bisammalve	1	—		
„ *mauritiana fl. rubro*, rothe mauritianiſche Malve	1	—		
„ „ *fl. albo*, weiße				
„ „ *fl. variegatis*, weiß und roth geſtreifte Malve	1	—		
Madia annua, einjähriges Gemsbarn	1	—		
„ *proboscidea*, langſchnäblichtes Gemsbarn	1	—		
Medicago variegata, bunter Schneckenklee	1	—		
Mirabilis Jalappa, fl. diverse, gemeine Jalappe in 8	—	—	4	
verſchiedenen Farben gemiſcht	1	—		
„ *longiflora*, langblüthige wohlriechende Jalappe	1	—		
Momordica elaterium, Springgurke	1	6		
Nicotiana nyctaginiflora, ſchöner wohlriechender Taback	1	6		
„ *undulaeflora*, ſchöner	1	—		
Nigella damascena, gefüllter Schwarzkümmel	2	—		
Oenothera amoena, angenehme Nachtkerze	1	—		
„ *grandiflora*, großblumige	1	—		
„ *Romanzowii*, blaue	1	—		
„ *purpurea*, purpurrothe				
Papaver Rhoeas, gefüllter Ranunkelmohn in mehreren	1	6	3	
ſchönen Sorten	—	—	3	
„ *somniferum*, vorzüglich ſchöner Gartenmohn	1	—	5	
Reseda odorata, Reſeda wohlriechende	1	—	6	
Ricinus communis, gemeiner Wunderbaum	1	—		
Scabiosa atropurpurea, major, afrikaniſche	1	—		
„ *stellata*, weiße Sternblume	2	—		
Schyzanthus pinnatus, gefiederter Schlitzblume	2	—		
Senecio elegans fl. albo, weißgefülltes Kreuzkraut	2	—		
„ „ *fl. purpureo* rothgefülltes				
„ „ *fl. atropurpureo*, dunkelpurpurrothes Kreuzkraut ſchön	3	—		
Silene Armeria, Gartenſilene	1	—		
„ *pendula*, hangende Gartenſilene	1	—		
Solanum Lycopersicum pomiferum, hochrother Liebesapfel	1	—		
„ „ *pyriferum*, hochrothe Liebesbirn	1	—		
Sycios angulata, eckige Haargurke, zur ſchnellen Bekleidung von Lauben	2	—		
Tagetes erecta, fl. aurantiaca, goldgelbe Sammetblume	1	—		
„ „ *fl. orange*, gefüllte	1	—		
„ „ *fl. sulphurea*, ſchwefelgelbe	1	—		
„ „ *fl. pl. fistulosa*, rohrenf., orange, ſehr ſchön	2	—		
„ *minima fl. pl.* klein	1	—		
„ *patula fl. pl.* ausgebreitete	1	—		
Trifolium coeruleum, blaublühender Klee	1	—		
„ *incarnatum*, rothblühender	1	—		
Tropaeolum majus, große indianiſche Kreſſe	1	—	2	
„ *minus*, kleine	1	—		
Vicia Faba, atropurpurea, dunkelpurpurrothe Puffbohne	1	—	2	
Viola tricolor grandiflora, großblumiges Stiefmütterchen	1	—		
„ „ *nigra* und *lutea*	1	—		
Xeranthemum annuum, weiß gefüllte Papierblume	1	6		
„ „ blaugefüllte	1	6		
Ximenesia encelioides, gehörte Ximenesie	1	—		
Zea Mais, fructo variegata, die [illegible] mit verſchiedenfarbigen Körnern	1	—	2	
Zinnia grandiflora, großblumige Zinnie	1	—		
„ *multiflora*, vielblühende rothe und gelbe Zinnie.	1	—		

	Rth.	Sgr.	₰
Ein Sortiment ſchön blühender Blumenſamen von 100 Sorten.	2	—	—
Eines dergleichen von 75 Sorten	1	16	—
„ „ „ 50	1	—	—
„ „ „ 36	—	20	—
„ „ „ 24	—	16	—
Ein Sortiment v. 12 Sort. ſchön blühend. Blumenſamen.	—	8	—

Verſchiedene Blumenzwiebeln und Knollen, welche von jetzt, bis zum April zu haben ſind.

	Rth.	Sgr.	₰
Ranunkeln, beſte gefüllte holländiſche in vielen Farben. à 100 Stück.	1	12	—
Dergleichen 50 Stück	—	18	—
Ranunkeln ordinaire gute, deutſche, à 100 Stück	1	—	—
„ in ſchönem Rummel à 12 Stück	—	4	—
„ in 26 extra Sorten mit Namen 26 Stück	1	—	—
Anemonen, beſte gefüllte holländiſche à 100 St.	2	—	—
Dergleichen 50 Stück	1	4	—
Tuberoſen-Zwiebel, gefüllt blühende 1 Stück	—	1	—
„ „ „ „ 100 Stück	3	—	—
Amaryllis formosissima à Stück	—	4	—
Ferraria tygridia „ „	—	2	6
Lilium tigrinum „ „	—	4	—
Georginen in 50 ſchönen gefüllten Sorten	10	—	—
„ „ 25 „ „	6	—	—
Dergleichen in 12	3	12	—
„ „ 6	2	—	—
„ „ 1	—	8	—
Ananas Kartoffel, ſehr tragbar, 10 Stück	—	3	—
Mandel „ kleine vorzüglich ſchmackhaft zu Salat, und ſehr ergiebig 25 Stück.	—	8	—
Ein Sortiment Kartoffel von 26 Sorten, worunter viele neue mit Namen à 2 bis 3 Stück.	—	2	—

Bemerkung. 1) Die reſpectiven Beſteller muß ich bitten, mir Ihre gütigen Aufträge, mit dem Betrage *franco* einzuſenden, oder ſonſtige Sicherheit zu begleiten. 2) Kleine Aufträge werden nur gegen gleich eingeſendeten Betrag ausgeführt 3) Die Beſtellung bitte ich auf ein beſonderes Blatt zu zeichnen 4) Für Emballage, welche bei Verpackung der auswärtigen Beſtellung erforderlich iſt, bitte ich nach Verhältniß etwas hinzuzufügen. 5) Muß ich um genaue Angabe des Wohnorts, und deutliche Namens-Unterſchrift bitten, welches zur ſchnellen Bedienung nothwendig iſt. Schließlich füge ich die ergebene Bitte hinzu, meine Saamen Verzeichniſſe möglichſt zu verbreiten, um dadurch weiter empfohlen zu werden.

Friedrich Wilhelm Wendel.

Erfurt im December 1852.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung ist 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Post-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Bestellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'sche Hofbuchhandlung zu Sondershausen die Commission übernommen.

Der Porto-Ansatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.), und wird dieselbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelst Reitpost in posttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen versendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. III. Weißensee, (in Thüringen). Februar 1833. VI. Jahrg.

Die Roſenſammlung von Wilhelm Keller zu Duisburg.

Der Kaufmann Hr. Wilhelm Keller in Duisburg am Rhein hat das Verzeichniß ſeiner großen Roſenſammlung, welche in den letzten Jahren nach Abſchaffung vieler alten werthlos gewordenen Sorten mit dem Neueſten aller Länder bedeutend vermehrt wurde, ganz umgearbeitet auf Poſtpapier in Octav drucken laſſen. Daſſelbe beſteht aus 53 Arten und 1068 Varietäten und Hybriden, welche nach den Monographien von Lindley und Pronville, ſo wie beſonders nach den neueſten Erfahrungen der ausgezeichneteſten Blumiſten Frankreichs ſo weit es bei den vielen ſich darbietenden Schwierigkeiten möglich war, ſyſtematiſch geordnet ſind, mit Beibehaltung der wahren Namen, welche ihnen von den verſchiedenen Roſenpflanzern nach ihrer erſten Blüthe beigelegt wurden, die ſelbſt die erſten pariſer Blumiſten in ihren neueſten Schriften größtentheils angenommen haben, und unter welchen ſie auch nach und nach in den Handel gebracht worden. Jede Roſe iſt nach ihrer Farbe, Form und Größe, ſo wie manche nach ihren Eigenthümlichkeiten und Unterſcheidungszeichen kurz und ſo genau wie möglich beſchrieben. Auf portofreie Beſtellungen wird dieſes Verzeichniß den Liebhabern unter Poſtnachnahme von 15 Silbergroſchen gleich von Duisburg zugeſandt, woher auch dieſe Roſen zu den im Verzeichniß beſtimmten Preiſen bezogen werden können.

Wie außerordentlich ſchwierig es heut zu Tage iſt, bei dem großen Reichthum an Roſen dieſelben richtig zu claſſificiren, darüber ſpricht ſich ein in der Roſen-Cultur ſehr erfahrner franzöſiſcher Schriftſteller in ſeinen neueſten Mittheilungen folgendergeſtalt aus:

„Von allen bis jetzt erdachten Syſtemen die Roſen methodiſch zu claſſificiren iſt nicht ein einziges wirklich gut, hieran ſind aber nicht die Verfaſſer, ſondern die Natur ſchuld, welche uns zu reich gemacht hat. Die Verfaſſer haben nur unrecht alles claſſificiren zu wollen, was doch nur theilweiſe geſchehen kann. Von allen Elementen, deren man ſich bis jetzt für dieſe verſchiedenen Claſſificirungen bedient hat, iſt nicht ein einziges welches nicht beſtritten werden könnte, nicht bloß mit guten Gründen, ſondern weit beſſer mit den Roſenſträuchen in der Hand. Am wenigſten mangelhaft iſt das Syſtem von Lindley, aber bei unſerm großen Zuwachs ſeit dieſer Zeit iſt es jetzt weniger werth als vor 10 Jahren. Es wäre thörigt zu behaupten, man könne alle unſere zahlreichen Varietäten nach ihren Charakteren mit Namen, welche auf ſie Bezug haben, bezeichnen. Den Gelehrten, welche ſie nicht kennen, möchte dies blos zu verzeihen ſein. Ohne Zweifel wäre es ſehr zu wünſchen, aber es iſt eine Sache der Unmöglichkeit. Gegenwärtig hat die Natur bei dieſem ſchönen Geſchlecht alles vermiſcht, alles unter einander gemengt, ſo daß es ſelbſt ſehr oft nicht mehr möglich iſt die Art zu beſtimmen. Will man nun gar anfangen mit den Varietäten eine Unterſuchung anzuſtellen, ſo entgeht auch dem Entſchloſſenſten der Muth, und ich möchte noch lieber Miniſter in Frankreich ſein, wenn ich die Gaben dazu beſäße, als mit einer ſolchen Arbeit beauftragt zu werden.“

Dem Urtheil eines ſolchen Mannes der ſich ſeit 15 Jahren faſt einzig mit dem Studium und der Cultur der Roſen beſchäftigte, aus deſſen Pflanzungen ungefähr 200 neue werthvolle Varietäten hervorgegangen ſind, die er erſt nach mehrjähriger ſorgfältigen Prüfung aus Tauſenden von Sämlingen für werth hielt im Handel zu erſcheinen, der oft die falſchen Anſichten der Pariſer Stubengelehrten durch ſeine neueſten Erfahrungen berichtigte, dieſem darf man wohl unbedingt Glauben beimeſſen. (Beſchluß folgt.)

Einige erläuternde Bemerkungen über die Levkojen unter Hindeutung des Entſtehens der Füllung der Blumen. (Beſchluß.)

Mitgetheilt von Hrn. Chriſt. Deegen aus Köſtritz.

Eine der Hauptkrankheiten der Levkojenpflanzen, die Stammfäulniß, mag hier noch Erwähnung finden, da ſie oft verderblich für die ganze Ausſaat wird. Sie macht ſich bemerklich durch das Umfallen und Bleichwerden der Sämlinge, welche man an der Oberfläche der Erde, angefreſſen oder brandig finden wird. Die Urſachen der Krankheit liegen hauptſächlich: in ſchwächlichem Samen, der von Pflanzen gewonnen, die von dieſer Krankheit befallen geweſen, ſich aber wieder erhohlt hatten, oder frühreif geworden iſt, ferner: in noch unvergohrener Erde, deren Beſtandtheile die Verweſung noch nicht vollendet und deshalb noch viel Säure enthalten, die, beim Gebrauch neue Gährung entwickelt, in zu enger Ausſaat und öfterm Verſchließen gegen das Eindringen der Luft und durchs Verſehen im Gießen.

Die Entſtehung der Krankheit wird vermieden:

1) durch die Ausſaat in ganz rein vergohrene, mit etwas Sand vermiſchte Garten-Erde,
2) durch ganz reifen, kräftigen Samen,
3) in Käſten oder Blumentöpfe ausgeſäet, welche von unten bewäſſert werden können. Meiſt geſchieht die Ausſaat in ſogenannten Miſtbeeten; rathſam iſt es hier, daß das hierzu zu verwendende Erwärmungsmittel erſt abbrenne, bevor die Erde darüber gethan wird, weil ſonſt der in der Erde ſich anhäufende Salpeter die Wurzelfäulniß erzeugt.
4) durch fleißiges Luft-Zulaſſen des Tags und des Nachts, wenn es nur angeht.
5) Trockenhalten und Gießen wenn es nothwendig erſcheint, mit ganz reinem, fließendem Waſſer.
6) Iſt es beſſer, wenn zu Miſtbeeten ſchon gebrauchte, durch Schmutz, oder ſonſt etwas bleiche Fenſter verwendet werden, damit das Gießen weniger nöthig wird.
7) Säe ich gern etwas Zwiebelſamen darunter, da die Zwiebel zunächſt jene Schärfen an ſich zieht, und nachdem ſie erwachſen, der Levkojenpflanze einigen Schatten gewährt ohne dem Luft-Zudrang bis auf die Erdoberfläche hinderlich zu ſein.

Die, in meinem in Nr. 1 d. Bl. beigelegtem, Blumenfreunden gewidmeten Blumenſamen-Verzeichniſſe voran aufgeführten Levkojen-Samen, ſind weder durch Caſtration erlangt, noch ſonſt künſtlich behandelt worden, ich glaube aber, ſie werden in Hinſicht der Farben, Schönheit und der häufigen Ausbeute gefülltblühender Stöcke, jeglichen Anſpruch rechtfertigen.

Die Farben ſind aufeinanderfolgend angegeben und die Auswahl der gewünſchten, oder fehlenden Farbe erleichtert.

Bemerkungen über die Georginen, (Dahlien. *)

(Von Hr. J. Wallner zu Genf.)

Das 4te Georginen-Verzeichniß enthält eine Auswahl der ſchönſten Varietäten, die ſich, ungeachtet der zahlreichen Ausmuſterungen, doch über 1500 an der Zahl belaufen. Der größte Theil der Pflanzen dieſes Verzeichniſſes iſt neu, theils aus meinen eigenen Samenbeeten, theils von andern Georginen-Cultivateurs erhalten. Ich habe in dieſem Jahre mit der Cultur der kugelblüthigen- (Globe flowered) und der anemonenblüthigen (anemone flowered) Dahlien angefangen, und beſitze jetzt eine Sammlung von 50 Varietäten davon. Es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß, wenn dieſe Spielarten erſt zahlreich vermehrt ſein werden, ſie die übrigen, wenigſtens die mit hohen Stengeln, in den kleinen Gärten verdrängen werden. Ich habe in dieſem Jahre meine 2 bis 4 Fuß hohen Zwerg-Georginen zur Bequemlichkeit meiner Freunde von den übrigen abgeſondert. Indeſſen muß ich bemerken, daß mehrere Dahlien von 3 Fuß Höhe, bis zu 5 Fuß hoch geworden ſind, während andre von 6 Fuß Höhe nur eine Höhe von 4 Fuß erreicht haben. Die Cultur ſcheint mir auf die Höhe der Stengel einen weit größern Einfluß zu haben, als die Eigenthümlichkeit des Erdreichs. Ich glaube wiederholt auf die Nothwendigkeit einer guten Cultur zur Erhaltung von ſchönen und gefüllten Blumen aufmerkſam machen zu müſſen. Wenn man die Georginen in jedem Sommer nicht wenigſtens 2mal tüchtig mit Düngerjauche begießen kann, ſo muß man dieß durch eine um ſo größere Menge Dünger zu erſetzen ſuchen. Das Thierblut hat mir als Düngungsmittel beſonders in dem Compoſt bei der Cultur der Georginen in Töpfen ausgezeichnete Dienſte geleiſtet; und um hier ſehr zahlreiche Blumen zu erhalten, muß man ſich bloß der Zwerg-Georginen bedienen, die in 6 — 8 Zoll weite Töpfe gepflanzt werden. Auf dieſe Weiſe habe ich ſehr ſchöne Blumen in Töpfen gezogen, aber ich habe es nicht unterlaſſen, dieſe Töpfe in jedem Sommer 2mal tüchtig mit Düngerjauche durchzugießen.

(Beſchluß folgt.)

Aus der Revue horticole.

Neue oder wenig bekannte Pflanzen.

Salpiglossis atropurpurea. Hortul. S. sinuata R. et P.

Der von Ruiz und Pavon in der Flora von Peru dieſer Pflanzengattung beigelegte Name zeigt an, daß der Griffel ihrer Blumen gleich einer röhrenförmigen Zunge geſtaltet iſt. Die Art mit welcher wir uns hier beſchäftigen, hat im Jahre 1830 zum erſtenmale in Frankreich, im Jardin des plantes, geblüht und zwar aus Samen, den wir aus Chili bekommen hatten. Sie iſt eine krautartige Pflanze, ſcheint 2-jährig und von etwas zärtlicher Beſchaffenheit zu ſein, aber ſie entſchädigt durch die Schönheit ihrer Blumen hinreichend für die ihr gewidmeten Bemühungen. Sie bringt 1 oder mehrere 15 — 18 Zoll hohe, aufrechte, wenig äſtige, behaarte Stengel hervor, die mit abwechſelnd ſtehenden, gleichfalls behaarten Blättern beſetzt ſind, von denen die untern länglich, ſich in 2 Spitzen verſchmälernd, 2 Zoll lang, auf jeder Seite mit 2 bis 3 Zähnen verſehen ſind; die obern ſind ganzrandig, lanzett- und linienförmig. Der Stengel theilt ſich an ſeinem obern Ende in mehrere Aeſte, von denen ſich ein jeder mit einer großen, trichterförmigen, violettpurpurſchwarzen Blume endigt; ſie iſt 15 — 18 Linien lang und breit, und das Innere des Blumenrohrs iſt prächtig gelb geadert und geſtricht. Vier fruchtbare Staubgefäße, ein fünftes unfruchtbares und der Bau der Frucht ſtellen dieſe Pflanzen zwiſchen Chelonia und Bignonia. Die Größe und die ſehr ſeltene Farbe der

---

*) Wir liefern hier unſern geehrten Leſern einen Auszug aus der Vorrede des Quatrième Catalogue des principaux Dahlia, cultivés à Genève, dans le jardin de Wallner 1831, der mehrere ſehr intereſſante Bemerkungen des berühmten Georginen-Cultivateurs enthält. D. R.

Blumen machen ſie zu einem wahren Ziergewächſe. Man ſoll ſie ins Miſtbeet, in eine leichte Erde ſäen, dann in Töpfe verpflanzen, und im mäßig warmen Glashauſe, nahe dem Lichte durchwintern: im nächſtfolgenden Frühjahre verſetzt man ſie in größere Töpfe und ſtellt ſie in den Halbſchatten oder man verpflanzt ſie ins Freie in eine gute Haideerde, gleichfalls in den Halbſchatten, wo ſie ihre ſchönen Blumen im Juni und Juli entwickelt. Sie bringt auch reifen Samen bei uns hervor.

Varietäten.

(Auszug aus einem Schreiben d. Herren Gebr. Baumann.)

Bollwiller, im oberrhein. Departement, d. 28. Januar 1833. Ungeachtet der graubärtige Winter unſre Regionen dermaßen beeiſet hat, daß man faſt glauben ſollte, wir wären nach Sibirien verſetzt, ſo ſind wir dennoch ſo glücklich, in unſern Pflanzenhäuſern die bezauberndſten Blumen in mannigfaltigſtem Farbenſpiele und den herrlichſten Formen auf den freundlichen grünen Camellien zu genießen.

Mutterſtöcke in Pyramiden wie in hochſtämmiger Form die mit 100 bis 200 u. mehrern Blumen u. Knoſpen beſetzt ſind, ſcheinen gleich den ſtolzen Dionen, eiferſüchtig im Schmucke einzigſter Schönheit zu prangen. Seit einigen Wochen ſchon blühen die Camellia Waratah alba; C. grandiflora rosea; C. oxoniensis, prachtvoll; C. pomponia; C. praegnans; C. Rausiana; Rex batavia; C. rubicaulis; C. staminea; C. variegata plena, wunderſchön; C. Yungii; C. invincible oder puncetata überaus ſchön, und kaum glaubbar die C. eclipisis der Engländer die wir aber

Reine des Francais nennen!

Dieſer kommt nichts gleich! Sie iſt die Schönheit aller Schönheiten, die in der 4. Lieferung der Bollwiller Camellien erſcheinen wird. Wir geben Ihnen darüber folgende Beſchreibung:

„Die Blume iſt die ausgezeichnetſte Schönheit; mittlerer
„Größe, alabaſterweiß, ſehr gefüllt; die Kronblätter ſind
„zugerundet, in der Mitte ein wenig eingeſchlitzt und ge-
„gen den Nagel verjüngt. Die innern Blumenblätter ſind
„theils zugerundet, theils ungleich geformt und ein we-
„nig zerriſſenwellenförmig, büſchelweiß beiſammen und un-
„gleich, aber ſehr angenehm gerichtet. Die ganze Blume
„iſt mit ſchönen roſafarbigen in's purpur verlaufende, un-
„regelmäßigen Fleckchen und ſehr abſchneidenden Streifen
„bandirt. Aus dem Herz der Blume ſchimmert ein gelb-
„licher Grund, der der ſeltenen Blume ein anmuthig An-
„ſehen giebt. — Geſchlechtstheile ſind keine vorhanden."

Es ſcheint die Engländer haben ihr den Namen Eclipse (Verdunkelung) gegeben, weil die ſchönſten Camellienblumen neben ſie geſtellt, an Schönheit zu verlieren ſcheinen, und dieſe als Paris hervortritt, und die Bewunderung der Liebhaber auf ſich richtet. Wir hoffen dieſes Jahr eine ſchöne Vermehrung von ihr zu erhalten, ſo daß ſie in kurzer Zeit in mancher Blumenſammlung erſcheinen kann.

Manche aus eigen gewonnenen Samen entſtandene Abart lachet uns entgegen und wir hoffen kommendes Jahr eine Serie dieſer einheimiſchen Novitäten bekannt machen zu

können — da wir mehrere beſitzen deren Habitus beſondere Eigenheiten verräth. —

— Auch erwarten wir aus allen Directionen neuen Zuwachs für unſere ſchon ſehr ausgedehnte Kollection — für die zu komplettiren wir kein Opfer ſcheuen.

Wir haben vorigen Herbſt eine Rabatte im freien Lande mit einigen tauſend jungen Camellien angelegt, ſolche mit einem Bretterkaſten umgeben und mit Fenſtern bedeckt, welche ſeit der habenden Kälte, bald 4 Wochen unter Pferdedung ruhen; dieſe ſollen ein wenig abgehärtet werden. — Wir werden uns ein Vergnügen daraus machen, Ihnen nächſtens das Reſultat dieſer Ueberwinterung im Freien anzuzeigen.

Duisburg am Rhein, den 14. Januar 1833. (Auszug aus einem Schreiben von Hrn. Keller daſelbſt.) (Beſchluß.) Hr. Selbſtherr hat laut Anzeige in der Blumenzeitung, in Verbindung mit einigen Breslauer Botanikern die Roſen nach ſeiner Art classificirt; ich habe das Buch noch nicht geleſen, aber ſo viel weiß ich daß kein Handelsgärtner ſein Verzeichniß nach dieſer Vorſchrift einrichten wird, beſonders wenn die Namen worunter die neuen Sorten allgemein im Handel bekannt ſind, mit botaniſchen oder lateiniſchen Benennungen bezeichnet werden ſollen. Ich traue in dieſer Hinſicht den weit erfahrenen Franzoſen mehr Kenntniſſe zu, und wie ſie die Sache beurtheilen, haben Sie geleſen. Wenn Hr. Selbſtherr 95 Arten angiebt, ſo hat er gewiß viele aus Büchern nachgeſchrieben, die aber noch nicht alle in Europa exiſtiren —, ebenſo führt Lindley mehrere Arten an, die nur nach trocknen Exemplaren beſchrieben ſind. Es wird wie die Franzoſen bemerken noch lange Zeit jede Classification ein unvollkommenes Machwerk bleiben.

Zur Anzucht hochſtämmiger Monats-, Thee- oder Noiſetteroſen in Töpfen bedarf es keines Warmhauſes. Will ich dieſe anziehn, ſo pfropfe ich die Hochſtämme im freien Lande vom März an in den Spalt, und ſpäter in die Rinde oder oculire ſie aufs treibende Auge, und wende überhaupt alle mögliche Veredlungsarten auf ſie an; im October oder November nehme ich die Stämme aus dem Lande, pflanze ſie in große Töpfe, und ſtelle ſie in ein froſtfreies Zimmer. So wachſen ſie recht gut, und bilden nach und nach ſchöne Kronen. Im freien Lande biege ich hochſtämmige Monats-, Noiſette- und Sempervirens-Roſen mit der Krone zur Erde, befeſtige ſie mit einem Haken und bedecke ſie mit Erde oder langem Dünger, was bei tiefem Schnee nicht einmal nöthig iſt. Dies ſind übrigens längſt bekannte Sachen. — In der den obigen Gegenſtand betreffenden Abhandlung des Hrn. Grafen v. Hagen wird auch einer Noisette lutea erwähnt, alſo einer gelbblühenden Noiſetteroſe. Dies wird ohne Zweifel auf einem Irrthum beruhen, denn nach den mir zugekommenen Nachrichten exiſtirt eine ſolche weder in England noch Frankreich. Zwar wird hin und wieder in Deutſchland behauptet, daß ſie in England befindlich ſey, mehrere Franzoſen ſchreiben mir dagegen, daß die engliſchen großen Handelsgärtner ſich bei ihnen darnach erkundigt hätten und glaubten, daß ſie in Frankreich exiſtire. Vor 2 Jahren wurde im allgemeinen Anzeiger der Deutſchen einer gelben Mooſroſe auch einer Semperflorens-Mooſroſe erwähnt, welche in la Flêche in Frankreich bei Jemand. deſſen Namen auch angezeigt wurde, zu haben ſeyen. Ich ſchrieb dahin auch an mehrere meiner franzöſiſchen Correſpondenten, aber kein Menſch hatte je etwas von dieſen Roſen gehört. So wird oft das Publikum getäuſcht! In den mehrſten Roſen-Verzeichniſſen findet man bloß die Namen der Roſen, dieſe können natürlich die Liebhaber zu keiner Auswahl beſtimmen, er überläßt demnach dieſe dem Abſender, wenn er nur eine gute Parthie zu recht wohlfeilen Preiſen erhält; was ihm geſandt wird, iſt vorauszuſehen. Ich kaufe niemals auf dieſe Weiſe; das Neue muß mir genau beſchrieben werden, und ich habe dabei mit ganz ehrlichen Leuten zu thun. Das neue Ausgezeichnete iſt auch in Frankreich gewiß nicht wohlfeil, ich habe noch kürzlich mehrere Sorten erhalten, die mir 10 und 15 Franken koſten. Nach meinem Verzeichniſſe, worin jede Roſe beſchrieben iſt, wird keinem Liebhaber die Auswahl ſchwer werden, er mag ſie übrigens kaufen wo er wolle. So wie die Liebhaberei für die Roſen in allen Ländern zunimmt, ſo fängt ſolche für die Pelargonien wieder an abzunehmen, wie mir von vielen Seiten berichtet wird.

Aurich in Oſtfriesland, am 4. Jan. 1833. (Beſchluß.)

Der gepfropfte Cactus Opuntia Ficus indica, welcher 6 Species trug, hat nur C. alatus, truncatus, flagelliformis und myosurus behalten. C. alatus blühte zu Ausgang des September trefflich. — Zu Johanni habe ich 2 Glieder des C. alatus auf einen ganz heterogenen Stamm, nämlich auf Cotyledon coccinea mit dem beſten Erfolge gepfropft, denn die Wunden vernarbten in dem erſten Monate, und beide Pfropfreiſer wachſen freudig. — Im Auguſt blühte auch ein ziemlich kleines Exemplar von Echino-Cactus Ottonis ſehr ſchön; es iſt mir geglückt, davon völlig reifen Samen zu erhalten. Der Samen von Passiflora coeruleo-racemosa, pallida mit P. coerulea befruchtet, iſt nicht aufgegangen, weil meine vielfachen Umzüge in vorigem Frühlinge mir nicht geſtatteten, die Körner mit Aufmerkſamkeit zu behandeln; doch habe ich wieder ſehr viel ähnlichen Samen gewonnen, wovon ich Ihnen hier etwas zur Probe beilege; hoffentlich wird es damit beſſer glücken.

Schlüßlich erſuche ich nochmals alle Cactus-Freunde, mir zum Tauſch ihre Verzeichniſſe zuzuſenden. Manche günſtige Verbindung macht es mir leicht, durch Seltenes und Neues wieder zu dienen. Wenn ich gleich ſo viel verloren habe, ſo bin ich jetzt doch ſchon wieder im Beſitze von 112 Species Cactus, ſo wie mancher anderen werthvollen Pflanze. Auch wird mir der nächſte Sommer recht viel Neues bringen.

C. Siedhof, Conrector am K. Gymnaſium.

Blumenfreunde glauben wir darauf aufmerkſam machen zu müſſen, daß Hr. E. Kruyff, Blumiſt in Saſſenheim bei Harlem eine kleine Parthie Zwiebeln von Gladiolus psittacinus an den Kaufmann Hrn. F. H. Meißner jun. in Leipzig zum Verkauf in Commiſſion gegeben und den Preis für eine Zwiebel auf 10 Sgr. (8 ggr.) feſtgeſetzt hat. — Da dieſe vortrefflich ſchöne Blume noch ſehr wenig bekannt iſt, ſo können Liebhaber die colorirte Zeichnung davon bei dem Hrn. Hofgärtner Mootz in Weimar in Augenſchein nehmen. — Zugleich wird bemerkt, daß die Zwiebel gleich der Amaryllis formosissima keinen Froſt vertragen, daher erſt zum Frühjahre ins freie Land, in Töpfe aber jetzt ſchon gepflanzt werden kann.

(Hamburg.) Das ſo eben erſchienene Samen-Verzeichniß von J. G. Booth und Comp. in Hamburg (wo von Exemplare in der Expedition der Blumenzeitung gegen portofreie Nachfrage zu haben ſind), zeichnet ſich dieſes Jahr wieder durch eine Menge neuer und ſeltener Samen-Arten aus. Es enthält:

1) eine vollſtändige Auswahl von Gemüſe- und Garten-Samen worunter die beſten ausländiſchen Sorten,
2) über 50 der vorzüglichſten Futtergräſer die in Quantitäten abzulaſſen ſind,
3) über 70 ſonſtige Futterkräuter und Feldſamen, wobei unter erſteren, die großen engliſchen Feldrüben — die neuen ſehr großen feſten rothköpfigen gelben Steckrüben oder Rutabago — die neuen ſehr großen ſüßen rothen engliſchen Wurzeln oder Möhren und mehr dergleichen, Empfehlung verdienen,
4) die neue Getreide-Sorte, der Hafer ohne Hülſe,
5) 34 Sorten Kartoffeln,
6) über 40 Sorten officineller Samen,
7) gegen 150 verſchiedne Holz- und Sträucher-Samen, worunter manche ſeltene und ausländiſche — ohne Inbegriff von 200 Sorten, die im Frühjahr wieder aus Amerika erwartet werden und worüber ſ. Z. ein ſeparates Verzeichniß erſcheint.
8) 80 Sorten exotiſchen Samen, worunter Banksia grandis — B. speciosa — B. coccinea — 27 Sorten capiſcher Ericae — 12 do. Proteen etc.
9) über 700 lauter ſchöner Blumenſämereien wovon hier ein Auszug der vorzüglichern, Neueren und ganz Neuen:

Ampherophis intermedia
Calampelis scabra
Calandrina grandiflora
16 div. Calceolaria
Campanula Lorei 2 Sorten
„ pyramidalis fl. alb.
Chrysanthemum carinatum elegans
Clarkia pulchella fl. albo
Clintonia elegans
Delphinium bicolor
„ grandifl. alb.
„ „ lividum
„ „ pallidum
Erythrolonia conspicua
Francoa appendiculata
Glaucium violaceum
Helianthus longicarpos
Heliophila arabioides
Hunnemannia fumariaefol.
Iberis superba
Isotoma axillaris
Lathyrus californicus
„ latifol. albiflorus
Lophospermum erubescens
Lupinus arboreus 3 Sorten
„ bicolor
„ canaliculatus
„ Cruikshanksii
„ lepidus
„ litoralis
„ Marschallianus 6 S.
„ mexicanus 3 Sorten
„ micranthus
„ Milleri 10 Sorten
„ mutabilis
„ ornatus
„ polyphyllus
„ „ violaceus
Lupinus polyphyllus albiflor.
„ tomentosus
Madia elegans
Malope grandiflora
Malva miniata
Maurandia bicolor
Mirabilis longifl. violaceus
Nicotiana alata
„ glauca
Nolana atriplicifolia
Nonea versicolor
Oenothera anisoloba
„ Lindleyii hybrida
„ bifrons
„ serotina
„ taraxafolia
Penstemon 11 Sorten
Plectocephalus americana
Podolepis gracilis
Salpiglossis 9 Sorten
Scabiosa atrop. nana
Solanum Melong. fr. luteo
Streptocarpus Rhexii
Trachymene coerulea
Tropaeolum majus nov. var.
Zinnia 12 Sorten
Gentiana 11 Sorten
Paeonia 14 Sorten etc. etc.

ferner (nicht im Verzeichniß angeführte ganz neue) als:

Schizanthus Hookerii à Pr. 1½ ℛℓ.
Salpiglossis großblühende purpur. à Pr. 1 ℛℓ.
„ neue violette
Primula sinensis fimbriata
„ „ hellblühende.

10) 36 dic. Zierkürbiſſe, worunter mehrere vor 2 Jahren durch uns aus Amerika eingeführte ſchöne Sorten — und
11) eine Auswahl engliſcher Garten-Meſſer und nützliches Garten-Geräth.

Hierbei 3 Beilagen, 1) Ein Verzeichniß von Hrn. W. Kirſcht in Weimar, 2) Ein Verzeichiß von Hrn. J. A. Büchner in Gotha. 3) Ein Probeblatt von der in Weißenſee erſcheinenden neuen Zeitſchrift: Gemeinnützliche Mittheilungen über Wein-, Obſt-, Gemüſebau ꝛc.

Verzeichniß

von

blumiſtiſchen Gegenſtän

welche

gegen Zahlung in Preuß. Cour. bei dem Gartenbeſitzer Wilhelm Kirſcht in Weimar, a
zu haben ſind 1833.

Emballage wird beſonders billig vergütet und um deutlich geſchriebene Adreſſen gebeten.

St.		gr.
	Acanthus mollis . . .	4
	Achillea ageratum . .	3
	— bipinnata . . .	
	— compacta . . .	2
	— eupatorium . .	3
	— impatiens . . .	2
	— macrophylla .	2
	— ptarmica flore pl.	2
	— purpurea . . .	1
	— tomentosa . .	3
	Aconitum album . . .	3
	— bicolor . . .	3
	— cammarum . ; .	3
	— humile . . .	4
	— napellus . . .	2
	[illegible]	2
	— canus	3
	— cordifolius . .	2
	— elegans . . .	2
	Aster floribundus . . .	2
	— gigateus . . .	2
	— hysoppifolius humile	2
	— linifolius . . .	2
	— multiflorus . .	2
	— mutabilis . . .	2
	— novae angliae pracox	3
	— — ros. flore.	2
	— — belgiae . .	3
	— novus	4
	— punctatus . . .	2
	— speciosus . . .	4
	— spectabilis . . .	3
	— rubicaulis . . .	2
	— tenuifolius . .	2
	— tradescanti . .	2
	Astragalus galegiformis fl.alb.	2
	— — — coerul.	2
	Astrantia carniolica . .	2
	— major	2

St.		gr.
	Astrantia minor . . .	2
	Balsamita vulgaris . .	2
	Betonica grandiflora . .	3
	— stricta	3
	Bulbocodium vernum . .	2
	Bupthalmum cordifolium .	3
	— grandiflorum .	3
	— scabrum . .	2
	Buxus foliis argenteis .	4
	Caltha palustris flore pleno	6
	Campanula carpathica .	2
	— glomerata alba .	4
	— — coerulea	3
	— medius fl. pl. .	2
	— persicifolia alba plena	2
	Dictamnus flore albo .	6
	— — rubro	3
	Digitalis alba	4
	— ambigua . . .	2
	— ferruginea . .	2
	— ochroleuca . .	2
	— purpurea . . .	2
	Dodecatheon Meadia . .	4
	Doronicum austriacum .	3
	— bellidiastrum . .	6
	— pardalianches .	2
	Dracocephalum sibiricum	2
	— — virginianum	3
	Epilobium glabellum . .	3
	— grandiflorum fol. variegatis .	3
	— montanum flor. rubr. . . .	2
	Erigeron purpureum . .	2
	Eryngium amethystinum .	4
	— planum . . .	2
	Erysimum barbarea flore. pleno.	4
	Erythronium dens canis fl.alb.	4

St.		gr.
	Erythronium dens canis fl. purp. . . .	4
	Eupatorium ageratoides .	3
	— cannabinum .	2
	— purpureum .	3
	— sessilifolium .	3
	— verticillatum .	3
	Euphorbia palustris . .	3
	Ferraria tigridia . . .	2
	Fritillaria imperialis fl. simpl.	3
	Galanthus nivalis flore pleno	2
	— — — simpl.	½
	Gentiana acaulis . . .	2
	— cruciata . . .	4
	Hysopus orientalis . .	1
	Iberis sempervirens . .	3
	Inula bubonium . . .	3
	— *dysentericum* . .	2
	— *ensifolia* . . .	2
	— *Helenium* . . .	3
	— *montana* . . .	3
	— *oculus christi* .	2
	Iris aphylla . . .	2
	— *constantinopolitana flore pleno* . .	4
	— *dichotoma* . . .	3
	— *flavissima* . . .	2
	— *florentina* . . .	3
	— *graminifolia* . . .	2
	— *pallida* . . .	2
	— *plicata* . . .	3
	— *pluvialis* . . .	4
	— *pseudacorus* . .	2
	— *sambucina* . .	2
	— *siberti* . . .	3
	— *spathacea* . . .	4
	— *spuria* . . .	2
	— *squalens* . . .	2

St.	
	Iris va
	— *ve*
	— *virg*
	Lactuca
	Lamium
	Lathyru
	Leucoju
	Ligustic
	Lilium
	tun
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	Parthen
	—
	—
	Phlomis
	Phlox c
	— *co*
	— *d*
	— *d*
	— *g*
	— *h*
	— *m*
	—
	— *o*
	— *p*
	—
	—
	— *p*
	— *p*
	— *r*
	— *s*
	— *s*

gelben Mooſroſe auch einer Semperflorens-Mooſroſe erwähnt, welche in la Flêche in Frankreich bei Jemand. deſſen Namen auch angezeigt wurde, zu haben ſeyen. Ich ſchrieb dahin auch an mehrere meiner franzöſiſchen Correſpondenten, aber kein Menſch hatte je etwas von dieſen Roſen gehört. So wird oft das Publikum getäuſcht! In den mehrſten Roſen-Verzeichniſſen findet man bloß die Namen der Roſen, dieſe können natürlich die Liebhaber zu keiner Auswahl beſtimmen, er überläßt demnach dieſe dem Abſender, wenn er nur eine gute Parthie zu recht wohlfeilen Preiſen erhält; was ihm geſandt wird, iſt vorauszuſehen. Ich kaufe niemals auf dieſe Weiſe; das Neue muß mir genau beſchrieben werden, und ich habe dabei mit ganz ehrlichen Leuten zu thun. Das neue Ausgezeichnete iſt auch in Frankreich gewiß nicht wohlfeil, ich habe noch kürzlich mehrere Sorten erhalten, die mir 10 und 15 Franken koſten. Nach meinem Verzeichniſſe, worin jede Roſe beſchrieben iſt, wird keinem Liebhaber die Auswahl ſchwer werden, er mag ſie übrigens kaufen wo er wolle. So wie die Liebhaberei für die Roſen in allen Ländern zunimmt, ſo fängt ſolche für die Pelargonien wieder an abzunehmen, wie mir von vielen Seiten berichtet wird.

Aurich in Oſtfriesland, am 4. Jan. 1833. (Beſchluß.)

Der gepfropfte Cactus Opuntia Ficus indica, welcher 6 Species trug, hat nur C. alatus, truncatus, flagelliformis und myosurus behalten. C. alatus blühte zu Ausgang des September trefflich. — Zu Johanni habe ich 2 Glieder des C. alatus auf einen ganz heterogenen Stamm, nämlich auf Cotyledon coccinea mit dem beſten Erfolge gepfropft, denn die Wunden vernarbten in dem erſten Monate, und beide Pfropfreiſer wachſen freudig. — Im Auguſt blühte auch ein ziemlich kleines Exemplar von Echino-Cactus Ottonis ſehr ſchön; es iſt mir geglückt, davon völlig reifen Samen zu erhalten. Der Samen von Passiflora coeruleo-racemosa, pallida mit P. coerulea befruchtet, iſt nicht aufgegangen, weil meine vielfachen Umzüge in vorigem Frühlinge mir nicht geſtatteten, die Körner mit Aufmerkſamkeit zu behandeln; doch habe ich wieder ſehr viel ähnlichen Samen gewonnen, wovon ich Ihnen hier etwas zur Probe beilege; hoffentlich wird es damit beſſer glücken.

Schlüßlich erſuche ich nochmals alle Cactus-Freunde, mir zum Tauſch ihre Verzeichniſſe zuzuſenden. Manche günſtige Verbindung macht es mir leicht, durch Seltenes und Neues wieder zu dienen. Wenn ich gleich ſo viel verloren habe, ſo bin ich jetzt doch ſchon wieder im Beſitze von 112 Species Cactus, ſo wie mancher anderen werthvollen Pflanze. Auch wird mir der nächſte Sommer recht viel Neues bringen.

C. Siedhof, Conrector am K. Gymnaſium.

Blumenfreunde glauben wir darauf aufmerkſam machen zu müſſen, daß Hr. C. Kruyff, Blumiſt in Saſſenheim bei Harlem eine kleine Parthie Zwiebeln von Gladiolus psittacinus an den Kaufmann Hrn. F. H. Meißner jun. in Leipzig zum Verkauf in Commiſſion gegeben und den Preis für eine Zwiebel auf 10 Sgr. (8 ggr.) feſtgeſetzt hat. — Da dieſe vortrefflich ſchöne Blume noch ſehr wenig bekannt iſt, ſo können Liebhaber die colorirte Zeichnung davon bei dem Hrn. Hofgärtner Mootz in Weimar in Augenſchein nehmen. — Zugleich wird bemerkt, daß die Zwiebel gleich der Amaryllis formosissima keinen Froſt vertragen, daher erſt zum Frühjahre ins freie Land, in Töpfe aber jetzt ſchon gepflanzt werden kann.

(Hamburg.) Das ſo eben erſchienene Samen-Verzeichniß von J. G. Booth und Comp. in Hamburg (wovon Exemplare in der Expedition der Blumenzeitung gegen portofreie Nachfrage zu haben ſind), zeichnet ſich dieſes Jahr wieder durch eine Menge neuer und ſeltener Samen-Arten aus. Es enthält:

1) eine vollſtändige Auswahl von Gemüſe- und Garten-Samen worunter die beſten ausländiſchen Sorten,
2) über 50 der vorzüglichſten Futtergräſer die in Quantitäten abzulaſſen ſind,
3) über 70 ſonſtige Futterkräuter und Feldſamen, wobei unter erſteren, die großen engliſchen Feldrüben — die neuen ſehr großen feſten rothköpfigen gelben Steckrüben oder Rutabago — die neuen ſehr großen ſüßen rothen engliſchen Wurzeln oder Möhren und mehr dergleichen, Empfehlung verdienen,
4) die neue Getreide-Sorte, der Hafer ohne Hülſe,
5) 34 Sorten Kartoffeln,
6) über 40 Sorten officineller Samen,
7) gegen 150 verſchiedne Holz- und Sträucher-Samen, worunter manche ſeltene und ausländiſche — ohne Inbegriff von 200 Sorten, die im Frühjahr wieder aus Amerika erwartet werden und worüber ſ. Z. ein ſeparates Verzeichniß erſcheint.
8) 80 Sorten exotiſchen Samen, worunter Banksia grandis — B. speciosa — B. coccinea — 27 Sorten capiſcher Ericae — 12 do. Proteen etc.
9) über 700 lauter ſchöner Blumenſämereien wovon hier ein Auszug der vorzüglichern, Neueren und ganz Neuen:

Ampherephis intermedia
Calampelis scabra
Calandrina grandiflora
16 div. Calceolaria
Campanula Lorei 2 Sorten
= pyramidalis fl. alb.
Chrysanthemum carinatum elegans
Clarkia pulchella fl. albo
Clintonia elegans
Delphinium bicolor
= grandifl. alb.
= = lividum
= = pallidum
Erythrolonia conspicua
Francoa appendiculata
Glaucium violaceum
Helianthus longicarpos
Heliophila arabioides
Hunnemannia fumariaefol.
Iberis superba
Isotoma axillaris
Lathyrus californicus
= latifol. albiflorus
Lophospermum erubescens
Lupinus arboreus 3 Sorten
= bicolor
= canaliculatus
= Cruikshanksii
= lepidus
= litoralis
= Marschallianus 6 S.
= mexicanus 3 Sorten
= micranthus
= Milleri 10 Sorten
= mutabilis
= ornatus
= polyphyllus
= = violaceus

Lupinus polyphyllus albiflor.
= tomentosus
Madia elegans
Malope grandiflora
Malva miniata
Maurandia bicolor
Mirabilis longifl. violaceus
Nicotiana alata
= glanca
Nolana atriplicifolia
Nonea versicolor
Oenothera anisoloba
= Lindleyii hybrida
= bifrons
= serotina
= taraxafolia
Penstemon 11 Sorten
Plectocephalus americana
Podolepis gracilis
Salpiglossis 9 Sorten
Scabiosa atrop. nana
Solanum Melong. fr. luteo
Streptocarpus Rhexii
Trachymene coerulea
Tropaeolum majus nov. var.
Zinnia 12 Sorten
Gentiana 11 Sorten
Paeonia 14 Sorten etc. etc.

ferner (nicht im Verzeichniß angeführte ganz neue) als:

Schizanthus Hookerii à Pr. 1½ ℛ.
Salpiglossis großblühende purpur. à Pr. 1 ℛ.
= neue violette
Primula sinensis fimbriata
= = hellblühende.

10) 36 dic. Zierkürbiſſe, worunter mehrere vor 2 Jahren durch uns aus Amerika eingeführte ſchöne Sorten — und
11) eine Auswahl engliſcher Garten-Meſſer und nützliches Garten-Geräth.

Hierbei 3 Beilagen, 1) Ein Verzeichniß von Hrn. W. Kirſcht in Weimar, 2) Ein Verzeichiß von Hrn. J. A. Büchner in Gotha. 3) Ein Probeblatt von der in Weißenſee erſcheinenden neuen Zeitſchrift: Gemeinnützliche Mittheilungen über Wein-, Obſt-, Gemüſebau ꝛc.

Verzeichniß

von

blumiſtiſchen Gegenſtänden,

welche

gegen Zahlung in Preuß. Cour. bei dem Gartenbeſitzer Wilhelm Kirſcht in Weimar, auf der Altenburg, zu haben ſind 1833.

Emballage wird beſonders billig vergütet und um deutlich geſchriebene Adreſſen gebeten.

St.		gr.
	Acanthus mollis	4
	Achillea ageratum	3
	— bipinnata	
	— compacta	2
	— eupatorium	3
	— impatiens	2
	— macrophylla	2
	— ptarmica flore pl.	2
	— purpurea	1
	— tomentosa	3
	Aconitum album	3
	— bicolor	3
	— cammarum	3
	— humile	4
	— napellus	2
	— neomontanum	3
	— pyramidale	3
	Actea racemosa alba	4
	— — atropurpurea	4
	— spicata	4
	Adonis vernalis	3
	Agrostemma coronaria fl. pl.	4
	— flos Jovis	2
	Ajuga pyramidalis	2
	Allium Moly	2
	Althea cannabina	2
	— rosea, 14 Sorten à 1 gr.	
	Alyssum saxatile	2
	Amaryllis lutea	4
	Amobium alatum	4
	Amygdalus pumila fl. simpl.	2
	— — pleno	4
	Anchusa italica	3
	Anemone apennina fl. coerul.	4
	— hepatica coerul. pl.	3
	— — rubra pl.	2
	— nemorosa alba plena	4
	— ochotensis	3
	— pulsatilla	2
	— sylvestris	2
	Anthemis nobilis	1
	Anthericum liliago	2
	— liliastrum	4
	— ramosum	2
	Antirrhinum bicolor	1
	— dalmaticum	1
	— majus, viele Farben à	½
	Apocynum androsaemifolium	3
	Aquilegia bicolor	3
	— canadensis	3
	— formosa	3
	— viridiflora	2
	— vulgaris	1
	Aristolochia clematitis	3
	Asclepias incarnata	3
	— pulchella	4
	— syriaca	2
	— vincetoxicum	2
	Asphodelus luteus	4
	Asplenium scolopendrium	3
	Aster aestivus	2
	— flore albo	3
	— alpinus	2
	— amellus	2
	— canus	3
	— cordifolius	2
	— elegans	2
	Aster floribundus	2
	— giganteus	2
	— hyssopifolius humile	2
	— linifolius	2
	— multiflorus	2
	— mutabilis	2
	— novae angliae praecox	3
	— — ros. flore.	2
	— — belgiae	3
	— novus	4
	— punctatus	2
	— speciosus	4
	— spectabilis	3
	— rubicaulis	2
	— tenuifolius	2
	— tradescanti	2
	Astragalus galegiformis fl. alb.	2
	— — — coerul.	2
	Astrantia carniolica	2
	— major	2

St.		gr.
	Astrantia minor	2
	Balsamita vulgaris	2
	Betonica grandiflora	3
	— stricta	3
	Bulbocodium vernum	2
	Bupthalmum cordifolium	3
	— grandiflorum	3
	— scabrum	2
	Buxus foliis argenteis	4
	Caltha palustris flore pleno	6
	Campanula carpathica	2
	— glomerata alba	4
	— — coerulea	3
	— medius fl. pl.	2
	— persicifolia alba plena	2
	— — — simpl.	2
	— — coerul. pl.	2
	— — — simpl.	2
	— pyramidalis	4
	— trachelium fl. alb. pl.	4
	— — coerul.	3
	— versicolor	4
	Carlina caulescens	2
	Centaurea cineroides	4
	— montana	2
	— purpurea	3
	Chelone barbata	3
	— obliqua	3
	Chryanthemum balsamita	2
	— coccineum (roseum)	3
	Chrysocoma linosiris	4
	Cineraria alpina	6
	— integrifolia	2
	Clematis angustifolia	4
	— erecta	2
	— maritima	3
	— viorna	3
	Colchicum autumnale purp. pl.	4
	Convallaria majalis	2
	— multiflora fl. pl.	
	— polygonatum fl. pl.	3
	— verticillatum	3
	Coreopsis Atkinsonii	3
	— auriculata	2
	— lanceolata	2
	— tenuifolia	2
	— tripteris	2
	— verticillata	2
	Coronilla varia	3
	Corydalis (Fumaria) nobilis	4
	Cynanchum nigrum	2
	Cynoglossum omphaloides	3
	Delphinium americanum	3
	— azureum plenum	6
	— coeruleum	3
	— exaltatum	3
	— grandiflorum coerul.	3
	— — purp.	3
	— hirsutum	3
	— pyramidatum	3
	Dianthus carthusianorum pl.	4
	— chinensis	1
	— plumarius maximus	2
	Dictamnus flore albo	6
	— — rubro	3
	Digitalis alba	4
	— ambigua	2
	— ferruginea	2
	— ochroleuca	2
	— purpurea	2
	Dodecatheon Meadia	4
	Doronicum austriacum	3
	— bellidiastrum	6
	— pardalianches	2
	Dracocephalum sibiricum	2
	— — virginianum	3
	Epilobium glabellum	3
	— grandiflorum fol. variegatis	3
	— montanum flor. rubr.	2
	Erigeron purpureum	2
	Eryngium amethystinum	4
	— planum	2
	Erysimum barbarea flore. pleno.	4
	Erythronium dens canis fl. alb.	4

St.		gr.
	Erythronium dens canis fl. purp.	4
	Eupatorium ageratoides	3
	— cannabinum	2
	— purpureum	3
	— sessilifolium	3
	— verticillatum	3
	Euphorbia palustris	3
	Ferraria tigridia	2
	Fritillaria imperialis fl. simpl.	3
	Galanthus nivalis flore pleno	2
	— — — simpl.	1
	Gentiana acaulis	2
	— cruciata	4
	— macrophylla	4
	— saponaria	4
	Geranium aconitifolium	2
	— ibericum	2
	— macrorrhizon	2
	— pratense flore coerul. pleno	4
	— — — alba simpl.	2
	— prostratum	4
	— sanguineum	2
	— striatum	3
	Geum coccineum	4
	Gladiolus communis	1
	Glaucium flavum	2
	Glycine apios	4
	Gnaphalium margaritaceum	2
	Gypsophyllum paniculatum	3
	Hedysarum coronarium rubr.	2
	Helianthemum (Cistus) vulgare	3
	Helianthus altissimus	2
	— diffusus	3
	— macrophyllus	2
	— missuri	2
	— multiflorus flore pleno	3
	Helleborus digitatus	6
	— hyemalis	2
	— niger	3
	— purpurascens	6
	Helonias bullata	8
	Hemerocallis flava	3
	— fulva	2
	— — foliis variegatis	4
	— graminea	4
	— japonica flore albo	3
	— — — coerul.	4
	Heracleum laciniatum	2
	Hesperis matronalis fl. alb. pl.	1
	— — simpl. coerul.	1
	— tristis	2
	Heuchera americana	2
	Hieracium aurantiacum	2
	— speciosissimum	2
	Hyacinthus botryoides fl. coerul.	½
	— muscaria	1
	Hypericum ascyron	3
	— perforatum	2
	Hysopus orientalis	1
	Iberis sempervirens	3
	Inula bubonium	3
	— *dysentericum*	2
	— *ensifolia*	2
	— *Helenium*	3
	— *montana*	3
	— *oculus christi*	2
	Iris aphylla	2
	— *constantinopolitana flore pleno*	4
	— *dichotoma*	3
	— *flavissima*	2
	— *florentina*	3
	— *graminifolia*	2
	— *pallida*	2
	— *plicata*	3
	— *pluvialis*	4
	— *pseudacorus*	2
	— *sambucina*	2
	— *siberti*	3
	— *spathacea*	4
	— *spuria*	2
	— *squalens*	2

St.		gr.
	Iris variegata	2
	— *versicolor*	2
	— *virginica*	2
	Lactuca perennis	3
	Lamium Orvala	3
	Lathyrus latifolius	2
	Leucojum aestivum	3
	Ligusticum levisticum	2
	Lilium bulbiferum pyramidatum	3
	— *candidum*	1
	— *chalcedonicum*	6
	— *martagon flore albo*	6
	— — — — *pleno.*	6
	— *tigrinum*	2
	Linaria peloria	1
	Linum perenne	2
	Lithospermum purp.	4
	Lychnis chalcedonica fl. rubr.	2
	— — — *carneo*	2
	— — — *albo.*	2
	— — *fl. rubr. pl. maj.*	4
	— — — — *minor.*	4
	— *dioica alba plena*	6
	— — *rubra plena*	3
	— *flos cuculi flore pleno.*	4
	— *fulgens*	3
	— *viscaria*	1
	Lysimachia punctata	2
	— *verticillata*	2
	— *vulgaris*	2
	Lythrum glabellum	2
	— *Salicaria*	2
	— *tomentosum*	4
	— *virgatum*	3
	Melissa grandiflora	2
	Melittis melissophyllum	4
	Mirabilis jalappa	3
	Monarda clinopodia	2
	— *didyma*	2
	— *fistulosa*	2
	— *oblongata*	2
	— *purpurea*	2
	— *violacea*	2
	Morea chinensis	4
	Myosotis palustris	2
	Narcissus poeticus fl. simpl.	½
	— — — *pleno.*	1
	Oenothera spectabilis	4
	Orobus lathyroides	2
	— *niger*	2
	— *varius*	2
	— *vernus*	2
	Paeonia albiflora	6
	— *corallina*	4
	— *hybrida*	4
	— *integra*	12
	— *laciniata*	6
	— *odorata purpurea plena.*	20
	— *officinalis purpurea plena.*	2
	— — *rosea plena*	3
	— *tenuifolia*	3
	Papaver cambricum	6
	— *bracteatum*	3
	— *nudicaule*	2
	— *orientale*	2
	Parthenium integrifolium	3
	— *matricaria*	1
	— *plenissimum*	2
	Phlomis samia	3
	Phlox acuminata	1
	— *caroliniana*	1
	— *decussata*	3
	— *divaricata*	1
	— *glaberrima*	3
	— *hybrida*	4
	— *maculata major*	3
	— — *minor*	3
	— *ovata*	4
	— *paniculata alba*	2
	— — *rosea*	4
	— — *violacea*	2
	— *parviflora*	1
	— *pilosa major*	3
	— *reptans*	4
	— *setacea*	6
	— *suaveolens*	3

St.		gr
	Phlox subulata	2
	Physalis alkekengi	2
	Podaliria australis	4
	Polemonium album	2
	— *coeruleum*	2
	Polygonum bistorta	2
	Potentilla alba	2
	— *atrosanguinea*	4
	— *erecta*	2
	— *intermedia*	3
	— *nepalense*	4
	Primula cortusoides	4
	Pulmonaria maculata	3
	— *mollis*	3
	— *officinalis*	2
	— *virginica*	6
	Pyrola [illegible]	3
	— *minor*	3
	— *uniflora*	3
	Pyrethrum pulverulentum	2
	— *sericeum*	2
	Ranunculus aconitifolius fl. alb. pl.	6
	— *acris*	2
	— *auricomus fl. pleno.*	4
	— *bulbosus fl. pleno.*	6
	— *ficaria*	2
	— *gramineus*	4
	— *grandiflorus fl. pleno.*	2
	— *lingua*	4
	— *repens*	2
	Rheum compactum	4
	Rudbeckia aspera	3
	— *digitata*	2
	— *fulgida*	3
	— *hirta*	4
	— — *purpurea*	16
	— *laciniata*	2
	— *oppositifolia*	2
	— *pinnata*	2
	— *purpurea*	3
	— *triloba*	2
	Salvia grandiflora	3
	— *sclarea*	2
	Sanguinaria canadensis	4
	Sanguisorba canadensis	2
	Saponaria plena	2
	Saxifraga crassifolia	2
	— *granulata plena*	3
	— *punctata*	2
	— *pyramidalis*	2
	— *serratifolia*	2
	Senecio saracenicus	2
	Scabiosa alpina	2
	— *austriaca*	4
	— *laciniata*	3
	— *ochroleuca*	2
	— *succisa*	2
	— *tatarica*	3
	Scilla amoena	4
	— *bifolia*	4
	— *campanulata*	4
	Scutellaria alpina	4
	— *orientalis*	3
	Sedum aizoon	2
	— *album*	2
	— *angustifolium*	2
	— *hybridum*	2
	— *spurium roseum*	2
	— *Telephium roseum*	3
	Sempervivum montanum	2
	— *tectorum*	1
	Silphium connatum	3
	— *perfoliatum*	2
	— *therebinthenaceum*	6
	Soldanella alpina	4
	Solidago altissima	2
	— *cambrica*	2
	— *flabelliformis*	2
	— *laevis*	2
	— *mexicana*	2
	— *odora*	3
	— *patula*	2
	— *rigida*	2
	— *serotina*	2
	— *ulmifolia*	4
	Spigelia marilandica	10
	Spirea aruncus	3
	— *filipendula fl. pl.*	3
	— — — *simpl.*	2
	— *lobata rubra*	4
	— *palmata*	6
	— *trifoliata*	4
	— *ulmaria fl. pleno*	3
	Statice armeria	1
	— *latifolia*	8
	— *limonium*	8
	— *tatarica*	8
	Thalictrum aquilegifol atro-purp.	3
	— — *fl. albo*	3
	— *canadensis*	3

St.		
	Thalictrum flavum	3
	— — *speciosum*	4
	— *glaucum*	3
	— [illegible]	3
	— *nigricans*	3
	— *tuberosum*	3
	Tradescantia virginica coerul.	3
	— — *purpur.*	3
	— — *roseo.*	3
	Trifolium rubens	2
	Trollius aconitifolius	4
	— *asiaticus*	6
	— *europaeus*	3
	— *tauricus*	3
	— *thuringiacus*	2
	Tulipa gesneriana, viele Farben, 100 St.	20
	— *monstrosa*	1
	— *hortensis flore pleno*, 100 St.	32
	— *sylvestris*	[illegible]
	Tussilago fragrans	2
	Valeriana alba	2
	— *dioica*	2
	— *officinalis*	2
	— *Phu*	2
	— *rubra*	2
	— *tripteris*	3
	Veratrum nigrum	4
	Verbascum ferrugineum	4
	— *nigrum*	4
	— *phoeniceum*	3
	— *pyramidatum*	6
	— *speciosum*	4
	— *virgatum*	3
	Veronica arguta	4
	— *foliosa*	2
	— *gentianoides*	2
	— *incisa*	3
	— *pallida*	2
	— *sibirica*	3
	— *spuria alba*	2
	— *taurica*	6
	— *virginica*	2
	— *viridiflora*	3
	Vinca herbacea alba	2
	— — *purpurea plen.*	2
	Viola odorata fl. albo pleno	2
	— — — — *simpl.*	[illegible]
	— — *coerul. plenissimo*	1
	— — *fl. coerul. simpl.*	[illegible]
	— — *intus rubro pl.*	3
	— — *rosea pleno*	2
	— — — *simpl.*	[illegible]
	— — *praecox*	[illegible]

II. Im freien Lande ausdauernde Rosen.

	Rosa unica alba	8
	— — *carnea*	8
	— *carnea millefolia*	3
	— *muscosa centifolia*	4
	— *inermis plena*	3
	— *damascena coccinea*	2
	— *gallica holoserica plena*	4
	— *belle pinne major*	3
	— *ambigua*	4
	— *royal*	2
	— *millefolia purpurea*	2
	— *gallica ranunculoides*	4
	— *Perl de Weissenstein*	4
	— *monstrosa*	3
	— *violacea magna*	4
	— *regia*	4
	— *amoena*	4
	— *vix spinosa*	3
	— *carnea humilis*	2
	— *regalis maxima*	3
	— *belgica major*	3
	— *pimpinellifolia rubra simpl.*	3
	— — *alba plena*	4
	— — — *simpl.*	2
	— *nova anglia*	6
	— *belgica minor*	3
	— *gallica imperialissima*	4
	— *gloriosa*	4
	— *muscosa dijoniana*	24
	— *centifolia Kinston portugall*	6
	— *mignonne*	4
	— *spectabilis plena*	8
	— *de Meaux*	4
	— *bipinnata*	8
	— *schönbrunniana*	4
	— *cinnamomea plena*	4
	— *incinerata plenissima*	4
	— *cuprea*	4
	— *centifolia sulphurea pl.*	3

St.			gr.
	Rosa sulphurea simplex.		
	— millefolia coccinea		2
	— — anglica		2
	— gallica versicolor		2
	— beauté tendre		4
	— marmorea gallica		3
	— centifolia maxima		2
	— — minor		2
	— punicea bicolor		1
	— alba plena		1
	— turbinata		1
	— fasciculata		2
	— umbellata		3
	— regalis incarnata		4
	— dijoniana		2
	— francisca rubra		3
	— centifolia hollandica,	oculirte.	4
	— muscosa humilis,		12
	— — simplex.		12
	— flore galante		4
	— prolifera		8
	— concavifolia		6
	— provincialis pyramidalis		6
	— papaverina minor		4
	— parviflora plena		4
	— pomponica		6
	— lucida plena		4
	— americana rubra		3
	— calendaria lucida plena.		4
	— de Haddington,	Schottische Rosen.	6
	— Port Patrik.		6
	— de Paisley.		6
	— de Greenok.		6
	— Falkirk.		6
	— Canney.		6

III. Semperflorentes. Topfrosen.

	Rosa grandiflora	6
	— centifolia	4
	— thea carnea	16
	— Noisettiana	6
	— parviflora	4
	— anemything	8
	— bracteata	4
	— aithales alba	6
	— anemoneflora	6
	— formosa	6
	— bichonia	4
	— rouge odeur du Thée.	4
	— variegata	4
	— caroliniana simplex	4
	— multiflora japonica	4
	— — rubra	4
	— violacea major	12
	— micrantha	4
	— centifolia speciosa.	4
	— — chinensis.	6
	— liginis flora	6
	— centifolia atropurpurea	6
	— pannosa	8
	— sempervirens involucrata	4

IV. Gefüllte Georginen oder Dahlien.

St.		Sr.
	Grand Duc, hellponceau.	5
	Sulphurea grandiflora, dunkelgelb mit chamois	5
	Atropurpurea formosa plenissima, oberer Theil der Blätter der Blumen dunkelviolett, der untere Theil hellviolett.	4
	Rubicunda, lebhaft rosa.	5
	Maxima. Orangegelb mit roth	5
	Crocea grandiflora, dunkelsafrangelb	4
	Drapeau bleu, hellviolett	4
	Aurora, gelb mit gelbroth	4
	Fuscata speciosa, gelb, gelbroth und hellviolett.	5
	Louis seize, chamois	5
	Graf Bulow, rothgelb	4
	Violacea hyalina, violettfarbig.	4
	Aurantiaca. pomeranzengelb.	4
	Speciosa grandiflora, dunkelviolett	5
	Carnea, hellfleischfarbig	4
	Fuscata miniata, scharlach mit gelb	4
	Lilacina grandiflora, blaßviolett	4
	Belle pourpre, violett	5
	Souvrain, rosa mit etwas weiß	5
	Purpurea maculata, blauroth mit Flecken	4
	Vitellina aurea, dottergelb.	4
	Atrococcinea grandiflora, schwarz und gelb	4
	Flavescens, hellorange, wird später gelb	4
	Coccinea splendens, leuchtend roth mit reinem Violett	5
	Aurantiaca rubra major, dunkelgelb mit ponceau	5
	Rosea grandiflora, dunkelrosa	4
	Coccinea speciosa, feurigroth	5
	Sanguinea splendens, mennigfarbig	4
	Wellington, braungelb	4
	Coccinea lutea, leuchtend gelbroth mit gelben Streifen	5
	Aurea violacea, violettroth.	4
	Molsdorf, roth mit dunkelgelb	5
	Coccinea multiflora, hellponceau mit gelb	4
	— formosa, scharlachroth	4
	Sanguinea rubra, blutroth.	4
	Mathilde, kupfergelb	5
	Gilvacea, isabellgelb	5
	von Goethe, schwarzponceau mit sammtartigen dunkelpurpur	16
	Rosea, blaßroth	4
	Squalens, purpur mit gelb und violett	4
	Purpurea pallideviolacea, blaßviolett	5
	Rosea spectabilis, leuchtend rosa	5
	Atrococcinea nigricans, dunkelpurpur mit fast schwarz.	4
	Sulphurea, schwefelgelb mit sehr wenig roth	5
	Sulphurea unica, rein paillegelb, neu	16
	Violacea, rothblau mit purpur	5
	Lutescens, gelblichroth	4
	Dryander, goldgelb	5
	Lactea, milchweiß	4
	Cinnaborum formosum, kupfergelb	4
	Ehrenberg, weißviolett	5
	Rubra maxima, dunkelroth	6
	Xerampelina, braunroth	5

Verzeichniß

von

Blumenſämereien, perennirenden Gewächſen und andern Zierpflanzen der ſchönſten und beliebteſten Arten,

deren

Echtheit und Güte meinen Handelsfreunden ſeit Jahren hinlänglich bekannt ſind.

Zu haben bei

J. A. Büchner in Gotha.

Bemerkungen:

Alle Aufträge werden ſo zeitig als möglich erbeten, und ſind franco mit Beifügung oder Anweiſung des Betrags einzuſenden.

Zahlung geſchieht in Preuß. Courant, den Thaler zu 24 ggl.

Bei den Sortimenten bleibt die Wahl mir überlaſſen. — Halbe Priſen können nicht gegeben werden.

Die Verſendungszeit der Pflanzen iſt bei günſtiger Witterung der März und April, Zwiebeln können nur bei froſtfreier Witterung verſchickt werden. — Den Pflanzen-Beſtellungen iſt nach Verhältniß eine Vergütung für Emballage beizufügen.

I. Blumenſämereien.

1. Levcoyen,

beſte und vorzüglichſte Sorten, die ſehr ins Gefüllte fallen; ganz reifer und ausgeſuchter Saamen.

a. Sommerlevcoyen, die Priſe zu 100 Korn 1 gl. 6 pf.

Nr.			Nr.		
1	apfelblüth	engl.	20	fleiſchfarbig	halbengl.
2	lichtblau	—	21	weiß	—
3	dunkelziegelroth	—	22	hellblau	—
4	roſenfarb	—	23	dunkelblau	—
5	rothbraun	—	24	braun	—
6	aſchblau	—	25	mordorée	—
7	carminroth	—	26	hochcarminroth	—
8	blaßbraun	—	27	dunkelkupferroth	—
9	hellmordorée	—	28	dunkelroſa	—
10	blaßlilla	—	29	ziegelroth	—
11	blaßziegelroth	—	30	aſchgrau	—
12	violett	—	49	carmoiſinroth	—
13	weiß	—	50	zimmtbraun	—
40	dunkelſchwarzbraun	—	31	carmoiſinroth	engl.
41	carmoiſinroth, wiener	—	32	dunkelblau	—
42	do. dunkel	—	33	kupferfarbig	—
43	fleiſchfarbig	—	34	weiß	—
44	zimmtbraun	—	56	blau	—
45	roth	—	51	roth mit Lackblatt	
46	blau	—	52	mordorée	—
47	neumordorée	—	54	weiß	—
48	ziegelfarbig	—	35	carmoiſinr., hlbeng.	
14	carminroth	—	36	dunkelbraun	—
15	fleiſchfarbig	—	37	fleiſchfarbig	—
16	mordorée	—	38	ziegelroth	—
17	weiß	—	39	weiß	—
18	zimmtbraun	—	53	blau	—
19	rothbraun	—	55	roth	—

Mit Lackblatt

Herbſt- o. Baſtard-Levcoyen, [illegible]

Vorſtehend angeführte Levcoyen-Sorten in 56 einzelnen Priſen à 100 Korn koſten . . . . 3 Thlr. 6 gl.
30 Sorten meiner Wahl, jede Priſe einzeln 1 „ 17 „
20 do. do. do. 1 „ 4 „
Eine Priſe zu 400 Korn, die Farben gemiſcht — „ 4 „
Eine dergl. 200 — do. — „ 2 „

b. Winterlevcoyen, die Priſe zu 100 Korn 1 gl.

A. hochroth
B. weiß
E. violett
F. feuerroth
H. hellviolett
J. zimmt- od. kupferf.
K. violette Baumlevc.
L. roſa
M. hellroſa
O. mordorée
AA. hoch carmin
AB. weiß mit Lackbl.

Dieſe 12 Farben in einzelnen Priſen 11 gl.
Eine Priſe zu 400 Korn gemiſcht 4 gl.

Sommergewächs-Sämereien.

Preuß.

à Priſe	ggl.	pf.
☞ Aſter chinenſ. fl. pl., ganz gef. Röhraſtern 1. dunkelroth, 2. dunkelblau, 3. fleiſchfarbig, 4. weiß, 5. roſa, 6. hellblau, 7. blau mit weiß, 8. roth mit weiß, 9. hellblau mit weißer Blatteinfaſſ., 10. hellroth mit weißer Einfaſſung, von jeder Farbe die Priſe zu 100 Korn	1	6
Alle 10 Sorten in einzelnen Priſen	12	—
Eine Priſe dieſer Farben melirt circa 400 Korn	3	—
Adonis autumn., hochrothes Adonisröschen	1	—
— aestivalis, Frühlings-Adonisröschen	1	—
Agrostemma coeli rosa, glattblättrige Gartenrade	1	—
Amaranthus caudatus, Fuchsſchwanz	1	—
— speciosus, prächtiger Amaranth	1	—
Anoda dillenii, blaue (ſchön)	1	—
Anthemis Arabica, arabiſche Camille	1	—
Arctotis calendulacea, ringelblumenartiges Bärenohr	2	—
Athanasia annua, jährige Athanaſia	1	—
Biserrula pelicinus, Egelkraut	1	—
Briza major, großes Zittergras	1	—
— minor, kleines —	1	—
Blitum virgatum, Erdbeerſpinat	1	—
Calceolaria pinnata, gefiederte Pantoffelblume (ſehr ſchön)	2	—
Calendula officinalis fl. pl., gef. Ringelblume	—	9
— pluvialis, Regen-Ringelblume	1	—
— off. fl. sulphur., ſchwefelgelbe	1	—
Campanula speculum fl. coeruleo et albo, blauer und weißer Venusſpiegel	1	6
Carthamus tinctorius, Saflor	1	—
Centaurea cyanus, Gartenkornblume verſchied. Farben	—	9
— moschata fl. albo, weiße Flockenblume	1	—
— — fl. coeruleo, blaue —	1	—
Centranthus calcitrapa. (Valeriana calcitr.)	1	—
Cerinthe major, große Wachsblume	1	6
Cheiranthus cheiri fl. pl., braun gefüllter wiener Stangenlack extra 100 Korn	2	—
— — semipl., halbgef. mit ſehr ſtarken Blumenbüſcheln	1	6
— blauer Buſchlack	1	—
— maritimus, Meerlevcoye, niedliche	1	—
Chryſanthemum carinatum, ſchönſte Wucherblume	1	6
— coronarium fl. pl. albo, weißgefüllte	1	—
— — fl. pl. aureo, goldgelbgef.	1	—
Clarkia pulchella, ſchönſte Clarkie (eine Prachtbl.)	1	6
Collinsia grandiflora, großbl. Collinſia	1	6
Convolvulus tricolor, dreifarbige Winde	1	—
— bicolor, zweifarbige	1	—
Corydalis aurea, gelbfarb. Erdrauch	1	—
Coreopsis tinctoria, färbende Wanzenblume	1	—
Crepis barbata, bärtiger Pippau	1	—
— rubra et alba, roſenrothe und weiße Grundfeſte	1	—
Cucurbita, Kürbiſſe, ein Sortiment von 12 Zierkürbiß-Sorten	12	—
— 8 Sorten der beſten Melonen	8	—
Cynoglossum linifolium, weißes Vergißmeinnicht zu Einfaſſungen à Loth	4	—
☞ Delphinium Ajacis, gef. niedriger ſehr ſchöner Ritterſporn in 8 Farben à Loth	6	—
— consolid. fl. pl., gefüllte Levcoyen-Ritterſporn in 6 Farben à Loth	6	—
— — simplex, einfacher	2	—
Dracocephalum Moldavica fl. albo, weißer türkiſcher Drachenkopf	1	—
— — fl. coerul., blauer —	1	—
Echium Creticum, cretiſche Stachelbolde	1	—
— grandiflorum, großblumige —	1	—
Elichrysum lucidum, glänzende Strohblume	1	6
Erodium moschat., Moſchus-Reiherſchnabel	1	—
— gruinum, candiſcher —	1	—
Euphorbia litterata, Wolfsmilch, gefleckte	1	—
Georgina variab. fl. pl., extra gef. Georginen 100 Korn	6	—
Gilia capitata, knopfförmige Gilie (ſchön)	1	6
Helianthus annuus fl. pl. aureo, goldgelbe gef. Sonnenbl.	1	—
— — fl. pl. sulphureo, ſchwefelgelbe —	1	—
Hibiscus trionum, Stunden-Eibiſch	1	—
Iberis amara, weiße Schleifenblume	1	—
— umbellata, bunte Schleifenblume	1	—
— — alba, (superba) weiße	1	6
— — fl. rubro, rothe, ſehr ſchön	2	—
— pinnata, gefiederte	1	—
Impatiens balsamina fl. pl., gef. Balſaminen in 12 Farben, extra 100 Korn	3	—
und in folgenden Farben: 1. weiß, 2. violett, 3. kupferfarbig, 4. ſcharlach, 5. lilla, 6. dunkelroſa, 7. purpur, 8. fleiſchfarbig, 9. weiß mit purpur, 10. weiß mit ſcharlach, 11. weiß mit kupfer, 12. weiß mit carmoiſin.		
Das ganze Sortiment jede Priſe à 10 Korn	12	—
Ipomoea purpurea, verſchiedenfarbige Trichterwinde	1	—
Ketmia vesicar., Blaſen-Ketmie (ſchön)	2	—
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke à Loth	2	—
— zeylanicus, himmelblaue, niedrige à Priſe	1	—
— striatus, geſtreifte (ſchön)	1	—
Lavatera trimestris fl. albo, weiße Sommerpappel	1	—
— — fl. rubro, rothe —	1	—
Lopezia exaltata, Lopezie	1	—
Lupinus majus, Lupinen, weiß, blau und roth	—	9
Malope trifida, dreitheilige Malope	1	—
Malva Mauritiana, Mauritianiſche Malve	—	9
Mirabilis jalappa, Jalappe, diverſe Farben	1	—
— longiflora, langblühende wohlriechende	1	—
Momordica elaterium, Spritz-Gurke	1	—
Nicotiana nyctaginiflora, wie Jasmin riechender Toback	2	—
— nana, aus Chili	1	—
Nigella damascena, Garten-Schwarzkümmel	—	9
— — nana, niedrig gefüllter	1	—
Oenothera amoena, ſchönſte Nachtkerze	1	6
— Lindleyana, (neu und ſchön)	1	6
— odorata, wohlriechende	1	—
— undulata, wellenförmige	1	—
— cruciata, gekreuzte	1	—
— tetraptera, vierflügelige	1	—
— longifol., langblättr.; sinuata, weichflächige; purpur., purpurf.; chiloecarpa, knollige jede Priſe	1	—
Papaver rhoeas fl. pl., gef. Ranunkel-Mohn à Loth	4	—
— somniferum fl. pl., bunter gef. Mohn —	3	—
Polygonum orientale fl. rubr., morgenl. Knöterich, rother	1	—
Reseda odorata, wohlriechende Reſeda à Loth	3	6
— alba, weiße Reſeda	1	—
Ricinus communis, gemeiner Wunderbaum	1	6
Rudbeckia amplexicaulis, ſtengelumfaſſende R.	1	—
Scabiosa atropurpurea, in 12 Farben	1	—
— major, großbl. in 6 Farben, vorzüglich ſchön	1	6
Schizanthus pinnatus, gefiederte Sch., ſehr ſchön	1	6
Scorzonera tingitana, Haferwurz	—	9
Senecio elegans fl. pl. albo, weißgef. Kreuzkraut	1	6
— — fl. pl. rubro, rothgef.	1	6
Silene quinquevulner., fünffleckige Gartenſilene	1	—
— pendula, hängende	1	—
Solanum lycopersicum fructu rubro, rothfr. Liebesapfel	1	—
— — fr. luteo, gelbfrüchtiger	1	—
Tagetes erecta fl. pl. aureo, aufrechte gef. hochgelbe Sammtblume	1	6
— — fl. pl. sulphureo, ſchwefelgelbe	1	6
— patula, braungelbe ausgebreitete	1	—
Trifolium melilotus fl. coerul., blauer Melilotten-Klee	—	9
Tropaeolum majus, große indiſche Kreſſe	1	—
Vicia faba, rothe [illegible] Puffbohne à Stück	1	—
Viola tricolor grandiflora, dreif. großbl. Stiefmütterch.	1	—
Xeranthemum annuum fl. albo, weiße Papierblume	1	—
— — fl. coeruleo, blaue	1	—
— — fl. albo pl., weiße gefüllte	2	—
— — fl. coerul. pl., blaue gefüllte	2	—
Zinnia multiflora rubra, rothe vielblumige Zinnie	1	—

Der Pränumerationspreis beträgt jährlich 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf.

Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungsexpeditionen und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen an.

Gemeinnützliche Mittheilungen über Wein-, Obſt- und Gemüſebau, Bienenkunde, Feld- und Hauswirthſchaft.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. I. Weißenſee, (in Thüringen). Februar 1833. I. Jahrg.

Probe-Blatt!

Weinbau.

Ueber die Behandlung des Weinſtockes in Thüringen.

Mitgetheilt vom Hrn. Hofgärtner Moos aus Weimar.

„Der Weinſtock iſt die edelſte, fruchtbarſte und angenehmſte Pflanze, die nützlichſte aller Obſtſorten!“ ſagt Kecht in ſeinem ſehr ſchätzenswerthem Werke über den Weinbau, und dieſes mit vollem Rechte; denn ſeitdem wir unſere Weinſtöcke nach der Kecht'ſchen Anweiſung behandeln, haben wir die Wahrheit dieſes Satzes gewiß alle erkannt, indem wir da Früchte erhielten, wo wir ſonſt nur leere Reben hatten, was beſonders in Gärten und an Häuſern der Fall war, wo doch die Trauben am beſten gedeihen.

Die Schuld, warum wir vor Bekanntwerdung der Kecht'ſchen Methode ſehr wenig Trauben an den ſchönſten Stöcken in unſeren Gärten erhielten, lag darinnen, daß wir unſere Weinſtöcke ganz nach Art der Winzer behandelten, ohne daran zu denken, daß bei einem Weinſtocke in gutem Gartenboden der Schnitt und die Behandlung überhaupt ganz anders ſein müſſe, als in einem mageren Weinberge.

Ich ſelbſt ließ mir von einem geſchickten Winzer, welcher in ſeinem Weinberge die ſchönſten Trauben zog, Unterricht in der Behandlung des Weinſtockes geben, und obgleich dieſer Mann die Behandlung an mehr als 50 Stöcken an einer gegen Mittag gelegenen Gartenmauer ein Jahr hindurch beſorgte, und ich genau nach ſeiner Anweiſung die folgenden Jahre damit fortfuhr, ſo erhielt ich doch ſo wenig Trauben, daß ich es nicht der Mühe werth hielt, meinen Weinſtöcken eine beſondere Wartung angedeihen zu laſſen, indem ja, wie ich glaubte, bei der beſten Behandlung nichts dabei zu gewinnen ſei.

Gewiß erging es vielen Anderen ebenſo wie mir, und daher kam es denn, daß dem Weinſtocke lange nicht die gebührende Aufmerkſamkeit geſchenkt, ja derſelbe ſogar oft als unnütz betrachtet, und ausgerottet wurde.

Der Weinſtock gedeihet in einem jedem Boden, ſowohl in magerem, als fettem, in trockenem und naſſem, und überall iſt er nach Verhältniß ergiebiger als alle andere Fruchtbäume und Sträucher, wenn er nur richtig behandelt wird; auch übertrifft er an Dauer alle bekannten Fruchtbäume.

Da wir nun ein ſo vortreffliches Werk über den Weinbau von J. S. Kecht in Berlin beſitzen, ſo könnte es ſcheinen, als ob es überflüſſig wäre, noch etwas über die Behandlung des Weinſtockes zu ſagen; dem iſt aber nicht ſo, und zwar aus dem Grunde: weil die Behandlung nach den Sorten, ganz vorzüglich aber nach dem Boden, worauf er wächſt, ſehr verſchieden iſt und ſein muß, wenn eine gute Ernte erzielet werden ſoll.

(Fortſetzung folgt.)

Obſtbaumzucht.

Ueber Ausſaat der Obſtkerne aus der Pflanzung der Kernpflanzen.

(Mitgetheilt von Hrn. Fr. von Dachröden in Elingen.)

Um gute Aepfel und Birnbäume zu erhalten, iſt das ſicherſte und wohlfeilſte Mittel, Baumpflanzungen aus den Samen ſelbſt zu ziehen, indem man bei dieſen keines großen Raumes bedarf. Zu dieſem Behuf wähle man einen ebenen Platz, der eine freie und von allen Seiten offene Lage hat, den die Sonne beſcheinen, und die Winde durchſtreichen können; der Boden darf nicht zu fett und nicht zu mager ſein, ſondern muß nur eine mittelmäßige Güte haben, muß mehr trocken als feucht und locker ſein. — Der Platz muß durch einen dichten Zaun verwahrt werden, damit ſelbiger vor Hühnern, beſonders vor den Haſen geſichert iſt. — Zu Ende des Monats September muß der Boden 1 1/2 — 2 Fuß tief, und recht fein umgegraben werden, auch iſt er von allen Unkrautwurzeln ſorgfältig zu reinigen; das gleichmäßige Graben, ſo wie das gleichmäßige Harken, iſt ein Haupterforderniß, weil dadurch die Feuchtigkeit gleichmäßig vertheilt wird, und ſich das Waſſer nicht leicht an einem Punkte ſammeln kann. — Die Beete werden zu 2 — 3 Fußbreiten getheilt, ſo, daß man von beiden Seiten in deren Mitte hineinreichen kann, ohne hineintreten zu müſſen. — Wenn dieß geſchehen iſt, zieht man Rinnen von 2 Zoll Tiefe die 6 — 8 Zoll von einander entfernt ſind. — Dieſe Arbeit muß bei gutem trockenen Wetter geſchehen, weil die Erde bei dieſem Geſchäfte durchaus nicht ſchmierig und klebrig ſein darf. — Jetzt nimmt man ſo viel Erde, wie man glaubt in den Rinnen zu gebrauchen, ſiebt ſelbige durch ein Sieb und bewahrt dieſe in einem Keller, oder ſonſt an einem trockenen froſtfreien Orte auf.

(Fortſetzung folgt.)

Das Beſchneiden der Pyramiden-Fruchtbäume.

(Mitgetheilt aus Weimar von .....r.)

Es iſt gewiß keine geringe Zierde eines Blumen- und Gemüſegartens, der nach regelmäßiger Abtheilung in Quadrate mit Rabatten und Einfaſſung angelegt iſt, wenn in der Reihe der Roſenſträncher und Staudengewächſe auch hie und da in gehöriger Entfernung von einander, ſymmetriſch geordnet, Pyramidenbäumchen, ſie mögen aus Aepfel- oder Birnſtämmchen beſtehen, angepflanzt werden. Sie unterbrechen das Gleichförmige und geben den Wegen und Rabatten, ſowie der ganzen Gartenanlage ein romantiſches Anſehen, ſobald die Form der Pyramide nur einigermaßen in Ordnung erhalten wird.

Auf die Form der Pyramide hat jedoch der Boden einen bedeutenden Einfluß und daher kömmt es, daß in einem guten nahrhaften Boden dieſe Bäume in ganz beſonders hohem Grade treiben und auf dieſe Weiſe einen großen Ueberfluß von Saft zeigen; es ſchießen aus der geſchmeidigen Rinde des Stammes in bewundernswürdiger Länge viele Ruthen hervor, die ſehr ſpät die Reife zum Fruchttragen erreichen und folglich den gewünſchten Zweck nicht erfüllen, welchen man von ihnen zu erlangen beabſichtigt. Das Anſehen dieſer Bäume iſt dann zwar ſchön, ſie blühen auch oft in Menge, tragen aber gewöhnlich keine Frucht. (Fortſetzung folgt.)

Gemüſebau.

Ueber das Erdmagazin zur Erziehung feiner und zarter Gemüſe.

(Eingeſandt von Hrn. Eyſerbeck, herzogl. S. Goth. Obergärtner in Gotha.)

Um ein gutes Erd-Magazin zu veranſtalten und hinlänglichen Nutzen davon zu ziehen, muß man folgende Materialien herbeizuſchaffen ſuchen:

1) iſt erforderlich eine Parthie guter Kuhmiſt; —
2) aus den Holzſtällen Säge-Späne; —
3) eine Parthie Trift-Raſen; —
4) eine Parthie feiner Sand; —
5) eine Parthie ausgeſtochene Lehm Erde.

Alle dieſe Quantitäten ſetzt man Schichtweiſe auf einen Haufen zuſammen und läßt ſolchen ein Jahr lang liegen und zuſammen verfaulen. Nach dieſer Zeit wird der Haufen durchgehackt, und durch eine Erdrolle geworfen, wo es ſich zeigen wird, ob die Erde zum Gebrauch für die Erziehung feiner Gemüſe dienlich ſei. Sollte ſich der Fall ereignen, daß die Ingredienzien noch nicht recht verfault ſind, ſo iſt es nöthig, den Haufen noch ein Jahr liegen zu laſſen, man muß daher ſuchen, alle Jahre ein Neues Erd-Magazin anzulegen, damit immer ein Vorrath, guter, brauchbarer Erde vorhanden iſt. Hat man ſich nun eine hinlängliche Quantität guter Erde angeſchafft, ſo kann man für die Erziehung feiner Gemüſe weitere Anſtalten treffen.

Will man Blumenkohl, Carotten, Bohnen, Gurken, und Melonen ziehen, ſo wird zu jeder Sorte ein beſonderer Kaſten, Fenſter, Deckladen, und Strohdecken verlangt, alsdann eine hinlängliche Quantität friſcher Pferdemiſt, je nachdem, was man ziehen will. (Fortſetzung folgt.)

Die früheſten Erbſen zu ziehen.

(Mitgetheilt vom Hrn. Hofgärtner J. Mooß zu Weimar.)

In der Mitte des Februar, oder wenn da die Kälte etwa noch zu ſtreng wäre, anfangs März wird ein Miſtbeet auf die gewöhnliche Weiſe, wie man es etwa zu Gurken anlegen würde, angelegt. Nachdem ſich der Miſt erwärmt hat, bringt man eine 6 Zoll hohe Lage Erde darauf, welche im Herbſte zuvor geſiebt und an einem trockenen Orte aufbewahrt worden iſt. Die Erde wird geebnet und mittelſt eines Stück Brettes, wie man ſich ſolches zum Andrücken bey den Miſtbeetſaaten bedient, ſo derb angedrückt als es nur einem möglich iſt. Hierauf wird nun ein Zoll hoch klarer Fluß- oder Grubenſand gelegt und die Erbſen auf den Sand ausgeſäet, und zwar ſo dichte, daß etwa auf einen □ Zoll zwei Erbſen zu liegen kommen. Nach der Saat werden die Erbſen mit zwei Zoll Sand bedeckt und das ganze Beet nun mit einem Brette mäßig gedrückt. Sollte der Sand nicht Feuchtigkeit genug haben, ſo iſt es nothwendig das Beet gleich anzugießen. Es können ſowohl Zucker- als Kneifel-Erbſen gebraucht werden, jenachdem man die Eine oder die Andere oder auch beide Sorten zu haben wünſcht. Von den Zuckererbſen wähle man aber die frühe Zwerg- und von Kneifelerbſen ebenfalls die frühe franz. Zwerg- oder frühe Maierbſe. (Fortſetzung folgt.)

Bienenkunde.

Ueber den Nordſtand der Bienen.

(Mitgetheilt von Hrn. Sachſe aus Werningshauſen.)

Da mehrere berühmte Bienenzüchter die Nordlage der Bienen oder ihren Ausflug gegen Norden ſehr empfohlen haben, ſo glaube ich wohl mit Recht die Aufmerkſamkeit der Bienenfreunde auf dieſe Verfahrungsart lenken zu können, um ſie zu etwanigen Verſuchen zu veranlaſſen. Riem in ſeinem „praktiſchen Bienenvater“ S. 13 §. 9 bemerkt z. B. unter andern darüber: „mehrere geſchickte Bienenlehrer ſagen, daß die Bienen im Winter nicht durch die Sonne hervorgelockt würden, ſondern beinahe ſo gut wie vergrabene Bienen, und wohl noch geſünder ſtänden, und daß bei der veränderlichen Frühjahrs-Witterung nicht deren ſo viele umkämen.“ Ferner erzählt derſelbe: „daß er in Oberſchleſien mit eigenen Augen in den Jahren 1776 bis 1785 geſehen, daß die gegen Norden den Ausflug gehabten Stöcke (oder Klotzbeuten) alle Mal mehr Honig gehabt und abgeben können, wie alle übrigen in andern Lagen.“ Mir ſelbſt iſt es erinnerlich, daß ich in meiner Jugend bei einem ſtarken Bienenzüchter in meinem Wohnorte mehrere Stöcke mit dem Flugloche gegen Norden geſehen habe. Daß den Bienen der Ausflug gegen

Norden nicht zuwider iſt, beweiſt ſchon der Umſtand, daß, wenn dieſelben bei Lagerſtöcken, welche mit dem Flugloche nach Mittag zu liegen, an den Hinterdeckeln eine Oeffnung finden können, ſie ihren ordentlichen Aus- und Einflug oft da nehmen. Ich habe im vorigen Jahre bei einem Bienenhalter einen ſolchen Stock gefunden, wo ſehr ſelten eine einzige Biene zum gewöhnlichen Flugloche, ſondern zwiſchen dem Hinterdeckel und dem Stocke herauskam. Hier war eine einen halben Finger breite und ohngefähr 3 Zoll lange Oeffnung, durch welche der ganze Flug ein- und ausging. Beim erſten Anblick dachte ich, das Flugloch wäre vielleicht von Unrath verſtopft; ich unterſuchte es deshalb, fand es aber ganz rein und offen. Nun ſtrich ich das hintere, falſche Flugloch mit Lehm zu, damit ſie ihren Fluge vorn heraus nehmen ſollten; jedoch hatten ſie das Verſtrichene gleich die erſte Nacht wieder durch gebiſſen, und dieſes geſchahe ſogar mehr Mal, bis ich ſie endlich durch Blenden mit Gewalt an ihren ordentlichen Flug gewöhnte. (Beſchluß folgt.)

Haus- und Landwirthſchaft.

Bemerkungen über Pferde und Pferdezucht.

Geſammelt von Warnofrid.

Beiträge zur Hippologie.

Relata et reflexa.

Der Menſch, ſagt Buffon, hätte unter allen Thieren, worüber er ſeine Herrſchaft beſtätiget, nicht leicht eine größere Eroberung machen können, als durch Zähmung des edlen, des ſtolzen, des flüchtigen Pferdes.

Nach Brugnone läßt ſich nirgends ein Beweis auffinden, daß man ſich der Pferde ſchon vor der Regentſchaft Joſephs in Aegypten (um das Jahr 642 nach der Sündfluth) bedient hätte.

Die Skolotten, ein ſcythiſches Volk, ſollen, wie Graf Bismark gedenkt, die erſten geweſen ſein, welche die Kühnheit hatten, das ſchöne Thier, Pferd genannt, zahm zu machen.

Aſien wird für das eigentliche Vaterland des Pferdes gehalten, weil es nur dort die vollkommenſte, regelmäßigſte Schönheit erreicht.

Schön iſt ein Pferd, erklärt Dennecker, wenn alle ſeine einzelnen Theile verhältnißmäßig gebaut ſind. Weder der kleine Kopf, noch die feinen Schenkel, noch das gewölbte Kreuz machen die Schönheit dieſes Thieres aus. Es iſt lächerlich fehlerhaft, dem Pferde einen kleinen Kopf als Schönheit anzurechnen, wenn er mit der übrigen ſtarken Bauart deſſelben in keinem Verhältniſſe ſteht. Es iſt Mangel an richtiger Beurtheilung, ein Pferd mit feinen Schenkeln zu loben, das auf dieſen ſchwachen Stützen kaum ſeinen eignen ſtarken Körper fortbringen kann. Das gewölbte Kreuz iſt nicht ſymmetriſch ſchön, wenn es gegen den Vordertheil zu ſchwach oder zu ſtark iſt. Wahre Schönheit muß geometriſch richtig ſein, ſonſt beruht ſie im Vorurtheil. Nicht einzelne Theile können entſcheiden, das Ganze, nicht nach idealen Anforderungen, ſondern nach dem natürlichen, einfachen Geſetz der Uebereinſtimmung beurtheilt, entſcheidet; Vollkommenheit wird nirgends angetroffen in dieſer Beziehung.

Brav iſt ein Pferd, wenn es Muth, Kräfte und Geſundheit beſitzt, wenn es in dem Dienſte, wozu es nach richtigen Grundſätzen beſtimmt und angelernt, brauchbar und thätig befunden wird.

Ein Pferd mit dünnen Schultern und flacher Bruſt eignet ſich in der Regel ſo wenig zum Ziehen ſchwerer Laſten, als ein Pferd mit dicken ſtarken Schultern und breiter mit dichten Fleiſchwappen verſehener Bruſt zum Reuterdienſte.

Die älteſte auf uns gekommene Beſchreibung eines Kriegspferdes befindet ſich im Hiob (Cap. 39, Vers 21—28), in welcher ſinnreich der Charakter des Roſſes geſchildert wird.

Hiob war ein Araber, und wie ſchon oben gedacht, daß Aſien das Vaterland des Pferdes, ſo iſt es in dieſem Welttheile vorzugsweiſe Arabien.

(Fortſetzung folgt.)

Ueber Leinſaat und Flachsbau.

Von ſehr ehrenwerther Hand iſt uns aus der landwirth. Zeit. folgende Mittheilung: „Leinſaat, wenn ſie die ruſſiſche erſetzen ſoll" mit der Bemerkung zugeſendet worden, die Herren Oekonomen auf den Vortheil aufmerkſam zu machen, welcher bei der hier angegebenen Behandlung hinſichtlich der Leinſaat und des Flachsbaues daraus entſpringen möchte und bittet: die Reſultate etwaniger Verſuche in d. Bl. gefälligſt mitzutheilen. — Leinſaat, wenn ſie nämlich die ruſſiſche erſetzen ſoll, ſäet man 1) Abends vor Untergang der Sonne und läßt ſie im Thau unbedeckt, egget aber dieſelbe vor Aufgang der Sonne. Damit die Winterfeuchtigkeit den Samen leichter keimen läßt, ſäet man die Leinſaat bei günſtiger Witterung bereits im Anfange des Aprils, aber dünner als gewöhnlich, entweder auf einen umgebrochenen fetten Raſen, oder auf einen kräftigen ſtark gedüngten milden Lehmboden, der — obgleich dieſe Bodenart diejenige iſt, auf welcher der Flachs am vorzüglichſten gedeiht — mindeſtens in 6 Jahren keinen Flachs getragen hat, jätet dieſes Feld in erſter Jugend des Flachſes und wiederum, wenn er 3 bis 4 Zoll hoch iſt, mit beſonderer Sorgfalt. 2) Man läßt den Samen reif werden und verzichtet auf einen bedeutenden Werth des alsdann freilich groben Baſtes. Die völlige Reife verräth die gelbe Farbe des Stengels, die bräunliche Farbe des Knoten oder Ballen, das Abfallen der Blätter, und muß der Same, wenn man die Ballen öffnet, völlig ausgebildet ſein. Wenn von dem zuerſt gebildeten Samen der größere Theil völlig reif iſt, wird der Flachs gezogen; denn wollte man alle Knoten reif und die Stengel ganz abſterben laſſen, ſo würde zu viel Same ausfallen und der Flachs ganz unnütz werden. 3.) Beim Raufen nimmt man die Hand nicht zu voll, läßt die Stengel ſich nicht unter einander verwirren und wirft jedes Unkraut weg. Man bindet die Leinſtengel in Büſchel, ſtellt ſie in Form einer Hütte auf u. läßt die Knoten ſo lange ausdorren, bis der Ballen aufzuſpringen anfängt. So behandelt, liefert der Flachs noch immer ſtarkes Haus-Linnen. (Beſchluß folgt.)

Gemeinnützliche Mittheilungen.

(Schlagende Kühe ruhig zu machen.) Es giebt Kühe, die beim Melken nicht ſtehen wollen, und dadurch die Milch verderben; durch Spannen und Knebeln, wie man dieß hie und da thut, werden ſie nur noch toller gemacht. Man hilft aber dieſem Uebel ganz ſicher und auf eine leichte Art dadurch ab, wenn man ein Stück in kaltes Waſſer getauchte Leinwand der Kuh aufs Kreuz legt, worauf ſie dann gewiß ſtehen wird.

(Kartoffelwein.) Capitain Jakob in Forges zieht jetzt aus Kartoffeln einen Wein, der dem Muscatwein durchaus gleichen ſoll. — Ueber die neueſte Erfindung, Kartoffel-Bier zu brauen, behalten wir uns ſpäterhin das Nähere vor.

Hafer ohne Hülſe, eine ganz neu eingeführte, äußerſt ergiebige Getreideart, deſſen Gewicht dem des Roggens gleich kommt, iſt in beliebigen Quantitäten bei Hrn. J. G. Booth u. Comp. in Hamburg zu beziehen. Nach dem Hamburger Preis-Courante iſt für dieſes Frühjahr der Preis deſſelben bei Quantitäten von 10 Pfund und darüber 1 Mark 8 Schilling pro Pfund, bei einzelnen Pfunden 2 Mark, Proben von circa ½ Pfund 1 Mark 4 Schilling.

(Kaminruß als Dünger.) Wenn man im März und April jungen Weizen, Klee, Wicken, ꝛc. mit trockenem, (weder mit Erde noch ſonſtigem Dünger vermiſchten) Kaminruß beſtreut, ſo ſoll dies eine wunderſame Wirkung hervorbringen, und die gelben kränklichen Halmen binnen wenigen Tagen eine geſunde, dunkelgrüne Farbe erhalten.

Acker-Spergel, ein nützliches und auf Sandboden leicht anzubauendes Futterkraut für das Schaafvieh, über deſſen Nützlichkeit ſich nun eine mehrjährige Erfahrung ſehr vortheilhaft ausgeſprochen, bietet Hr. Paſtor Schnädelbach zu Unterkoskau im Fürſtenthum Reuß-Schleiz das Pfund zu 5 Sgr. aus. Wir machen Landwirthe darauf aufmerkſam.

Statt der Silos oder Erdgruben zur Aufbewahrung von Getreide baut man in Baiern jetzt mit ſehr glücklichem Erfolge Gebäude und Magazine, bei welchen jede Beimiſchung von Kalk oder Mörtel vermieden und der Zutritt von Luft verhindert wird. Der Verderbniß des Getreides ſoll dadurch vorgebeugt werden und die Sache nur geringe Koſten verurſachen.

(Wieſenwäſſerung im Winter.) Es gehört zum Grundſatze der erfahrenſten engliſchen Landwirthe, ihre Wieſen den Winter hindurch ſo oft als möglich zu überſchwemmen, weil das Gras dadurch gegen den Froſt geſchützt wird. Die Vegetation wird durch die Näſſe nicht gänzlich unterdrückt, und im Frühjahr entwickelt ſie ſich kräftig, während trockene Gründe noch lange winterlich erſtarrt liegen.

(Farbe aus Kartoffelblüthen.) Ein franzöſiſcher Chemiker hat eine ganz außerordentlich ſchöne gelbe Farbe erfunden, die er aus den Blüthen der Kartoffelpflanze bereitet, welche ſich vorzüglich zur Seidenfärberei eignet und dabei vor andern Farben das voraus hat, daß ſie gar keine Säure annimmt.

(Bienen Curioſität.) Der Geſellſchaft der Künſte in London ſtellte ſich neulich ein Hr. Bildeman aus Plymouth vor mit drey Bienenſchwärmen, welche er theils auf ſeinem Geſicht, theils ſeinen Schultern u. in ſeinen Taſchen hatte. Die Bienenkörbe wurden in einen benachbarten Saal geſtellt, und er begann zu pfeifen. Mit dieſem gegebenen Zeichen verließen ihn alle Bienen, und jeder Schwarm begab ſich in ſeinen Stock. Hr. Bildeman pfiff zum zweiten Male, und die Bienen ſetzten ſich wieder auf ihren vorigen Platz, auf das Geſicht, die Schultern und in die Taſche ihres Herrn. Er wiederholte den Verſuch zum öftern, ohne daß irgend Jemand der Anweſenden beſchädigt wurde.

Der Weinbau im ganzen ſüdlichen Rußland, und zwar namentlich in Georgien, der Krimm, Tartarei ꝛc. machte in den jüngſt verfloſſenen Jahren reiſſende Fortſchritte. So wurde z. B. im vorigen Jahre allein daſelbſt gegen 12 Millionen Maaß recht guter Wein erzeugt und verkauft.

Fichtenſamen liefert Oel pr. Pfund etwas über ⅕ Pfund mit 22½ Sgr. Koſten pr. Malter. Das Oel iſt etwas unreiner als Rüböl, brennt aber gut, und faſt ſo ſparſam als Rüböl.

Die Aracacha und Secacül, zwei neue ſehr wohlſchmeckende Rüben, auf die wir nächſtens in Mehrerem zurückkommen werden. Die erſtere iſt der Kartoffel ſehr ähnlich, aber leicht verdaulicher und wohlſchmeckender als dieſe und daher Kranken und Geneſenden ſehr zu empfehlen. In Amerika wird ein magenſtärkendes Getränk daraus gebraut.

(Milch in Pulverform.) Der Apothek. Legrip in Paris hat eine tragbare Milch in Pulverform erfunden, welche beſonders Reiſenden ſehr erwünſcht ſeyn dürfte. Sie beſteht aus neutraliſirter Sodakohle, Milch und feinzerſtoßenem Zucker, Waſſer und irgend einem aromatiſchen Syrup, gewährt ein ſehr angenehmes, unſchädliches Getränk, und wird durch einen bloßen Aufguß von Waſſer in wenigen Augenblicken vollkommen brauchbar hergeſtellt.

(Großes Geſtüte.) Auf dem Gute der Gräfin Orloff Tſchesmerskoi in Rußland befindet ſich ohnſtreitig eines der ſchönſten Geſtüte, denn es zählt gegenwärtig 1320 Pferde von arabiſcher und engliſcher Raçe.

Um frühe Gartengewächſe, als grüne Erbſen, Gurken, Bohnen ꝛc. im Garten vor dem Erfrieren zu ſchützen, ſtelle man auf jedes Gartenbeet, welches man gegen den Froſt ſchützen will, 5 bis 6 Schüſſeln mit kaltem Waſſer.

Die Veredlung der Schaafzucht macht jetzt auch ſchon in Sibirien große Fortſchritte; aus den ſächſiſchen Merino-Schäfereien wurden bis an die Ufer des in den Amur fallenden Argunfluſſes eine Heerde Merinos zur Veredlung der einheimiſchen Raçen getrieben; ſie haben 5 Jahre auf dieſer Reiſe zugebracht, gedeihen nun aber dort vortrefflich.

Im Garten zu Chisvik bei London wurden voriges Jahr 1205 Aepfelſorten, 622 Birnſorten, 293 Pflaumenſ., 246 Kirſchenſ., 224 Pfirſichſ. 72 verſchiedene Brugnons; 54 Aprikoſenſ., 167 Rebenſ., 71 Melonenſ., 121 Erdbeerſ. ꝛc. gezogen. — In der letzten Gemüſe ꝛc. Ausſtellung des Vereins für Gartenbau u. Blumiſtik in Weimar befanden ſich unter andern auch 257 Gemüſearten, 63 Sorten Wein- und Nüſſe, 487 Sorten Obſt u. 75 Arten Kartoffeln.

(Stand des Ackerbaues.) Die von manchem Landwirth, ſelbſt von Behörden noch ſo oft in Schutz genommene Dreifelderwirthſchaft war der eigentliche Typus der Römer noch im 20. bis 30. Jahre vor Chriſti Geburt, wie uns Columella berichtet. Da die Ackerbaukunde zu jener Zeit noch in der Wiege lag, war dieſe angewandt, woran noch Mangel an Bevölkerung weſentlichen Antheil hatte. Daß Karl der Große ſolche ſeinen Beamten beſtimmt vorſchrieb, war in der Ordnung; denn es beſtand nichts beſſeres. Kein Wunder alſo — ſagt unſer ſel. Thaer darüber — daß in Zeiten, wo Autorität alles galt, und der Verſtand ſich jeder poſitiven Vorſchrift blindlings unterwarf, ſich dieſes Syſtem durch die chriſtliche Welt ſo allgemein verbreitete, und daß die geſetzlichen Einrichtungen des Eigenthums ſowohl, als der Feldpolizei, ſich ganz darauf bezogen. Daß in den darauf folgenden finſtern und unruhigen Zeiten, wo der Ackerbau faſt entehrend in den Händen des in Stupidität und Sklaverei verſunkenen Bauers beruhte, worüber niedere Freigelaſſene die Inſpektoren machten, keine Fortſchritte denkbar waren, iſt natürlich; heut zu Tage aber ſollte man ſo etwas nicht mehr finden.

(Neue Preisſchriften.) Durch ein Reſcript des königl. bair. Staatsminiſt. d. Innern vom 22. Oct. 1832 iſt ein Preis von 100 Species-Ducaten auf die Bearbeitung eines vollſtändigen, leichtfaßlichen Unterrichts über die Zucht, Behandlung und Veredlung der Rindviehgattungen, dann ihre landwirthſchaftlichen Benützungen, ausgeſetzt worden. Das Werk muß die katechetiſche Form beſitzen, und das Bedürfniß und die Intereſſen kleiner Grundeigenthümer eben ſo ſorgfältig, wie jene der ſogenannten großen Landwirthe umfaſſen. Ein beſonderer Abſchnitt muß die Krankheiten des Rindviehes, ihre Kennzeichen und Heilmittel behandeln. Ferner iſt der in jedem Theile Baierns vorhandenen Viehraçen, ihrer Mängel, Gebrechen und moglicher Veredlung ausführliche Erwähnung zu machen. Ein gleicher Unterricht iſt über die Schweinezucht beizufugen. Die Preisſchriften in- und ausländiſcher Sachverſtändigen ſind bis Ende Septembers 1833 unter den gewöhnlichen Formen an den General-Comité des landwirthſchaftlichen Vereins in Munchen einzuſenden,

Desgleichen hat die Landeskultur-Geſellſchaft zu Arnsberg in Weſtphalen einen Preis von 4 Friedrichsdor fur denjenigen praktiſchen Kenner der Obſtbaumzucht ausgeſetzt, der die Kernobſtſorten, welche ſich fur den gebirgigen Theil des dortigen Regierungsbezirks am beſten eignen, und ſich durch ihre Brauchbarkeit fur Tafel und Wirthſchaft, vorzüglich zum Anbau empfehlen, deutlich bezeichnet, und die beſte Behandlungsart derſelben faßlich beſchreibt.

Auf die in Weißenſee erſcheinende „Blumenzeitung" und das „Weißenſee'r allg. Unterhaltungsblatt" können zu jeder Zeit Beſtellungen gemacht und auch noch complette Exemplare der frühern Jahrgänge bezogen werden.

Die folgenden Nummern können nur nach erfolgter Beſtellung verſendet werden.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt=Aemter, Zeitungs=Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto=Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen= Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. IV. Weißenſee, (in Thüringen). Februar 1833. VI. Jahrg.

Fortlaufendes Pränumeranten=Verzeichniß. (Fortſetzung.)

Mons. H. I. I. Wallner à Plainpalais à Genève.
Königl. Wohllöbl. Poſt=Amt Stzralkowo.
— — — — Eupen.
— — — — Mühlheim a. Rhein.
— — — — Königsberg in Preuſſen.
Herr Conditor Stützer zu Sprottau.
Herr Oberamtmann Schottmann in Buttſtedt.
— Joh. Caſp. Grimm in Gotha.
— Hofgärtner Seiffert in Elſterwerda.
— F. G. Schmidt in Erfurt.
— Schullehrer Eiſenbrandt in Langenſalza.
— Kneiſt in Biebra.

Die Roſenſammlung von Wilhelm Keller zu Duisburg. (Beſchluß.)

Die im Verzeichniß bemerkten Arten ſind folgende:

1. Art. Rosa berberifolia. 2. Art. Rosa ferox. 3. Art. Rosa kamtschatica. 4. Art. Rosa bracteata mit 3 Varietäten. 5. Art. Rosa rapa mit 7 Varietäten. 6. Art. Rosa lucida mit einer Hybride. 7. Art. Rosa pensilvanica mit 2 Varietäten. 8. Art. Rosa carolina mit 2 Varietäten. 9. Art. Rosa corymbosa mit 5 Varietäten. 10. Art. Rosa blanda. 11. Art. Rosa fraxinifolia mit einer Varietät. 12. Art. Rosa cinnamomea. 13. Art. Rosa alpina mit 4 Varietäten und 9 Hybriden. 14. Art. Rosa pyrenaica. 15. Art. Rosa acicularis. 16. Art. Rosa Woodsii. 17. Art. Rosa alpina laevis nach L. Noisette. Rosa rubella. 18. Art. Rosa sulphurea mit einer Varietät. 19. Art. Rosa pimpinellifolia, rosa spinosissima mit 10 einfachen, mit 12 halbgefüllten und 4 gefüllten Varietäten und 10 Hybriden. 20. Art. Rosa Centifolia in 5 Abtheilungen: die erſte mit 2 Varietäten, die durch die Sonderbarkeit ihrer Blumen ausgezeichnet ſind. Die zweite mit 5 Varietäten, ausgezeichnet durch die Form und das Gezähnte ihrer Blätter. Die dritte mit den Unterſcheidungszeichen und dem Ausſehn der gemeinen Centifolie, enthält 21 Varietäten. In der vierten Abtheilung ſind die niedrigen unter dem Namen Pompon bekannte Centifolien mit 4 Varietäten aufgenommen. Die fünfte endlich enthält 15 Hybriden der Centifolie. 21. Art. Rosa muscosa mit 16 Varietäten. 22. Art. Rosa belgica mit 2 Varietäten und 8 Hybriden. 23. Art. Rosa portlandica in 4 Abtheilungen. Die erſte enthält die Perpetuellen oder mehr als zweimal jährlich blühenden in 11 Varietäten, die zweite 14 Varietäten welche gewöhnlich zweimal auf einem Theil ihrer Zweige blühen, die dritte mit 7 Varietäten, welche nur einmal jährlich blühen. Die vierte 4 Hybriden. 24. Art. Rosa damascena mit 29 Varietäten und 7 Hybriden. 25. Art. Rosa provincialis mit 34 Varietäten und Hybriden. 26. Art. Rosa gallica mit 3 Abtheilungen. Die erſte mit 296 Varietäten, die zweite faſt ohne Stacheln mit 9 Varietäten, die dritte mit 14 Varietäten, welche alle punktirt, geſtreift oder marmorirt ſind. 27. Art. Rosa burgundica. 28. Art. Rosa turbinata mit 3 Varietäten und 3 Hybriden. 29. Art. Rosa villosa mit 2 Varietäten und 2 Hybriden. 30. Art. Rosa tomentosa mit einer Hybride. 31. Art. Rosa alba, erſte Abtheilung mit weißen Blumen in 16 Varietäten. Zweite Abtheilung mit fleiſchfarbenen Blumen in 21 Varietäten. Dritte Abtheilung mit roſenrothen Blumen in 6 Varietäten. Hybriden mit weiſſen Blumen ſind fünf, mit fleiſchfarbigen Blumen ſechs und mit roſenrothen Blumen zwei. 32. Art. Rosa evratina. 33. Art. Rosa eglanteria lutea mit drei Varietäten. 34. Art. Rosa rubiginosa mit vier Varietäten und 10 Hybriden. 35. Art. Rosa glutinosa. Rosa Cretica mit 2 Hybriden. 36. Art. Rosa canina mit 3 Varietäten. 37. Art. Rosa Collina mit 3 Varietäten und einer Hybride. 38. Art. Rosa rubrifolia mit einer Varietät. 39. Art. Rosa indica fragrans, erſte Abtheilung mit 40 Varietäten, zweite Abtheilung mit 4 Hybriden. 40. Art. Rosa semperflorens. Rosa bengalensis, erſte Abtheilung mit 78 Varietäten, zweite Abtheilung mit 94 Hybriden. 41. Art. Rosa chinensis mit 8 Varietäten. 42. Art. Rosa Lawrenceana mit 10 Varietäten. 43. Art. Rosa Borboniana mit 10 Varietäten und 5 Hybriden. 44. Art. Rosa Noisettiana, erſte Abtheilung mit 41 Varietäten, zweite Abtheilung mit 28 Varietäten, dritte Abtheilung mit 8 Hybriden. 45. Art. Rosa arvensis. Rosa capreolata, mit 6 Varietäten. 46. Art. Rosa sempervirens mit 2 Varietäten und 12 Hybriden. 47. Art. Rosa multiflora mit 6 Varietäten. 48. Art. Rosa Brunonii. Rosa nepalensis mit 2 Varietäten. 49. Art. Rosa Setigera. 50. Art. Rosa moschata mit 3 Va-

rietäten und 2 Hybriden. 51. Art. Rosa trifoliata. 52. Art. Rosa microphylla. 53. Art. Rosa banksiae mit 2 Varietäten. Zuletzt 12 Arten oder Varietäten, deren Stelle noch ungewiß iſt.

Bemerkungen über die Georginen, (Dahlien).

(Von Hrn. J. **Wallner** zu Genf.) (Beſchluß.)

Die Angabe der Cultur der Georginen, vom Hrn. Graf **Lelieur** in dem Memoire sur les Dahlia iſt ſehr genau und vollkommen richtig. Alles was er über die Entartung der Georginen ſagt, iſt ganz wahr, und dieſes Memoire iſt ein herrlicher Wegweiſer bei der Cultur dieſer ſchönen Blume. Nur erlaube ich mir zu bemerken, daß die in dem Königreiche Neapel kultivirten Georginen-Knollen im November ihre Stengel verlieren, und erſt im folgenden Monat März wieder neue treiben. Die Blumen ſind daſelbſt viel kleiner und viel zahlreicher als im Norden, und die Samenkörner ſind viel vorzüglicher und geben eine weit größere Anzahl Pflanzen mit gefüllten Blumen.

Die frühzeitig blühenden Varietäten der Dahlien haben, wie es mir ſcheint, 3 Zeiträume der Blüthezeit: der erſte, im Juni und Juli liefert nur einige einfache oder halbgefüllte Blumen; der zweite, vom Juli bis Sept., giebt die ſchönſten, größten, gefüllteſten Blumen mit den lebhafteſten Farben; im 3ten Zeitraume, vom 15ten Sept. bis zum eintretenden Froſt, liefern die erſchöpften Pflanzen nur ſehr mittelmäßige einfache oder gefüllte Blumen. Man kann dieſe Unannehmlichkeit vermeiden, wenn man im erſten Zeitraume alle mittelmäßigen Blumen abſchneidet, den Pflanzen nicht zu viele Blumen und nur ſehr wenig oder gar keinen Samen tragen läßt; man erhält alsdann für die letzte Blüthezeit die ſchönſten Reſultate.

Die Dahlien mit ſcharlach- und ponceau-rothen Blumen ſind ſehr geneigt, Aeſte und ſelbſt Stämme mit ſämmtlich einfachen Blumen zu treiben. Es iſt in ſolchem Falle durchaus nöthig, dieſe Stengel unterhalb des Halſes (collet) abzuſchneiden; denn ohne dies Verfahren, würde die Pflanze ausarten. Dieſem Umſtande hat man wahrſcheinlich auch die Ausartung der ſchönen engliſchen Dahlie — Georg IV. — beizumeſſen. Ich habe bemerkt, daß wenn man bei entarteten Dahlien die Stengel bis auf die Mitte abkürzt, ſie wieder in ihren vorigen Zuſtand übergehen und wieder ihre gefüllten Blumen bringen. Bei mehrern meiner Handelsfreunde habe ich die ſchönſten Dahlien meiner Sammlung in einem nur mittelmäßigen Zuſtande angetroffen, während bei andern dieſelben Varietäten ihre Schönheit und Vorzüglichkeit erhalten hatten. Ich glaube daß dieſe Unregelmäßigkeit vielleicht in der Cultur, vielleicht in Ueberreſten von ausgearteten Stengeln an den Knollen ihren Grund hat, gewiß iſt es aber, daß dieſe Pflanzen zu gedrängt, oder zu nahe an andern Pflanzen geſtanden haben. Die Dahlie will Luft und Raum; ihre dünnen Wurzeln verbreiten ſich ſtark und verlangen viel Nahrung. Im Jahre 1830 hatte ich aus meinen Samenbeeten eine ſehr ſchöne Dahlie mit **ganz rein himmelblauen Blumen** erhalten. Die Knolle war noch ſehr klein; ſie hatte ſehr ſpät geblüht

und war ſehr zärtlich. Ich glaubte es recht gut zu machen und legte, um dieſe herrliche Spielart zu erhalten, die Knolle in einen mit trocknen Sand gefüllten Topf. Unglücklicherweiſe aber ſtellte man während meiner Abweſenheit den Topf ins Warmhaus nahe an den Heizungskanal, und — die Knolle war vollkommen vertrocknet; ich hatte den Verdruß, dieſe ſchöne Varietät verloren zu haben, die ich ohne Zweifel erhalten haben würde, wenn ſie wie die übrigen aufbewahrt worden wäre, denn ich erhalte die oft nur haſelnußgroßen Knollen meiner Samenbeete den Winter über ohne alle weitere Sorgfalt, als daß ich ſie trocken und froſtfrei aufbewahre.

Ueber die Anzucht hochſtämmiger Roſen.

(Beſchluß.)

Hierbei muß ich bemerken, daß die Veredlung theils durch Copulation, theils durch Pelzen in die Rinde, in den Spalt, und mit dem **Geißfuß** vorgenommen wurde, welches Inſtrument auch bei Veredlung der Kern- und Stein-Obſt-Sorten mit vorzüglichem Nutzen angewandt werden kann. *)

Am beſten gelangen die Veredlungen durch Copulation (wobei meiſtens nur 2 Augen gelaſſen wurden) die aber bei Hochſtämmen nur ſelten angewandt werden kann, dann die, mit dem Geißfuß, weil das Reis wenn es genau in die, mit dem Inſtrument gemachte Oeffnung paßt, ſchnell und ſchön verwächſt und nicht eine ſo gewaltſame Operation, wie das Pelzen in den Spalt veranlaßt, weshalb ſelbſt das Pelzen in die Rinde mehr als letzteres zu empfehlen iſt. Die beiden Roſenſorten Rose Frankfurtensis und Rosa majalis ſind auch in der Hinſicht zu Unterlagen zu empfehlen, weil ſelbige meiſtens ſehr ſchöne ſtarke Wurzeln haben.

Im nächſten Frühjahr werde ich auch Verſuche mit Monats- Thea und Noisette-Roſen machen, wovon ich wie ſchon erwähnt, ſehr ſchöne Sorten vom Herrn Hofgärtner **Wimmer** in **Schlitz** bei **Fulda** erhielt, welchen ich hiermit allen Roſen-Freunden mit ſeiner ſchönen Roſenſammlung und hinſichtlich der billigen Preiſe und der reellſten Bedienung mit den ſchönſten Exemplaren, beſtens empfehlen will.

Ich behalte mir vor, die künftig gemachten Erfahrungen, in dieſen ſchätzbaren Blättern mitzutheilen.

Coburg, im Januar 1833.

Ludwig Donauer.

Herzogl. S. Cobg. Gotha., Fürſtl. Thurn- und Taxiſch. Poſtmeiſter.

Merkwürdige Erſcheinung von gefüllten Bartnelken.

Als ich im vorigen Sommer einen Freund in ſeinem Garten beſuchte, wurde ich durch eine wohl vierzig bis funfzig Fuß lange Rabatte mit gefülltblühenden Bartnelken (*Dianthus barbatus*) überraſcht, und dieß um ſo mehr, als die gefüllten Bartnelken noch unter die Neuigkeiten gehören und ich ſie noch nicht in ſolcher Menge geſehn hatte. Ich muß geſtehen, daß dieſes Beet einen wahrhaft prachtvollen Anblick gewährte. Auf meine Erkundigung, wie mein Freund zu einer ſo großen Menge in ſo prächtigen Farben gefüllter Bartnelken gekommen ſei: indem ich aus denen ſeit mehreren Jahren von gefüllten Samen gewonnenen Pflanzen viele einfache und nur wenig gefüllte gewonnen hätte, wurde mir folgende Erklärung:

---

*) Dem geehrten Herrn Verfaſſer ſagen wir für das uns gefälligſt überſchickte Inſtrument, (Geißfuß), unſern ergebenſten Dank. Wir werden nicht ermangeln, nicht allein die Gartenfreunde hieſiger Gegend damit bekannt zu machen, ſondern auch in einer der nächſten Numern der bei uns erſcheinenden „gemeinützlichen Mittheilungen über Wein-, Obſt- und Gemüſebau ꝛc. eine Abbildung davon geben. Die Redakt.

„Als ich im vorigen Sommer über meine Blumenſamen Muſterung hielt, fand ſich unter Andern auch eine große Portion ſehr alten Bartnelken-Samens; gewiß, daß davon nicht ein Korn mehr aufgehen könnte, ſchüttete ich ſolchen durch das Fenſter meines Gartenhauſes hinaus auf den Fahrweg. Nach einiger Zeit bemerkte mein Gartenarbeiter eine Menge kleiner Bartnelken-Pflanzen am Rande des Fahrweges zwiſchen den Steinen, welche größtentheils durch die Schaafe abgefreſſen worden waren; er ſuchte die beſten Pflanzen heraus u. pflanzte ſie auf die eben leer ſtehende Rabatte; daraus ſind nun dieſe gefüllten Nelken geworden, die ich früher nie geſehn vielweniger beſeſſen habe, und wo alſo eine Verwechſelung mit gefüllten und einfachen Samen nicht hat vorkommen können.“

W...r. M.

Aus der Revue horticole.

Bemerkungen über die Cultur einiger Amaryllis-Arten.

(Von Hrn. Lemon.)

Die Amaryillis reginae iſt ſeit länger als 40 Jahren in Frankreich bekannt; nichtsdeſtoweniger gilt ſie als eine der ſchätzbarſten Amaryllis in jeder Sammlung. Indeſſen iſt ſie noch immer ſelten, da die Liebhaber ſie oft durch zu große Bemühungen bei ihrer Cultur verderben. Dieſe ſchöne Pflanze geht in wenig Jahren in den Warmhäuſern zu Grunde, wo man ſie eigenſinniger Weiſe, ungeachtet ihres Widerwillens gegen die Gerberlohe, die ihr immer ſchädlich iſt, gewöhnlich kultiviren will. Mehrere Liebhaber dieſer Blume haben ſchon die Bemerkung gemacht, daß dieſe Zwiebeln einige Jahre länger dauern, wenn man ſie mit dem Topfe auf die Stellage ſtellt, als wenn man ſie dem Lohbeete anvertraut. Denn dieſe letztern, durch zu große Wärme getrieben, werden gewaltſam zur Vegetation angeregt, d. h. zu einer ihrer Natur nicht eigenthümlichen Vegetation; die Folge davon iſt, daß ſie ſich dadurch weit ſchneller erſchöpfen und früher zu Grunde gehen.

Um dieſe Amaryllis gut zu erhalten, ſie zur Blüthe und ſchnellen Vermehrung zu bringen, muß man ſie zu Ende Septembers an einen ſehr trockenen Platz in das kühle Glas- oder Orangerie-Haus, oder ſelbſt in eine froſtfreie Stube, ſtellen. Man ſetzt die Töpfe dem Lichte ſo nahe wie möglich, und giebt ihnen bis Mitte März durchaus kein Waſſer. Um dieſe Zeit verſetzt man die Pflanze, und zerſtückelt den Erdballen, ohne die Wurzeln dabei zu verletzen. Alsdann verpflanzt man ſie wieder in eine fruchtbare, leichte, gut verweſete Erde. Die beſte hiezu iſt diejenige, welche man aus trockenen Gräben, oder entlang den Mauern, wo Kräuter und andrer Unrath verweſet ſind, ſammelt, und welcher man ein Viertheil gute Gartenerde beimiſcht. Nach dem Verſetzen ſtellt man die Töpfe an einen warmen Ort, entweder auf die Stellage eines mäßig warmen Glashauſes oder in den Vordertheil der Orangerie, wo die Pflanze, wenn ſie übrigens geſund und ſtark genug iſt, gut wächſt und vollkommen blüht.

Gegen die Mitte Mai, zu welcher Zeit die Witterung gewöhnlich doch mild und günſtig bleibt, ſetzt man die Töpfe an die freie Luft an eine warme gegen Norden geſchützte Stelle. Hier wächſt die Pflanze ſchnell, und bringt eine Menge Zwiebelbrut hervor, die bereits im 2ten Jahre ſtark genug iſt, um zu blühen.

Seit 10 Jahren habe ich mehr als 150 Zwiebeln verkauft, die alle von einem einzigen Exemplare ſtammen und auf die eben angegebene Weiſe kultivirt wurden.

Auf gleiche Weiſe und mit gleich günſtigem Erfolge kann man alle Arten Amaryllis mit zweizeiligen Blättern, die ihre Blätter verlieren oder im Winter nicht treiben, kultiviren. Alle dieſe Amaryllis können im Winter im Glashauſe und im Sommer an der freien Luft gehalten werden.

Ungeachtet der beiden kalten und regnigten Sommer in den Jahren 1829 und 1830 haben die Amaryllis reginae und alle Varietäten derſelben in freier Luft vollkommen getrieben und geblüht. Daſſelbe war der Fall mit Amaryllis purpurea, equestris, crocata, pulverulenta, ambigua und aulica.

Neue Cacteen. (Beſchluß.)

Rhipsalis salicornioides. Link.

Wenn dieſe Art auch nicht ſo neu in unſern Sammlungen iſt als Rhipsalis grandiflorus, ſo iſt ſie doch nicht weniger ſeltſam. Sie bildet ein kleines, 1 Fuß hohes, ſtark äſtiges Büſchchen, deſſen Stengel aus eiförmig-länglichen Gelenken, welche, durch kaum fadenſtarke Verengerungen von einander geſchieden, zuſammengeſetzt ſind. Jedes Endgelenk ſchmückt ſich mit 1 bis 7 ſitzenden, gelbröthlichen, ungefähr 8 Zoll breiten Blüthen, welche 2 Eigenthümlichkeiten haben. Die erſte, daß der Kelch, die Blumenkrone und die Staubgefäße unter dem Fruchtknoten befeſtigt ſind, (hypogyne); die zweite, daß der Fruchtknoten keine Samenkörner enthält, daß er immer fortfährt, zu wachſen, und ein neues Gelenk bildet, welches ſich an ſeiner Spitze verdickt und ſich gleich der Pflanze verlängert. Dieſe Erſcheinung kann dem urſprünglichen Zuſtande dieſer Pflanze nicht beigemeſſen werden, ſondern ſcheint ein Produkt der Cultur zu ſein. Es iſt unbedingt dieſelbe Erſcheinung, welche wir bei manchen Roſen beobachten, wenn aus der Mitte der Blüthe ein neuer Zweig emporſteigt, (Roſenkönig), der eine Verlängerung des Blüthenſtiels iſt; denſelben Fall habe ich an einer Craſſanne-Birne in der Topf-Obſtbaumzucht zu Verſailles beobachtet, indem aus der Blume einer Birne ein 1 Fuß langer Zweig, mit Blättern verſehen wie die übrigen Zweige, hervorgetrieben worden war. Dieſe Birne hatte weder Fruchtkammern noch Kerne, ihr Mittelpunkt war holzig und man konnte den Fruchtſtiel nicht wie bei den übrigen im Gelenke auslöſen.

Der Rhipsalis salicornioides hat noch eine merkwürdige Eigenthümlichkeit, die meines Erachtens, eine Folge der erſtern iſt; nehmlich das Zellgewebe dieſer Pflanze enthält ſehr dicke Bläschen, die mit einem gummöſen ſehr zähem Safte angefüllt ſind und zwar in einem bei weitem ſtärkern Grade, als in andern Cactusarten.

Varietäten.

Berlin. In den beiden jüngſten Verſammlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues am 6. Januar und 3. Februar d. J. wurden durch den Direktor deſſelben vorgetragen: eine Abhandlung des Hofgärtner-Aſſiſtenten Herrn **Schwedler** in **Fulda**, über verſchiedene Erfahrungen bei der Roſen-Veredlung; die Mittheilungen des Garten-Conducteurs Herrn **Schoch** in **Wörlitz**, über die

Wichtigkeit eines ſchon früher von dem Herrn Dr. **Buddeus** in **Gotha** angeregten Verfahrens, die Spitzen der Zweige einiger zärtlicheren Baum- und Strauch-Arten durch Behängen mit Schilf oder ähnlichem Material gegen den Froſt zu ſchützen; einen Aufſatz des Oberförſters Herrn **v. Pfuhl** in **Hamm**, über die Erzielung der blauen Blüthe der Hortenſien durch Anwenduug von Buchen-Kohlenmeiler-Erde, oder durch das Begießen mit Waſſer, das einige Tage über Buchen-Kohlen geſtanden; eine andere Mittheilung der Garten-Geſellſchaft in **Braunſchweig** von der Erzielung deſſelben Reſultates durch Anwendug einer Miſchung von ½ Oker-Erde mit ½ Garten-Erde; eine Abhandlung des Inſtituts-Gärtners Herrn **P. L. Bouché** über die Benutzung des dem Narcissus poeticus L. ſehr ähnlichen N. radiiflorus Salisb. zur Blumen-Treiberei, unter Vorzeigung eines im Inſtituts-Garten zu Schöneberg erzogenen Exemplares; einige Bemerkungen des Schullehrers Hrn. **Görner** in **Straupitz** bei Lübben, über die Beförderung des Blühens der Paſſionsblume (Passiflora) und über die Gewinnung des Samens von der weißen Lilie (Lilium candidum) durch Abſchneiden der Blüthenſtengel und Aufhängen derſelben im Zimmer. Durch den Secretair wurde verleſen: die ſehr beachtenswerthen Bemerkungen des hieſigen Kunſt- und Handelsgärtners Herrn **P. Fr. Bouché** über das Beſchneiden der Roſen, mit beſonderer Berückſichtigung der ſtrauchartigen derſelben.

(**Wien**, 29. Januar 1833.) In den Gewächshäuſern des k. k. Hofgartens zu Schönbrunn blühen jetzt folgende Gewächſe:

Aloë principis. (Haworth.) Vom Vorgeb. d. g. Hoffnung. Hemerocallideae. Hexandria, Monogynia.
Ardisia coriacea. (Swarts.) Aus Weſtindien. Myrsineae. Pentandria, Monogynia.
Crevillea rosmarinifolia. (R. Brown.) Aus Neuholland. Proteaceae. Tetrandria, Monogynia.
Lobelia surinamensis: (L.) Aus Surinam. Lobeliaceae. Pentandria, Monogynia.
Massonia cordata. (Jacquin.) Vom Vorgeb. d. g. Hoffnung. Asphodeleae. Hexandria, Monogynia.
Neja gracilis. (Don.) Aus Mexiko. Compositae. Syngenesia, Superflus.
Thea chinensis. (L.) Aus China. Theaceae. Polyandria, Monogynia.

Bibliographiſche Notiz über Blumiſtik.

J. E. v. Reider, Annalen der Blumiſterei oder Beſchreibung ſeltener und neuer vorzüglicher Blumen und Ziergewächſe ſammt deren Cultur- und Vermehrungsmethoden, für Gartenbeſitzer, Kunſtgärtner, Samenhändler und Blumenfreunde. In Verbindung mit mehrern Blumenfreunden und Kunſtgärtnern herausgegeben. 7ter **und** 8ter **Band**. 1831 und 1832. Jeder Band in 4 Heften mit 24 nach der Natur gezeichneten und fein illuminirten Kupfertafeln. Nürnberg und Leipzig. Verlag der Zeh'ſchen Buchhandlung. Cart. 8.

Dieſes höchſt ſchätzbare blumiſtiſche Werk bewährt auch in den erſchienenen beiden letzten Bänden den ſchon mehrmals in dieſen Blättern gerühmten Werth. Es iſt unbedingt das wohlfeilſte und vollſtändigſte, was in dieſer Art in Deutſchland exiſtirt; die abgehandelten Blumen- und Zierpflanzen ſind meiſtentheils neu, die angegebenen Culturmethoden zweckgemäß, die Abbildungen treu, ſehr ſauber und fein colorirt.

Der 7te **Band** enthält die Abbildungen von: Amaryllis hemerocalliflora, Calceolaria corymbosa, Camellia atrorubens v. coccinea, Cerbera fruticosa, Crassula hybrida, Rosa centifol. cristata, Camell. splendens, Elichrys. atropurp., E. humile, Fuchsia gracilis, Oenothera Lindleyana, Rhododendron azaleoides alb. odorat., Saracenia purpur., Azalea lutea rubicanda, Crotalaria purpur., Glycine coccin., Polygala latifol., Rhododendr. pont. fol. varieg., Ros. thea belladonna, Amaryll. specios. purp., Calceolaria arachnoid, Chelone specios., Gentiana Catesbaei, Ixora Banducca, Verbena coccinea.

Der 8te **Band** enthält: Georgina speciosissima lilacina albicans, Lupinus polyphill., Metrosideros semperflor., Paeonia chinensis odorata, Potentilla formosa, Volkameria coccinea, Anthemis artemisiaefol. (die flammigröhrige), Hibiscus rosa sinensis fl. purp., Polygala Heisteria, Ros. thea lilacina, Ros. de. Bourbon, Verbena pulchella, Amaryllis sarniensis, Azalea indica phoenicea, Daviesia longifol., Fuchsia arborescens, Houstonia coerulea, Watsonia fulgens, Camellia aucubaefol., Nerium spectabile, Pelargon. Lommel, Primula veris fulgens, Stenanthera pinifol. und Zinnia elegans coccinea.

Der Verf. beabſichtigt, den im Jahre 1833 herauszugeben den 9ten Band unter dem Titel „Neue Annalen der Blumiſterei" erſcheinen zu laſſen, um Blumen- und Gartenfreunden, welche die erſchienenen 8 Bände nicht nachkaufen und auch nicht gern ein incompletes Werk beſitzen wollen, eine neue Gelegenheit zum Ankauf dieſes blumiſtiſchen Werks zu geben.

(**Pflanzentauſch-Anerbieten.**) Ein in dieſen Blättern Jahrgang 1831 Nr. 18 gemachtes Anerbieten, welches nicht ohne Theilnahme geblieben iſt, wird andurch nachſtehend wiederholt. Tauſchweiſe können überlaſſen werden:

1. Ausdauernde Sträucher und Gehölze zu Gartenanlagen:

Amorpha fruticosa. — Hybiscus syriacus. — Prunus mahaleb. — Liriodendron tulipifera. — Rhus cotinus. — R. typhinum. — R. glabra. — R. radicans. — Spiraea opulifolia. — S. chamaedrifolia. — S. sorbifolia. — S. tomentosa. — S. salicifolia carnea. — Symphoricarpos vulgaris. — Cytisus laburnum. — C. capitatus. — C. nigricans. — Bignonia catalpa. — Ribes aureum. — Robinia caragana. — Crataegus fl. albo pleno. — C. fl. rubro pleno. — Castanea vesca. —

2. Obſt-Orangerie oder Zwerg-Obſt-Stämmchen in Töpfen; ſämmtlich Copulanten auf, dem Zweck entſprechenden Unterlagen. Benennung nach Sickler.

a. **Aepfel.** Geſtreifte Sommer-Parmaine. — Wahre weiße Herbſt-Reinette. — Kentiſcher Täubling. — Rother Tauben-Apfel. — Kleiner Apf. — Goldgelber Herbſt-Strichling. — Himbeer-Apfel. — Geſtreifter Herbſt-Calville. — Winter-Citron-Apfel. — Sommer-Citron-Apfel. — Van Mons Gold-Reinette. — Gasdonker Gold-Reinette. — Großer Naſtauer. — Baumanns rothe Winter-Reinette. — Pfund-Apfel. — Lothringer Sommer-Rambour. — Weißer Sommer-Calville. — Band-Apfel. —

b. **Birnen.** Späte große Sommer-Blanquette. — Gerdeſtens weiße Butter-Birn. — 2mal blühende, 2mal tragende. — Die Saracin. —

c. **Pflaumen.** Große Reine-Claude. — Gelbes Rebhühner-Ei. — Glühende Kohle. — Lange Hungariſche. — Kirſch-Pflaume.

d. **Kirſchen.** Engliſche Weichſel. — Spaniſche Weichſel. — Loth-Kirſche. — Frühe Mai-Kirſche. — Mit gefüllter Bluthe. — Kurzſtielige Amarelle. — Große ſchwarze Morelle. —

3. Rhododendron ponticum, 2 Ellen Leipziger Maas Höhe. — Nelkenſenker, Sortiments-Blumen mit Namen und Charakteriſtik. — Metrosideros verſchiedene Arten. — Pflanzlinge von Cobea scandens. — Dergl. von Passiflora racemosa — Rosa noissettana verſchiedene Arten.

Dagegen würden willkommen ſein:

Großblumige und neue Pelargonien. — Cactus verſchiedene Sorten. — Nelkenſenker, ingleichen Sortiments-Blumen mit Namen und Charakteriſtik. — Camellien, verſchiedene Sorten. — Georginen-Knollen. — Hyacinthen-Zwiebeln. — Sonſtige Glashauspflanzen.

Greiz im Voigtlande, den 6. Februar 1833.

Der Kammerrath von Grün.

(**Anzeige für Blumen- und Gartenfreunde.**) Indem ich hiermit anzeige, daß mein neues, aus 900 Numern und Sortimenten beſtehendes Samen-Verzeichniß zum Ausgeben bereit liegt, mache ich zugleich ſowohl auf die darinne aufgeführten **ganz neuen Prachtgewächſe**, als auch ganz vorzüglich auf den von mir ſorgfältigſt gezogenen **Levkojenſamen** von den ſchönſten, und mindeſtens **vierfünftel Gefüllte** gebenden Sorten, aufmerkſam.

Langenſalza, den 23. Februar 1833.

K. W. Marburg.

---

*) Blumenfreunde hieſiger Umgegend können auch bei der Redaction der Blumenzeitung obiges Verzeichniß unentgeltlich erhalten.

Die Herren **J. H. Booth** und Comp. in **Hamburg** haben uns eine Anzahl ihrer neueſten Preis-Verzeichniſſe (gultig bis Auguſt 1833) zum Vertheilen an Blumenfreunde überſendet. Diejenigen nun, welche von dieſem reichhaltigen Verzeichniſſe Gebrauch machen wollen, mogen ſich deshalb gefälligſt an uns wenden und der ſofortigen unentgeltlichen Einſendung deſſelben vergewiſſert ſein.

Die Redact. der Blumenztg.

(Hierbei eine Beilage, „Ankündigung Weimariſche Gartenbau-Verhandlungen" betreff.)

Ankündigung und Subſcriptions-Anzeige.

Weimariſche Gartenbau-Verhandlungen ꝛc.

Herausgegeben und verlegt von **Friedrich Häßler**, Redacteur der Blumenzeitung ꝛc. in **Weißenſee**.

Neben der bei mir erſcheinenden „Blumenzeitung" und den „gemeinnützlichen Mittheilungen über Obſt-, Wein- und Gemüſebau, Bienenkunde, Haus- und Feldwirthſchaft" wird vom Jahre 1833 ab bei mir noch erſcheinen:

Weimariſche Gartenbau-Verhandlungen,
oder
monatliche Berichte und Mittheilungen
aus
dem Verein für Blumiſtik und Gartenbau in Weimar.

Nach Maaßgabe des ſtatutenmäßigen Zweckes dieſes Vereins, deſſen Beſtrebungen und Leiſtungen ſchon vielſeitiges Anerkenntniß gefunden haben: Erziehung von Blumen und Acclimatiſirung ausländiſcher Gewächſe; Anbau von Gemüſen und Handelskräutern, ſo wie Gewinnung guter Sämereien von beiden; Obſtkultur und Weinbau; werden auch dieſe „Gartenbau-Verhandlungen oder monatlichen Berichte und Mittheilungen" ꝛc. auf alle genannten Zweige ſeiner Thätigkeit im weiteſten Umfange ſich erſtrecken.

Sie werden enthalten nicht nur alles Neue und Nützliche, was durch die eigene Thätigkeit des Vereins, Beobachtungen, Verſuche und Erfahrungen gefördert und gewonnen worden iſt oder noch gefördert und gewonnen werden ſoll, in Beſchreibungen und Abhandlungen, Vorſchlägen, Anfragen und Aufgaben ſowohl als Notizen von allen ſonſtigen intereſſanten Gegenſtänden ſeiner Verhandlungen und ſeiner Wirkſamkeit; ſondern auch Nachrichten von wichtigen, nützlichen und lehrreichen Erſcheinungen im Gebiete der Blumiſtik und des Gartenbaues überhaupt, namentlich: von neuentdeckten Pflanzen und Veredelung ſchon bekannter, von neuen oder verbeſſerten Werkzeugen und Maſchinen, von neuem oder verbeſſertem Kulturverfahren, von verbeſſerter oder erweiterter Benutzung der Erzeugniſſe u. ſ. w. beſonders mit Benutzung ausländiſcher Literatur.

Von vorzüglich intereſſanten Gegenſtänden, neuen Pflanzen, Obſt- und Weinſorten, Maſchinen u. ſ. w. werden treue Abbildungen in Kupferdruck, und zwar die von Pflanzen, Obſt- und Weinſorten ſauber colorirt, beigegeben werden.

Von dieſen „Gartenbau-Verhandlungen oder monatlichen Berichten und Mittheilungen“ ꝛc. wird monatlich ein halber Bogen und zu je 3 Monatslieferungen ein Kupfer in groß Quartformat erſcheinen für den jährlichen Pränumerationspreis von 1 Rthlr preuß. Cour. einſchließlich der Kupfer und 15 Sgr (12 ggr.) ohne dieſelben, am Verlagsorte.

Obſchon nach Maaßgabe der intellektuellen und materiellen Mittel, welche der Verein in ſich findet und die ihm ſonſt zur Benutzung gegeben ſind, die angekündigten Gartenbau-Verhandlungen“ für jeden Freund und Beförderer der Blumiſtik und des Gartenbaues eine werthvolle Erſcheinung ſein werden und namentlich alle Leſer der Blumenzeitung dieſelben nicht werden entbehren wollen, ſo ſtehet es doch den verehrlichen Pränumeranten auf die Blumenzeitung frei, dieſe fernerhin ohne die „Gartenbau-Verhandlungen“ zu beziehen, und ebenſo können die letztern ohne die Blumenzeitung bezogen werden; wie nicht minder auch die Pränumeration auf die „Gartenbau-Verhandlungen“ mit oder ohne Kupfer geſchehen kann.

Die hiernach zu bewirkenden Erklärungen und Beſtellungen, die ich mir recht bald erbitte, beſonders damit die erforderliche Anzahl der Kupferabdrücke ohngefähr berechnet werden kann, können, wie bei der Blumenzeitung, bei allen Poſtämtern und Zeitungs-Expeditionen gemacht werden; die Verſendung der Blätter durch die Poſt erfolgt durch das Königl. Wohllöbl. Poſtamt zu Weißenſee.

Für den Buchhandel hat Hr. Hofbuchhändler Eupel in Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Weißenſee, im Februar 1833.

Friedrich Häßler.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto-Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 9 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in vortäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. V. Weißenſee, (in Thüringen). März 1833. VI. Jahrg.

Neue Roſen.

Mit welchen Rieſenſchritten die Cultur aller Roſen, namentlich der semperflorens fortſchreitet, beweiſen die jährlich erſcheinenden Cataloge der franzöſiſchen Handelsgärtner. Ihnen haben wir aber auch die meiſten Varietäten darin zu verdanken, und es iſt nicht zu läugnen, daß ſich einige derſelben außerordentliche Mühe geben, durch künſtliche Befruchtung neue Sorten zu gewinnen. Dies iſt den Cultivateurs beſonders in den letzten drei Jahren außerordentlich gelungen, denn es ſind jetzt in den Monatsroſen ſowohl als auch in den Noiſett- und Theeroſen Schönheiten vorhanden, die man nie geahndet hätte und die zur größten Bewunderung hinreißen.

Sehr zu bedauern iſt nur dabei, daß keine Einheit hinſichtlich der Benennungen ſtatt findet, und die Verwirrung darin jährlich immer mehr zunehmen wird; es iſt nicht ſelten, daß man ein und dieſelbe Sorte unter fünf verſchiedenen Namen erhält, und ich führe nur als Beiſpiel die Rosa Noisette von der Inſel Bourbon an, die ich zuerſt unter dieſem Namen erhielt, aus der nämlichen Roſenſammlung bekam ich ſie als Rosa Dubreuil von der Inſel Bourbon, ferner aus eben derſelben als indica purp. odoratissima, und erſt nach 2 Jahren wurde mir die Gewißheit, daß dieſe 3 Roſen ein und dieſelbe Sorte ſind. In dieſem Jahre erhielt ich R. Neumannii und ſpäter R. suaveolens, zwei Sorten, die ſich wiederum als jene von der Inſel Bourbon darſtellten; mit manchen Anderen ging es nicht beſſer, u. ich habe auf dieſe Weiſe mehr als 50 Thaler ausgegeben, ohne eine neue Sorte dafür gewonnen zu haben.

Ein blumiſtiſcher Verein, der die Mittel zur Anſchaffung aller Roſen beſäße, würde ſich ein wahres bleibendes Verdienſt bei allen Freunden dieſer herrlichen Blume, und deren ſind nicht wenige, erwerben, wenn durch ſorgfältige Cultur aller Roſen eine möglichſt genaue Claſſification und vor allen Dingen eine ſorgfältige Characteriſtik entworfen würde. Die Koſten eines ſolchen Unternehmens, zwar anfänglich bedeutend, würden bei einer Central-Roſenſchule durch den Verkauf der Vermehrung nicht nur gedeckt werden, ſondern noch ein reichlicher Gewinn zu hoffen ſein, und dadurch vieles Geld, was jetzt in fremde Länder geht, für Deutſchland erhalten werden, jedoch nur durch die Cultur und Bearbeitung dieſer einzigen Blume von ſachverſtändigen Blumiſten ließe ſich etwas Ausgezeichnetes erwarten, denn alle früher erſchienenen und noch erſcheinenden Schriften über dieſen Gegenſtand genügen nicht, da ſie durch das raſche Fortſchreiten in Erzielung neuer Sorten kaum für den Augenblick des Erſcheinens ausreichen, und den Roſenfreunden das Gehoffte nicht mehr leiſten. Gern werde ich, ſollte ein ſolches Unternehmen zu Stande kommen, meinen Beiſtand darbieten und meine gemachten Erfahrungen mittheilen.

Zu den vorzüglichſten Schönheiten unter den Semperflorens oder ſogenannten Monats-Roſen gehören: Admiral de Rigny, anemone cramoisi, Bardon, Bisson d'Agers, camellia flora, camelia rosa, Corniculata alba, Darius, der Aetna, der Veſuv, die prächtige Dubreuil von der Inſel Bourbon, Felix, Fabvier, Gloire d'Auteuil, l'herméte de Soigne, Jaquin le grand Hercule, l'Erémit d'Angers, Navarin, Nicetas, Olymp, Turenne.

Unter den Noiſetten: Aime de Vibert, Charles X, Corali, Cupido, Delphine, der Schneeball, Isabelle d'Orleans, Lafavette, Lée, Loddiges, Noisette mit herabhängenden Blumenblättern, Philemon, Prinzesse d'Orange, die Prolifirende, die Rankende, La vièrge, Woods.

Unter den Thee-Roſen: Belladonna, der Schneeball, Campsée, Catharina II., Diane de Bollwiller, die Lillafarbige, die Nymphe, Egine, Elvire, Flavescens, Framma Clamma?, Hyemenée, Maria Stuart, Narzisse unique blanche, von der Inſel Bourbon, Strombio vera.

Unter denen in dieſem Herbſt aus Bollwiller erhaltenen Roſen ſoll ſich die Thea Triomphe de Bollwiller am meiſten auszeichnen, und alle anderen Thee-Roſen an Pracht überſtrahlen, ich zahlte für zwei Exemplare noch 30 Frcs. Aus Auteuil bei Paris erhielt ich 135 neue Sorten, worunter R. Thea Comtesse Albemarle 20 Frcs. Lutescens mutabilis 15 Frcs., R. Banse 12 Frcs., R. à odeur de muscate 10 Fr., für R. Noisette Desprez, (eine kupfrig-gelbe Noiſett-Roſe, die prächtig ſein ſoll,) mußte ich für ein im verfloſſenen Herbſt eingeſetztes noch ſchlafendes Auge 30 Fr. zahlen, Rosa Noisette Apollonia Laffay 20 Fr., Rosa Véléda von der Inſel Bourbon 25 Fr. und viele andere von 5 bis 10 Fr.

Aus Lüttich empfing ich circa 50 neue Sorten, unter denen ſich R. semp. fl. Philippe I. für 6 Fr., R. rêve du bonheur für 12 Fr., R. noisette Pyramidale für 15 Fr., R. noisette lutescens pleine superba für 8 Fr., R. thé bracteata Maria Leonida für 8 Fr. beſonders auszeichnen ſollen. Und doch giebt es Blumenliebhaber, die mir für dergleichen Exemplare 4 gr. bieten, und meine Sammlung zwar einzig ſchön aber doch koſtbar finden! Für nächſtes Jahr ſehe ich nun wiederum einem Flor von 150 neuer angeſchaffter Sorten Topfroſen entgegen, und behalte mir vor, das Ausgezeichneteſte davon in dieſen Blättern zu ſchildern.

Erfurt, im Januar 1833.

Friedr. Ad. Haage jun.

Einige Bemerkungen über Lupinus Cruikschankii, mutabilis und Termis.

(Von dem Herzogl. Hofgärtner Hrn. Richter aus Louiſium bei Deſſau.)

Im 21. Stück der Blumenzeitung des vorigen Jahrganges, ſagt Herr Hofgärtner Boſſe in Oldenburg bei Beſchreibung des Lupinus Cruikschankii, daß derſelbe gewiß mit Lupinus mutabilis einerlei ſei. Ich möchte aber darin nicht ganz mit einſtimmen. Auch ich bekam beide Lupinus-Arten aus dem botaniſchen Garten zu Neuſchöneberg bei Berlin, und cultivirte ſie im vergangnen Jahre, fand aber hier bei mir einen Unterſchied zwiſchen beiden. Lup. Cruikschankii, wovon ich mehrere Exemplare erzog, ſtimmte mit der Beſchreibung, die Hr. Boſſe in der Blumenzeitung davon gibt, ganz überein. Die Pflanzen blüheten prachtvoll, und ich bekam auch eine ziemliche Zahl reifer Körner. Lup. mutabilis aber, wovon ich nur 2 Exempare erzog, war bei mir in der Blüthe verſchieden; denn dieſelbe war ganz weiß, u. nur das Fähnchen war anfangs am Grunde etwas gelb. Nach u. nach, jemehr die Blumen dem Verblühen ſich hinneigten, wurden ſie aber mehr lilla und zuletzt blaß, röthlich-violett, was noch auffallender erſchien, als bei L. Cruikschankii. Auch blühete dieſe Pflanze bei ganz gleicher Cultur viel ſpäter, und breitete ſich nicht ſo aus; ich bekam daher auch keinen reifen Samen, hauptſächlich, da die zeitigen Nachtfröſte zu heftig waren, und die Samenkapſeln zerſtörten. Ich pflanzte daher ein Exemplar dieſes L. mutabilis in einen Topf, und habe es den Winter über im Orangeriehauſe gehalten, wo es zwar ſehr zurückgegangen iſt, aber hoffentlich bei herannahendem Frühjahre wieder austreiben wird. Auch mit L. Termis habe ich den Verſuch des Durchwinterns gemacht, da dieſe Art bei mir im vergangenen Jahre nicht einmal zur Blüthe kam. Ueberhaupt iſt ein ſchwerer kalter Boden, wie meiſtens in meinem Garten vorherrſchend iſt, ſehr wenig zur Cultur der beſſern Lupinus-Arten geeignet, beſonders wenn die Sommer kalt oder feucht ſind, wie die letztvergangnen Jahre. Ich habe daher, um die Pflanzen früher zum Blühen und Samentragen zu bringen, den Verſuch gemacht, die Pflanzen im Spätſommer aus Samen zu ziehen, und ſie noch jung im Orangeriehauſe zu durchwintern, was dieſelben jedenfalls ſehr vorwärts helfen muß, indem ſie dann gleich mit Anfang des Sommers zum Blühen kommen müſſen. —

Einiges über Acclimatiſirung und Behandlung der Heideerdepflanzen. (Fortſetzung.)

(Eingeſandt vom Hrn. Freiherrn von Pfeffenrath, Herzog. Sächſ. Kammerherrn zu Saalfeld.)

Auf dieſe Art in großen Maſſen angewendet, erhält ſie ſich ſehr gut, und wenn die Gruben gegen ſtehende Feuchtigkeit geſchützt, und nördlich gelegen ſind, ſo gedeihen alle Heideerdepflanzen ſehr gut darinne. Zur Topfpflanzenzucht taugt dieſe Erde aber nichts, denn ſie zerſetzt ſich ſchnell, verbirgt und ernährt eine Menge Gewürm, und ihre durch das häufige Begießen zerſtörten und zerſchlemmten Theilchen bilden eine feſte harte Maſſe, welche für die feinen Haarwurzeln undurchdringlich wird, beſonders den guten Eriken ſelbſt. Um dieſe Zerſetzung und Verdichtung ſo viel als möglich zu verhindern, miſcht man Lauberde darunter; man muß dieſe Erde zerſchlagen. Auf die Oberfläche der Grube ſtreut man einige Zoll hoch feine Erde, um die Haarwurzeln zu bedecken. Will man eine Saat machen, ſo muß die Erde durchgeſiebt werden.

Man hebt die Heideerde von ihrem urſprünglichen Grundboden in Schichten mit einer Schaufel ab und hackt ſie dann in kleine Stücke. Die Pflanzenerzieher welche ſie im Großen anwenden, laſſen ſie mehrere Monate in großen Haufen liegen (wodurch ſie beſſer verweſt). Denn nur dadurch wird ſie der Cultur der feinwurzlichen Pflanzen erſt recht zweckdienlich: z. B. den jungen Pflanzen aus Auſtralien, die in einem tiefen lockeren Humus ihrer Urwälder wachſen; ferner für die Sämerei harziger Holzarten; dann für Rhododendron, Betula etc., auch zur Zucht derjenigen zarten Gemüſe, von denen man die Schößlinge verſpeiſt, z. B. vom Spargel, Hopfen ꝛc. würde ſie von großem Nutzen ſein, wenn ſie nicht ſo ſelten zu bekommen wäre.

Die täglichen Bereicherungen der Botanik und die Verbreitung der exotiſchen Pflanzencultur laſſen hoffen, daß die Benutzung der Heideerde einſt ein einträglicher Handelsartikel für diejenigen armen Orte werden kann, wo viel Heide vorkommt. Sie wird ihre Wüſten verlaſſen, um unſre Gärten zu befruchten; man wird ſie auf den Flüſſen und Canälen wie die Lohe, Steinkohlen und den Torf den großen Handelsplätzen zuſchiffen ſehen. Jeder Grundeigenthümer wird ſeinen Kindern ein ſchönes Erbtheil hinterlaſſen, wenn er von der Oberfläche eines unfruchtbaren Grundſtückes einige Zoll dieſer Erde zu Markte ſchickt, verſteht ſich in großen Quantitäten, und auf den friſch abgezogenen Boden Saaten von Bäumen und Sträuchern aus der Familie der Coniferen, Leguminosen und Amentaceen ſtreut: wodurch er einſt reiche Wälder an der Stelle dürrer Heide erzielt.

(Fortſetzung folgt.)

Beſchreibung und Cultur einiger noch nicht allgemein bekannten und einiger neuen Zierpflanzen.

Mitgetheilt von Hrn. J. W. Boſſe, Herzogl. Oldenburgiſchem Hofgärtner zu Oldenburg. (Fortſetzung.)

18) Calceolaria floribunda Humb. Blüthenreiche Pantoffelblume, aus Quito. Sie wird wenig über 1' hoch, iſt äſtig, und an allen grünen Theilen mit kurzen, klebrigen Drüſenhärchen bekleidet. Die Blätter umfaſſen mit der Baſis den Stengel, ſind entgegengeſetzt, grün und zugeſpitzt; die unterſten ſind länglich, am Grunde geſchmälert, ſägezähnig, die mittlern eiförmig, ebenfalls ſägezähnig, die obern herzeirund, kaum gezähnt, theils ganzrandig. Die zahlreichen, zierlichen Blumen ſind gelb, taſchenförmig, mit flach eingedrückter, rund um die Oberlippe hervorſtehender Unterlippe verſehen, und bilden 2theilige Endrispen. — Man kann ſie als ein Sommergewächs behandeln, und den feinen Samen jährlich im März in dem Topf in feingeſiebte Lauberde ausſäen, und in ein warmes Miſtbeet ſtellen, ſpäterhin die jungen Pflanzen theils in Töpfe ſetzen, anfangs warm unter Glas halten, dann aber in's offene Glashaus, in's Zimmer oder auf ein Geſtell in's Freie ſtellen, theils dieſelben zu Ende des Maies oder Anfangs Juni auf eine warme Rabatte ins Freie oder früher ſchon auf ein kühles Miſt- oder Laubbeet verpflanzen. (Fortſetzung folgt.)

Einige erläuternde Bemerkungen über die gefüllten Dahlien oder Georginen, mit Angabe der Mittel zur Erlangung neuer ſeltener Varietäten und eine unmaßgebliche Eintheilung derſelben.

(Mitgetheilt von Hrn. Chr. Dregen aus Koſtnitz.)

Dieſe, mit allem Reiz an Farben- und Formenſchönheit ausgeſtattete Blume, auf einem majeſtätiſchen, ſchön grünbelaubten Strauch, meiſt reichlich und regelmäßig vertheilt, in anmuthiger Höhe blühend, hat bisher gewiß bei jeglichem Blumenfreund das lebhafteſte Intereſſe erregt und wer nur einigen Platz für ſie in ſeinem Garten hat, ſucht ſie zu erhalten um ſich ſeine Gartenfreuden durch ihren trefflichen Schmuck und lieblichen feenartigen Zauber zu erhöhen.

Ich erhielt im Frühjahr 1824 die erſten gefüllten Georginen durch Freundes Hand in den damals bekannten ſchönſten Sorten. Mich erfreute ihre Flor unbeſchreiblich und die Mannigfaltigkeit in Farben und Formen der Blumen, ja in allen ihren Theilen, im Laube, Stengel in der Wurzel, ließ im Verfolg ihrer Cultur eine unerſchöpfliche Veränderlichkeit wahrnehmen; der ähnlich, wie ſie die Topfnelke, deren Cultur mir nicht fremd war, gegeben.

Der Erlangung neuer Farben und Formen, widmete ich meine ganze Aufmerkſamkeit, ich unternahm mancherlei Verſuche in Miſchungen der Erde, Veränderungen des Standorts in Bezug nach oben und der Erdart, und außer ſolchen mit dem beſten Erfolg:

1) die ſogenannte künſtliche Befruchtung durch Uebertragung des Samenſtaubes aus der einen Blume auf das Piſtill einer anders gefärbten, der Farbe nach jedoch verwandten Blume des eigens dazu erwählten Mutterſtockes,
2) copuliren und Pfropfen auf Wurzel und Zweige in Farben und Formen einander fremder Sorten,
3) zulaſſen des reinen Sonnenlichtes oder Schutz dagegen,
4) ſich ſelbſt überlaſſner natürlicher Befruchtung wird hier mit erwähnt, weil zu Erforſchung der Reſultate, zu natürlicher und künſtlicher Befruchtung gleiche Mutterſtöcke, in gehöriger Anzahl, erwählt wurden.

Die Erfahrung lehrte nämlich: daß die Farben der Georginen eine Wahlverwandtſchaft zeigen, indem ſie ſich anziehen u. abſtoßen bei der künſtlichen Befruchtung; es mußten deshalb paßende Mutterſtöcke erwählt u. dieſen nur verwandtliche Farben zugeführt werden, um eines Erfolges ſicher zu ſein. (Fortſ. folgt).

Bemerkungen über die Behandlung der Orangerie in Töpfen. (Fortſetzung.)

(Vom Hrn. Hofgärtner J. Moos zu Weimar).

Zur Anzucht junger Orangenbäumchen aus Samen nimmt man am liebſten die Kerne von bittern Pommeranzen, dieſe legt man im März in mehr breite als tiefe Töpfe etwa einen Zoll im □ auseinander; beſitzt man ein Miſtbeet, wo die Töpfe eingeſetzt werden können, ſo iſt dieß der beßte Platz; in Ermangelung deſſen ſetzt man ſie im Zimmer an ein Fenſter wo ſie volle Sonne haben. Gegen das Ende Mai können die jungen Pflänzchen an einen warmen Ort ins Freie geſtellt werden.

Im nächſten Frühjahre ſind dieſelben in kleine Töpfchen zu pflanzen und, bis ſolche angewachſen ſind, ſo warm als möglich zu halten. Bei guter Behandlung werden ſie nun im darauf folgenden Jahre zum Oculiren ſtark genug ſein, wo ſie im Monat Auguſt ins ſchlafende Auge oculirt werden.

Im Sommer lieben die Orangen einen warmen ſonnigen Standort, wo man es ihnen aber nicht an Feuchtigkeit darf fehlen laſſen, beſonders in der Zeit wo ſie treiben; gegen den Herbſt gießt man ſparſamer und den Winter hindurch mit aller Vorſicht; jedoch darf man ſie auch im Winter niemals ſtaubtrokken werden laſſen, wodurch ſie, wenn ſie nun wieder Waſſer erhalten, gewöhnlich die Blätter abwerfen.

Das Waſſer womit man gießt, muß im Winter mehrere Tage in dem Durchwinterungslocale und im Sommer an der Sonne geſtanden haben, auch muß dieß Fluß- oder Regenwaſſer ſein. (Fortſ. folgt.)

Syſtematiſche Namen der merkwürdigſten Pflanzen Gattungen und Arten, ihr Genitiv ꝛc.

Mitgetheilt von L. aus T. (Fortſetzung.)

Alcĕa (Malva) L. ae. foem. Siegmannswurz, Siegmarwurz oder Siegmannskraut, Siegmarkraut.

'Αλκέα (Theophr. I. 5 und 14; Plin. XIX. 4) von 'αλκε, Arzneimittel, daher falſch Alcaea. Dem allgemeinen Aberglauben zu Folge ſollte ſie feſt und unverletzlich machen und den Sieg verſchaffen, wovon obige deutſche Benennungen herrühren, denn Siegmann oder Siegmar bedeutete ehedem einen Sieger.

Alchemilla. L. ae. foem. Sinau, Frauenmantel, Marienmantel, Löwenfuß, Alchemiſtenkraut.

Das Diminutivum von Alchymia (von χυμεια und dieß aus dem arabiſchen âlkêmelych, die Kunſt, die verborgenen Eigenſchaften der Metalle kennen zu lernen) die Alchymie, die Ausartung der Scheidekunſt in Goldmacherei. Mit der A. vulgaris L. machten ſich die Alchymiſten viel zu ſchaffen. Sie gaben ihr den Namen Coagulum mercurii und glaubten, mercurium oder nach ihrer Sprache, den latronem fugitivum, servum ambulantem etc. mittelſt derſelben coaguliren zu können, allein, ſtatt zu gewinnen, brachten ſie dabei das Gold zum Opfer, was ſie darauf verwendet hatten — Bona dilapidant omnia pro lapide!

Da auf den Blättern der Thau auch im Sonnenſchein ſtehen bleibt, ſo vermuthet Adelung, daß der Name Sinau von Sonne und Au (Aa, Waſſer) herrühre. Die übrigen deutſchen Benennungen ſind von der Form der Blätter hergenommen. (Fortſ. folgt.)

Aus der Revue horticole.

Ueber die Erziehung der Ranunkeln aus Samen.

Nachdem Hr. Tyſo mehrere Jahre lang ohne glücklichen Erfolg Samen von halbgefüllten Ranunkeln ausgeſäet hatte, kam er auf den Gedanken, ob, wenn er einige gefüllte Blumen künſtlich befruchtete, vielleicht günſtigere Reſultate hervorgehen würden. Demzufolge befruchtete er die unvollkommen ausgebildeten Narben einer beſtimmten Anzahl gefüllter Blumen mit dem Samenſtaube von einfachen und halbgefüllten. Bald nachher ſah er mehrere Fruchtknoten ſich entwikkeln, ja bei den Varietäten: Arbrisseau, Grand Monarque, Horatio, Rose incomparable, la Tendresse und mehrern andern wuchſen ſie einen Zoll lang. Die ſorgfältig eingeſammelten reifen Samen zeigten ſich fruchtbar; aus ihnen kam eine hübſche Anzahl junger Pflanzen hervor, die im folgenden Jahre ausgezeichnete Blumen lieferten und zwar beſonders bemerkenswerth durch die Aehnlichkeit die ſie mit der Mutterpflanze zeigten. Die aus dem Samen von Naxara, Viola, la vraie noire etc. entſtandenen blühten ſchwarz. Die aus Samen von den Varietäten: Arbrissoau, Grand Monarque und Horatio hervorgegangenen hatten gefleckte und gelbeingefaßte Blumen. Mehrere dieſer Baſtarde waren viel ſchöner als die Mutterpflanze und wurden an verſchiedene Liebhaber für 3 bis 5 Guineen verkauft.

Varietäten.

Berlin. In der 117ten Verſammlung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuß Staaten am 3. März c. referirte Herr Prof. v. Schlechtendal einige intereſſante Auszüge aus den neuern Heften von Loudons Gard. Mag. und aus den Annales de la société d'horticulture de Paris über die Anwendung des ammoniakaliſchen Waſſers, welches bei der Steinkohlen-Gas-Bereitung gewonnen wird, zur Vertilgung von Inſekten und Würmern in den Gewächshäuſern. Nachricht von einer bei Petersburg mit gutem Erfolge angewendeten Methode, ein Warmhaus durch die Ausdünſtung von Vieh zu erwärmen. — Einen Vorſchlag, jede Feuerung zur Erwärmung von andern Räumen, ſo auch von Gewächs-Häuſern zu benutzen; über die Anwendung des gegoſſenen und geſchmiedeten Eiſens zu Blumenſtöcken und Pfählen; Nachricht von der gelungenen Methode im botaniſchen Garten zu Alfort, die Thalia dealbata, Calla aethiopica und Sagitteria sinensis in einem Baſſin im Freien zu ziehen. — Der Director des Vereins brachte unter andern zum Vortrage: einige intereſſante Bemerkungen des Herrn Grafen von Bruhl über die Fortſchritte der Garten-Kultur in der Schweiz, unter Vorlegung einer bequem zu führenden kleinen Gartenſcheere, die zum Beſchneiden von Roſen und andern ſtachlichten Sträuchern vorzüglich brauchbar erſcheint.

(**Methode, Glashäuſer durch Ausdünſtung von Vieh zu erwärmen.**) Armſtrong erzählt, daß man in Rußland und namentlich in der Nähe von Petersburg Glashäuſer durch die Ausdünſtung von Rindvieh heizt, indem man nämlich einen Viehſtall, welcher gehörig geſchloſſen gehalten wird, und der ſelbſt mit Winterthüren und dergleichen verſehen iſt, auf gehörige Weiſe mit den Glashäuſern in Verbindung ſetzt. Man bringt zu dieſem Behufe in der Mauer, welche den Stall von dem Glashauſe trennt, einige Zoll uber den Barren viereckige Löcher an, durch welche die warme, von den Thieren ausgeathmete Luft beinahe unmittelbar in das Glashaus übergeht. Dieſe ausgeathmete Luft ſoll ſelbſt in dem kalten Rußland hinreichen, um in den Glashäuſern im Winter die gehörige Temperatur zu unterhalten; ja ſelbſt das Lüften der Fenſter ſoll zu gehöriger Zeit geſchehen können. Ueberdies ſoll die Luft der Glashäuſer auf dieſe Weiſe auch noch ſo viel Feuchtigkeit mitgetheilt erhalten, daß man die Pflanzen nur ſelten zu begießen braucht: ein Vortheil, der ihnen vorzüglich im Winter ſehr gut zu Statten kommt. Man verſichert, daß ſich die Gewächſe in den auf ſolche Weiſe geheizten Glashäuſern weit beſſer conſerviren, daß ſie ein weit friſcheres und üppigeres Ausſehen erhalten, als dies in andern Glashäuſern im Winter der Fall iſt; und endlich, daß das Vieh durch das Verſchließen der Ställe nicht nur keinen Nachtheil erleide, ſondern ſchneller in der Maſtung zunehme. Die aus dem Glashauſe in den Stall zurücktretende kältere Luft ſoll nämlich hinreichen, um die Luft in dem Stalle geſund zu erhalten. Sollte ſich dieſe Heizmethode bewähren, ſo dürfte ſich der Gartenbau auf eine neue, höchſt vortheilhafte Weiſe mit der Viehzucht verbinden laſſen.

Die vorzüglichſten Nelkenſammlungen in und bei Paris findet man bei Hrn. Fries-Morel in der Akazienſtraße zu Paris, bei Hrn. Deſaubry zu Groslay, und bei Hrn. Simon Dubos, Blumiſten zu Pierrefitte.

Bibliographiſche Notiz über Blumiſtik.

In der Ebnerſchen Buchhandlung in Ulm iſt erſchienen und in mehreren guten Buchhandlungen zu haben:

1) **Vollſtändiges Lexicon der Gärtnerei und Botanik**, oder alphabetiſche Beſchreibung vom Bau, Wartung und Nutzen aller in- und ausländiſchen, ökonomiſchen, officinellen und zur Zierde dienende Gewächſe. Von Dr. Friedrich Gottlieb Dietrich, großherzogl. S. Rath u. Profeſſor der Botanik zu Eiſenach. Zweite verbeſſerte und vermehrte Auflage. Dritter Band. Chamaerops bis Ernodea. Ulm 1833.

Dieß claſſiſche Werk wird fortgeſetzt. Der dritte Band (neuer Nachtrag) iſt unter der Preſſe und wird bald gedruckt erſcheinen.

2) **Der Wintergärtner**, oder Anweiſung die beliebteſten Modeblumen oder Zierpflanzen ohne Treibhäuſer und Miſtbeete in Zimmern, Kellern und andern froſtfreien Behältern zu überwintern oder für den offenen Garten vorzubereiten. Nach eigenen Erfahrungen bearbeitet von Dr. Friedr. Gottl. Dietrich, großherzogl. S. Rath und Profeſſor der Botanik. Fünfte verbeſſerte und vermehrte Auflage. Ulm 1833.

Das Inhalts-Verzeichniß von der Blumenzeitung 1832 ſoll mit nächſter Numer verſendet werden.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllobl. Poſt=Aemter, Zeitungs=Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Euvel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto=Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 9 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen=Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. VI. Weißenſee, (in Thüringen). April 1833. VI. Jahrg.

Der Lenz erwacht, auf den erwärmten Triften
Schießt frohes Leben jugendlich hervor,
Die Staude würzt die Luft mit Nektardüften,
Den Himmel füllt ein muntrer Sängerchor,
Und Jung und Alt ergeht ſich in den Lüften,
Und freuet ſich, und ſchwelgt mit Aug' und Ohr.
Der Lenz entflieht! Die Blume ſchießt in Samen,
Und keine bleibt von allen, welche kamen. Schiller.

Fortlaufendes Pränumeranten=Verzeichniß. (Fortſetzung.)

Herr Profeſſor Wilhelmi in Roßleben.
— Kunſt= und Handelsgärtner Rauſche in Tonndorf bei Weimar.
Herr Apotheker Warneyer in Wurzen.
— Actuarius Brater in Schloßbeichlingen.

Beſchreibung u. Cultur ſchönblühender Glashaus= und Stuben=Pflanzen.

Rhododendron arboreum. Smith. Baumartige Schneeroſe. Roſenbaum. Alpenbalſam.

(Beſchluß.)

In England, wohin die baumartige Schneeroſe im Jahre 1817 zuerſt kam, hält dieſe Pflanze den Winter recht gut im Freien aus. Es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß ſie auch in den wärmern Gegenden Deutſchlands bei geeignetem und geſchütztem Stande ganz in freiem Boden kultivirt werden könne, und es gilt dann für dieſe Pflanze in Bezug auf Lage und Bodenart daſſelbe, was bei der Abhandlung des Rhododendr. pont. in Nro. 2 des 3ten Jahrg. der Blumenzeitung geſagt worden iſt. Indeſſen beſchränkt man ſich in Deutſchland bei der geringen Vermehrung und bei der Seltenheit dieſer Pflanze vorläufig noch auf die Cultur im Blumentopfe. Man durchwintert ſie im Glashauſe oder in einem luftigen hellen Zimmer bei 5 — 8° R. Wärme. Im Sommer ſtellt man ſie ins offene Glashaus auf eine geſchützte, etwas ſchattige Stelle ins Freie, wo ſie dann nicht zu ſpärlich begoſſen ſein will. Am beſten ſagt ihr eine lockere, ſandige, zwar nahrhafte, aber nicht gedüngte Erde zu, die man ſehr zweckmäßig aus 2 Theilen Lauberde, 2 Theilen Moorerde, 2 Theilen ſandiger Heideerde, etwas altem, lockerm Lehm und etwa noch 1/5 Flußſand oder feinem Kies bereiten kann. Auf den Boden des Topfs bringt man noch 1 Zoll hoch groben Kies.

Die Vermehrung dieſer Pflanze bei uns geſchieht wegen der Seltenheit des guten Samens, den man aus Indien bezieht, größtentheils durch Ableger mittelſt Anhänger, und durch das Ablactiren auf Stämme von Rhododendr. ponticum und maximum. Die Anzucht aus Samen geſchieht ganz auf dieſelbe Weiſe wie beim Rhododenron ponticum.

Dieſe Pflanze variirt auch mit unten roſtfarbigen Blättern. In Loddig. Catal. findet man noch eine Varietät mit weißen Blumen aufgeführt.

Beſchreibung und Cultur einiger noch nicht allgemein bekannten und einiger neuen Zierpflanzen.

Mitgetheilt von Hrn. J. W. Boſſe, Herzogl. Oldenburgiſchem Hofgärtner zu Oldenburg.

(Fortſetzung.)

19) **Russelia multiflora Sims.** Die vielblumige Ruſſelie iſt ein 3 — 4′ hoher, in Mexico einheimiſcher, im Frühling und Sommer mit ſehr zahlreichen, hochrothen Blüthen geſchmückter Zierſtrauch. Der ſchlank aufſteigende Stengel hat 4eckige, entgegengeſetzte, glatte, horizontale Aeſte. Die Blätter entgegengeſetzt, eirund, 8 — 14‴ lang, grob gekerbt=geſägt, ſpitz, glatt. Die Blumen traubenförmig=endſtändig, in quirlſtändigen Afterdöldchen; Corolle 10‴ lang, mit bauchigem, gebartetem Schlunde und 2lippigem Rande, von dem die Oberlippe ausgerandet, die Unterlippe 3lappig iſt. — Sie gehört in die 2te Ordn. der 14ten Claſſe nach Linné, und nach Juſſien zur Familie der braunwurzart. Pflanzen (Scrophularinae). — Man kann ſie leicht durch Stecklinge fortpflanzen und im Treibhauſe oder Zimmer bei 10 — 12° Wärme unterhalten. Sie liebt im Sommer reichliche Luft und Waſſer, muß aber im Winter mäßig begoſſen werden; übrigens wird ſie im Frühling in friſche, mit etwas Sand vermiſchte Laub= oder Miſtbeeterde verpflanzt, und gedeihet beſonders gut, wenn man ſie im Anfange

des Juni auf eine warme Rabatte in's Freie oder auf ein kühles Laub= oder Miſtbeet verpflanzt.

(Fortſetzung folgt.)

Einige erläuternde Bemerkungen über die gefüllten Dahlien oder Georginen, mit Angabe der Mittel zur Erlangung neuer, ſeltener Varietäten und eine unmaßgebliche Eintheilung derſelben.

(Mitgetheilt von Hrn. Chr. Deegen aus Köſtritz.)

(Fortſetzung.)

Die Farben trennen ſich, aus ihren Grundfarben erzogen, in 2 Theile und nähern ſich wieder in Uebergangsfarben, verwandlich iſt jetzt:

roth, durch alle Nüançen hindurch bis ins hellſte gelb;

purpurviolett, dunkel und hell bis ins weiß.

Die Uebergangsfarben ſind amaranth und blauroth in dunklen Farben, und

lilaroſa und gelblichlila, in hellern Farben.

Die dunkelſten, tiefſten ſtehen den hellſten, lichteſten am nächſten.

Durch den Verfolg der Cultur verſchmelzen ſich die Farben immer mehr und mehr in einander und durch oben angegebene künſtliche Behandlungen iſts möglich geworden, die ſonderbarſten Farben auf einem Blumenblatt zu vereinigen.

Früher ſuchte man die Schönheit einer gefüllten Georgine, nächſt der vollendetſten Füllung, bei ſchöner Blumenblatt=Geſtaltung und aufrechter, dem Anſchauer entgegenſtehender Stellung, in einer tiefen, reinen Färbung. Jetzt, wo man durch jene Hülfsmittel, eine, früher kaum denkbare Höhe und Tiefe, einen Glanz und ein Feuer der Farben erlangt hat, und dieſe Farben mehrfarbig in einer Blume, auch einem Blumenblatt, in bewundernswürdiger Abzeichnung vereiniget findet, und wo ſich dieſer Mannichfaltigkeit noch eine merkwürdige Formen=Veränderung anſchließt, welche ſich, ſonderbar genug, in den Formen unſerer ältern Lieblingsblumen mit ſchönerer Pracht abſpiegelt, um alle Huldigungen nur auf ſich zu lenken; da drängt wohl manchen Georginenfreund ſich der Gedanke auf, dieſe Verſchiedenheiten in ein Ganzes geordnet zu ſehen. Ich habe dieſen Sommer einen Verſuch darinnen gemacht, die Witterung übte indeß eine ſehr ungünſtige Wirkung auf die Flor, daß dieſe Arbeit erſchwert und verzögert wurde, bis der frühe Reif am 20. Sept. den um dieſe Zeit ſich ſchöner entwickelnden Flor endete, u. alle Arbeiten ſtörte, daher hier nur die Umriße:

I. Eintheilung der Georginen nach ihren Formen.

A. Nach Analogie des Baues von Blumen anderer Pflanzen.

a) Zuſammengeſetzter Bau, wo Rand= und Füllungsblätter ſich unterſcheiden.
   1) Scabioſenbau Scabiosa major ähnlich
   2) Anemonenbau Anem. hort. fl. pl.
   8) Mohnbau Papaver Rhoeas fl. pl.
   4) Schleifenbau hab. tortuos.

b. einfacher Bau, wo Rand= und Füllungsblätter gleich ſind und letztere nur gegen innen ſich verkleinern:
   5) Ranunkelbau Ran. asiat. fl. pl.
   6) Nelkenbau Dianth. Caryoph. fl. pl.
   7) Röhrenaſterbau Ast. fist. = =
   8) Sonnenroſenbau Helianth. annuus
   9) Seeroſenbau Nymphaea alba =
   10) Roſenbau Rosa centifolia = =
   11) Ringelblumenbau Calend. speciosa =
   12) Malvenbau Althaea rosea =

B. Nach Analogie anderer Gegenſtände u. Formen,
1) nach dem Habitus der ganzen Blume,
   13) Sternbau h. stellatus,
   14) Kugelbau h. globularis
2) nach der Form des einzelnen Blumenblattes.
   15) Gebogener Blätterbau h. flexuosus
   16) Kahnbau h. cymbaeformis,
   17) Dietchenbau h. semifistulosus,
   18) Knopfbau h. pseudo-proliferans,

(Fortſetzung folgt.)

Einiges über Acclimatiſirung und Behandlung der Heideerdepflanzen. (Fortſetzung.)

Eingeſandt vom Hrn. Freiherrn von Pfeffenrath, Herzog. Sächſ. Kammerherrn zu Saalfeld.)

Da wir nun die Beſtandtheile der Heideerde kennen, ſo iſt es auch leicht, künſtliche zu ſchaffen; indem man große Maſſen von Blättern, Moos, dürre Wurzel und Aeſt=Ueberreſte, zerhackte Heide, dürre Stengel und verfaultes Holz mit gereinigtem, abgeſchlemmten Sande vermiſcht. Auch abgezogener Waldboden und normale Erde, (loam) iſt gut hiezu. Beſonderes Intereſſe hat dieſes für die landwirthſchaftliche Chemie.

Die Magnolien nehmen den erſten Rang unter den Heideerdepflanzen ein; es ſind Bäume und Sträuche, die theils wegen ihres ſchlanken, hohen Wuchſes, ihren regelmäßigen, ausgebreiteten Aeſten, der pyramidalen, buſchigen Form merkwürdig ſind. Die Blätter erlangen bei manchen eine bedeutende Größe, und ſind hart, filzig, aber von einem lebhaften glänzenden Grün; die ſchönen Blüthen, von denen einige einen großen Umfang haben, ſind tulpenförmig, weiß, gelblich, purpurfarbig und von angenehmem Geruch. Ihr Wachsthum iſt ſchnell; wenn man ſie pflanzen will, muß man hiezu ein großes Terrain wählen, damit ſie ganz ihre ſchönen Formen entwickeln können. Die größten Blätter hat Magn. macrophylla, dieſe ſind oft über 2 Fuß lang. Die ſchönſte M. iſt die grandiflora. Dieſer prächtige Baum iſt noch ſelten und theuer; jedoch hat er angefangen, ſich in Frankreich zu befruchten und iſt bereits in mehreren Gärten acclimatiſirt, und hat die ſtärkſten Winter ausgehalten. Im Nothfall reicht eine leichte Bedeckung hin. Gleich vielen andern immergrünen nicht laubabwerfenden Bäumen, muß man ihn außer Berührung der heftigen Sonnenſtrahlen bringen, daher iſt ihm eine nördliche Expoſition am zuträglichſten; der Einfluß der ſtrengſten Kälte ſchadet ihm weniger, als der Wechſel von Froſt und Thauwetter.

Aus den Wäldern von Südcarolina hervorgegangen, verträgt er in ſeinem Geburts- oder Mutterland die heftigſte Kälte. Noch iſt beſonders zu bemerken, daß die Feuchtigkeit den immergrünen Blätter-Pflanzen am meiſten ſchadet: deswegen iſt auch eine Bedeckung mit feuchten Blättern oder ſonſtigen Gegenſtänden, die Feuchtigkeit anziehen, höchſt nachtheilig, weil ſie die Näſſe den lebenden Blättern und Zweigen mittheilt, und ſo das Erfrieren bewirkt. Nach den Geſetzen der Hygrometrie muß man daher immer eine zweckmäßige trokkene Bedeckung anwenden, die das Waſſer und die Feuchtigkeit abhält, und die Luft zuläßt. (Fortſ. folgt.)

Bemerkungen über die Behandlung der Orangerie in Töpfen. (Fortſetzung.)

(Vom Hrn. Hofgärtner J. Moos zu Weimar).

Fehlt es zur Durchwinterung an einem Gewächshauſe, ſo können die Orangenbäumchen in einem Zimmer bei drey bis fünf Grad Wärme Reaum. recht gut durchgewintert werden; es iſt nur darauf zu ſehen, daß die Wärme immer ſo viel als möglich gleichmäßig iſt, denn eine ungleiche Temperatur wirkt nicht nur bei den Orangen, ſondern auch bei allen übrigen Topfgewächſen zerſtörend auf ihre Geſundheit. Bei drey bis fünf Grad Wärme R. befinden ſich die Orangen im Winter wohl, aber auch bei ſechs bis acht Grad würden ſie ſich wohl befinden, nur dürfte die Wärme nicht etwa bald drey, bald acht Grad ſein, dann würden ſie bald erkranken.

Das Umſetzen geſchieht, je nachdem die Bäumchen ſchwächer oder ſtärker treiben, alle zwey bis drey Jahre. Man nimmt ſie dann mit dem Ballen aus dem Topfe und ſchneidet ringsum die Wurzeln glatt ab; es muß dieß mit einem ſcharfen Meſſer geſchehen, damit alle Quetſchungen der Wurzeln vermieden werden. Hierauf nimmt man, wenn es die Stärke des Bäumchens erfordert, einen etwas größeren Topf und ſetzt es in friſche Erde. Man hüte ſich ja, den Bäumchen unnöthiger Weiſe größere Töpfe zu geben, weil dieſe nicht, wie Mancher glaubt, das Wachsthum befördern, ſondern verhindern.

Bei der Topforangerie iſt das Auflegen von Dünger oder ein Guß von demſelben durchaus nicht zu empfehlen! Findet man, daß es dem Bäumchen im Sommer bei ſtarkem Triebe an der nöthigen Nahrung fehlt, ſo nehme man ein bis zwey Zoll tief die Erde, ohne die Wurzel zu beſchädigen, vom Ballen ab und fülle friſche Erde auf; dieß wird dem Bäumchen bis zum Verſetzen im nächſten Frühjahre die nöthige Nahrung geben.

Die gewöhnlichen Krankheiten, wovon die Orangenbäumchen befallen werden, iſt die Fäule und der Roſt an den Wurzeln, welche durch übermäßige Feuchtigkeit und friſche Düngermittel herbei geführt werden. Man bemerkt dieſe Krankheit zunächſt am Stillſtand im Wachsthum und beſonders an den jüngſten Blättern, welche anſtatt grün, gelb und weiß erſcheinen.

(Beſchluß folgt.)

Anfrage.

Wie erzieht man Roſen aus Saamen, d. h. wann wird der Saamen geſäet, in welche Erde, und wie werden die aufgehenden Pflanzen bis zur Blüthe behandelt?

S...g. A. S. v. Wernich.

Königl. däniſcher Premier-Lieutenant und Poſtmeiſter.

Syſtematiſche Namen der merkwürdigſten Pflanzen Gattungen und Arten, ihr Genitiv ꝛc.

Mitgetheilt von L. aus T. (Fortſetzung.)

Alectra. Thunb. ae. f. (Alectrion Gaertn.) Alectra.

Von 'αλέκτωρ, ορος, ὁ der Hahn, weil ihre gelben, mit purpurrothen Streifen verſehenen Blumen Aehnlichkeit mit einem Hahnenkamm haben.

Alectorolophus. Hall. helv. Nr. 313. i. masc.

Alectorolophus (Rhinanthus) Hoffm. et Roth.. (Rhinanthus Crista galli. L.) Hahnenkamm, Klapperkraut.

Von 'αλέκτωρ, der Hahn und λόφος, ȣ, ὁ der Nacken, daher auch ein Federbuſch auf dem Kopfe etlicher Vögel, oder Crista, der Kamm, alſo lateiniſch Crista galli. Die Blätter ſind in Geſtalt eines Hahnenkammes ausgeſchnitten; die reifen Samen klappern in der Kapſel, wenn ſie gerüttelt wird.

Aletris. L. idis. foem. Runzelblume, Hyacinth-Aloe.

Von 'αλετρὶς, ἰδος, die Frau des Mühlers. Die Blumenkrone der in Amerika einheimiſchen A. farinosa. L. iſt runzlig und wie mit Mehl überſtreut. Die Pflanzen dieſer Gattung haben viel Aehnlichkeit mit den Aloen und Hyacinthen.

Aleurites. Forst. Aleurites.

Von ἄλευρον, das Mehl; die verſchiedenen Theile dieſes Baumes ſcheinen wie mit Mehl bedeckt zu ſein.

Alhagi (Hedysarum) L. Türkiſcher Hahnenkopf; türkiſcher Süßklee, Mannaklee.

A. iſt ein arabiſches Wort und heißt eigentlich ăghùl. Aus den Zweigen dieſes in der Tartarei, Perſien, Syrien und Paläſtina wild wachſenden kleinen Strauchs ſchwitzt ein ſüßer, ſich an der Luft verdickender, mannaartiger Saft aus, den die orientaliſchen Völker genießen und den man fur das Manna oder Dsches hält, von welchem ſich die Israeliten in der Wuſte genährt haben ſollen. (Fortſ. folgt.)

Varietäten.

Dresden, d. 31. März. Die hieſige Geſellſchaft für Gartenbau und Botanik erfreut ſich nach überſtandenen Stürmen der Zeit einer vielſeitigen Theilnahme und hat nunmehr königliche Beſtätigung erhalten, ſo daß ſie ſich dadurch in den Stand geſetzt ſieht, auch auswärtige Verbindungen zu pflegen. Die Direction führt Hr. Hof- und Med.-Rath Dr. Kreyſig und als zweiter Director iſt Hr. Lieutenant Wäber erwählt und mit ſpecieller Beſorgung der Pflanzenausſtellungen beauftragt, Hr. Hofrath Reichenbach als Secretair ferner beſtätigt worden. Hr. Lieut. W. hat in Verbindung mit den thätigen Hrn. Hofgärtnern E. Seidel, A. Terſcheck, G. Terſcheck, Mieth und F. A. Lehmann und den ſich durch eine rühmliche Bereitwilligkeit bei dergleichen Unternehmungen auszeichnenden Kunſt- und Handelsgärtnern Hrn. Jac. Seidel, Liebich, Schreiber, Treiſe, Jannack, Felbel ꝛc. in den letztverfloſſenen rauhen Wintertagen gezeigt, was die Blumenausſtellungen hier ſein können und künftig ſein werden. Das ſchöne Auditorium der Naturgeſchichte am k. Naturalien-Cabinet, in welchem die Geſellſchaft auch während des Winters ihre Verſammlungen hielt, und welches wir vorzüglich der unermüdeten Fürſorge des

Hrn. Hofraths **Reichenbach** verdanken, ſchien ſich wegen ſeiner Form und Größe zu einer großartigen Ausſtellung zu eignen, und die gelungene Ausführung durch die geſchmackvoll leitende Hand des Hrn. Lieut. **Wäber** entſprach allen Erwartungen ſo vollkommen, daß die Erinnerung an den hier gebotenen Anblick noch lange fortleben wird. Die ganze große Rotonde war mit Korbgeflecht eingefaßt, dieß mit Moos angefüllt und darin an tauſend Töpfe verborgen, deren Pflanzen fröhlich emporblühten. Ein Rhododendron von 10 Fuß Höhe nahm den Mittelpunkt ein und ſtreckte ſeine 107 Blüthenbüſchel durch weiße Schneeballen und hochgelbe Trauben von Cytisus Laburnum hindurch. Azaleen, Acacien, Bankſien und Diosmen ſetzten die Reihen beiderſeits fort, mit hohen Acacien beſchließend und durch niedere Gewächſe unterbrochen. Vor der Rotonde erhob ſich auf einem ſchön decorirten Poſtament eine blühende Fächerpalme und ihr zur Seite verbreiteten zierliche Blumenkörbe ihre Wohlgerüche in die Umgebung. Im Vordergrunde entſtiegen aus coloſſalen Mooskörben zwei Pyramiden, welche die ſeltenſten Gewächſe enthielten; niedliche Alpenpflanzen und Zwiebelgewächſe erfüllten die unteren größeren Kreiſe, und aufſteigend wurde der Kenner in jeder Reihe wieder durch zahlreiche Numern befriedigt, während prächtige Azaleen und vielgeſtaltige Camellien die Augen der Blumenfreunde ergötzten. Auf der entgegengeſetzten Seite des Saales ſtanden die ſeltnern, durch Größe u. Schönheit ausgezeichneten Acacien u. in ihrer Mitte die Krone der Sammlung ein Enkyanthus von 10 Fuß Höhe mit mehren Blüthenzweigen, in deren Blüthen die Beſchauer im Sonnenſchein fünf glänzende Rubine zu erblicken glaubten. Die Theilnahme des Publikums war überaus groß. Die kleinen Eintrittsgelder (zu 2 gr.) wurden durch eine von der Geſellſchaft erwählte Deputation aus 5 Mitgliedern zu Ankauf von ſeltenen Pflanzen verwendet, um dieſe denjenigen durch das Loos zu verehren, welche die ausgezeichnetſten Gewächſe zur Ausſtellung geliefert hatten. Nach Abzug der Koſten blieb für jene Zwecke 100 Thlr. übrig. Den erſten Preis der Seltenheit und Neuheit erhielt eine 6 Fuß hohe Acacia decora (Rchb. hort. bot. tab. 199) des Hrn. Hofgärtners A. **Terſcheck** aus dem Garten vom japan. Palais; den zweiten der Enkyanthus des Herrn Hofrath **Kreyſig**, den dritten die Sammlung von 36 Azaleen des Herrn Lieutenant **Wäber**, den vierten die Sammlung der Camellien des Herrn Kunſtgärtners Jacob **Seidel**. Noch waren aus den botaniſchen Gärten in Dresden und in Pillnitz, ſowie aus denen des Hrn. Hofr. K. und Grafen von **Hoffmansegg** viele neue und ſchöne Gewächſe vorhanden, Amaryllis psittacina und spectabilis (aus Pillnitz) von vorzüglicher Schönheit und Größe, Cyclamen repandum, Gesneria Douglassii, Scottia dentata, trapeziformis, Hovea, Lisianthus, Begonia vitifolia von 4 Fuß Höhe u. a. m. Die in dem Locale zu haltenden zoologiſchen Vorleſungen haben auch mitten unter dieſer prachtvollen Ausſchmückung unausgeſetzt ſtatt gefunden, und Hr. Prof. **Reichenbach** fügte noch drei Extravorleſungen über die Vegetation der Tropenländer und vorzüglich Braſiliens, nach von Martius's reizender Schilderung, hinzu. Eine andere Vorleſung faßte die Ausſtellung ſelbſt ins Auge und belebte vorläufig den Eifer der akademiſchen Bürger für den bald zu beginnenden Curſus der ſyſtematiſchen Botanik.

Wien, den 21. Febr. 1833. In den Gewächshäuſern des k. k. Hofgartens zu **Schönbrunn** blühen jetzt folgende Gewächſe:

Acacia linearis. (Wendland.) Aus Neuholland. Leguminosae, Mimoseae, Polygamia, Monecia.

Aloë glauca. (Haworth.) Vom Vorg. d. g. Hoffnung. Hemerocallideae. Hexandria, Monogynia.

Arbutus Unedo. (Linnè) Aus Südeuropa. Ericeae. Decandria, Monogynia.

Brucea ferruginea. (Hèritier.) Aus Abyſſinien. Connaraceae. Dioecia, Tetrandria.

Erica margaritacea. (L.) Vom Vorg. d. g. Hoffnung. Ericeae. Octandria, Monogynia.

Erica melanthera. (Linnè.) Vom Vorg. d. g. Hoffnung. Ericeae. Octandria, Monogynia.

Erica trivialis. (Hortorum.) Vom Vorg. d. g. Hoffnung. Ericeae. Octandria, Monogynia.

Grevillea acuminata. (R. Brown.) Aus Neuholland. Proteaceae. Tetrandria, Monogynia.

Periptera punicea. (De Candolle.) Aus Neuſpanien. Malvaceae, Monadelphia, Polyandria.

Rhipidodendron plicatile. (Wildenow.) Vom Vorg. d. g. Hoffnung. Hemerocallideae. Hexandria, Monogynia.

Rhipsalis salicornoides. (Haworth.) Aus Braſilien. Cacteae. Icosandria, Monogynia.

Sida obliqua. (Hortorum.) Aus Mexiko. Malvaceae. Monadelphia, Polyandria

Soulangia buxifolia. (Brogniart.) Vom Vorg. d. g. Hoffnung. Rhamneae. Pentandria, Monogynia.

(**Drei Mittel wieder die Inſekten an den Pflanzen in den Gewächshäuſern.**)

1) Man waſche die Pflanzen in einer wäſſrigen Auflöſung von **Aloe**. **Tredgold**.

2) Man benetze die Stengel und Blätter mittelſt einer durch Waſſer gemachten Abkochung von 1 Theil geraspeltem **Quaſſiaholz** (oder **Coloquinten**) und 12 Theilen Waſſer. **Hermbſtädt**.

3) Man koche **türkiſchen** oder **Cayenne-Pfeffer** (Capsicum annuum und baccatum Lin.) in Waſſer, und benetze die Stengel und Blätter der Gewächſe mit dieſer ſtarken und allen Inſekten ſehr widerlichen Auflöſung, mit der man auch die Feld- und Bettwanzen vertreiben kann.

Rumy.

(**Die Vegetation auf den Bergen von Java.**) Java iſt beſonders reich an Feigen und Lorbeer-Arten; dieſe vereinigen ſich mit einigen Eugenien und andern Myrtaceen, und mit einer immerblühenden großblüthigen Gardenie, um überall die größten Höhen der Berge zu bewalden. Zu ihnen geſellen ſich hochſtämmige Melaſtomen und Rhododendrons, Magnolien, welche die Waldluft mit wohlriechenden Düften erfüllen, und viele Eichen. Mit und zwiſchen dem Allen herrſcht beſtändig die größte Mannigfaltigkeit der Orchideen vor. Nur zuletzt, wenn auch die Lorbeerwälder aufhören, die Gipfel der Berge ſich immer mehr verſchmälern, dieſe die Humusdecke nicht mehr feſthalten können, wenn die Luft immer dünner und kälter wird, auf einer Höhe von 7000 und mehrern Schuhen, da ändert ſich endlich die Geſtalt des Waldgehölzes, es ſchrumpft ein, wird krumm und krüppelicht, die Blätter werden kleiner, ſteif und hart, langblättrige Usneen hängen von den dickbemoosten Zweigen, und Alles bringt die Erinnerung an die kältern Alpenhöhen zurück. Da ſind es vorzüglich Ericeen, ſo wie Andromeda, Vaccinien und Clethra, dann auch eine Myrica, niedrige Arten Rhododendron, die jene noch bewachſenen höchſten Gipfel bedecken. Noch andre Formen, die man nie im niedern Indien findet, die man nur bei uns oder außer den Tropen einheimiſch wähnt, überraſchen uns auf jenen Höhen; Valeriana, Ranunculus, Bellis, Hypericum, Lonicera, Gnaphalium, Swertia und eine kleine niedliche Gentiana, die noch in der dürren Lava-Aſche lebt; — dieſe alle wachſen hoch, aber noch unter oder nahe der Mittagslinie. Gleiche Ueberraſchung gewähren die hohen feuchten Thäler oder die eingeſchloſſenen Felder zwiſchen den hohen Gipfeln des vulkaniſchen Gebirges. Hier zeigen ſich Doldengewächſe, Veilchen, Flieder, Münzen, Potentillen, Ampfer, Centaureen, Spiraeen, Iſoppen, ſelbſt Carices fehlen dieſen Orten nicht.

(**Pflanzenreichthum.**) Ein ausgezeichneter Botaniker hat berechnet, daß ſeit der Entdeckung der neuen Welt 2375 verſchiedene Arten amerikaniſcher Bäume und Pflanzen, und 1700 vom Vorgebirge der guten Hoffnung nach Europa verpflanzt worden ſeyen, und daß, wenn noch die exotiſchen Pflanzen aus China, Oſtindien, Neuholland und andern Theilen Aſiens, Afrika's und den Grenzen Europa's hinzugefügt würden, ſich die Zahl der Varietäten kultivirter Pflanzen im gemäßigten Europa bis auf 120,000 belaufe.

Hierbei das Inhalts-Verzeichniß der Blumenzeitung von 1832

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto-Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. VII. Weißenſee, (in Thüringen). April 1833. VI. Jahrg.

Einige erläuternde Bemerkungen über die gefüllten Dahlien oder Georginen, mit Angabe der Mittel zur Erlangung neuer, ſeltener Varietäten und eine unmaßgebliche Eintheilung derſelben.

(Mitgetheilt von Hrn. Chr. Deegen aus Köſtritz.)

(Fortſetzung.)

II. Eintheilung nach ihren Farben oder Zeichnungen.

A. einfach gefärbt, Flos unicolor

a. obere und untere Hälfte des Blumenblattes gleichförmig gefärbt, Flos unicolor, intensis.

b. ungleich gefärbt, indem die Intensitaet der Farbe an einigen Stellen, beſonders an den Spitzen abnimmt, aber ohne merkliche Unterſcheidung, Flos unicolor, dilutus.

c. ſchillernd, unter gewiſſem Einfallswinkel der Lichtſtrahlen, erſcheint ſcheinbar eine andere Farbe, Flos simpl. perlucitans.

d. der Widerſchein wird durch Sammt oder Duft hervorgebracht, Flos holosericeus perlucitans.

e. halbdurchſichtig (wie glaſirt), Flos hyalinus

B. zwei und mehrfarbig gezeichnet, Flos delineatus bicolor (multicolor).

a. ohne anſcheinende Ordnung, Flos varieg.

b. die Farben ſind verwaſchen oder getuſcht, Flos dilutus discolor.

c. die Farben ſind deutlich abgeſondert.

aa. das Blumenblatt iſt ſeiner Länge nach gezeichnet.

aaa. blos am Rande.

aaaa. nur die äußerſte Peripherie kaum bemerkbar umfaßt, Flos limbatus.

bbbb. ſchmal geſäumt, Flos marginatus.

cccc. breit umfaßt, Flos cinctus.

bbb. geſtreift.

aaaa. geſtreift (bandartig), Flos striatus.

bbbb. gefärbt liniirt, Flos lineatus.

ccc. das Blumenblatt hat flammenartige Färbung, Flos flammeus.

ddd. das Blumenblatt iſt gefleckt, (punktirt), Flos maculatus.

bb. das Blumenblatt iſt nach der Breite des Blattes (in die Quere) gezeichnet, Flos concentrice varians.

cc, an der Spitze des Blumenblattes gefärbt (hat den Anſchein wie übereinander liegende Schuppen) Flos ad apicem petalorum pictus.

dd. die in kleine Blumenblättchen übergehende Staubgefäße, bilden bunte Blumenblättchen von abweichender Form, Flos paradoxus.

C. Die obere und untere Seite des Blumenblattes hat verſchiedene Farbe (wie bei den Nelken) fameus Flos dispar coloratus.

Obige zwar unvollendete Umriſſe, mögen dem Georginenfreund ein Beweis ſein, wie erfolgreiche und erfreuliche Reſultate mir die Cultur der Georginen in den wenigen Jahren gegeben, und aufmuntern, deren Cultur mit zu unternehmen.

Die neueſten, aus obiger künſtlicher Behandlung hervorgegangenen Georginen hierzu verwendet, namentlich die buntfarbigen, werden auch ohne Anwendung künſtlicher Mittel Samen erzeugen, welcher die erfreulichſten Reſultate geben wird, da in dieſen Georginen, durch den Einfluß der in jeder Art vollkommenen Eltern, die Eigenſchaft ſchöner Füllung und Färbung erhöhet und mehr vervollkommnet worden iſt.

(Beſchluß folgt.)

Einiges über Acclimatiſirung und Behandlung der Haideerdepflanzen. (Fortſetzung.)

Eingeſandt vom Hrn. Freiherrn von Pfeffenrath, Herzog. Sächſ. Kammerherrn zu Saalfeld.)

Bishieher der Verfaſſer der erwähnten Abhandlung. Gewiß iſt die Cultur, Vermehrung und Acclimatiſirung der Haideerdepflanzen ein Verdienſt und Gewinn für die Pflanzenliebhaber und das Gartenweſen: durch obige Ueberſetzung, wenn ſolche auch vielleicht nicht ganz fließend und ſchön gelungen, glaubte ich einiges zur Aufmunterung und Verbreitung der Cultur dieſer Pflanzengattung beizutragen, und dadurch den Wunſch erfüllt zu ſehen, meinen Lieblingen mehr Freunde und Pfleger zu verſchaffen, denn dieſe Pflanzen gehören gewiß zu den edelſten und zarteſten, welche die Bemühungen ihrer Pfleger hinlänglich belohnen werden. Wer nur einige in ihrer ganzen Ausbildung und in ihrem Flor geſehen hat, wird mir beiſtimmen müſſen. Ich will ſelbſt mit den erſten Verſuchen vorangehen, und liefere hier ganz kurz die Beſchreibung meiner Anlagen zu dieſem Zweck, der ein doppelter iſt:

1) um die Haideerdepflanzen ſo viel als möglich zu vervielfältigen, um einſt durch billige Preiſe den Liebhabern derſelben den Ankauf zu erleichtern.

2) um durch ſucceſſive Abhärtung und Entziehen jeder Bedeckung Acclimatiſirungsverſuche zu machen.

Ein dritter Zweck ergibt ſich auch noch, nämlich die ganz freie, kräftige Entwickelung dieſer Pflanzen und ihrer prachtvollen Blüthen in einem hinlänglich unbeſchränkten Boden wahr zu nehmen: denn bis jetzt kennen wir ſie nur in ſchwächlichem, zwergartigem Zuſtand. Die Blumen der Azaleen, Rhododendr. Kalmien etc. werden in freiem Boden ohne Topf noch einmal ſo groß.

An einer nach Mitternacht gelegenen, 12 Fuß hohen Gartenmauer habe ich einen 2 Fuß tiefen und 5 Fuß breiten Graben ausheben laſſen, der an 40 Fuß lang iſt; wo eine ſolche Mauer fehlt, kann man ſie auch durch eine dichte Wand von Taxus- oder Nadelholz erſetzen; denn auf einer Seite müſſen die Pflanzen Schutz haben und beſonders der Einwirkung der brennenden Mittagsſtrahlen entzogen werden. Dieſen Graben, plate bande, oder Blattbahn genannt, habe ich zum leichtern Abzug des Waſſers 3 Zoll hoch mit dürren Blättern, dünnen, verdorrten Aeſtchen und verfaultem Holze anfüllen laſſen. Hierauf iſt nun die zubereitete Haideerde gelegt, und das Pflanzen ganz nach Vorſchrift der dabei nöthigen Vortheile und Sorgfalt verrichtet worden: zunächſt an der Mauer die höchſten Bäume und ſo nach vorn immer in einer terraſſenförmigen Abnahme nach ihrer natürlichen, eigenthümlichen Höhe geſetzt. Den Winter werden nun dieſe Pflanzen, ſo lange ſie nicht hoch gewachſen ſind, umgelegt, und mit ganz dürrem Laube, und leichten Strohdecken überdeckt. Kann man darüber eine leichte Dachung von Brettern machen, ſo daß von den Seiten Luft hinzu kommen kann, iſt es noch zweckmäßiger, indem ſie dadurch gegen die Näſſe geſchützt werden. Werden dann die Bäume und Sträucher höher, ſo muß man ihre Aeſte ſorgfältig und locker zuſammen binden, ſie mit Stroh umwinden, und in die leeren Zwiſchenräume ganz dürres Laub füllen. Das Zubinden der Bäume muß mit beſonderer Vorſicht geſchehen; die Bände dürfen nicht zu feſt angezogen werden, und der ganze Verband muß ſo locker ſein, das ſich kein ſtehendes Waſſer oder Feuchtigkeit in den Zwiſchenräumen des Baumes und des Verbandes aufhalten kann: es dürfen auch im Frühjahre die Bedeckungen nicht eher hinweggenommen werden, als bis man keine Fröſte mehr zu befürchten hat, denn bei eintretendem Safte erfrieren die Pflanzen am leichteſten. (Fortſetzung folgt).

Cacten-Tauſchanerbieten.

Ein Blumenfreund in Thüringen wünſcht nachverzeichnete Cactus-Arten (geordnet nach dem, in der 13ten Lieferung der Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuß. Staaten enthaltenen Verzeichniſſe) gegen andere, in dem nachſtehenden Verzeichniſſe nicht mit aufgeführte Arten einzutauſchen. Liebhaber dieſer Pflanzen mögen ſich gefälligſt in dieſer Angelegenheit in frankirten Briefen an die Redaction der Blumenzeitung wenden und dann des Nähern ſofort vergewiſſert ſein.

I. Mammillaria.

1 M. flavescens (straminea).
2 - parvimamma.
3 - simplex.
4 - stellata (pusilla).
5 - densa (caespitosa).
6 - coronaria.
7 - discolor (depressa).
8 - fuscata.

II. Melocactus.

9 M. communis.
10 - ambiguus.

III. Echinocactus.

11 E. tenuispinus.
12 - Ottonis.
13 - polyacanthus.
14 - Oxygonus.
15 - multiplex.

IV. Cereus.

16 C. multangularis.
17 - strigosus.
18 - Scopa.
19 - peruvianus(hexagon.)
20 - peruv. monstrosus.
21 - albispinus.
22 - niger.
23 - chiloensis.
24 - Royeni.
25 - caudicans.
26 - repandus.
27 - Deppii.
28 - tetragonus.
29 - Pitayaya.
30 - — aus Mexiko mit eßbaren Früchten.
31 - serpentinus.
32 - flagelliformis.
33 - — minor.
34 - grandiflorus.
35 - pentagonus.
36 - humilis (gracilis).
37 - speciosissimus.
38 - coccineus.
39 - triangularis.
40 - triqueter.
41 - prismaticus.
42 - extensus.
43 - setaceus.
44 - squamulosus.
45 - Myosurus.

V. Epiphyllum.

46 E. Phyllanthus.
47 - Phyllanthoides (alat.)
48 - allat. (Spec. London).
49 - truncatus.

VI. Opuntia.

50 O. cylindrica.
51 - imbricata.
52 - rosea (tunicatus).
53 - foliosa.
54 - currassavica.
55 - fragilis.
56 - pusilla.
57 - horizontalis.
58 - undulata.
59 - ferox.
60 - spinosissima.
61 - leucacantha.
62 - longispina.
63 - horrida.
64 - Tuna.
65 - pseudo-Tuna.
66 - polyantha.
67 - monocantha.
68 - nigricans.
69 - triacantha.
70 - decumana.
71 - cochenillifera.
72 - Ficus indica.
73 - tomentosa.
74 - lanceolata.
75 - stricta.
76 - rubescens.
77 - crassa.
78 - vulgaris.
79 - — major.
80 - microdasys.
81 - brasiliensis.

VII. Pereskia.

82 P. aculeata.
83 - — longissima.
84 - grandifolia.

VIII. Rhipsalis.

85 R. Cassytha (pendulus).
86 - funalis (grandiflora).
87 - messembrianthoides.
88 - salicornoides.

Andere ſucculente Pflanzen.

Aloë.

1 A. Americ. fol. variegatis.
2 = angulata.
3 = arborescens.
4 = attenuata.
5 = — variegatis.
6 = brevifolia.
7 = commelina.
8 = cymbaeformis.
9 = echinata.
10 = excavata.
11 = Hanta canta.
12 = humilis.
13 = maculata.
14 = pentagona.
15 A. pronafera.
16 = picta oder umbellata.
17 = radula.
18 = retusa.
19 = Rhodocanta.
20 = serrata.
21 = spiralis.
22 = turgeda.
23 = variegata.
24 = verrucosa.
25 = virens.

Euphorbia.

1 Euph. canariensis.
2 = caput medusae.

3 E. erosa.
4 „ mammillaria.
5 „ meloformis.
6 „ polygona.

Crassula.

1 C. coccinea.
2 „ incarnata (Rochea falcata).
3 „ orbiculata.

Sempervivum.

1 Semperv. monanthos.
2 Semp. tabulaeformis.

Stapelia.

1 St. deflexa.
2 „ glauca.
3 „ grandiflora.
4 „ irorata.
5 „ paluta.
6 „ planifolia.
7 „ replicata major.
8 „ sororia.
9 „ tridendata.
10 „ variegata.
11 „ asteria.

Auch hat uns am Schluſſe vorigen Monats der Königl. baier. wirkl. Collegialrath, Herr von Gemünden aus München (Ludwigs-Vorſtadt, Singſtraße Nro. 153) ein höchſt reichhaltiges Pelargonien-Verzeichniß zum Austauſch für die Blumenzeitung eingeſendet, und zwar: a) gegen neue engl. oder wiener Pelargonien, b) gegen Nelken von ausgezeichneten Sorten, die Hr. v. G. ſich aber auswählen wird und c) auch gegen Cacten. Da quaest. Verzeichniß jedoch für den Raum d. Bl. zu groß war und leider durch ein Verwiſchen von Tinte mehrere Stellen unleſerlich geworden, andern Theils aber auch durch den verſpäteten Eingang des Briefs für dieſes Jahr der Abdruck zwecklos wurde, weil eine Verſendung der Pelargonien nur bis Ende März und die der Nelkenſenker nur bis zum halben April angenommen werden ſollte und konnte; ſo mußten wir gedachtes Verzeichniß einſtweilen als unbenutzt bei Seite legen. Es würde uns jedoch angenehm ſeyn, wenn Hr. v. G. uns vielleicht ſpäterhin eine deutlichere Reinſchrift der zu vertauſchenden Pflanzen zur Aufnahme in die Blumenzeitung einzuſenden die Güte hätte; der Abdruck ſoll dann gewiß ſofort erfolgen.

Beitrag zur Behandlung der Myrte während des Winters.

Da gewiß jeder Blumenfreund, und beſonders jede Blumenfreundin, wenigſtens eine Myrte beſitzt und auch dieſe oft im Winter ſterben ſieht, ſo möchte folgende Bemerkung vielleicht nicht unerwünſcht ſein.

Das Krankſeyn der Myrte zeigt ſich meiſtentheils durch das Abfallen der Blätter, worauf ſie bald ganz kahl daſteht und gewöhnlich abſtirbt. Dieß iſt die Folge theils des zu häufigen Gießens, theils der ſich oft ſehr zahlreich, ſowohl an den Blättern, als auch dem Stamme findenden Schildläuſe. Deshalb waſche man die Myrte, indem man ein Gefäß, welches größer iſt, als der Myrten-Stock, mit lauwarmen Waſſer füllt, den Topf daneben legt, und den Stock behutſam hineinbiegt, um ihn im Waſſer abzuſpülen. Hierauf laſſe man ihn ½ Stunde lang ſtehen, damit die Schildläuſe, ſowie der von denſelben abgeſetzte klebrige Saft losweicht. Dann ſpüle man ihn nochmals auf dieſelbe Weiſe in reinem lauwarmen Waſſer ab, und wiederhole dies alle 3 bis 4 Wochen. Hierdurch wird der Stock von den Schildläuſen und allem Schmuze befreit und die Ausdünſtung befördert.

Uebrigens gieße man nur ſehr wenig während des Winters; und um zu ſehen, ob das Gießen erforderlich ſei, unterſuche man die Erde mit dem Finger. Iſt ſie 1 1/2 Zoll tief ausgetrocknet, dann gieße man mit überſchlagenem Waſſer, jedoch nur ſo, daß die Erde nicht bis auf den Boden durchdrungen wird, weil ſich doch unten im Topfe ſtets eine gewiſſe Feuchtigkeit hält. Hierdurch verhütet man das Faulen der Wurzeln.

Auf dieſe Weiſe habe ich meine Myrten, welche während des Winters nicht hinter dem Fenſter ſtehen können, ſchon ſeit 6 Jahren behandelt und ſie ſo ſchön erhalten, daß ſie nie Blätter abwerfen.

Heiligenſtadt. B.

Blumiſtiſche Notiz.

Herr Schullehrer Probſt in Nauſiß pflanzte im vorigen Jahre ſpätgeſäete Sommerlevkojen in ſein Gärtchen. Der trockene und dürre Sommer bewirkte, daß ſie erſt im ſpäten Herbſte blühten, aber dann auch als eine herrliche und ſchöne Flor das kleine Gärtchen zierten.

Ein Stock, der ſich durch ſeine großen, gefüllten und ſchön braunfarbigen Blüthen auszeichnete, wurde in der Mitte des Novembers vorſichtig ausgehoben und in einen Aſch (Blumentopf) gepflanzt.

Einige Tage wurde er in Schatten geſetzt, und ſo blühte er bis Weihnachten entzückend fort. Jetzt wurden alle Blüthen und Blüthenknoſpen abgeſchnitten und der Aſch erſt in die Oberſtube und ſpäter, bei der größten Kälte dieſes Winters in den Keller geſetzt. Im Februar dieſes Jahres wurde er begoſſen, und an Sonne und Luft gebracht. Er bekam ſchnell ein lebhaftes Anſehen und Wachsthum und blüht jetzt (am 1. April) köſtlich und duftend.

Günſtedt, im April 1833. Fiſcher.

Syſtematiſche Namen der merkwürdigſten Pflanzen-Gattungen und Arten, ihr Genitiv ꝛc.

Mitgetheilt von L. aus T.

(Fortſetzung.)

Alisma. L. mătis. neutr. und nicht foem. Froſchlöffel.

Ἄλισμα (Diosc. III. 169. Plin. XXV. 10.) Nach Linné von ἀλυσμὸς, ὁ, die Aengſtlichkeit, das ängſtliche unruhige Umherwerfen der Kranken, wogegen dieſe Pflanze gebraucht worden. Richtiger wohl von dem celtiſchen alis, Waſſer, weil ſie nur auf wäſſerigen Stellen angetroffen wird. Die deutſche Benennung rührt von der löffelförmigen Geſtalt der Blätter und davon her, daß die Pflanze in ſolchem Waſſer wächſt, wo ſich die Fröſche aufzuhalten pflegen.

Alkekengi (Physălis) L. Judenkirſche, Blaſenkirſche.

Ein arabiſches Wort: àl kêkendg, im Spaniſchen alcaquengi. Die Beere ſchmeckt ſüßlich, wenn vorher der rothe blaſenförmige Kelch, welcher die Beere umgiebt, nicht berührt wird; hat man ihn aber angefaßt, ſo iſt ihr Geſchmack bitter. Die Urſache dieſer Erſcheinung liegt in einem bittern Staube, der die innere Fläche des Kelchs bedeckt und durch das Andrücken deſſelben an die Beere, ihr mitgetheilt wird. Der Name Judenkirſche rührt nach Adelung davon her, daß die Frucht einem Kopfe mit einem rothen Schleier gleicht, dergleichen ehedem die Jüdinnen tragen mußten.

Allasia. Lour. ae. foem. Allaſie.

Von ἀλλᾶς, ἄντος, Bratwurſt. mit welcher die dicke, fleiſchige und lange Frucht viele Aehnlichkeit hat.

Alliarĭa (Erysĭmum) L. Knoblauchskraut.

Von Allium und zwar sativum L. Der Geruch dieſer Pflanze iſt knoblauchartig wenn man die Blätter reibt.

Allium. L. i. neutr. Lauch.

Eine Pflanze dieſes Namens kommt im Plin. (XIX. 6.) vor, welcher ſagt: A. und Cepae wären bei den Aegyptiern Gottheiten geweſen und man habe dort bei ihnen geſchworen. Das A. (sativum. L. der Knoblauch) war im Alterthume ein Sinnbild des kriegeriſchen Lebens und Sinnes, und man bediente ſich daher gegen einen zum Zank geneigten Menſchen ſprüchwörtlich des Ausdruckes: Allium ne edas; iß keinen Lauch. Bei den Griechen war er aber auch als ein Mittel gegen den Reiz der Liebe bekannt, weshalb er während der Skirophorien von den atheniensiſchen Frauen genoßen wurde, die bei dieſem der Minerva, Ceres und Proserpina zu Ehren gefeierten Feſte die Gemeinſchaft mit ihren Männern ſorgfältig meiden mußten. (Man vergl. Agnus castus). Jetzt iſt er in Griechenland und der Türkei, ſo wie ſelbſt unter uns, nur noch ein Gegenſtand des Aberglaubens, indem man ihm die Kraft beilegt, jeden, der ihn bei ſich trägt, gegen die feindlichen Einwirkungen der Herzen und böſen Geiſter zu ſchützen, welche Eigenſchaft ihm ſelbſt im alten Rom zugeſchrieben ward, und er daher vorzugsweiſe den Laren geheiligt blieb.

Die Herleitung des Wortes Allium iſt noch ungewiß. Einige leiten es ab von dem griechiſchen Worte Allesthai, hervorſpringen, weil ſie ſich durch Seitenſproſſen vermehrt, andere von ἀλέω, ich fliehe, weil viele dieſe Pflanze ihres übeln Geruches wegen zu vermeiden pflegen, und wieder andere aus dem Celtiſchen all, welches ſcharf, brennend bedeutet, wegen ſeines beißenden Geſchmacks. Was die deutſche Benennung Lauch betrifft, ſo könnte man glauben, daß ſolche von den hohlen Stengeln dieſes Gewächſes und alſo von Loch herrühre, wenn es nicht erwieſen wäre, daß Lauch ehedem nicht nur jedes Gemüſe, ſondern auch eine jede Pflanze überhaupt bedeutet habe. (Fortſetzung folgt).

Varietäten.

Bollweiler. Verzeichniß der Camellien, welche gegenwärtig in dem Garten der Herren Gebrüder **Baumann** daſelbſt kultivirt werden:

Camel. alba simplex.
„ — plena.
„ longifolia.
„ Aitonia.
„ Alnuts superbe.
„ Althcaeflora.
„ annemoneflora. W.
„ Wt. alba variabilis.
„ W. fl. roseo.
„ W. fl. purpureo.
„ Bukliana.
„ Chandleri.
„ corallina.
„ Decora.
„ dianthiflora.]
„ Dorsettii.
„ argentea.
„ flammea.
„ florida.
„ Kentii.
„ ornata.

Camel. Rawsiana. Roni.
„ staminea.
„ Woodsii.
„ atropurpurea.
„ atroviolacea.
„ Aucubaefolia.
„ Amelie de Baie.
„ Bruneliensis.
„ carnea.
„ cerassina.
„ Charles Auguste.
„ Charlemagne.
„ coccinea.
„ compacta.
„ concata.
„ conchiflora.
„ coronata.
„ colowret.
„ crassifolia.
„ crassinervis.
„ pressi, Eclipse.

(Fortſetzung folgt).

Gartenkunſt der Chineſen. Hr. Gilbert Slater von Layton in Eſſex ſendete vor mehreren Jahren Hrn. Jacob Main, einen geſchickten Gärtner, nach der Stadt Canton, um daſelbſt und in der Umgegend neue Abarten gefüllter Camelien zu ſammeln. Dieſer bemerkte über die Gartenkunſt in China Folgendes:

Der erſte Anblick der Küſte von China muß in dem ankommenden Reiſenden unſtreitig die vorgefaßte Meinung erregen, die chineſiſche Nation beſtehe blos aus Gärtnern. Das Land erſcheint als eine weit ausgebreitete, nach allen Richtungen mit ſchiffbaren Canälen durchſchnittene, mit hin und her zerſtreuten, ſteilen und ſchroffen Hügeln angenehm verzierte Ebene. Von den überhängenden Felſen beſchützt, ſteht hier eine Laube von Saſſafraslorbeer, und der cultivirte Abhang des andern Hügels iſt mit Citronenarten und andern Fruchtbäumen bedeckt, und von dem prächtigen Ceiba (Bombax Ceiba) überſchattet. Innerhalb der und um die grotesken, aber luftigen Wohnplätze, welche wie hängend über den flaggenreichen Ufern des Stromes ſich darſtellen, bemerkt man Magnolien, Ixoren und Chryſanthemum u. ſ. f. in Ueberfluß. Nach einer weitern intereſſanten Fahrt ſtromaufwärts erreicht man die Vorſtädte, und erſtaunt über die Menge von Blumen und blühenden Sträuchen, welche den Augen überall begegnen, und womit jedes Haus, jedes Fenſter, jeder Hof überfüllt iſt. (Fortſetzung folgt).

Die Lorbeer-Magnolie (Magnolia altissima) gehört unter die ſchönſten Bäume des ſüdlichen Amerikas. Die Spitzen dieſes Baumes bilden einen vollkommenen Kegel; ſeine dunkelgrünen Blätter ſcheinen von milchweißen Blumen verſilbert zu ſeyn. Die Blumen haben 8 und mehr Zoll im Durchmeſſer, und ſind großen Roſen ähnlich. Der Stamm wird 100 Fuß hoch, ja bisweilen noch höher und wächſt vollkommen gerade. Die Blumen ſitzen an den äußerſten Enden der Zweige, im Mittelpunkte eine Krone, welche dunkelgrüne, glänzende, eiförmig geſpitzte Blätter hat. Jede Blume beſitzt 15 bis 25 Kronenblätter, von einem dicken lederartigen Gewebe. Im Mittelpunkte derſelben ſteht der Stempel, groß und fleiſchartig; eine goldfarbige Narbe deckt ihn. Im Herbſte wird der Stempel ein karmeſinrother Zapfen, und enthält mehre korallenartige rothe Beeren.

Ausdünſtung von Pflanzen. Ausdünſtung geht in Pflanzen unter gewiſſen Umſtänden in einem unbegreiflichen Grade vor ſich. Durch die Verſuche des Dr. **Hates** iſt bekannt, daß eine Sonnenblume binnen 12 Stunden 1 Pfd. 14 Unzen durch Ausdünſtung verliert, und daß im Allgemeinen „von gleichen Oberflächen und in gleichen Zeiträumen ein Menſch 1 — 50, die Pflanze 1 — 165 oder 50: 15 verdunſten würde," und daß, unter übrigens gleichen Umſtänden, eine Sonnenblume 17 mal ſtärker dünſtet, als ein Menſch. Derſelbe genaue Beobachter fand, daß ein Kohlkopf in 12 Stunden 1 Pfd. 9 Unzen dünſtete, eine Pflanze von dem Zwergapfel (Paradise) in ihrem Topf 11 Unzen, und eine Limonenpflanze 8 Unzen. — **Guittard** giebt an, wie er gefunden habe, daß das Cornusmascula binnen 24 Stunden zweimal ihr eigenes Gewicht verdunſte, und Hr. **Knight** hat bemerkt, wie ein Weinſtock an einem heißen Tage mit ſolcher Schnelligkeit Feuchtigkeit ausgab, daß ein unter eins ſeiner Blätter geſtelltes Glas ſchnell mit Thau bedeckt war und in einer halben Stunde das Waſſer von dem Glaſe lief. In feuchtem Wetter iſt die Ausdünſtung geringer, in heißem oder trockenem Wetter am ſtärkſten. (Lindley's Guide.)

Neue Fenſter für Glashäuſer. In England fängt man an, die Treibhäuſer, ſtatt mit gewöhnlichem Glaſe, mit dem ſogenannten Frauenglaſe zu bedecken. Aber eine ziemlich myſteriöſe Notiz über ein Surrogat des Glaſes befindet ſich im Gardèner Magazine. Ein Freund, meldet daſelbſt ein Korreſpondent, führte mich in ſein Gewächshaus, wo er mich unter andern darauf aufmerkſam machte, daß an dem ganzen Gebäude kein Fuß breit Glas ſich befinde. Da ich nach Durchſichtigkeit und Färbung allenthalben nur Glas zu ſehen glaubte, ſo wußte ich nicht, was er mit dieſer Aeußerung ſagen wollte; bei näherer Unterſuchung fand ich jedoch, daß das ganze Haus ſtatt der Glasfenſter durch ein vegetabiliſches (?) aus Rußland kommendes Erzeugniß, das mein Freund Tout nannte, erhellt wurde. Hagel, ja ſelbſt Hammerſchläge, vermögen daſſelbe, ſeiner Ausſage nach, nicht zu zerbrechen; Feuer wirkt nicht darauf ein; und gleichwohl kann es mit der Scheere geſchnitten werden. Er hält es für wohlfeiler als Glas, und hat mir eine Scheibe davon zugeſchickt, die ſich wieder in verſchiedene dünnere Scheiben von einander ſchneiden läßt.

Hierbei eine Beilage: 1) Pelargonien-Verzeichniß des Hrn. J. C. Grimm und 2) Anzeige für Freunde der Obſtkunde betreffend.

Verzeichniß
von
# ſehr ſchönen engliſchen großblumigen Pelargonien
bei
Joh. Casp. Grimm.
Neudietendorfer Commiſſions-Handlung in Gotha.

	ggr.		ggr.		ggr.
Adonis	6	Hammerslayanum . . .	8	pulcherrimum	12
Antonianum	12	Husseyanum	6	Queenii	6
affine	5	Jenkinsonii	6	rugosum	8
Bischof of salisbury . .	6	inexprimable	5	rutilans	10
Brittannicum	6	Iphigenie	5	recurvifolium	10
coelestinum	8	Ladi Liverpool	6	salebrosum	8
corruscans	6	ladilobum	6	Schmithianum	6
cruentum	6	L'Honneur de L'Heern .	8	Schargenianum	16
Couctsiae (?)	12	Lambertii	6	spectabile purpureum . .	6
duschesse of Kent . . .	6	maculatum superbum . .	6	n. — atropurpureum	6
defiance	4	hilleri	8	splendidissimum . . .	16
expansum	5	Montblanc	4	spharocephaloides . .	4
eriophorum	6	Mungo Park	5	translucens	12
Ferronii	6	nervosum	6	villosum coccineum . .	5
General Riego	8	Octarwik	8	Vulkan	6
Gowerrii superbum . .	10	Palkii	8	Walnerianum	6
grande	6	princeps	8	ypsilanti	6
grandeus superb. . . .	6	Prinz Regent nov. . .	5	youngii	6
granditentatum magniflos.	8	psylophyllum	6		

Die ganz neuen davon ſind einjährige Pflanzen.

12 Stück der ſchönſten engliſchen gepuderten Aurikeln extra extra	3 thlr.	— ggr.
12 Stück ſchöne Holländiſche ſchöne Luiker-Aurikeln	— =	18 =
12 Stück Alcea rosea fl. pl., Steckroſe, Malve in 12 Sorten extra	— =	18 =
12 Stück Calceolarien in 12 Sorten	6 =	— =
12 Stück Camellien in 12 Sorten	12 =	— =
12 Stück Ericae in 12 Sorten	6 =	— =
12 Stück Fuchſien in 12 Sorten	3 =	— =

Die Zahlung, die ich Franco erwarte, geſchieht in preuß. Courant.

Joh. Casp. Grimm,
expedirendes Mitglied des thüringiſchen Gartenbau-Vereins in Gotha und
Mitglied der Gartenbau-Geſellſchaft zu Frauendorf in Baiern.

Anzeige für Freunde der Obſtkunde.

Von dem deutſchen Obſtcabinet, welches unter Aufſicht und Mitwirkung des thüringer Gartenbau-Vereins von Unterzeichnetem herausgegeben wird, ſind die 3te bis 6te Lieferung erſchienen und können gegen portofreie Einſendung des Betrags bezogen werden.

Die 3te und 4te Lieferung enthalten jede 24 nach von Truchſeß Syſtem benannte und geordnete, aus Papiermaché geformte Kirſchenſorten, und koſten nebſt gedrucktem Verzeichniß, in ein Kiſtchen gut verpackt, jede 4 Thaler preuß. Courant.

Lieferung 5 und 6 bringen, nach Diel's ſyſtematiſchen Beſchreibungen, jede 6 Aepfel- und 6 Birnenſorten, ebenfalls aus Papiermaché geformt, zum Preis von 3 Thaler preuß. Courant für die Lieferung.

Die gelungene, naturgetreue Nachbildung dieſer aus Papiermaché verfertigten Früchte, welche viel größeren Schwierigkeiten unterliegt, als das bei den zwei erſten Lieferungen der Kernobſtfrüchte angewendete Abformen in Wachs, wird die geringe Erhöhung des Preiſes der Kirſchenſorten wohl hinreichend entſchuldigen.

Gotha, den 1ten März 1833.

Johann Georg Dittrich,

Küchenmeiſter Ihrer Hoheit der Frau Herzogin von Sachſen-Gotha
und Altenburg.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto-Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-

Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. VIII. Weißenſee, (in Thüringen). Mai 1833. VI. Jahrg.

Beſchreibung und Cultur ſchönblühender Glas- haus- und Stubenpflanzen.

Magnolia discolor Vent. Die zweifarbige Magnolia. Magnolia obovata Willd. Mag. purpurea Rus.

Gehört zur 13. Cl. 7. Ordn. Polyandria Polygynia des Linn. Syſt. und zur Familie Magnoliaceae des natürl. Syſt.

Dieſe ſchöne, aus Japan ſtammende Pflanze, welche ſowohl in ihrem Vaterlande, als auch in China in den Gärten kultivirt wird, kam im Jahre 1790 zuerſt nach England. Sie bildet einen Strauch mit langen, gebogenen, aufrecht-abſtehenden Aeſten; die Rinde iſt bräunlich und glatt. Die Blätter ſind abſtehend auf kurzen, 4 — 6 Linien langen, behaarten Blattſtielen, oval oder verkehrt-eiförmig, ganzrandig, nach beiden Seiten zugeſpitzt, in der Jugend völlig behaart, ſpäter oben faſt glatt und nur unten an den Nerven und am Rande weichhaarig; die größern ſind ungefähr 4 Zoll lang und 2 1/2 — 3 Zoll breit. Die großen Blüthen erſcheinen einzeln auf kurzen, aufrechten, ſtarken, weichhaarigen Blüthenſtielen. Der Kelch iſt aus 3 oder auch 5 lanzettförmigen, glatten, röthlichen, zurückgebogenen Blättchen gebildet. Die glockenförmige Blumenkrone beſteht aus 3 äußern u. 3 innern, aufrechten, länglich-keilförmigen, ſtumpfen, fleiſchigen Blumenblättern, die auf der innern Seite weiß, auf der äußern purpurroth gefärbt ſind. Die zahlreichen Staubgefäße ſtehen dicht gedrängt um den untern Theil des verlängerten Fruchtbodens; die Staubfäden ſind kurz, kaum 2 Linien lang, verdickt, roth, und tragen an den Seiten die der ganzen Länge nach angewachſenen Staubbeutel mit weißem Samenſtaube erfüllt. Die Griffel bilden oberhalb der Staubgefäße einen kleinen Zapfen aus dicht übereinanderliegenden eiförmigen, auf dem Rücken gewölbten, einfächrigen Fruchtknoten, die ſich in eine zugeſpitzte, röthliche Narbe endigen. Die Blüthezeit iſt bei uns, je nachdem die Pflanze im Gewächshauſe oder im Freien kultivirt wird, verſchieden; im erſtern Falle iſt ſie in den Monaten März und April, im letztern im Mai und Juni. (Beſ. f.)

Ueber die gefüllten Dahlien oder Georginen.

(Mitgetheilt von Hrn. Chr. Deegen aus Köſtritz.) Fortſetzung.

Mit der Acquiſition der aus Irland und England zu uns gekommenen ſogenannten Anemonen-Georgine haben wir zugleich eine neue intereſſante Form erlangt, die ein weites Feld zu Verſuchen jeder Art eröffnet und deren Zartheit der Blätter und Färbung uns zu Erlangung der ausgeſuchteſten und feinſten Zeichnungen, nächſt veränderter Formen, die beſte Ausſicht giebt. Durch vorzügliche Zeichnungen dürfte ſie dann den wundervollen Formenſchönheiten unſerer Georginen an die Seite geſtellt werden können. Vielleicht erlangen auch die Blumen der Anemonen-Georgine durch die Kultur in unſern klimatlichen Verhältniſſen mehr Conſiſtenz, da die Blumen jener aus dem Nebellande zu uns gekommenen Exemplare gegen Sonnenhitze und Regen gleich empfindlich ſind.

Die oben angegebenen neuen und merkwürdigen Formen, eben ſo die Färbungen: reinfarbig, von tiefem Schwarz, durch alle denkbaren, der Georgine eignen Farben-Nüançen hindurch, bis zu weiß und mehrfarbig in bunten, ſanft übergehenden und abſtechenden Zeichnungen auf dichtgefüllten Blumen, ſind in dem Sortiment meines Verzeichniſſes aufgeführt, welches ich ebenfalls Blumenfreunden hier anliegend ergebenſt überreiche.

Zu der äußerſt angenehmen und belohnenden Selbſterziehung gefüllter Sorten und neuer Varietäten aus Samen enthält mein Samen-Verzeichniß die dazu tauglichſten Sorten in beliebiger Farbenauswahl. (Beſchl. f.)

Beſchreibung und Cultur einiger noch nicht allgemein bekannten und einiger neuen Zierpflanzen.

Mitgetheilt von Hrn. J. W. Boſſe, herzogl. oldenburgiſchem Hofgärtner zu Oldenburg.

(Fortſetzung.)

20) Francoa sonchifolia. Spreng. Gänſediſtelblättrige Francoa. Eine ſehr ſchöne mehrjährige Zierpflanze aus Chili, welche hier im großherzogl. Garten zu Oldenburg ſowohl im Glashauſe im Topfe, als auch auf einer Rabatte im Freien (wohin ſie im Mai gepflanzt wird) im Auguſt bis Herbſt blühet. Die Gattung Francoa hat einen obern, 4ſpaltigen Kelch, 4 Blumenblätter, 4 Nektardrüſen und 4 gekielte, vielſamige Capſeln. Sie gehört in die 4. Ord. der 8. Kl. nach Linné und nach Sprengel muthmaßlich zur Familie der Veilchenart-Pflanzen (Violeae). — Der 4 bis 5″ hohe, dicht beblätterte Stengel dieſer Species iſt, gleich der ganzen Pflanze, dicht mit weichen, kurzen Härchen bekleidet, und treibt aus der Spitze einen auf-

rechten, meiſtens nackten, etwa 3′ hohen Blüthenſtengel, welcher eine Endtraube und 3 — 4, entfernte, geſtielte Nebentrauben hervorbringt. Die ſehr abſtehenden Blätter ſind 5 — 8″ lang, leierförmig, gefiedert, mit rundlichen, ſtumpfen, herablaufenden, kaum gezähnten Seitenlappen, und ſehr großen, herz-eiförmigen, mehr oder minder ausgeſchweiften, undeutlich gezähnten, ſtumpf gerundeten Endlappen; die Blattſtiele breit geohrlappt. Die Blume ſehr ſchön, kurz geſtielt, in einfacher, dichter Traube, mit lanzettförmigen Brakteen; die Kronblätter länglich, 8‴ lang, ſtumpf, roſenroth, nach der Baſis zu mit einem dunkelpurpurrothen Male geziert.

(Beſchluß folgt.)

Ueber die Kultur der Camellien.

(Vom Kunſt- und Handelsgärtner Hrn. Fr. Jakob Seidel in Dresden.)

Es iſt ſchon viel über die Pflege der ſo beliebten Camellien geſchrieben worden. Da ich jedoch ſeit 20 Jahren dieſe Pflanzen mit Glück kultivire und jährlich ohngefähr 10000 junge davon aus Stecklingen ziehe, ſo glaube ich, es wird manchen Blumenliebhabern angenehm ſein, wenn ich meine Erfahrungen über zweckmäßige Behandlung derſelben, ſo wie über ihre Vermehrung durch dieſe Blätter bekannt mache. Die Camellia japonica, von der ich jetzt 160 Arten beſitze, empfiehlt ſich nicht allein durch ihre prächtigen Blumen und durch ihren ſchönen Habitus, ſondern auch dadurch, daß ihre Behandlung äußerſt leicht iſt, als wodurch es auch denen, die keine Gewächshäuſer haben und ſich blos mit einer Stube oder einem Doppelfenſter begnügen müſſen, leicht möglich wird, ſie zu ihrer größten Vollkommenheit zu ziehen. Ich nehme zu meinen Camellien reine Torf-Erde, welche jedoch einige Monate an der Luft gelegen haben muß, damit ſie die Säure, welche dieſer Erde eigen iſt, verliert. Dieſe menge ich mit einem Drittheil Quarzſand, am beſten mit weißem, weil der gelbe Eiſentheile enthält. Doch ſind die Camellien nicht ſo zart, daß dies einen beträchtlichen Unterſchied verurſachen ſollte. Die beſte Zeit zum Verſetzen iſt im Monat Mai, wo der erſte Trieb beendigt ſein ſoll. Es iſt gut, wenn ſie alle Jahre verſetzt werden. Doch iſt dies auch nicht unumgänglich nöthig. Ja es bringen die Pflanzen, die ihre Erde ſtark ausgewurzelt haben, oft mehr und größere Blumen als ſolche, die friſche Nahrung bekommen und daher mehr in die Zweige treiben. Was auch einige ſehr gute Cultivateurs, wie z. B. Sweet und andere Engländer, ſagen mögen, daß es ſchädlich ſei, die Wurzeln zu beſchneiden: ich nehme ſie mit einem ſcharfen Meſſer ſowohl an den Seiten, als auch unten etwas ab, denn häufige Erfahrungen haben mich belehrt, daß, wenn man dies unterläßt, die Pflanzen alsdann viel ſchwerer in die neue Erde einwurzeln, ja ſogar Fäulniß in den alten Wurzeln entſtehe. Die Größe der Töpfe hängt vom Geſundheitszuſtande der Pflanze ab. Iſt die Pflanze vollkommen geſund, ſo kann der neue Topf wohl 3 Zoll im Durchmeſſer größer ſein, da hingegen bei einer kranken Pflanze der Topf oft kleiner gegeben werden muß, als der war, worin ſie zuvor ſtand; denn der Ueberfluß von Nahrung, welchen die Pflanze nicht aufnehmen kann, verſauert, und macht, daß ſie immer kränklicher wird.

(Fortſetzung folgt.)

Rosa bracteata. Maria Leonida.

Sie ſtammt von der künſtlichen Beſtaubung der Rosa bracteata mit der gelben Theeroſe her. Bevor die ſchönen, großen, gefüllten, wohlriechenden, weißen, in der Mitte etwas gelblichen Blumen erſcheinen, hat der ſehr kräftig wachſende Strauch ganz das Ausſehen der gemeinen Rosa bracteata, und zeichnet ſich daher auch durch beſonders ſchönes Laub aus. Sie hat noch den großen Vorzug, daß ſie, wie die Theeroſe, mehreremal im Jahre blüht. Von Duisburg ſind von dieſer ausgezeichneten Baſtardroſe noch gute, wurzelächte Exemplare zu 1 1/2 Thlr. zu beziehen.

Duisburg am Rhein. **Wilh. Keller.**

Rafflesia Arnoldi.

Nachträglich bemerken wir über die in No. 12 u. 13 der Blumenz. 1832 erwähnte Rafflesia Arnoldi noch Folgendes:

Blum entdeckte auf einer kleinen Inſel von Java eine zweite Gattung, deren Blüthe 2 Fuß breit war; die Einwohner nennen ſie Patma, der botaniſche Name derſelben iſt Rafflesia Patma. — Eine andere Gattung entdeckte Blum in der Provinz Buitemzorg im öſtlichen Java, die auf einer Höhe von 150 Fuß über der Meeresfläche wächſt; ſie hat den Namen Brugmansia Zipalii erhalten. — Der Dr. Horsfield hat von einer kleineren Gattung derſelben Kunde gegeben, die nur 3 Zoll breit war.

Alle dieſe ſeltſamen Pflanzen gleichen ſich in mehrern Punkten: ſie haben keine eigenen Wurzeln, ſondern ziehen ihre Nahrung aus andern Pflanzen, auf denen ſie wachſen; demnächſt haben ſie auch keine äußern Blätter, die Knospen ſind vielmehr in purpurfarbene oder braune Schalen eingehüllt, wie die Blüthen unſerer Bäume. Wie die Champignons ſcheinen ſie aus der Rinde des cissus oder eines andern Baumes hervorzukommen. Dieſe wunderbaren Blumen, welche 6 — 9 Fuß im Umfang haben, finden im Pflanzenreiche keine andere Aehnlichkeit, als die mit den Pilzen, von denen einige Gattungen ſo klein ſind, daß ſie kaum mit bloßem Auge wahrgenommen werden können.

(Beſchluß folgt.)

Aus der Revue horticole

Ueber die Kultur der Pelargonien.

(Von Poiteau).

Die Gattung Geranium bietet gewiß dem Geſchmacke der Blumenfreunde die meiſten Arten mit ſchönen Blumen dar. Lange Zeit hindurch zierten die Arten inquinans und zonale mit dem Laurus Finus, Oleander und den Granatbäumen allein unſre Orangeriehäuſer; viel ſpäter kamen das triste, odoratissimum, peltatum, und noch ſpäter die Arten fulgidum, lanceolatum, candidissimum, bicolor, tricolor und einige andre hinzu. Gegen das Ende des 18ten Jahrhunderts fand man in den Gärten der Blumenfreunde keine größere Anzahl davon, obwohl die Botaniker eine weit größere Zahl kannten. Nach dem franzöſiſchen Botaniker l'Héritier hat man alle Geranien, geſtützt auf die Zahl und Vollkommenheit der Staubfäd- ; in 3 Abtheilungen getheilt; ſo hat man die Arten mit 10 fruchtbaren Staubfäden Geranium genannt; die mit 5 fruchtbaren und 5 unfruchtbaren Staubfäden bilden die Gattung Erodium, und endlich diejenigen, welche nur 7 Staubfäden, und zwar 4 fruchtbare und 3 unfruchtbare haben, machen die Gattung Pelargonium aus, die viel zahlreicher an Arten iſt, als die beiden andern und die durch ihre Größe, Geſtalt und Verſchiedenheit der Farben ausgezeichnetſten Blumen enthält. Mit dieſer letzten Gattung beſchäftigen wir uns hier.

Der im Jahre 1826 erſchienene Hortus Britannicus von Sweet enthält 402 Arten oder Hybriden von Pelargonien, ohne die Zahl der Varietäten mitzuzählen.

Die Arten ſind faſt alle am Vorgebirge der guten Hoffnung einheimiſch; die Hybriden und Varietäten ſind größtentheils in den Gärten durch künſtliche wechſelſeitige Befruchtungen oder durch günſtige Zufälligkeiten entſtanden. Unter den Hybriden findet man die ſchönſten Blumen und täglich erhält man noch neuere ſchönere; die älteſten machen allmählich den neueſten vorzüglichern Platz, ſo daß die vor 20 — 30 Jahren ſehr geſuchten Pelargonien, welche man damals recht ſchön fand, von den Liebhabern vernachläſſigt und ihre Namen faſt vergeſſen ſind. Unter den Blumiſten von Paris, welche die ſchönſten Pelargonien mit Vorliebe kultiviren und vermehren, iſt Hr. Lemon derjenige, welcher ſich am meiſten dafür intereſſirt, deſſen Verzeichniſſe die größte Anzahl enthalten, und der zugleich über ihren Werth am eigenſinnigſten urtheilt. Er erhält nicht nur ſehr ſchöne Sorten aus ſeinem eignen Samenbeete, ſondern er iſt auch ſtets bemüht, anderswoher ſich ſolche zu verſchaffen. Obgleich ſeine Sammlung nicht jedes alte oder gewöhnliche Pelargonium enthält, ſo iſt ſie doch weit zahlreicher, als irgend eine andere dieſer Art. Man kann aber nichts Herrlicheres ſehen, als dieſe, mit Geſchmack auf Stellagen geordnete Sammlung zur Zeit der Blüthe. Die Zierlichkeit, die Pracht u. die Verſchiedenheit der Blumen bilden das bezauberndſte Gemälde, das man aus Blumen zuſammenzuſetzen vermag.

(Fortſetzung folgt).

Neue oder wenig bekannte Pflanzen.

Senecio venuſtus. Willd. Dieſe Pflanze ſtammt vom Cap. Der Stengel iſt faſt holzig, aufrecht, 2 — 4 Fuß hoch, glatt, am obern Theil äſtig und bildet leicht eine gerundete Krone. Die Blätter ſind lanzettförmig, gezähnt, gefiedert, mit linien-lanzettförmigen, gezähnten, glatten Ausſchnitten, die Mittelrippe unten mit einigen kleinen Stacheln. Die Aeſte theilen ſich oben in lange, nackte Stengel, die ſich in ſtrahlenförmigen, zollbreiten Blumen mit gelber Scheibe und bei einer Varietät mit zartroſafarbigem, bei einer andern mit lebhaftroſaviolettem Strahle endigen.

Man findet dieſe Pflanze nur erſt im königl. Garten, aber wegen ihrer leichten Vermehrung durch Samen und Stecklinge wird ſie ſich bald auf den Blumenbeeten verbreiten, wo ſie im Frühlinge gewiß eine ſchöne Anſicht gewährt. Wenn man ſie zur rechten Zeit beſchneidet, ſo kann man ſie ſicher im Herbſte wieder blühend haben. Ich glaube, die beſte Methode, ſie ſchön zu erhalten, iſt: ſie im erſten Jahre in Töpfe zu ſetzen, in der Orangerie zu durchwintern, und im folgenden Frühjahre in's freie Land zu ſetzen. (Fortſ. folgt.)

Verſuchte Beantwortung.

Ueber die in der Blumenzeitung Nr. 20 vom v. J. aufgegebene Frage: welche Pflanzen wohl am beſten und zweckmäßigſten zur Bekleidung einer Laube dienen? erlaube ich mir, eine Pflanze, welche, wenn auch nicht alle, doch die meiſten vorgeſchriebenen Bedingungen erfüllt, vorzuſchlagen; es iſt nämlich Lycium barbarum. Dieſe Pflanze bedeckt, wenn ſie gehörig angebunden u. jedes Frühjahr zurückgeſchnitten, oder eigentlich, die im vorigen Jahre gemachten Triebe auf 6 bis 12 Augen eingeſtutzt, überdies den Sommer hindurch ordentlich behandelt wird, in einigen Jahren eine Laube vollkommen.

Sonderburg. A. S. v. Wernich.

Varietäten.

Berlin. Im königl. botaniſchen Garten blühten in den letztvergangenen Monaten: Caladium princeps, Hortor. — Kunthia xalapensis, H. ber. — Aloe caesia β. elatior, Salm. — A. frutescens, Salm. — A. principis, Hav. — Crocus imperati, Tenore. — Prescotia plantaginea, Lindl. — Cymbidium sinense, W. — Oncidium tetrapetalum, W. — Euphorbia atropurp., Brouss. — Protea mellifera, Thunb. — Grevillea rosmarinifol., Cunningh. — Banksia Cunninghami, Sieb. — B. Lamberti, H. angl. — B. marginata, Cav. — B. media, R. B. — Dryandra armata, R. B. — D. formosa, R. B. — D. longissima. — Begonia vitifol., Schott. — Thunbergia coccinea, Wallich. — Gesnera elongata, Humb. — Buddleja heterophylla, Bot. Mag. — Andromeda buxifolia, Lam. — Epacris paludosa, R. B. — Cunonia capensis, L. — Enkianthus quinqueflorus, Lour. — Mehrere Arten Ericae. (Fortſetzung folgt.)

Berlin. Herr Handelsgärtner Limprecht hat im vergangenen Herbſte nicht weniger als 30,000 Hyacinthen in mehr als 10,000 Töpfen ausgepflanzt.

Wien, den 25. April 1833. In den Gewächshäuſern des k. k. Hofgartens zu Schönbrunn blühen jetzt folgende Gewächſe: Abutilon roseum. (Link et Otto). Aus Braſilien. Malvaceae. Monadelphia, Polyandria. — Aloe tuberculata. (Haworth.) Vom Vorgebirg der guten Hoffnung. Hemerocallideae. Hexandria, Monogynia. — Aloe virens. (Haworth.) Vom Vorgebirg d. g. Hoffn. ditto. ditto. — Banksia spinulosa. (Rob. Brown.) Aus Neuholland. Proteaceae. Tetrandria, Monogynia. — Begonia malabarica. (Bojer.) Von Malabar. Begoniaceae. Monoecia, Polyandria. — Elaeodendron australe. (Ventenat.) Aus Neuholland. Celastrinae. Pentandria, Monogynia. — Erica pubescens. (Hortorum). Vom Vorgeb. d. g. Hoffn. Ericeae. Octandria, Monogynia. — Erica sparsa. (Hortorum.) dto. dto. dto. — Kennedya monophylla. (Ventenat.) Aus Neuholland. Leguminosae. Diadelphia, Decandria. — Melasphaerula graminea. (De Candolle.) Vom Vorgeb. d. g. Hoffn. Irideae. Triandria, Monogynia. — Pomaderris lanigera. (Sims.) Aus Neuholland. Rhamneae. Pentandria, Monogynia. — Rhipsalis funalis. (Salm.) Aus Südamerika. Cacteae. Icosandria, Monogynia. — Rulingia pannosa. (Rob. Brown.) Byttneriaceae. Pentandria, Monogynia.

Petersburg. Die kaiſerl. ruſſiſche Akademie der Wiſſenſchaften hat im Laufe des Jahres 1832 ihre Muſeen mit den reichhaltigen Herbarien der Floren von Taurien, der chineſiſchen Mongoley und Nordchina's, des Altaigebirges und der Umgegend von Orenburg bereichert. Durch die botaniſche Reiſe des Hrn. Bunge iſt die Akademie mit 400 größtentheils neuen Pflanzengattungen, durch die des Hrn. Dr. Heft mit einem Herbarium kaukaſiſcher Pflanzen vermehrt worden. Für die Kryptogamienſammlungen iſt eine von Drummond während der bekannten Expedition des berühmten Nordpolfahrers Capitän Franklin zu Stande gebrachte Sammlung nordamerikaniſcher Mooſe angekauft worden. Von den Doubletten ſind mehrere den bekannteſten Pflanzenforſchern in den verſchiedenen Erdtheilen geſandt, und zu gleicher Zeit ein Tauſchſyſtem eröffnet worden.

Nantes. Am 30. September 1832 fand das jährliche Blumenfeſt der Gartenbau-Geſellſchaft zu Nantes ſtatt. Dieſes Feſt beſteht in einer öffentlichen Ausſtellung von den Erzeugniſſen des Gartenbaues, von Zier- und Nutzpflanzen, und in einer öffentlichen Verſammlung der Geſellſchaftsmitglieder unter dem Schutze der Stadtbehörden, wo der Präfekt den Vorſitz hat. Die Kolonnaden der Börſe und der ſchöne Platz vor denſelben ſind gewöhnlich der Ort der Ausſtellung. Die verſchiedenen Verhandlungen über Gärtnerei, über die Fortſchritte und Beſtrebungen in dieſer Kunſt werden hier gehalten, hier werden die Preiſe beim Klange einer harmoniſchen Muſik ausgetheilt, und eine große Menge Leute ſtrömt herbei, um die Vereinigung der ſchönſten Blumen, Früchte und Gemüſe, welche nicht allein die Gartenfreunde der Stadt, ſondern des ganzen Departements zuſammengebracht haben, zu bewundern. Seit ihrer Entſtehung ſchreitet die Gartenbau-Geſellſchaft zu Nantes immer vorwärts; dieſe letzte Ausſtellung war viel zahlreicher und prächtiger, als irgend eine vorhergegangene. Es ſind diesmal 8 Preiſe und 3 Acceſſits ertheilt worden. Wenn ähnliche Anſtalten und Einrichtungen in Frankreich ſich vermehren, ſo wird der Geſchmack an der Gärtnerei gewiß ſchneller ausgebildet werden.

Auszug aus dem Briefe eines deutſchen Botanikers. „Der Gelehrte, deſſen Schreiben Sie in Ihrem Nachwort erwähnen, hat völlig recht, daß ein Syſtem der jetzigen Roſen ein Problem ſei. Ich möchte hinzufügen: Syſteme gehörten eigentlich mehr für die Botanik als für die Blumiſterei, denn wo der Menſch gleichſam als Gehülfe zugleich mit der Natur arbeitet, und ſo zu ſagen ihre Farben mit mengen und auftragen hilft, da ſind die Varietäten unendlich, und nur das Endliche, Abgeſchloſſene läßt ſich in ein Syſtem bringen. Die getreue Natur aber hat abgeſchloſſen. Ein Syſtem würde erfordern z. B. daß bei zehn Eigenſchaften, die ich mir merke, die erſte der 30 (oder 50) Klaſſen nur eins oder zwei dieſer Kennzeichen hätte, und ſo progreſſiv in den verſchiedenſten Miſchungen der zehn Charaktere fort, bis die 50ſte Klaſſe ſie alle vereinigte. Dies iſt meine Anſicht. Ein Syſtem kommt mir vor wie ein Baum, der erſt einen einfachen Stamm treibt (z. B. Nr. 1 Rosa canina als Mutter), dann einige Aeſte; aus dieſen viele Zweige; endlich aus letzteren zahlloſe Blätter. Aber da alljährlich noch ſo viele dem Blumiſten hochwichtige, dem trocknen Botaniker aber völlig gleichgültige Miſchungen und Spielarten von Roſen erzeugt werden, ſo iſt hier an keinen Abſchluß und folglich an kein Syſtem zu denken.

Heiligenſtadt, den 3. Mai. An den **Volkamerien** gewann ich große Dolden, indem ich die bis zu ¼ Elle abgeſchnittenen Stöcke in einen ſehr großen Topf ſetzte, demſelben oben auf einen Zoll hoch friſchen Schafdünger, zu einem dicken Brei aufgelöſt, gab und dieſen mit Erde bedeckte. Hierauf ließ ich den Stock unausgeſetzt hinter dem Fenſter gegen Oſten ſtehen und gab demſelben viel Waſſer. Die auf dieſe Weiſe behandelten Stöcke waren über 1¼ Elle hoch, ſtark und kräftig. Die Blätter ½ Elle lang und ¼ Elle breit. Die Dolden hatten 3½ Zoll im Durchmeſſer und 150 Blumen. — Das Pfropfen der Cacten auf die Stelle eines friſch abgeſchnittenen Triebes, oder Stachelbüſchels, weil hier jedesmal ein triebfähiges Auge ſitzt, habe ich gleichzeitig mit Herrn M. (ſiehe Blumenzeitung Jahrgang V. Nro. 21) bewährt gefunden.

Böttner.

Bollweiler. (Fortſetzung). Verzeichniß der **Camellien**, welche gegenwärtig in dem Garten der Herren Gebrüder **Baumann** daſelbſt kultivirt werden.

C. Egerstonia.
- Elegans.
- Bedfortia.
- Whitini!!
- Elphinstonia.
- expansa.
- fascicularis.
- fimbriata.

C. flavida.
- Gallica alba.
- fulgens.
- gigantea.
- gloria mundi.
- Grussonia.
- grandifl. simpl.
- grandissima.

C. Hallesia.
- Henriette.
- heptangularis.
- heterophylla.
- hexangularis.
- humilis.
- imbricata!!!
- incarnata.

(Fortſetzung folgt).

Weimar. Am 6. Mai beginnt im Locale des Schüzzenhauſes die vom Vereine für Blumiſtik und Gartenbau in **Weimar** veranſtaltete Blumenausſtellung, und dauert bis zum 8. Mai. Dieſe Ausſtellung verdient auch dieſes Jahr wieder, ihrer ſeltenen und höchſt ausgezeichneten, ſchönblühenden Blumen wegen, die Aufmerkſamkeit aller Blumenfreunde, und behalten wir uns vor, in einer der nächſten Numern der Blumenzeitung von dieſer außerordentlich reichen und geſchmackvoll geordneten Ausſtellung mitzutheilen.

Duisburg, am Rhein. Von der ſchönen Roſe Maria Leonida ſind bei Hrn. Kaufmann **Wilhelm Keller** noch 12 Exemplare zu 1½ Thlr. vorräthig. Auch kann das neue Roſen-Verzeichniß des Hrn. Kaufm. Wilhelm **Keller** hieſelbſt (ſiehe Blumen-Zeitung No. III, dieſes Jahres), aus 1068 Sorten beſtehend, im Wege des Buchhandels durch die **Bädeker**ſche Buchhandlung in Eſſen für 12 ggr. bezogen werden.

Weißenſee, den 6. Mai. Blumenfreunde hieſiger Gegend müſſen wir auf die ſich immer höher hebende Aurikelflor des Herrn Poſtmeiſters Heidemann hieſelbſt aufmerkſam machen. In der diesjährigen Flor haben wir über 2000 höchſt ausgezeichnete Numerblumen bemerkt, unter welchen ſich Exemplare finden, die durch die Größe der Blumen und ihre Farbenpracht den Blick des Beſchauers feſſeln. Der Herr Poſtmeiſter Heidemann wird wahrſcheinlich die Güte haben und uns in einer der nächſten Numern der Blumenzeitung darüber einen ausführlichen Bericht mittheilen.

Auf der **Pfaueninſel** bei **Potsdam** hat als eine nicht geringe Seltenheit Pandanus utilis Bory geblüht und wird Früchte hervorbringen. Dies Exemplar kam 1804 aus dem Schönbrunner Garten bei Wien als große Seltenheit nach dem berliner botan. Garten und 1832 nach der Pfaueninſel. Es iſt eins der ſchönſten und größten Exemplare der deutſchen, franzöſiſchen und engliſchen Gärten. Vor mehreren Jahren blühte dieſelbe Art in Wien und im vorigen Jahre zu Belvedere bei Weimar.

In **Berlin** im königl. Garten zu Monbijou blühten im März Camellia fulgens und rosaeflora.

In **Pankow** bei Berlin blühte im Monat März bei Herrn **Kuhfeld** Camellia anemoneflora striata.

Um gefüllte Balſaminen zu erhalten, nehme man die von den ſchönſten Blüthen gewonnenen Samen, und wähle unter denſelben jene, welche die kleinſten oder mittlern, aber vollkommen runden Körner ſind, verwerfe dagegen die größten, weil dieſe gewöhnlich nur einfache oder halbgefüllte Blumen geben.

(Gegenſtück zur chineſiſchen Luftpflanze in Deutſchland.) Eine der chineſiſchen Luftpflanze (Epidendron flos aeris), die zu ihrem Fortkommen der Erde nicht bedarf, blos aus der Luft nährende Theile einzieht und deswegen von den Chineſen an die Decken der Zimmer aufgehängt wird, ähnliche Saftpflanze findet man auf dem Rieſengebirge in Deutſchland: es iſt die Rhodiola rosea Linn. Sie lebt in den Zimmern der Gebirgsbewohner, am Faden hängend, Jahr und Tag, und blüht.

Bibliographiſche Notiz über Blumiſtik.

Allgemeine Gartenzeitung. Eine Zeitſchrift für Gärtnerei und alle damit in Verbindung ſtehende Wiſſenſchaften, in Verbinduug mit den tüchtigſten Gärtnern und Botanikern des In- und Auslandes, herausgeben von **Friedr. Otto** (königl. preuß. Garten-Direktor und Inſpektor des bot. Gartens zu Berlin) und **Albert Dietrich** (Dr. der Philoſophie und Lehrer an der Gärtner-Lehranſtalt zu Berlin.) Nauckſche Buchhandlang in Berlin. 4 ⁊c.

Unter obigem Titel erſcheint eine Zeitſchrift für Gärtnerei und für alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften, in der alles Neue, für Gartenkunſt und Gartenbotanik Intereſſe Habende aufgeführt, kurze Beſchreibung von neuen Zierpflanzen gegeben, und das Wichtigſte aus engliſchen und franzöſiſchen Gartenſchriften, ſowie aus den erſchienenen botan. Werken des Auslandes aufgenommen und, wo es nöthig iſt, durch Kupfer oder Holzſchnitte erläutert werden ſoll. Der Jahrgang wird 52 Nro. oder Bogen in gr. 4 umfaſſen.

Die Namen der Herren Herausgeber, ſowie ihre Stellung an der Spitze berühmter Garten-Inſtitute und die nähere Bekanntſchaft derſelben mit den ausgezeichnetſten Gärtnern und Botanikern, ſichern dieſer Zeitſchrift im Voraus einen bleibenden Werth, der ſich auch bereits in der erſten Nro. bekundet.

Hierbei zwei Beilagen: 1) Monatliche Berichte aus Weimar, 2) Gemeinnuͤtzige Mittheilungen ⁊c.

No. I. April. 1833.

Monatliche Berichte und Mittheilungen aus dem Verein für Blumiſtik und Gartenbau in Weimar.

Redacteur: Dr. Weiſſenborn in Weimar.

Ueber Acclimatiſirung exotiſcher Zier-Pflanzen.

Vom Herrn Garten-Conducteur L. Sckell zu Belvedere.

Schon oft wurde ich von hier durchreiſenden Gärtnern oder Blumenliebhabern gefragt, woher es käme, daß man noch wenig von jenen ſchönen exotiſchen Sträuchen, wie z. B. Kalmien, Azaleen, Andromeden, Rhododendren, Vaccinien, Clethren u. ſ. w. in den Gärten hieſiger Gegend finde, die doch an andern nicht ſehr entfernten Orten *) in ſo üppiger Schönheit im freien Lande vegetirten. Auch mir fiel es ſehr auf, als ich im Jahre 1820, aus England kommend, eine Menge Pflanzen fand, welche nicht im freien Lande ſtanden, und die ich in den Niederlanden, ſelbſt noch in und um Frankfurt a. M., in vollkommener Schönheit geſehen hatte; gewahrte aber bald, daß es hier nicht ſo leicht wie in jenen Gegenden ſei, mehrere jener Pflanzen im freien Lande zu kultiviren, ſondern daß man mit dem Klima, hauptſächlich aber mit dem Boden zu kämpfen habe, beſonders, da eine den meiſten dieſer Pflanzen zuſagende Erde in hieſiger Gegend gar nicht oder wenigſtens ſelten zu finden iſt. Doch endlich gelang es dem raſtloſen Eifer des verewigten Großherzogs **Carl Auguſt**, durch fortwährend fortgeſetzte, oft mit vielen Unkoſten verbundene Verſuche in den Großherzogl. Gärten zu Weimar, Belvedere und Jena einige Gruppen dieſer Gewächſe im freien Lande zum Gedeihen zu bringen.

Da ich nun aber zu der feſten Ueberzeugung gelangt bin, daß wir einen großen Theil jener ausländiſchen Gewächſe, die den Gärten eines großen Theils unſers Deutſchlands, wie den Gärten der Niederlande, Englands und Frankreichs zur beſondern Zierde gereichen, auch in unſern Gärten mit gutem Erfolg und oft mit geringen Koſten kultiviren können, ſo erlaube ich mir deswegen, was ich bei deren Kultur erfahren habe, denjenigen verehrlichen Mitgliedern des Vereins für Blumiſtik und Gartenbau, die noch nicht mit deren Behandlung bekannt ſein ſollten, und ſolche doch in ihren Gärten zu haben wünſchten, in dem Blatte unſers Vereins mitzutheilen, erſuche aber zugleich diejenigen verehrlichen Mitglieder, die ſich ſchon mehr damit beſchäftigt und mehr Erfahrungen gemacht haben dürften, als ich, meine Anſichten zu prüfen und ihre Erfahrungen ebenfalls gütigſt mitzutheilen, weil wir nur dadurch am ſicherſten und ſchnellſten zu dem Ziele, welches ſich der Verein in Hinſicht der Acclimatiſirung exotiſcher Zierpflanzen geſteckt hat, gelangen können.

Um aber nicht zu weitläuftig zu werden, ſoll nur die Kultur derjenigen exotiſchen Sträuche beſchrieben werden, die ſich durch beſondere Schönheit auszeichnen, und die jeder Beſitzer eines Gartens im freien Lande haben kann, und da möge denn die Familie der Rhododendren, worunter nämlich: Azalea, Andromeda, Kalmia, Clethra, Rhododendron, Vaccinium etc. gehören, den Anfang machen.

Da dieſe insgeſammt ſehr viele feine Wurzeln machen und mithin eine ſehr feine ſandige, aus ſeit vielen Jahren verweſetem Laub entſtandene Erde lieben, ſo muß man, um dieſe leicht austrocknende Erde nicht zu ſehr der Sonne auszuſetzen, und weil dieſe Pflanzengattungen eine allzuſonnige Lage auch nicht vertragen können, einen etwas ſchattigen Ort wählen; nur ſehe man darauf, daß ſolcher nicht zu eingeſchloſſen und dumpfig ſei, denn man darf nicht vergeſſen, daß dieſe Pflanzengattungen meiſt Gebirgsbewohner ſind, folglich gern frei und luftig ſtehen; zudem wird bei anhaltendem Regenwetter dieſe ohnehin ſchwammige Erdart ſauer, und erzeugt eine Menge Mooſe, welche die feinen Wurzeln der Pflanzen erſticken und ſomit ihren Tod herbei führen.

(Fortſetzung folgt).

Anzeige und Anerbieten zur Beförderung des Anbaues der vorzüglichſten Kartoffelſorten.

Je größer die Anzahl der Varietäten iſt, in welchen wir die Kartoffel (Solanum tuberosum), dieſen ſo hochwichtigen Gegenſtand unſerer Bodenerzeugniſſe, beſitzen und womit die Waaren-Verzeichniſſe unſerer Pflangen- und Samen-Handlungen fortwährend bereichert werden; je mehr auch dieſe Varietäten in ihren verſchiedenen Eigenſchaften, in Geſtalt, Größe, Farbe, Geſchmack und vorzüglich ihrem innern Gehalt an Nahrungsſtoff von einander abweichen: deſto wichtiger erſcheint eine genaue Kenntniß derſelben, erſcheinen fortgeſetzte Verſuche, Prüfungen und Vergleichungen zu genauer Ermittelung jener Eigenſchaften und der diesfallſigen Verhältniſſe, um hiernach die, nach Zweck und Umſtänden, zum Anbau vorzüglichſten kennen zu lernen.

---

*) Wie z. B. in Stuttgardt, Carlsruhe, Schwetzingen, Frankfurt a. M., Caſſel und ſelbſt in dem von uns nördlich liegenden Oldenburg und Berlin.

Der Verein hat zu dieſem Zweck ſich in den Beſitz eines Sortiments geſetzt, welches gegenwärtig in den nachverzeichneten 58 Sorten beſteht:

No. 1 Feine mehlige engl. ganz frühe Kartoffel,
— 2 — — — Winter —,
— 3 — holländ. blaublühende —,
— 4 Vorzüglich große mehlige Futterkartoffel,
— 5 Lange ganz frühe Kartoffel,
— 6 Engl. Roaſtbeef-Kartoffel,
— 7 Frühe neue engl. Maylay's Early,
— 8 Sehr frühe Miſtbeet-Kartoffel,
— 9 — — neue Amerikaniſche frühe,
— 10 Lange eſchenblättrige Nieren —,
— 11 Immerwährende oder engl. Everlaſting,
— 12 Engl. Spargel-Kartoffel,
— 13 Wilde Kartoffel,
— 14 Lange frühe rothblaue,
— 15 Zwitter-Kartoffel,
— 16 Neue Amerikaniſche ſpäte,
— 17 Glatte weiße frühe,
— 18 Schottländiſche,
— 19 Beſte Speiſe —,
— 20 Preis von Holland,
— 21 Zwiebel-Kartoffel,
— 22 Gurken-Kartoffel,
— 23 Preis von Weſterwald,
— 24 Gelbe Patata,
— 25 Frühe hellrothe Pfälzer,
— 26 Große Vieh-Kartoffel,
— 27 Lerchenei-Kartoffel,
— 28 Rothblau marmorirte,
— 29 Weiße große Kartoffel,
— 30 Peruvianiſche —,
— 31 Wachholder —,
— 32 Große Nuß —,
— 33 Schwarze Horn —,
— 34 Hellrothe Rocks —,
— 35 Hellroth marmorirte,
— 36 Schwarze runde,
— 37 Große blaurothe,
— 38 Engliſche große,
— 39 Lange rothe Nieren —,
— 40 Lange weiße Nieren —,
— 41 Gelbe Zapfen —,
— 42 Biskuit-Kartoffel,
— 43 Runde hellrothe,
— 44 Kaſtanien —,
— 45 Liverpool-Kartoffel,
— 46 Runde Frühkartoffel,
— 47 Ananas-Kartoffel,
— 48 Lange ſchwarze frühe,
— 49 Schottländiſches-Mäuschen,
— 50 Kleine Nußkartoffel,
— 51 Gelbe Speiſekartoffel,
— 52 Rothe Schweizer —,
— 53 Rothe Zapfen —,
— 54 Mühlhäuſer violette,
— 55 Roth marmorirte,
— 56 Späte hellrothe Schweizer,
— 57 Callaiſer Kartoffel,
— 58 Rothe Ananas-Kartoffel,

wovon auch der allergrößte Theil bereits in bedeutende Vermehrung gebracht worden iſt.

Mitglieder des Vereins, welche eine und die andere oder mehrere Sorten zu eigener Kultur zu haben wünſchen, erhalten dieſelben **unentgeldlich**, übernehmen jedoch die Verpflichtung, die Hälfte der erſten Erndte von allen empfangenen Sorten, welche ſorgfältig rein und unvermiſcht zu halten und mit den richtigen Nummern zu bezeichnen ſind, an den Verein zum weitern Gebrauch abzuliefern, dabei zugleich die Stückzahl und das Gewicht des eingelegten Samens ſowohl, als der davon gewonnenen Erndte genau zu bemerken, und eben ſo Nachweiſung zu geben über die Lage und Eigenſchaften des Bodens, worein die Einſaat geſchehen iſt, auch ob derſelbe friſch gedüngt war und womit.

Die im Fall ſich befindenden Mitglieder haben ſich, unter Angabe der Nummern und Namen der gewünſchten Sorten, an Herrn Hofgärtner Mootz hier zu wenden, der die Abgabe beſorgen wird. Sollte eine oder die andere der bezeichneten Sorten ſchon vergriffen ſein, ſo wird ſtatt derſelben, ſo weit es möglich iſt, eine andere ähnliche Sorte beigelegt werden.

Zur Nachricht für das übrige Publikum wird bemerkt, daß von dem Herrn Hofgärtner Mootz, aus dem oben verzeichneten Sortiment, **Parthien von vierzig verſchiedenen Sorten**, nach Wahl des Abſenders, für 1 Thlr. 12 gg. welche nebſt 4 gg. für Emballage der Beſtellung beizufügen ſind, abgelaſſen werden können.

Weimar, den 20. März 1833.

Beſchreibung und Kultur der Lechenaultia formosa.

Vom

Herrn Hofgärtner J. C. **Sckell** zu **Belvedere**.

In den Gewächshäuſern des Großherzogl. Pflanzengartens allhier, blühte im vorigen Jahre zum erſtenmal eine Pflanze, die wohl manchem Blumenliebhaber noch unbekannt iſt, gleichwohl hinſichtlich der Blüthezeit und des ſchönen Baues halber bald allgemeiner eingeführt zu werden verdient.

Es iſt dieſes die Lechenaultia formosa, von welcher bereits in dem neuen allgemeinen Gartenmagazine vom Jahr 1826, zweiten Bandes 1. Stück, eine Abbildung nach Curtis Botanical Magazine geliefert wurde, der jedoch die nähere Beſchreibung mangelt, und ich will dieſe hiermit ergänzen, und über die Cultur das Nöthige bemerken.

Dieſe niedliche Pflanze wurde zuerſt von R. **Brown** an den ſüdlichen Küſten Neuhollands entdeckt, und von ihm nach dem berühmten franzöſiſchen Botaniker **Lechenault** benannt. Sie iſt erſt ſeit 1823 in Englands Gärten, von wo ſie wahrſcheinlich nach dem Continent kam, jedoch in Deutſchlands Gärten noch wenig bekannt. — Dieſe Pflanze welche nach dem natürlichen Syſtem zur Familie der Lobeliae (5. Claſſe 1. Ord. nach dem **Linné**'ſchen) gehört, ſcheint, wenn man ſie ohne Blüthen ſieht, zu den Haiden (Erica) zu gehören, wenigſtens haben die Blätter ſehr viel Aehnlichkeit mit denen dieſer Familie; ihre Blüthen ſtellen ſie aber unbedingt unter die Lobeliae, und ſind ſchön orange-gelb, mit etwas dunkelfarbiger Schattirung gezeichnet; ſie ſtehen in den Winkeln der Blätter und ſind ſanft überhängend. Die ganze Pflanze, in vollkommener Entwickelung, iſt ohngefähr einen Fuß hoch, und iſt den größeren Theil des Jahres hindurch, beſonders im Herbſt, mit Blüthen bedeckt, wenn ſie die ihr zuſagende Erde und Wartung hat.

(Fortſetzung folgt).

Ueber den Einfluß des Mondes auf die Witterung und Vegetation.

Mitgetheilt vom Redacteur.

Der Glaube an den Einfluß des Mondes auf die Witterung, die Vegetation und vorzüglich den thieriſchen Organismus iſt wahrſcheinlich ziemlich ſo alt wie das Menſchengeſchlecht, und ſcheint urſprünglich aus der Quelle alles Aberglaubens, der Unwiſſenheit, herzurühren, die ihn auch noch jetzt als eine treue Mutter ſorglich hegt, und der er dagegen mannigfaltige Dienſte leiſtet.

Ich glaube dieſe Behauptung begründen zu müſſen, um bei den Vielen, welche noch jetzt dem Monde einen ſehr ausgedehnten Einfluß auf die Witterung und viele Geſchäfte des menſchlichen Lebens, insbeſondere des Gartenbaues, zuzuſchreiben geneigt ſind, die Tendenz der nachfolgenden Mittheilung zu rechtfertigen und ihr eine aufmerkſamere und unpartheilichere Prüfung zu ſichern.

Dem Naturmenſchen iſt nicht nur das für den menſchlichen Verſtand überhaupt unergründliche Urprincip aller Naturthätigkeit verborgen, ſondern es ſind ihm auch die nach und nach durch die Wiſſenſchaft gewonnenen Geſetze unbekannt, nach denen jene Thätigkeit wirkt. Dennoch fühlt er das Bedürfniß, die auf ſein Wohl und Wehe Einfluß habenden Wirkungen irgend einer Urſache beizumeſſen, und wo dieſe nicht klar vorliegt, ſieht er ſich zu willkührlichen Annahmen genöthigt. Dabei ſpielen nun, neben guten und böſen Geiſtern, Sonne, Mond und Sterne die Hauptrolle, die ihm als räthſelhafte Weſen erſcheinen, von deren Auf- und Niedergang mannigfaltige Wirkungen abhängig ſein können; und daß dem Monde auf dieſe Weiſe Vieles zugeſchrieben wurde, woran er keinen Theil hat, iſt bei ſeiner ſcheinbaren Größe und dem beſtändigen Wechſel ſeines Lichtes und ſeiner Stellung gegen die Erde ſehr begreiflich.

Die erſten Erfahrungen, aus deren allmäliger Anhäufung ſich nach und nach etwas einem wiſſenſchaftlichen Syſtem Aehnliches bildete, wurden unter dem Einfluſſe ſolcher vorgefaßten abergläubiſchen Meinungen geſammelt und ihnen, ſo gut es ging, angepaßt. An ein Forſchen nach abſoluter Wahrheit war, ſelbſt bei redlichem Willen, vorerſt nicht zu denken; und als die Natur-Wiſſenſchaft in Oſtindien, Meroe und Aegypten, in der Hand einer eigennützigen Prieſterkaſte, zum Monopol herabgewürdigt wurde, konnten die Uneingeweihten nur zu dunkeln Ahnungen oder vereinzelten Reſultaten gelangen.

Die gebildeten Völker des Alterthums, bei denen die Wiſſenſchaft mehr die Form freier und allgemeiner Forſchung nach Wahrheit annahm, die Griechen und deren Schüler, die Römer, als deren geiſtige Deſcendenten wir uns betrachten müſſen, ſtanden ebenfalls in ihren wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen ſehr unter dem Einfluſſe jener ſich aus der Urzeit herſchreibenden abergläubiſchen Meinungen. Dies gilt insbeſondere von den Einwirkungen, die ſie den Geſtirnen zuſchrieben. Bei Hippokrates, der alle Patienten davor warnt, einen Arzt zu gebrauchen, der nichts von Aſtronomie verſtehe, ſpielen der Arcturus und die Plejaden, bei ſeinem Schüler Galenus, der Mond die Hauptrolle. Die Römer ſchrieben manchem Fixſterne z. B. dem Procyon im kleinen Hunde, einen entſchiedenen Einfluß auf die Vegetation zu. Uebrigens kann man das, was die Römer von dem Einfluſſe der Geſtirne meinten, nur für kraſſen Aberglauben halten. Denn die Zeichen am Monde, welche ihren Schriftſtellern zufolge, zur Vorherbeſtimmung der Witterung dienen können, und auf die wir ſpäter zurückkommen werden, erſchienen ihnen nicht als Urſachen, ſondern als myſtiſche Vorbedeutungen, und ihre Beobachtung wurde von jenen Schriftſtellern nicht gewiſſenhafter empfohlen, als die der Geſtalt der Kohle, die ſich an dem Dochte ihrer Lampen bildete. Da wir nun, was ſich durch Beiſpiele darthun läßt, unſern Glauben an den Einfluß des Mondes von dem der Römer herzuleiten haben, ſo ſcheint die obige Behauptung hinreichend begründet.

(Fortſetzung folgt).

Einige Winke über die Weinbereitung aus Obſt und Beeren, wie auch aus Weintrauben,

nach den Erfahrungen und Verſuchen

des Dr. Macculloch.

Die Beſtandtheile des ausgepreßten Obſt- oder Traubenſaftes, welche bei der Weinbereitung vorzüglich in Berückſichtigung kommen, ſind Weinſteinſäure mit Kali verbunden, (Weinſtein), Aepfelſäure (entweder freie, oder ebenfalls mit Kali verbundene, was noch nicht vollkommen ausgemittelt iſt), Zucker-Gährungsſtoff, Waſſer, Färbeſtoff, Gärbeſtoff und Aroma (Bouquet). Die Verhältniſſe derſelben ſind in verſchiedenen Obſtarten gar ſehr verſchieden, und es iſt manchmal der Fall, daß einer oder mehrere dieſer Beſtandtheile gänzlich fehlen. Bei der weißen Johannisbeere z. B. fehlt der Färbeſtoff oft gänzlich, iſt aber reichlich vorhanden in den Hollunderbeeren und in den rothen Weintrauben. Häufiger trifft man dagegen die weinſteinſauren und äpfelſauren Salze an, und der Gährungsſtoff iſt ſogar in den meiſten ſüßen Pflanzenſäften ein treuer Begleiter des Zuckers.

Die wichtigſten charakteriſtiſchen Verſchiedenheiten in den Producten der verſchiedenen Obſtarten beruhen auf den verſchiedenartigen Verhältniſſen der erwähnten in ihnen anweſenden Beſtandtheile. Allerdings kann eine verſchiedenartige Behandlung verſchiedenartige Wirkungen hervorbringen, aber es gibt kein Mittel, der Stachelbeere die Beſtandtheile der Traube zu verleihen, und eben ſo wenig läßt ſich auf irgend eine Weiſe aus Stachelbeerenſaft ein Wein mit dem Wohlgeſchmacke des Champagners herſtellen, wiewohl Manche, die den Geſchmack des fremden Weines nicht gut kennen, ſich durch einen Wein haben täuſchen laſſen, der aus Stachelbeeren fabricirt worden war.

Unter den angeführten Beſtandtheilen ſind nun, wenn es gilt, Obſtwein darzuſtellen, der Weinſtein, das Waſſer, der Zucker und der Gährungsſtoff die wichtigſten. Farbe und Bouquet kann man als Nebendinge betrachten; und diejenigen Beſtandtheile, aus welchen man ſie gewinnt, ſind bei der Weinbereitung nichts weniger, als weſentlich.

Weinſtein ſcheint indeſſen zur Erzeugung eines guten weinartigen Getränkes unentbehrlich zu ſein; und ein Zuſatz von Weinſtein, wo derſelbe von Natur fehlt, verbeſſert, wie man gefunden hat, nicht allein das Product, ſondern vermehrt ſogar die Quantität des Alkohols, welche eine gegebene Quantität Zucker und Gährungsſtoff zu erzeugen vermögen. Die Gährung geht weit leichter von ſtatten, wo dieſes Salz anweſend iſt; und aus den Verſuchen einiger franzöſiſcher Chemiker ſcheint ſich zu ergeben, daß es während des Gährungsproceſſes zerſetzt werde. Zweifelhaft iſt es dagegen, ob der Weinſtein, wie ſie behaupten, in Apfelſäure verwandelt werde. Die Anweſenheit des Weinſteins iſt der Umſtand, durch welchen ſich die Traube hauptſächlich vor allen andern Obſtſorten unterſcheidet, die zur Weinbereitung benutzt worden ſind. In dieſer Obſtart iſt der Weinſtein vor dem Reifwerden derſelben in der größten Quantität vorhanden, und eine Portion deſſelben verſchwindet während des Reifens. Wegen dieſer Eigenthümlichkeit der Traube hat man ausgepreßten Obſtſäften, die in Wein verwandelt werden ſollten, häufig Weinſtein zugeſetzt und **dadurch die beſten Reſultate erhalten.** (Fortſetzung folgt).

Miscellen.

Saamen durch Vögel zur Vegetation vorbereitet. — Fleiſchige Früchte dienen Säugethieren und Vögeln zum Futter, während die oft harten und unverdaulichen Saamen derſelben unverſehrt durch den Darmcanal gehen und oft ſehr fern von dem Platze, wo ſie gewachſen ſind, in einem zur Vegetation ſehr günſtigen Zuſtande abgeſetzt werden. Den engliſchen Landwirthen iſt das Factum ſo bekannt, daß, wenn ſie in möglichſt kurzer Zeit eine Hecke in die Höhe bringen wollen, ſie welſche Hühner mit den Beeren von Weißdorn (Crataegus oxyacantha) füttern, und dann die mit den Excrementen ausgeleerten Steine ſäen, wodurch ſie ein volles Jahr in dem Wachsthum der Pflanze gewinnen. (Iſt wenigſtens fernerer Prüfung werth.)

Vertilgung der Unkräuter von Wegen, freien Plätzen ꝛc. Der mit Unkraut ſtark überwachſene Hof der Pariſer Münze wurde auf folgende Weiſe ſchnell gereinigt. Man kochte in einem eiſernen Keſſel 20 Pfd. Kalk und 2 Pfd. Schwefelblumen mit 100 Pfd. Waſſer, ließ die Miſchung dann kurze Zeit ſtehen, goß die klare Flüſſigkeit in ein anderes Gefäß ab, gab ungefähr eben ſoviel gewöhnliches Waſſer zu, und begoß damit die überwachſenen Stellen. Auf dieſe Weiſe kann viel Tagelohn erſpart und auch wohl die Rückkehr des Unkrauts auf lange Zeit verhindert werden. (L'Eco. Giornale di Scienze, Lettere, Arti etc.)

In welcher hohen Temperatur zuweilen das vegetabiliſche Leben ausdauern kann, ergiebt ſich durch eine Art **Chara**, welche Hr. John **Daulby** (der Bruder des Vorſtehers des botaniſchen Gartens zu Liverpool) aus Island mitgebracht hat, wo er ſie in einer der heißen Quellen der Inſel blühend und Samen tragend fand, während, ſeiner Angabe zufolge, ein Ei darin binnen 4 Minuten gekocht wurde. **Breislac** hat in ſeinen Institutions géologiques einen Artikel über dieſen Gegenſtand. Unter andern erwähnt er, daß **Dunbar** und **Hunter** auf ihrer 1804 längſt dem Waſhita oder Onachita, einem Fluſſe in **Louiſiana**, gemachten Reiſe über dem Fort Meiro, an der Grenze der vereinigten Staaten, Quellen von 40° — 50° R. oder 122° — 125° Fahr.) geſehen hätten, worin nicht allein Conferven und krautähnliche Pflanzen, ſondern auch Sträuche und Bäume wuchſen.

Ueber die **Function der Rinde** findet ſich in der **Londoner Encyclopädie** folgende Anſicht: „Die Rinde übt wahrſcheinlich vor dem Ausſchlagen der Knospen, und zuweilen zu allen Zeiten, gleiche Functionen aus, wie die Blätter; ſonſt würde es ſchwer halten, das Wachsthum der Cactus, der Euphorbien, mancher Apocyneen ꝛc. zu erklären, die alle keine Blätter haben. Die Rinde kann mit einem Worte einem Univerſalblatte, welches nur **eine** Oberfläche hat, verglichen werden."

(**Ausdünſtung von Pflanzen.**) Ausdünſtung geht in Pflanzen unter gewiſſen Umſtänden in einem unbegreiflichen Grade vor ſich. Durch die Verſuche des Dr. **Hales** iſt bekannt, daß eine Sonnenblume binnen 12 Stunden 1 Pfd. 14 Unzen durch Ausdünſtung verliert. Derſelbe genaue Beobachter fand, daß ein Kohlkopf in 12 Stunden 1 Pfd. 9 Unzen und eine Pflanze von dem Paradiesapfel in ihrem Topfe 11 Unzen ausdünſtete. **Guettare** giebt an, wie er gefunden habe, daß Cornus mascula binnen 24 Stunden zweimal ihr eigenes Gewicht verdunſte, und Hr. **Knight** hat bemerkt, wie ein Weinſtock an einem heißen Tage mit ſolcher Schnelligkeit Feuchtigkeit ausgab, daß ein unter eines ſeiner Blätter geſtelltes Glas ſchnell mit Thau bedeckt war und in einer halben Stunde das Waſſer von dem Glaſe lief. Bei feuchtem Wetter iſt die Ausdünſtung geringer, bei heißem oder trocknem Wetter am ſtärkſten. (Lindley's Guide.)

(**Fruchtbarkeit des Bilſenkrautes, Hyoscyamus niger.**) Nach einigen Verſuchen bringt das Bilſenkraut mehr als 50000 Samenkörner; aber angenommen, es bringe nur 10000 Körner, ſo würden ſich ſchon die Samenkörner bei der vierten Erndte auf 10,000,000,000,000,000 belaufen; und da die Quantität des feſten Landes auf der Oberfläche der Erdkugel zu 1,400,350,599,914,400 Q. F. berechnet iſt, ſo folgt daraus, daß jeder Q. F. 7 Pflanzen enthalten müſſe, und es würde deshalb die ganze Erde nicht ausreichend ſein, um den Ertrag eines einzigen Bilſenkraut-Exemplars am Ende des vierten Jahres aufzunehmen. (Penny Magaz.)

Ueber die Pflanzen, welche Inſekten fangen, wie Saracenia (Saracaria?), Nepenthes, Apocynum, Dionaea etc. hat Prof. Burnet nach ſeinen Beobachtungen die Anſicht gefaßt, daß die von den Inſekten kommenden Subſtanzen und Ausdünſtungen für Leben und Geſundheit dieſer Pflanzen wohlthätig und weſentlich ſeien. „In den größten Exemplaren ſolcher Pflanzen ſammeln ſich zuweilen ſo viele getödtete Inſekten und Würmer an, daß dieſe, in den Zuſtand der Fäulniß übergegangen, einen unangenehmen Geruch in der Gegend verbreiten. Das Verfaulen iſt übrigens ein nothwendiger Prozeß, der wahrſcheinlich durch den Zuckerſaft der Pflanzen gemäßigt und beſchränkt wird, welcher, wie der Magenſaft bei den Menſchen und Thieren, nicht allein zur Verdauung, ſondern auch zur Hemmung und Regelung der Veränderung in der animaliſchen Speiſe dienen mag. Ich habe einen Verſuch mit zwei Exemplaren der Dionaea muscipula gemacht, und zu dem Ende zwei von beinahe gleicher Größe und Geſundheit gewählt. Die eine davon bekam weder Würmer noch Fliegen ꝛc., während die andere täglich mit kleinen Ueberbleibſeln von Thieren gefüttert wurde; das Ergebniß dieſes Verſuchs war, daß die erſte Pflanze bei ihrer ſtrengen Diät, allmählig hinwelkte, die andere aber, bei ihrer **Fleiſchkoſt**, ſich vortrefflich befand." (Berl. Nachr. 1832, N. 297.)

(**Nekrolog.**) Am 15. März ſtarb zu Halle der durch ſeine Geſchichte der Medicin berühmte und hochverdiente Director des botaniſchen Gartens der Univerſität **Kurt Sprengel**, 66 Jahr alt.

(Hierbei eine Beilage).

Gedruckt bei Friedrich Häßler in Weißenſee.

Der Pränumerationspreis beträgt jährlich 1 Thlr. 5 Sgr. 6 pf.

Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungsexpeditionen und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen an.

Gemeinnützige Mittheilungen über Wein-, Obſt- und Gemüſebau, Bienenkunde, Feld- und Hauswirthſchaft.

Redacteur und Verleger: Friedrich Häßler.

Nro. V. Weißenſee (in Thüringen). Mai 1833. I. Jahrgang.

☞ Bemerkenswerthe Anzeige.*)

Ueber den Ankauf nordamerikaniſcher Gehölz-Samen für die deutſchen Gärten und Forſten.

(Eingeſandt vom herzogl. Hofgärtner Herrn Schoch in Wörlitz bei Deſſau).

Die Fortſchritte in mehreren Waldungen Deutſchlands erfordern, daß mit Ernſt darauf geſehen werde, ſie nicht allein zu heben, ſondern ſie auch vor dem völligen Eingang an nutz- und brauchbaren Hölzern, denen manche Forſten ausgeſetzt ſind, zu ſichern.

Obgleich Deutſchland in dem Beſitz von Holzarten iſt, welche bei zweckmäßigem Anbau derſelben wohl im Stande wären, uns in jeder Hinſicht an Bau- und Brennholz zufrieden zu ſtellen; ſo wäre doch ſehr rathſam, einige fremde Gehölze, welche ſich durch ſchnellen Wuchs und Güte des Holzes auszeichnen, und woran doch Nordamerika ſo reich iſt, hier in Deütſchland urbar zu machen, die gewiß ſpäterhin großen Gewinn bringen würden.

Mehrere Gegenden von Nordamerika ſind in Hinſicht des Clima's, ja ſelbſt in den verſchiedenen Erdarten, Deutſchland völlig gleich. Der dortige ſchwere Boden kommt unſerem Lehmboden in ſeinen verſchiedenen Geſtalten ſehr nahe, wenn er auch häufig ganz einer zähen aſchenfarbigen Thonerde gleicht, und viele Salz- und Salpetertheile enthält, ſo werden die bergigen und felſigen Gegenden mit ihren Kalk- und andern Steinarten, welche mit einer Auflage von fruchtbarer Erde, die unterwärts aus Thonerde, oberwärts aus weißem Sand und aufgelöſten Vegetabilien beſteht, Kraft genug beſitzen, um nicht allein Geſtrüppen, ſondern förmlichen Wäldern Nahrung zu geben. Hier erheben ihre Häupter die verſchiedenen Eichen, Eſchen, Ahorn, Ulmen, Buchen u. dergl. m. in den prachtvollſten, ja ehrwürdigſten Exemplaren.

Es fehlt Nordamerika aber auch nicht an dem weniger guten Boden, und man findet hier große Flächen von Sandhügeln, zwiſchen denen flaches, ebenes, hartes Sandland liegt, welche unſeren Haiden ähnlich ſind. Da hat die Natur ebenſo, wie bei uns, geſorgt, daß dort Holzarten wachſen, welche dem Boden angemeſſen ſind; und es finden ſich da eine Menge Fichten und Kiefernarten, welche den größten Nutzen gewähren, da wir hier in Deutſchland nur in dem Beſitze der gewöhnlichen Fichte, einiger Tannenarten und des Lerchenbaums ſind, die als Forſtbäume angebauet werden.

So beſitzt Nordamerika auch, wie wir, Moorflächen, die von großen, ſeichten, ſumpfigen Teichen, welche durch Bäche in der Nähe Abzug erhielten, entſtanden, und ihre angemeſſenen Hölzer mit üppigem Wucher hervorbringen. Es ſind dies nicht allein die Ellern, Birken, Weiden u. a. m., ſondern ſelbſt einige Fichtenarten wachſen da mit Nutzen.

Daß viele der nordamerikaniſchen Holzarten ſich ſehr gut eignen, in unſeren deutſchen Forſten angebauet zu werden, beweiſen die ſchönen ſtarken Exemplare in unſeren herzogl. Gärten, welche nur erſt ein Alter von 60 bis 70 Jahren erreicht haben. Obenan ſteht die Quercus coccinea, Scharlacheiche, deren herrliche Eigenſchaften nicht zu verkennen ſind. Auch haben die meiſten dieſer Holzarten, wie ſelbſt die Scharlacheiche, den Vorzug, daß ſie, wenn ſie gleich in ganz gutem Boden beſſer und ſchneller gedeihen, doch auch mit weniger gutem vorlieb nehmen, ſobald derſelbe nicht ganz ſchlecht, d. h. unfruchtbarer Sand oder rother Kies iſt.

Durch die Reiſe des botaniſchen Gärtners Herrn Carl Beyrich — aus dem botaniſchen Garten zu Berlin — nach Nordamerika, welcher drei Jahre dazu verwenden will, die verſchiedenen Theile dieſes Landes zu bereiſen, um ſeltene und nützliche Naturprodukte, vorzüglich im Pflanzenreiche zu entdecken, und in Hinſicht der Botanik und Pflanzenkultur thätig zu wirken: bietet ſich eine Gelegenheit dar, welche höchſt ſelten vorkommt, und beſonders für die Forſten Deutſchlands von der größten Wichtigkeit ſein kann. Wenn nämlich die Forſtbeſitzer dieſen Zeitpunkt benutzen und durch Herrn Beyrich Ankäufe von Samen (welche billig und gut ausgeführt werden, da er ſelbſt an Ort und Stelle iſt) von denjenigen Holzarten machen ließen, die ſich zur Forſtkultur eignen, entweder durch ſchnellen üppigen Wuchs, Güte des Holzes, oder andere Eigenſchaften, wodurch ſich doch ſo viele nordamerikaniſche Holzarten auszeichnen. Gewiß wäre eine Uebertragung ſolcher Holzarten in die deutſchen Wälder von großem Gewinn.

Herr Beyrich macht dieſe Reiſe zum Theil auf Koſten des königl. preußiſchen Staates, zum Theil erhält er Unterſtützung von verſchiedenen Inſtituten und Privaten dazu. Es iſt ihm erlaubt, Samen für Jedermann, wer es wünſcht, in Nordamerika anzukaufen, um dadurch dieſe Reiſe recht gemeinnützig zu machen. Er iſt ein braver, tüchtiger Mann, der volles Vertrauen verdient, und hat dies ſchon dadurch bewieſen, daß er früher mehrere Jahre hindurch eine Reiſe in Südamerika zur größten Zufriedenheit und mit dem beſten Erfolg und Nutzen für den botaniſchen Garten zu Berlin machte.

Ausgangs Februar in dieſem Jahre iſt Herr Beyrich von Bremen aus mit einem Schiffe abgereiſt, welches nach Baltimore geht, und hat in Hamburg

Herrn Louis Gabain,

als Commiſſionär ernannt, welcher alle Beſtellungen auf Samen und Pflanzen annimmt und auf das ſchnellſte nach Philadelwhia oder Neu-York ihm nachſenden wird. Herr Beyrich wird nächſten Sommer die Gebirgskette der Apalachen und Aleyhanen, wie die Umgebung derſelben bis zum Erie-See und den mächtigen Sturz des Niagara durchſuchen, und ſich vom Juli an in den Staaten Virginien, Ohio, Penſilvanien und Neu-York aufhalten, welche Gegenden die vorzüglichſte Heimath der für unſer Clima paſſenden Gehölze ſind.

Herr Beyrich wird im Herbſte mir Nachricht aus Nordamerika geben und alle die Gehölze mir namhaft machen, welche ſich hier in Deutſchland durch ihre vorzüglichen Eigenſchaften zur Forſtkultur eignen. Ich werde dann im Monat Januar kommenden Jahres noch eine ausführliche Abhandlung hierüber öffentlich bekannt machen, welche alle dieſe Gehölze, die mit Nutzen angebauet werden können, namentlich enthalten ſoll, damit ein Jeder, wer Luſt hat, dadurch ſeine Forſten zu verbeſſern, nicht unnütz Geld für Sachen auszugeben braucht, welche ſich dazu nicht eignen.

Beſondere Aufmerkſamkeit verdient dieſe Anzeige noch für Garten- und Baumſchulenbeſitzer, welche dieſelben mit neuen Schmuckbäumen und Zierſträuchen vermehren wollen, woran bekanntlich Nordamerika ſo reich iſt: als an vielen ſchönen Pinus- und Quercus-Arten, die Acer, Cupressus, Magnolia, Liquidambar, Gleditschia, Liriondendron, Juglans, Nyssa u. dergl. m., ſo wie wieder an die Cornus, Chionanthus, Laurus, Cyrilla, Hopea, Azalea, Andromeda, Rhododendron, Halesia, Tillandsia, Kalmia, Prunus u. a. m.

Die Aufträge kann man jetzt ſchon an den Commiſſionär nach Hamburg ſenden, um Herrn Beyrich dadurch wiſſen zu laſſen, was man wünſcht, oder demſelben für eine gewiſſe beſtimmte Summe die Wahl neu vorgefundener Sachen zu überlaſſen.

Die erſte Sendung von angekauften Samen wird ſchon im Herbſte dieſes Jahres in Hamburg eintreffen, die zweite im Frühjahr 1834 und ſo fort die drei Jahre hindurch, je nachdem die Beſtellungen eingehen.

Jedem, wer es verlangt, bin ich gern erbötig, ſchriftlich noch nähere Auskunft darüber zu geben.

---

*) Hr. Hofgärtner Schoch hatte die Güte, mir obigen Aufſatz für die Blumenzeitung einzuſenden. Da jedoch gedachtes Blatt blos für rein blumiſtiſche Aufſätze beſtimmt iſt, ſo habe ich mir die Freiheit genommen, demſelben in d. Bl., wohin er ſeiner Tendenz nach wohl eher gehören mochte, eine Stelle zu geben; um aber der guten Sache beſtens zu genügen, werde ich dies Blatt nicht nur der Blumenzeitung, ſondern auch dem allg. Unterhaltungsblatte als Beilage beifügen. Häßler.

Die Behandlung des Weinſtockes in Thüringen.

(Vom Hrn. Hofgärtner J. Moos zu Weimar). (Fortſetzung.)

Man bedient ſich in den Bergen zu einem jeden Stocke eines Pfahles, an welchen ſowohl Frucht-, als Holzreben befeſtiget werden; dadurch wird nun die Behandlung den Sommer hindurch ſehr erſchwert, ja es iſt kaum möglich, die einzelnen Reben richtig zu behandeln, wenn man nicht den ganzen Stock aufbindet und auseinander legt, welches ſehr viel Zeit koſten würde. Dieſem könnte nun auf folgende Art abgeholfen werden, bei welcher der etwas größere Aufwand an Pfählen und Stangen durch viel reichern Ertrag der Stöcke und leichtere Behandlung wirklich gedeckt würde.

Es wäre nach der Reihe der Weinſtöcke auf je acht zu acht Fuß Entfernung ein Pfahl in liegender (?) (ſchiefer? ſchräger?) Richtung einzuſchlagen, worauf etwa drei leichte Bohnenſtangen im Verhältniß nach der Pfahllänge befeſtigt würden und auf dieſe Art ein liegendes oder ſchräges Spalier gebildet, woran die Reben gehörig ausgebreitet und behandelt werden könnten. Bei dieſem nach dem Berge liegenden Spaliere würde man noch den Vortheil haben, daß die Trauben, welche unter den Blättern alle nach der Erde und folglich wärmer hingen, als an Pfählen, nicht nur weit größer werden könnten, ſondern auch früher zur Reife gelangen müßten.

Die Vermehrung des Weinſtockes geſchieht theils durch das Einlegen der Reben am Stocke ſelbſt, theils durch Schnittlinge; da dieſes aber hinlänglich bekannt iſt, ſo halte ich es für unnöthig, etwas darüber zu ſagen. Ich will hier nur noch einer Vermehrungsart gedenken, welche noch nicht ſo allgemein bekannt iſt: es iſt die durch Augen. (Fortſetzung folgt.)

Ueber Ausſaat der Obſtkerne. (Fortſetzung.)

(Mitgetheilt von Hrn. Fr. von Dachröden in Elingen.)

Im Herbſt werden die reifſten Nüſſe mit der grünen Schale geſammelt, dann in ein luftiges Zimmer zum Eintrocknen gelegt. Sollte etwa die grüne Schale Schimmel bekommen, ſo werden die Nüſſe abwechſelnd in die Sonne gelegt, wodurch dann die Schale nach und nach ſchwarz und trocken wird. Nun können die Nüſſe an einem froſtfreien Orte aufgehoben werden.

Im Frühjahre werden die Nüſſe ins Waſſer gelegt, wo ſie ſo lange in demſelben liegen bleiben, bis ſich die ſchwarze Schale ganz von den Nüſſen getrennt hat und die Nüſſe ſelbſt ihr friſches Anſehen wieder erhalten haben. Mit dem Waſſer, worin die Nüſſe liegen, muß man übrigens oft wechſeln. Darauf können die Nüſſe gelegt, und in der Pflege, was oben ſchon bemerkt wurde, ganz auf die Art wie Obſtkern-Pflanzen behandelt werden.

Will man eine Vermehrung von Aepfel- und Birnenbäumen durch Wurzelſtückchen als Stellvertreter der Kernſaat machen, ſo hat man auf folgende Art zu verfahren: Man ſammelt im Herbſte alle Abgänge von geſunden Baumwurzeln, welche $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{2}$ Zoll ſtark ſind, von dieſen ſchneidet man 3 — 4 Zoll lange Stückchen, welche man in einer etwas ſchrägen Richtung in die Erde ſtellt, ſo daß der Obertheil der Wurzelſtückchen mit der Oberfläche der Erde gleich zu ſtehen, der Untertheil aber 1 Zoll tiefer zu liegen kommt. Dieſe Wurzelſtückchen werden mäßig angedrückt und einigemal begoſſen. Im Spätherbſte werden die ſo gepflanzten Wurzelſtückchen $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Zoll hoch mit guter Erde bedeckt. Zum künftigen Frühjahre im Monat Mai kommen die Wurzelkeime zum Vorſchein, und man hat dann blos dieſelbe Behandlung zu beobachten, wie bei der Kern-Ausſaat. (Fortſetzung folgt.)

Ueber Erdmagazine zur Erziehung zarter Gemüſe.

(Mitgetheilt vom herzogl. Goth. Obergärtner Hrn. Eyſerbeck zu Gotha. (Fortſetzung.)

Sollte die Kälte dringender werden, ſo legt man ein Fenſter, Strohdecken und Laden auf den Kaſten und wirft ſo viel Laub darüber, daß der Froſt nicht eindringen kann, und wenn ſich gelinde Witterung zeigt, ſo deckt man das Beet täglich auf und bei ſpäterer Tageszeit, wo es kühler wird, wieder zu, ſo wird man unter dieſer Behandlung die jungen Pflanzen einſtweilen erhalten, bis man zu Ende Januar ein warmes Miſtbeet anlegt, welches nach vorbeſchriebener Art veranſtaltet werden muß.

Um frühzeitigen Blumenkohl zu ziehen, muß der Kaſten auf dem Hintertheil zwei Bohlen Höhe haben, welches zur Erziehung von Gurken, Bohnen, Carotten und Salat nicht nöthig iſt. Wenn nun alles ſo weit vorbereitet iſt, daß das Blumenkohl-Beet beſtellt werden kann, ſo ſtreuet man etwas Salatſamen und Radieß darauf, hackt dieſen ein, ziehet das Beet wieder gerade und pflanzt unter jedem Fenſter 4 bis 6 Stück Blumenkohlpflanzen. Nachdem dieſes geſchehen iſt, deckt man das Beet ſorgfältig wieder zu und lüftet täglich unter den Mittagsſtunden bei Sonnenſchein die Fenſter; ſobald es ſich aber der Sonnenwärme nicht mehr zu erfreuen hat, legt man die Fenſter wieder zu und ſchützet durch Zudecken das Beet gegen Nachtfröſte, und wenn es nöthig iſt, beſpritzt man die Pflanzen mit larwarmem Waſſer, wo man das Wachsthum wird zunehmen ſehen. (Beſchluß folgt.)

Frühzeitige Gurken und Melonen zu ziehen.

(Mitgetheilt von Hrn. Eyſerbeck, herzogl. Obergärtner in Gotha.)
(Fortſetzung.)

So wie das Gurkenbeet angelegt und behandelt wird, eben ſo kann auch ein Melonenbeet vorbereitet werden.

Bei Erziehung der Melonen iſt Folgendes zu bemerken: Hat man in das Gurkenbeet auch Melonenkerne gelegt, ſo muß man den Pflänzchen, wenn ſie das vierte Blatt bekommen, ebenfalls das Herz ausſchneiden, und dieſelben oben über die Gurken, 4 Zoll weit von einander verpflanzen. Haben dieſe Melonenpflanzen ihre gehörige Größe und Stärke erlangt, ſo muß vorher ſchon ein warmes Beet bereit gehalten werden, um dieſelben in einem beſondern Kaſten weiter zu verpflanzen, bei welchem alle Veranſtaltungen eben ſo ſein müſſen, als bei einem Gurkenkaſten. Hier pflanzt man jedoch nur auf einen 4fenſtrigen Kaſten, auch blos 4 Melonenpflanzen, ſo daß unter jedes Fenſter nur eine Pflanze kommt. Ehe die Melonenpflanzen anfangen, Ranken zu treiben, kann man auch Salat, Radießchen und Bohnen daneben ziehen; wenn ſich die Melonenpflanzen vergrößern und wilde Ranken durch einander treiben, eingeſtutzt und die Hunger-Ranken ausgeſchnitten werden, wo ſich's dann zeigen wird, daß ſie bald Früchte anſetzen. (Beſchluß folgt.)

Bienenkunde.

Wie Capitain Beechy in ſeiner Reiſe nach dem ſtillen Ocean erzählt, ſollen die merikaniſchen Bienenwirthe von dieſem Inſekte behaupten, am Eingange jedes Stockes halte *eine* Biene Wache, welche das Aus- und Eingehen ihrer Kameraden beobachte, und dieſe Schildwache werde nur alle 24 Stunden abgelöſ't. Ueber die Dauer dieſer Wache könnte man allerdings Zweifel hegen, aber ihre Exiſtenz iſt durch vielfache Beobachtungen feſtgeſtellt. Jederzeit ſtand in dem Flugloche eine einzige Biene, die ſich, bei Annäherung einer andern, in eine kleine, anſcheinend zu dieſem Zwecke dem Flugloche zur Linken gemachte Verſenkung zurückzog, und auf dieſe Weiſe den aus- oder eingehenden Kameraden durchließ, aber dann ſogleich ihren Poſten bezog. Wie lange daſſelbe Individuum auf Wache blieb, ließ ſich nicht ermitteln, denn, ſo oft man auch den Verſuch machte, daſſelbe mittelſt eines Pinſels mit Farbe zu zeichnen, ſo wich es doch immer aus. Man beſtrich nun das Flugloch mit Farbe, und ſobald ſich die Schildwache nicht mehr beläſtigt ſah, näherte ſie ſich der fremden Subſtanz, koſtete dieſelbe und zog ſich, da ſie ihr offenbar nicht anſtand, in den Stock zurück. Bald ſah man einen Trupp Bienen auf den Ort anrücken, von denen jede ein Stückchen Wachs oder Vorwachs in den Freßzangen trug, womit ein Theil der verunreinigten Stelle des Holzes verklebt wurde. Dann kehrten die kleinen Arbeiter in den Stock zurück, holten neuen Vorrath, und wiederholten die Operation ſo lange, bis über der verunreinigten Stelle ein kleiner Hügel entſtanden war, welcher die Bewohner von den aus der Anweſenheit der fremden Subſtanz entſpringenden Unannehmlichkeiten völlig ſicher ſtellte.

Wie man auf eine einfache Art die Eigenſchaft und die Verſchiedenheit des Bodens erkennt.

Man nehme von der Oberfläche des Feldes, das man verſuchen will, einen kleinen Theil Erde, einen gleichen Theil etwas tiefer, um die verſchiedenen Erdlagen beurtheilen zu können. Beide Theile werden nun ein jedes beſonders mit Waſſer angefeuchtet, kleine Kugeln daraus gemacht und dieſe an der Luft getrocknet.

Diejenigen Kugeln nun, welche nach erfolgtem Trocknen eine mittelmäßige Dichtigkeit behalten, und gleichwohl zwiſchen den Fingern zerdrückt werden können, deuten einen Boden an, der vermittelſt einer zweckmäßigen Düngung fruchtbar werden kann. Die Kugeln aber, welche nicht leicht zerdrückt werden können, deuten einen zu zähen Boden an, welcher verbeſſert zu werden nöthig hat. Die Kugeln endlich, welche bei der erſten Berührung zuſammen fallen, zeigen einen Boden an, der mit einer fetten Erde vermiſcht werden muß, bevor man ihn mit Dünger verſieht.

Um den Reichthum in humus der verſchiedenen Boden zu erkennen, muß man dieſe Kugeln gut trocknen laſſen, ſie nächſtdem genau wiegen, und ſie dann in einem ſehr heißen Ofen brennen, oder auf einer eiſernen Schüppe über dem Feuer halten und glühend machen. Sobald dies geſchehen iſt, laſſe man ſie erkalten, ſtoße ſie in einem Mörſer, löſe ſie in Waſſer auf, kläre ſie ſodann ab, und ſammele den Rückſtand, welcher getrocknet und nächſtdem gewogen wird. Der Unterſchied zwiſchen dem Gewicht iſt nun der auflösbare Gehalt von humus des Bodens; daß mehrere Wäſchen ſtatt finden müſſen, um ſich zu überzeugen, ob auch die zerſtoßene gebrannte Erde vollſtändig aufgelöſet worden, iſt wohl überflüſſig hinzu zu fügen; genug, je größer der Unterſchied im Gewicht iſt, deſto beſſer iſt der Boden.

(Beſchluß folgt).

Bemerkungen über Pferde und Pferdezucht.

Geſammelt von Warnofrid. (Fortſetzung.)

Das ſpaniſche Pferd hat ein edles, ſtolzes Anſehn, funkelnde Augen, iſt voller Muth und Feuer, und doch zugleich zahm und gelehrig. Die oberandaluſiſchen werden beſonders geſucht.

Italiens Pferde ſind von jeher geſchätzt und berühmt geweſen, namentlich die neapolitaner. Letztere ſind hoch, ſtark, haben ein leichtes Maul, nur etwas ſtarken Kopf, dicke Ganaſchen und fleiſchigen Hals.

Die engländiſchen Pferde gleichen ſo ziemlich den arabiſchen, von welchen ſie auch zum Theil abſtammen. Sie ſind größer, aber nicht ſo gewandt und von weit geringerer Manövrirfähigkeit als dieſe, wohl aber als Wettrenner berühmt. Die Engländer haben ſich hinſichtlich der Pferde einigen Ruhm erworben — doch bekundet ſich in Behandlung, Dreſſur und Verzierung des Thieres ihr bizarrer Geſchmack.

Frankreich hat nie große Anſprüche auf den Ruhm der Pferdezucht gemacht, doch finden ſich in mehreren Provinzen gute, brauchbare Pferde.

Irrlands Pferde ſind lebhaft und behende, kleiner und unterſetzter, als die engländiſchen, aber zur Arbeit taugbarer. (Fortſetzung folgt.)

Das Kartoffel-Säen.

Man hat ein ſehr einfaches Mittel, dem Ausarten der Kartoffeln zuvorzukommen und ſich neue Arten zu verſchaffen. Ein einziger Samenapfel (Kapſel) kann 20 verſchiedene Arten hervorbringen. Um einen vollſtändigen Erfolg zu erlangen, muß man folgender Geſtalt verfahren: Das Land muß hinreichend umgearbeitet und gedüngt ſein, ohne das würde der Erfolg mißlingen, wenn man gleich die beſte Frucht einſäete. Man hat bemerkt, daß der Theil, der gegen Wind und Wetter geſchützt war, gewöhnlich den beſten Erfolg gab. Die Samenäpfel ſind nach der Art und der Kraft der Pflanze mehr oder weniger ſamenreich: um ſie einzuernten, muß man abwarten, bis ſie gehörig reif ſind, und dies iſt gewöhnlich bei den Frühkartoffeln Ende Octobers. Sie fangen alsdann an, ſich wieder zu erweichen, und in der Mitte weiß zu werden. Es kömmt nun darauf an, ſie zu ernten und während des Winters bis zum Frühjahr aufzubewahren.

Erhaltung der Samenäpfel. Man kann die Samenäpfel von den Stengeln löſen laſſen, die ſie am gemeinſchaftlichen Stamme verbinden, und ſie ſo auf der Mauer, auf Brettern oder Stricken aufhängen, oder man kann ſie unmittelbar nach der Ernte in Kaſten mit einem Erdlager, und immer auf jede Schicht Samenäpfel ein neues Erdlager bringen, bis der Kaſten voll iſt. Da ſie inzwiſchen doch in jedem Fall zerdrückt, und beim Säen mit Erde vermiſcht werden müſſen, ſo kann dieſe Weitläufigkeit erſpart und die Saat weit vortheilhafter vorbereitet werden, indem man folgendes Mittel anwendet. (Fortſetzung folgt.)

Gemeinnützige Mittheilungen.

(Portugieſiſche Methode, Zwiebeln zu pflanzen.) Die portugieſiſchen Zwiebeln ſind in England theils wegen ihrer Größe, theils wegen ihres angenehmen, viel mildern Geſchmackes ſehr geſchätzt. Ein Herr J. T. behauptet nun, daß dieſer Vorzug der portugieſiſchen Zwiebeln vor den engliſchen nicht von der Verſchiedenheit des Klimas herrühre, ſondern davon, daß die Portugieſen eine eigene, weit zweckmäßigere Pflanzmethode haben, als die Engländer und die Teutſchen. Sie ſäen nämlich ihre Zwiebelſamen in Samen- oder Miſtbeeten und verpflanzen die jungen Pflanzen dann in tiefe Löcher. Bei trockenem Wetter ſollen die Pflanzen ſtark begoſſen werden. Da ſich die Zwiebeln bei der gewöhnlichen Pflanzmethode in der Nähe der Oberfläche der Erde oder ſelbſt über dieſer ausbilden, ſo ſcheint es, wenn obige Methode richtig angegeben iſt, daß die Einwirkung der Luft großen Einfluß auf die Schärfe und das Wachsthum der Zwiebeln hat. (Repertory of Patent-Inventions).

(Kartoffelbau.) Nach den Reſultaten, welche man bei vielen, verſchiedenen Verſuchen erhalten hat, übertrifft die peruvianiſche Kartoffel alle übrigen. Denn man erhält von ihnen 8509 pCt., während die Mainzer Kartoffel nur 1911 pCt. Ausbeute giebt. Sie iſt demnach für die Landwirthſchaft ſehr zu empfehlen.

Die Verwahrung der Bäume, vorzüglich der jüngern, gegen den Angriff der Haſen geſchieht dadurch, daß man ſie ſo hoch, als dieſe ungebetenen Gäſte reichen können, mit Seife oder Speck beſtreicht; die Auslage iſt nicht bedeutend, ſelbſt dann nicht, wenn man der größern Sicherheit wegen dieſes Beſtreichen zwei Mal, im Frühjahre und Herbſte, vornimmt.

(Kohlenſtaub verhindert das Keimen der Kartoffeln.) Der Flaſchnermeiſter Eduard Wolf zu Annaberg hatte eine bedeutende Menge Holzkohlen in ſeinem Keller, die verbraucht wurden. Davon blieb ein Theil als Staub zurück. Zufälliger Weiſe wurden im Herbſte eine Partie Kartoffeln darauf geſchüttet. Im Spätfrühjahre zeigte es ſich, daß davon keine gekeimt waren, da im Gegentheil andere, welche nicht darauf lagen, Keime getrieben hatten. Man merkte auf den Geſchmack und machte die ſchätzbare Entdeckung, daß jene Kartoffeln auf den Kohlen an Güte und Wohlgeſchmack gewonnen hatten.

(Butter auf eine vortheilhafte Art einzuſalzen.) Man nehme 2 Theile Kochſalz, 1 Theil Zucker und 1 Theil Salpeter, miſche dies wohl durch einander, knete auf 1 Pfund Butter 2 Loth dieſer Miſchung wohl durch, und ſchlage ſie zum Gebrauch ein. Man muß ſie aber wenigſtens 3 — 4 Wochen ſtehen laſſen, ehe man ſie anbricht. Butter, auf dieſe Art eingeſalzen, iſt nach drei Jahren noch ſo gut, wie ſie im Anfange war.

(Für Schäferei-Beſitzer.) Um Schaf-Heerden aus in Brand gerathenen Ställen zu entfernen, wird die einfache Maßregel empfohlen, daß man die Schafe daran gewöhnt, auf ein beſtimmtes Zeichen den Stall augenblicklich zu verlaſſen, und daß zu dieſem Zweck der Schäfer jedesmal, wenn er das Futter einlegen will, die Schafe aus dem Stalle treiben und dabei immer denſelben Ruf oder daſſelbe Pfeifen anwenden läßt. Eine ſolcherweiſe geübte Heerde ſoll durch nichts im Stalle zurückzuhalten ſein, ſobald bei geöffneten Thuren der gewohnte Ruf erſchallt, was bei dem bekannten gewohnheitsſüchtigen Naturell des Schafes nicht unwahrſcheinlich iſt.

(Vorſicht bei der Behandlung rotziger Pferde). Wer mit ſolchen Pferden umgehen muß, betrachte zuvor genau ſeine Hände, ob er daran nicht etwa kleine Wunden, Geſchwüre oder Stellen hat, wo die Oberhaut abgerieben oder abgeſtoßen iſt; denn kommt der Eiter des Pferdes auf eine ſolche Stelle, ſo iſt die Inoculation des Giftes unvermeidlich; darum hüte man ſich auch, daß man ſich nicht bei der Operation mit dem Meſſer ſchneide. Aber auch wenn die Hand ganz geſund iſt, nehme man ſich in Acht, daß man mit den beſchmutzten Fingern nicht in das Geſicht, an die Augen, an die Naſe und den Mund, überhaupt, wo die Haut dünner iſt, fahre und waſche ſich nach vollbrachter Operation die Hände mit Seifenwaſſer.

(Gegen den ruhrartigen Durchfall der Schafe). Hr. Amtmann Heldberg zu Strettenſee gab den Schafen pr. Kopf ein Quentchen unverdünnte Salzſäure in Leinſamendekokt ungefähr zu ½ Quart ein, ein größres Quantum habe die Schafe auf der Stelle getödtet. Als ein Präſervativmittel habe er Wachholderbeeren, Wermuth und Salz gebraucht, wobei er die Bemerkung gemacht habe, daß die völlig geſunden Schafe dieſe Miſchung nicht berührt, die bereits mit dem Durchfall behafteten aber dieſelbe ſehr begierig genoſſen hätten und dadurch gegen den Durchfall geſichert worden wären.

(Nahrhafte Eigenſchaft der Gährung.) Die gegohrnen Speiſen ſind viel nahrhafter als diejenigen, die nicht gegohren haben. Der Käſe iſt weit nahrhafter als die Butter.

Auch die Thiere nehmen wenig bei dem Freſſen ungegohrner Nahrungsmittel zu; das Schwein bleibt mager, wenn es nur rohe Kartoffeln frißt; es wird aber ſehr bald fett, wenn man ſie ihm gekocht und gegohren giebt.

(Schnell mäſtendes Viehfutter.) In Frankreich benutzt man jetzt häufig den baumartigen grünen Kohl zum ſchnell mäſtenden Viehfutter, ſowie den großen Kürbis. Erſterer wird 8 Jahr alt, erreicht eine Höhe von 8 — 10 Fuß, die untern Blätter kann man von Monat zu Monat abpflücken.

Als Mittel, reife Gartenfrüchte vor Inſekten zu ſchützen, wird gerathen, entweder dieſelben mit Watte zu überziehen, oder die einmal angefreſſenen Früchte hängen zu laſſen, weil dann die friſchen verſchont bleiben.

(Mittel gegen die Kornwürmer.) Man lege in die Nähe des Kornes Schaffelle, die ihre Wolle noch haben.

Um das Schoſſen der Salatſtauden zu hindern, ſchneide man mit einem ſcharfen Meſſer den Stock oder Strunk des Salatkopfes über der Erde bis etwa auf die Hälfte ein.

Graphit oder kohlenſaures Eiſen mit Talg gerieben, wird jetzt, als die neueſte engliſche Erfindung, als das beſte Mittel zum Schmieren der Wagen und aller Arten Maſchinen empfohlen.

Federvieh. Die Hühner pflegen im Winter ſehr an Läuſen zu leiden; man zerſtört ſie mit geſtoßenem Pfeffer. Die Pfauen krepiren, wenn ſie Hollunderblüthe freſſen. Die Hühner dagegen, wenn ſie die ſchwarzen Beeren dieſes Baums freſſen. Damit die Zucht der jungen Puter gut gerathe, iſt es zweckmäßig, unter ihre Nahrung gehackte Brenneſſeln, beſonders aber gehackte Zwiebeln zu miſchen.

(Curioſum.) In Bonn iſt es einer Pfauenhenne, nachdem ſie drei Eier gelegt, plötzlich eingefallen, ein Hahn zu werden; ſie bekam vollkommen männliches Gefieder und iſt als ein ſchöner Pfauhahn dem anatomiſchen Muſeum geſchenkt worden, welches nun unterſuchen ſoll, wie dieſe Veränderung zugegangen. Man hat ſchon ähnliche Fälle bei Faſanen, dem Puter und dem gemeinen Huhn bemerkt.

(Pulver, um die Schweine geſund zu erhalten). Antimon. crud. 2 Loth, Bryonienwurzel 4 Loth, Lorbeern ohne Schale 2 Loth, gelben Schwefel 1 1/2 Loth, rothen Bolus 4 Loth — geſtoßen und unter einander gemiſcht; einem großen Schweine eine kleine Meſſerſpitze voll in ſaurer Milch nüchtern gegeben; jedoch muß man es jedem Schweine beſonders vorhalten. Im März, April, Mai und Juni 1 — 2 Mal die Woche, außerdem dann und wann.

(Kleeſamenhandel.) Seit mehreren Jahren iſt der Kleeſamen ein wichtiger Artikel des landwirthſchaftlichen Handels geworden. Ueber Breslau allein gehen von demſelben alle Jahre 10 bis 12000 Ctr. nach England, der großentheils in Schleſien erzeugt wird, und wozu Galizien und Böhmen nur höchſtens ein Fünftel liefert. Dieſer Zweig bleibt übrigens dem deutſchen Landbaue noch lange geſichert, weil England wegen ſeiner aufzubringenden hohen Boden-Rente und der theuren Arbeit ihn nicht zu einem ſo niedrigen Preiſe erzeugen kann. Auf dem am 29. März zu Harſewinkel im Regierungsbezirk Münſter abgehaltenen Kleeſamen-Markte waren im Ganzen 360 Sack à 250 Pfund Kleeſamen, welcher zu 30 — 40 Thlr. für einen Sack, alſo nach dem Mittelpreiſe von 35 Thlr., zu 12000 Thlr. verkauft wurde.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto-Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. IX. Weißenſee, (in Thüringen). Mai 1833. VI. Jahrg.

Der Lenz iſt aufgegangen,
Mit Blüthen angeſchwellt,
Ihm ſind die zarten Wangen
Von Roſenlicht erhellt;
Umſpielt von weichen Flocken,
Beglänzt vom Sonnenſtrahl,
Ruft er mit Blumenglocken
Zu ſich ins grüne Thal.

Das Rieſeln klarer Bäche
Durchwallt die bunte Flur,
Und küßt die Blumenfläche
Der feiernden Natur;
Und Liederſtimmen ſchallen
Wie Liebesmelodien,
Und Blüthenblätter fallen
Auf Bacheswellen hin.

Leicht, wie das Blatt der Roſe
Sich wiegt im Frühlingswind,
So ſpielt im Blumenſchooſe
Die Luſt, das Sylphenkind;
Sie ſchwebt auf lichten Flügeln
Im muntern Reihentanz,
Und pflückt von Myrtenhügeln
Sich einen friſchen Kranz.

O glücklich, wem Empfinden
Die Seele ſanft umfließt,
Und wer im Grün der Linden
Die Gegenwart genießt:
Beim Nachtigallen-Liede
Träumt ſelig das Gemüth,
Und ihm entkeimt der Friede,
Der über Sternen blüht!

Fortlaufendes Pränumeranten-Verzeichniß. (Fortſetzung.)

Herr Hof-Gärtner Wimmer zu Schlitz bei Fulda.
Herr Kunſt-Gärtner Wend zu Conez.
Das herzogliche Privat-Büreau zu Coburg.
Der Gartenbau-Verein zu Coburg.

Königl. Wohllöbliches Poſt-Amt zu Marienburg.
— — — — zu Deſſau.
— — — — zu Eisleben.
— — — — zu Wernigerode.

Ueber die Cultur der Camellien.

Vom Kunſt- und Handelsgärtner Hrn. Fr. Jakob Seidel in Dresden.)

(Fortſetzung).

Das Begießen iſt bei den Camellien wie bei faſt allen Pflanzen. Man laſſe ſie jedesmal erſt trocken werden und begieße ſie alsdann ſo ſtark, daß die Erde im ganzen Topfe Feuchtigkeit bekommt. Bei Beobachtung dieſer einfachen Maßregel wird ſich von ſelbſt ergeben, daß die Pflanze im Frühjahr oder Sommer, wenn ſie treibt, oft alle Tage Waſſer verlangt, ja zuweilen ſogar in einem Tage 2mal; dahingegen im Herbſt und Winter bei ſchlechtem Wetter das Begießen manchmal 14 Tage, vielleicht 3 Wochen ausgeſetzt werden muß. Das Spritzen mit einer Brauſe über die Blätter iſt im Frühjahr bei vollem Triebe ſehr gut; erſt muß man ſie aber einzeln mit dem Rohre durchgegangen haben, damit nicht beim bloßen Spritzen einige zu wenig Waſſer bekommen.

Eine allgemeine Klage bei den Camellien iſt das Abwerfen der Knospen. Man kann aber dieſem Uebel durch folgende Behandlung ſehr abhelfen: Die Camellie, urſprünglich eine japaniſche Pflanze, verlangt nämlich zu ihrer Ausbildung einen langen Sommer. Dieſer fehlt ihr nun freilich hier in unſerm rauhen Deutſchland und muß künſtlich gegeben werden. Man ſetze ſie alſo vom Anfang Februar in ein warmes Gewächshaus, Beet oder auch Stube, wo ſie immer 8 bis 15 Grad Reaum. Wärme haben. Da werden ſie zeitig und kräftig treiben. Bis Mitte April iſt ihr erſter Trieb beendigt, wo ſie alsdann auch ſchon Knospen anſetzen, welche nun Zeit genug haben, bei ſchönem Wetter groß zu werden. Bis Ende Juni oder Anfang Juli laſſe man ſie unter oder hinter Glas ſetzen. Dann kommen ſie ins Freie, an einen vor Wind und Sonne etwas geſchützten Ort; doch ja nicht ſo, daß ſie unter Bäumen ſtehen; denn nur wenige Pflanzen ſind von der Natur darauf angewieſen, unter Bäumen zu leben. Die meiſten werden kränklich, wenn ihnen der unmittelbare Einfluß der Atmosphäre entzogen wird. Zu Ende Auguſt, wenn die Nächte kühl zu werden anfangen, müſſen die Camellien wieder unter's Glas. Sie verlangen den ganzen Herbſt viel Luft und bis Anfang Februar ſo wenig als möglich künſtliche Wärme, 3 bis 5 Grad iſt hinlänglich. Wollte man ihnen um dieſe Zeit mehr geben, ſo würde der größte Theil der Knospen abfallen. (Beſchluß folgt.)

Beſchreibung und Cultur einiger noch nicht allgemein bekannten und einiger neuen Zierpflanzen.

Mitgetheilt von Hrn. J. W. Boſſe, herzogl. oldenburgiſchem Hofgärtner zu Oldenburg.

20) Francoa sonchifolia. (Beſchluß).

Dieſe vortreffliche Zierpflanze erzieht man aus dem Samen, welcher im März oder April in einen Topf in Laub- oder lockere Miſtbeeterde geſäet, und in's warme Miſtbeet geſtellt wird. Die jungen Pflanzen verſetzt man in kleinen Töpfen in obengenannte Erde, die mit etwas Sand gemiſcht iſt, und hält ſie, bis ſie ſtark herangewachſen ſind, im Miſtbeet unter Glas, wo man ihnen hinreichende Luft und ſtets mäßige Feuchtigkeit giebt. Sie werden ohne Unterſchied der Jahreszeit ſo oft in größere Töpfe verpflanzt, als die vorigen Töpfe vollgewurzelt ſind, bis ſie blühen wollen. Man durchwintert ſie im Zimmer oder Glashaus bei 6 — 8°

Wärme möglichſt nahe an oder unter dem Fenſter, und pflanzt im Mai oder Juni einige Exemplare ins freie Land, während man die andern im offenen Glashauſe oder Zimmer ſtehen läßt, oder ſie auf eine warme, bedeckte Stellage in's Freie bringt.

Rafflesia Arnoldi.

(Beſchluß.)

Die Rafflesia Arnoldi, auch Krubul oder die große Blume, die Rieſenblume in Sumatra, in einigen Provinzen Oſtindiens auch Ambur-Ambur genannt, hat keinen Samen, ſondern pflanzt ſich kryptogamiſch fort, wie die Pilze, mit denen ſie auch der Form nach im Allgemeinen eine große Aehnlichkeit hat; auch die Maſſe, aus der die zolldicken Blumenblätter gebildet ſind, gleicht ſehr den Champignons.

Sie blüht nur einmal im Jahre und immer nach der regnichten Jahreszeit. Sie hat keinen eigentlichen Stengel, ſondern wächſt auf den Wurzeln einer Art von cissus (cissus anguitifolia). Die Raffl. Arn. ſcheint aus den Ritzen oder Spalten der Wurzeln jenes Baums hervorzukommen, und zeigt ſich im Anfange in der Geſtalt eines runden Knopfes, in welchem die unentwickelte Blume liegt, in zahlreiche Hüllen eingewikkelt, welche in dem Maße, in dem ſich die Blume entwickelt, ſich öffnen und abfallen. Die Blume verwelkt bald nach ihrer Blüthe, und die Samenkörner gehen in eine markige Maſſe über.

Bemerkungen über die Behandlung der Orangerie in Töpfen.

(Beſchluß.)

(Mitgetheilt vom Hrn. Hofgärtner J. Moos zu Weimar.)

Sobald man die in voriger Numer erwähnte Krankheit der Orangeriebäumchen (die Fäule und der Roſt an den Wurzeln) gewahr wird, halte man die Bäumchen ſo trocken und warm als es nur immer möglich iſt. Kann man ſie in ein warmes Lohbeet bringen, ſo erholen ſie ſich hier am ſchnellſten.

Eine zweite Krankheit iſt das Ausſchwitzen des Saftes, wobei die Bäumchen vergelben, und endlich am Holze und auf den Blättern einen ſchwarzen Ueberzug bekommen. Dieſe Krankheit wird dadurch herbeigeführt, wenn die Bäumchen bei großer Wärme zu trocken gehalten ſind, oder auch durch Mangel an Luft; endlich wird auch der Schmutz auf den Blättern und am Holze durch einen zu feuchten Standort im Winter erzeugt. Das beſte Mittel, ſie von dieſer Krankheit zu heilen, beſteht darin, daß man weiches Waſſer mit einem Viertheil weißen Weines vermiſcht und hiermit die Bäumchen an Holz und Blättern mittelſt eines Schwämmchens genau abwäſcht, welches einigemal wiederholt werden muß.

Geſchieht dies nicht, ſo erzeugen ſich an dem Bäumchen Schildläuſe, wo es dann gewöhnlich ſchon ſo krank iſt, daß man es zurückſchneiden und in ein Lohbeet nothwendig bringen muß.

Zu dieſen beiden Uebeln geſellt ſich oft noch ein drittes, die rothen Ameiſen, welche ſich zwiſchen den Wurzeln ſo einniſten, daß das Verſetzen unerläßlich iſt. Dabei iſt es gut, daß man das Stämmchen über dem Topfe mit etwas Wolle umbindet, und dieſe ſo wie den Topfrand einigemal mit venetianiſchem Terpentin überſtreicht.

Syſtematiſche Namen der merkwürdigſten Pflanzen-Gattungen und Arten, ihr Genitiv ꝛc.

Mitgetheilt von L. aus T.

Allĭum ascalonĭum. L. Schalotte, Schlotte, (noch mehr verſchlimmert Scharlotte) Aſchlauch, Aeſchlauch, Eßlauch.

Dieſer Lauch führt den Namen nach Plin. (XIX. 32.) von Ascalo oder Ascalon, einer Stadt in Paläſtina, und dieſem Umſtande haben auch die deutſchen Benennungen ihren Urſprung zu verdanken. Merkwürdig iſt es, daß die Alten ſie aus Samen, und nicht aus Zwiebelbrut vermehrten. Wahrſcheinlich iſt das warme Klima und der fruchtbare Boden des Morgenlandes als Urſache davon anzuſehen. Denn bei uns ſetzen die Schlotten ſo ſelten Blüthe an, daß Linné ſich durch Hasselquist dergleichen aus Paläſtina kommen ließ.

Allĭum ursīnum. L. Bärlauch, Rams.

Dieſer kommt ſchon im Plin. (XIX. 34), doch ohne Angabe des Grundes dieſer Benennung vor.

Das Wort **Rams** kommt wahrſcheinlich von dem altnordiſchen Beiworte ramur her, welches ſowohl ſtark, als bitter bedeutet und dieſer Pflanze wegen ihres bittern Geſchmacks und wegen ihrer Kraft, das umherſtehende Gras und Unkraut zu vertilgen, ohne Zweifel beigelegt worden iſt. Der Geruch dieſes Lauchs iſt ſo ſtark, daß er ſich über ganze Gegenden ausbreitet und daß man ihn, weil er den Ratzen und Maulwürfen zuwider iſt, zur Einfaſſung um die Gartenbeete empfohlen hat. Auch ſoll es dieſer Lauch eigentlich ſein, wovon die Leipziger Lerchen Geſchmack und Fettigkeit erhalten — eine Eigenſchaft, die man gewöhnlich dem A. vineale L. Weinlauch beilegt. (Fortſ. folgt.)

Aus der Revue horticole

Ueber die Cultur der Pelargonien.

(Von Poiteau).

(Fortſetzung.)

Wir liefern hier zunächſt das Verzeichniß der bei Herrn Lemon befindlichen ſchönen Pelargonien, nach der **Farbe der Blüthe** geordnet, wie man ſie vom Ende April bis zum Juni daſelbſt ſehen kann.

Pelargonien-Blüthen mit weißem Grunde und rothen Flecken: Brightianum. Candidissimum. Coronatum magniflore. Erectum. Grandidentatum magniflore. Liliiflorum. Reginae. Reg. majus. Venustum nov. var. Yungi grandiflorum.

Pelargonien-Blüthen mit lilla- oder zartviolettem Grunde: Abietinum. Comptum. Decorum majus. Dependens. Floridum majus. Grandidentatum fragrans. Heterophyllum. Imbricatum verum. Involucratum majus. Mucronatum. Paucidendatum grandiflorum. Ramigerum. Verecundum. Vandaëlianum.

Pelargonien-Blüthen mit fleiſchfarbigem oder zartroſafarbigem Grunde: Andrewsianum roseum. Electum. Gloriosum incarnatum. Liriodendroides. Micans. Pudibundum.

Pelargon.-Bl. mit hellem Grunde und braun-karmoſinrother Zeichnung: Amabile. A. majus. Affine. Banksianum roseum. Coronatum. Diadematum. Ampliſsimum novum. Glorioſum grandiflorum. Heterotricum roseum. Pulcherrimum roseum. Rodanthum. Splendidum verum. Speciosum rubrum. Fulminans. Thunbergianum.

Pelargon.-Blüthen mit ſchwefelgelbem Grunde: Daucifol. Triste nocteolens. Vespertinum.

Pelargon.-Blüthen mit hellrothem und ſcharlachfarbigem Grunde: Bakerianum. Brightianum rubrum. Grandis coccineum. Insigne. Laxiflorum. Moreanum majus. Metallicum. Ornatum coccineum. Pronayianum. Pavonicum coccineum. Thouinianum. Teniescens. Victori.

Pelargon.-Bl. mit feuerfarbenem und karmoſinrothem Grunde: Dumontianum. Flexuosum. Rubro-fuscum.

Pelargon.-Bl. mit dunkelviolettem und purpurfarbigem Grunde: Articulatum. Amoenum majus. Banksianum majus. Bristolianum purpureum. Cletonia. Desfontainianum. Exornatum. Primatum. Gloriosum purpureum. Holosericeum. Hallenii majus. Involucratum violaceum. Lanigerum. Megaleon majus. Russelianum. Fimbriatum. Adansoni.

Pelargon.-Bl. mit karmoſinrothem und mordoréfarbigem Grunde: Bullatum. Coutareanum. Daveyanum arboreum. Fusco-superbum. Questorum. Recurviflorum. Superbum grandiflorum.

(Fortſetzung folgt).

Neue oder wenig bekannte Pflanzen.

Lubinia atropurpurea. Link. Sie ſtammt vom Cap. Eine perennirende, ſtaudenartige Pflanze, die mehrere 1 bis 2 Fuß lange, glatte Stengel treibt. Die untern ſpathelförmigen Blätter ſind 2 — 3 Zoll lang, die obern abwechſelndſtehenden ſind lanzettförmig, zugeſpitzt, ganz glatt und unten punktirt, obgleich Sprengel das Gegentheil ſagt. Die Blüthe iſt endſtändig, obgleich ſie ſeitenſtändig zu ſein ſcheint, weil junge Seitenzweige ſie bald überwachſen; ſie bildet eine aufrechte, eiförmige Traube, von geſtielten purpurvioletten Blumen, deren Kelch faſt ſchwarz und runzlig iſt, mit 5 lanzettförmigen, zugeſpitzten Abſchnitten; die Blumenkrone iſt 4 — 5 Linien lang, tief in 5 längliche, auswärts gefaltete Lappen geſpalten; die 5 Staubfäden, noch einmal ſo lang als die Blumenkrone, aufrecht und ſich einwärts neigend, purpurfarbig wie das Uebrige der Blume, umgeben den viel kürzern Griffel.

Dieſe Pflanze iſt eine von denjenigen, welche man den Sommer hindurch in das freie Land pflanzen muß, um ganz ihre Schönheit entfaltet zu ſehen, während deſſen man junge Exemplare zurichtet, die man den Winter über im Glashauſe hält, um ſie im nächſten Frühjahre ins freie Land zu pflanzen. Wir haben die Blumenfreunde ſchon aufmerkſam gemacht, nach dieſer Methode exotiſche Pflanzen, die ſich leicht durch Samen, Stecklinge oder Wurzeltheilung vermehren, zu behandeln. Im Topfe kultivirt, entwickelt dieſe Pflanze kaum ein Viertel ihrer Schönheit, während ins freie Land an einen zweckmäßigen Ort gepflanzt, man ganz ihre Schönheit genießt u. ihren Werth erkennt.

Die Lubinia atropurp. blühte im Jardin des Plantes im Monat Juni. Hr. Neumann bemerkte, daß ihr eine ſehr feuchte Erde und ein warmer geſchützter Standort ſehr zugeſagt.

Selago dentata. Poir. Eine Cap-Pflanze mit einem am Grunde holzigen Stengel, der ſich in mehrere einfache, 12 — 15 Zoll hohe, grüne, geſtreifte Stengel theilt, welche mit zerſtreuten, linienförmigen, einen Zoll langen, am obern Theile mit einigen zugeſpitzten Zähnen verſehenen Blättern beſetzt ſind. Dieſe Blätter haben das Eigenthümliche, daß ſie oberhalb wie unterhalb eine tiefe Furche haben. Die zahlreichen Blüthen ſtehen in gedrängten Aehren an den Spitzen der Stengel, wo ſie hübſche hellillenfarbige Büſchel bilden. Ich habe bemerkt, daß der Kelch bei dieſer Art 5 faſt wellenförmige Abſchnitte hat, 3 obere ſehr kurze, und 2 untere ſehr lange, obgleich die Autoren bei der Gattung Selago nur 4 Kelchabſchnitte angeben, ferner daß der Kelch mit dem Deckblättchen, welches an ihm befindlich, verwachſen iſt, weil man daſſelbe nicht entfernen kann, ohne den Kelch mit loszureißen. Dieſe kleine Pflanze iſt ſehr zierlich, und verdient von den Blumenfreunden kultivirt zu werden; ſie blühte vom März bis zum Mai bei Herrn Cels, der ſie im mäßig warmen Glashauſe ſtehen hat.

Varietäten.

Berlin. In der 119. Verſammlung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den königl. preuß. Staaten am 5. Mai d. J. wurde unter andern vorgetragen: die von dem Herrn Profeſſor Schübler in Tübingen mitgetheilten, höchſt intereſſanten Unterſuchungen über die Gartenverhältniſſe in den Blüthen der Flora Deutſchlands, wonach die drei Hauptfarben: gelb, roth und blau am häufigſten in der Blüthe vorkommen, unter denen gelb die häufigſte, blau die ſeltenere iſt, und es ergibt ſich aus jenen mit großer Genauigkeit angeſtellten Unterſuchungen, daß die Flora Deutſchlands, im Mittel, unter 1000 Phanerogamen, mit deutlich ausgebildeten Blüthen: 344 weiß-, 299 gelb-, 5 orange-, 177 roth-, 59 violett-, 90 blau-, 16 grün-, 4,3 braun-, 1,4 ſchwarz-, 1,3 graublühende Arten beſitzt, ſo daß, wenn die weißblühenden von den übrigen abgezogen, und die drei ſo ſelten vorkommenden Farben: grau, braun und ſchwarz — nicht weiter in Berechnung gebracht werden, das Verhältniß ſich dahin geſtaltet, daß im Mittel unter 1000 mit gefärbten Blüthen: 457 gelb, 8 orange, 270 roth, 91 violett, 133 blau und 25 grün blühen. Nach dem Schluſſe der Sitzung begab ſich die Verſammlung in den königl. botan. Garten, um daſelbſt eine von dem Garten-Direktor Herrn Otto veranſtaltete Zuſammenſtellung der jetzt blühenden ſeltenen Gewächſe in Augenſchein zu nehmen, die mit Recht allgemeine Bewunderung erregte.

Berlin. In der 118ten Verſammlung des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den königl. preußiſchen Staaten am 14. April kamen zum Vortrage: Die Abhandlung des Subrektors Herrn Kahle zu Puttlitz über eine neue Vermehrungsart bei den Roſen, zur zahlreichen und ſchnellen Vervielfältigung der Mutterpflanzen; die Nachricht von einer durch den Cenſor Herrn Rupprecht zu Wien veranſtalteten Ausſtellung von Chrysanthemum Indicum von mehr als 1000 Exemplaren in 55 Arten. Noch verdient als eine ſeltene Erſcheinung beſonders erwähnt zu werden: ein von dem Juſtizrath Hrn. Meyer in der Verſammlung producirtes Exemplar von Rhododendrum arboreum in ſchönſter Blüthenpracht. Nach dem Schluſſe der Sitzung begab ſich die Verſammlung in den königl. botaniſchen Garten, um das daſelbſt neuerbaute, ſeiner Vollendung nahe Gewächshaus mit der dabei nach den Angaben des Herrn Garten-Direktors Otto eingerichteten, durch den Bau-Inſpektor Herrn Schramm ausgeführten neuen Waſſerheizung in Augenſchein zu nehmen; die Beſichtigung ergab das befriedigendſte Reſultat, und die in dieſem neuen Hauſe aufgeſtellte, reiche Sammlung der ſelteuſten blühenden Gewächſe gewähren einen reizenden Anblick.

Potsdam, den 6. April 1833. Auf der königlichen Pfaueninſel bei Potsdam hat von der ehemaligen Fulchironſchen

Palmen-Collection zu Paris, jetzt im Palmenhauſe auf der Pfaueninſel aufgeſtellt, Phoenix reclinata Jacq. aus Afrika und Fulchironia Senegalensis Leseb. vom Senegal, in Blüthe geſtanden.

Weimar, den 6. Mai 1833. Heute eröffnete der hieſige Verein für Blumiſtik und Gartenbau unentgeltlich für das Publikum die ſechſte wohlgelungene und hinſichtlich der blühenden Pflanzen wirklich großartige Blumenausſtellung im gewöhnlichen Lokal des Büchſenſchießhauſes. Jedesmal kann man ſich freuen, wenn dieſer uneigennützige durch unermüdeten Eifer für das Geſchmackvolle und Nützliche im Gartenbau ſich auszeichnende Verein eine Ankündigung zu einer Ausſtellung erläßt, denn gewöhnlich wird die Erwartung durch die Ausführung übertroffen, und befriedigt den Kunſtkenner, wie den Laien vollkommen, was auch bei dieſer Ausſtellung der Fall war.

Ein neues Arrangement durch Stellung der Pflanzen zeigte, wie man hier nicht anders gewohnt iſt, abermals geſchmackvolle Einrichtung und zwar auf eine ſolche Weiſe, daß die Eigenthümlichkeit jeder Pflanze deutlich hervortrat und recht gut beaugenſcheinigt werden konnte; — ein weſentliches Erforderniß einer derartigen Kunſtausſtellung. — Trotz der rauhen Witterung in den Monaten März und April, die uns nur mit ſehr wenigen Sonnenblicken erfreut haben, war die Zahl der ſchön und reichlich blühenden ſeltenern und bekannteren Pflanzen über die Erwartung groß, übertraf ſogar die letzte Frühjahrsausſtellung, und erregte die allgemeine Bewunderung der Menge der Beſchauenden.

Die Aufſtellung der Büſte der erhabenſten, allverehrteſten regierenden Frau Großherzogin, Protektorin des Vereins, die den Sinn für alles Gute und Nützliche durch raſtloſe Theilnahme weckt und pflegt, durfte hier nicht fehlen, ſie befand ſich in der Mitte zweier rechts und links derſelben angebrachten Blumenberge, welchen die ſeltenen Pflanzen in zahlreicher Blüthe vorzüglich zugetheilt waren. Während hohe, vielblumige Acacien, ſeltene Eriken, ſchöne Camellien, Azaleen, Rhododendren und Pelargonien in mancherlei Abarten und verſchiedenen lebhaften Farben die Augen der Blumenfreunde ergötzten, erfüllten Magnolien, Diosmen, Roſen, Hyazinthen, Nelken und ähnliche geruchvolle Pflanzen und deren Blüthen reichlich durch Wohlgerüche die Atmosphäre. Beſondere Abtheilungen im Zimmer auf halbrunden Tiſchen zeigten ebenfalls den regen Eifer der hieſigen und auswärtigen Mitglieder des Vereins bei Lieferung zur Ausſtellung.

Zwei vorzügliche Samenlackſtöcke von vier bis fünf Fuß Höhe mit vielen dichtgefüllten, langen Blumenſtengeln erregten vorzüglich Jedermanns Aufmerkſamkeit und Bewunderung.

Die höchſten Herrſchaften beehrten am erſten Tage die Ausſtellung mit ihrer Gegenwart und die überaus zahlreiche Menge der Zuſchauer, die täglich zuſtrömten, verließen ſehr befriedigt das blumenreiche Lokal.

Am dritten Tage der Ausſtellung hielten die zahlreich ſich eingefundenen einheimiſchen und auswärtigen Mitglieder des Vereins die gewöhnliche vierteljährliche Hauptverhandlung, in welcher unter mehrern eingereichten ſchriftlichen Abhandlungen auch eine über „Anwendung des Kecht'ſchen Weinſchnitts in hieſiger Gegend“ befindlich geweſen ſein ſoll.

Nach geendigter Hauptverhandlung freueten ſich viele Mitglieder des Zuſammenſeins bei einem gemeinſchaftlichen frugalen Mittagsmahl und ſchieden, nachdem eine freiwillige Abgabe von zwölf Stück ſchönblühender Blumenſtöcke aus den reichdotirten Belveder'ſchen Glashäuſern durch Verloſung mannichfaltigen Stoff zur heitern Unterhaltung gewährt hatte, fröhlich von einander.

Wien, 27. April. In den Gewächshäuſern des k. k. Hofgartens zu Schönbrunn blühen jetzt folgende Gewächſe:
Acacia diffusa. (Ker.) Aus Neu-Süd-Wallis. Leguminosae. Monadelphia, Polyandria.

A. longifolia. (Willdenow.) A. N.-S.-W. L. M. P.
— myrtifolia — — — — — —
— suaveolens — — — — — —
— verniciflua. (Cuningham.) — — — — —
Dodonaea salicifolia. (De Candolle.) Aus Neuholland. Sapindaceae. Octandria, Monogynia.
Dracaena reflexa (Lamark.) Von Madagascar. Asphodeleae. Hexandria, Monogynia,
Erica curviflora. (Hortorum.) Vom Vorg. d. g. Hoff. Ericeae. Octandria, Monogynia.
E. mollissima. (Hortorum.) V. V. d. g. H. E. O. M.
Erythrina carnea. (Aiton.) Aus Neuſpanien. Leguminosae. Diadelphia, Decandria.
Hakea acicularis (R. Brown.) Aus Neuholland. Proteaceae. Tetrandria, Monogynia.
H. microcarpa. (R. B.) V. d. Van-Diemens-Inſel. P. T. M.
— saligna. — Aus Neuholland. — — —
Leptospermum baccatum (Smith.) — Myrtaceae. Icosandria, Monogynia.
Sphaeroma umbellatum. (De Candolle.) Aus Südamerika. Malvaceae. Monadelphia, Polyandria.

Berlin. Im Monat März blühten im königl. botaniſchen Garten folgende ſchöne Pflanzen: Aloe glauca β. elatior How. — Crocus stellatus Hort. ang. — C. pusillus Tenore. — Dracaena paniculata Hort. — Bletia florida R. B. — Iusticia ventricosa Wall. — Oralia umbraculifera Roxb. — Eucalyptus paniculata. — Indigofera verrucosa Wall. — Scottia trapeziformis Bot. Mag. — Chorizema rhombeum R. B. —

Berlin, im März. In dem Gewächshauſe des Hrn. Juſtizrath Meyer iſt eine ganz vortreffliche Hyazinthenflor in den ſeltenſten und ſchönſten Farben und Formen aufgeſtellt. Auch iſt daſſelbe mit vielen andern ſchönen Topfgewächſen, namentlich mit Azalea ledifolia auf's Herrlichſte geſchmückt.

Im Garten zu Bellevue bei Berlin iſt auch in dieſem Jahre das ſchöne Gewächshaus mit blühenden Kamellien, Liliaceen und vielen andern ſchönen Pflanzen geſchmückt, und gewährt einen herrlichen Ueberblick. Ein neues und ſeltenes Epidendron aus Mexiko iſt unter den blühenden Pflanzen bemerkbar.

Berlin. Im März blühten bei dem Handelsgärtner Hrn. Kratz eine Menge ſehr ſchöne Camellien und zierten deſſen Gewächshäuſer.

Auch bei dem Fabrikanten Herrn Monves blühten die noch ziemlich ſeltenen Camellia eximia und reticulata.

Berlin, im März. Bei dem Handelsgärtner Herrn George findet man Maſſen von Rhododendren, Hyacinthen und von blühender, hoch und in Kronen gezogener Syringa Chinensis. Auch bei Herrn David und Pet. Friedr. Bouche fehlt es nicht an einer ſchönen Blumenflor, und die Häuſer ſind mit den mannichfaltigſten Liliaceen geſchmückt.

Berlin. Im März blühten bei dem Kunſt- und Handelsgärtner Herrn Mathieu die ſchöne Camellia ignescens, die C. Wittonia oder parviflora und die C. delecta.

Von der in Paris herausgekommenen gekrönten Preisſchrift:
„Traité du maïs ou blé de Turquie, contenant son histoire, sa culture et ses emplois en économie domestique et en medecine, par E. A. Duchesne“
erſcheint von J. H. Meyer in Braunſchweig in wenigen Wochen eine deutſche Bearbeitung, worauf wir unſere geehrten Leſer aufmerkſam machen wollen.

Hierbei eine Beilage: Pflanzen-Catalog von Hrn. Traugott und Jacob Seidel zu Dresden.

	à Priſe	ggl.	pf.
Zinnia multiflora fl. luteo, gelbe Zinnie		1	—
— — aurea, goldgelbe		1	—
— elegans, ſchöne		2	—
— grandiflora, großblumige		1	6
— tenuiflora, ſchmalblättrige		1	—
☞ Ein Sortiment Sommergewächſe, ſchönſte Sorten in 50 Priſen	1 Thlr.	—	—
Ein dergl.	in 30 Priſen	20	—
Ein dergl.	in 18 —	12	—
Ein dergl. der allerſchönſten	in 12 —	12	—

3. Topfgewächs-Blumen-Sämereien.

Die mit w. bezeichneten wollen warm ſtehen.

	à Priſe	ggl.	pf.
Acacia verticillata, wirtelblättrige Akazie	4 Kr.	1	—
— acanthocarpa, dornlaubblättrige	2 Kr.	2	—
— longifolia, langblättrige	2 Kr.	2	—
— lophanta, büſchelblüthige	3 Kr.	2	—
Amaranthus tricolor, w., dreifarbiger Amaranth		1	—
Argemone mexicana, Stachelmohn		1	—
Ardisia crenulata, w., kerbige Spitzbl.		2	—
Asclepias curassavica, w., Südamerik. Seidenpflanze		1	6
— nivea, w., weißblühende		1	6
Aster agrophyllus, Moſchus-Aſter		1	6
Basella rubra, w., rothe B.		1	6
Browallia elata, w., aufrechte B., blaue		1	—
Cactus mammillaris, Melonendiſtel		2	—
Canna indica, w., Indiſches Blumenrohr	4 Kr.	1	—
— coccinea, ſcharlachrothes	4 Kr.	1	6
— glauca, graugrünes	3 Kr.	1	6
— speciosa, w., prächtiges	4 Kr.	1	6
— mexicana, mexicaniſches	3 Kr.	1	6
Capsicum cerasiforme, w., kirſchähnliche Beißbeere		1	—
— baccatum, beerentragende		1	—
— nigrum, w., ſchwarze		1	—
— grossum, w., große		1	—
Cardiospermum halicacabum, w., glatter Herzſaame		1	—
Celosia argentea, ſilberähriger		1	—
— cristata, in 6 Farben, groß		1	6
— paniculata, riſpenförmiger		1	—
— pyramidalis, w., pyramidenartiger, extra		2	—
Commelina coelestis, w., blaue Comeline		1	6
Convolvulus siculus, w., Sicilianiſche Winde		1	—
Coronilla glauca, gelbe Peltſche		1	—
Cyclamen persicum, perſiſche Erdſcheibe		1	—
Datura fastuosa fl. pl. viol., w., gef. blauer Stechapfel		2	—
Dolichos lablab, w., Aegyptiſche Faſeole		1	—
Grahamia aromatica, gewürzhafte G., neu aus Mexico		1	6
Gomphrena globosa fl. albo, w., weiß. Kugel-Amaranth		1	—
— — fl. carneo, w., fleiſchfarbiger		1	—
— — fl. rubro, w., rother		1	—
Harachia speciosa, w., ſchöne H.	6 Kr.	2	—
Hedysarum paniculatum, w., riſpenförmiger	6 Kr.	1	—
— vespertilionis, w., fledermausblättr.	6 Kr.	1	6
— triquetrum, dreiſeitiger	6 Kr.	1	6
Heliotropium indicum, indian. Sonnenwende		1	6
— parviflorum, kleinblumige		1	—
Hemimeris urticifolia, neſſelblättrige Halbblume		1	—
Hibiscus manihot., w., ſchwefelgelber		1	6
— Humboldti, Humboldt's		1	—
— cannabinus, hanfartiger	3 Kr.	1	—
Ipomea coccinea, w., ſcharlachrothe Trichterwinde		1	6
— tuberosa, knollige	6 Kr.	1	—
— quamoclit., gefiederte	3 Kr.	1	6
Kaulfussia amelloides, amellenartige K.		2	—
Leptospermum rubricaule, rothſtengliche Südſeemyrthe		1	6
Malva elegans, ſchöne M.		1	6
Maurandia semperfl., immerblühende M.		1	6
— Barkleyana, Barkleys M. (prächtig)		2	—
Mesembrianthemum crystallinum, Eiskraut		1	6
— pomeridian., ranunkelblüth.		2	—
Melaleuca hypericifol., johanniskrautblättrige M.		1	6
Metrosideros lanceolat., lanzenförmige		1	6
— linearis, leinblättr.		1	6
Mimosa pudica, ſchamhafte Sinnpflanze	6 Kr.	2	—
Momordica balsamina, Balſamapfel	4 Kr.	1	—
Myrthus macrophylla, großblättrige Myrthe		1	—
Ocymum album, weißes Baſilicum		1	—
— maximum, großes		1	—
Passiflora gracilis, w., ſchlanke Paſſionsblume	6 Kr.	1	6
Pelargonia div. spec. grandifl., von beſten Sorten		1	
Rhododendron maximum, größte Alpenroſe		2	
— ponticum, pontiſche		2	
Rivinia humilis, w., rothfrüchtige Rivinie		1	
Salvia coccinea, ſcharlachrother Salbei		1	12
Solanum corallinum, Corallkirſche		1	
— melongena fr. albo, weißer eiförm. Nachtſchatten		1	12
— — fr. coeruleo, blauer		1	
Spermacoce rubra, w., rothe Sp.		1	12
Trachelium coeruleum, blaues Halskraut		1	
Tradescantia discolor, verſchiedenfarbige T.		1	
Verbena aubletia, Eiſenkraut (ſchön)		1	
Veltheimia capensis, capiſche Veltheimie		1	

4. Sämereien von Stauden-Gewächſen,

oder ſolche, die mehrere Jahre im freien Lande ausdauern.

	ggl.
Aconitum barbar., Sturmhut	1
— variegatum, bunter —	1
— Wildenowianum, Wildenows —	1
Agrostemma coronaria fl. rubro, Gartenrade, rothe	1
— — fl. albo, weiße	1
Althea rosa fl. pl., gef. ſehr ſchöne Winter-Malven in 12 Farben	1
— — aurea plenis., gefüllteſte Goldmalve	2
Amobium alatum, neue Immortelle	2
Antirrhinum bicolor, zweifarbiges Löwenmaul	2
— majus, großes —	1
Aquilegia vulgaris, gefüllt blühende Akelei in 16 Sorten extra	1
— vulg. bicolor, zweifarbige gefüllte —	1
— stellata, ſternförmig gefüllte —	1
— speciosa, prächtige —	1
Astragalus galegiformis, leinblättr.	1
Campanula medium fl. albo pl., weißgef. Glockenbl.	2
— coerulea pl., blaugef. G.	2
— medium, gem. einf. G., blau, weiß u. milchbl.	1
— pyramidalis, pyramidenförmig	1
— versicolor, verſchiedenfarbige	1
Catananche coerul., blaue Raſſelbl.	1
Dictamnus fraxinell., Diptam	1
Dianthus barbatus, Bartnelken in vielen Farben	1
— — fl. pl., gefüllte Bartnelke	2
— chinensis, Chineſernelke in vielen Farben	1
— — fl. pl., gefüllte —	1
☞ — caryophyllus, beſte Topfnelken, von 100 der beſten Sorten geſammelt 100 Kr.	16
— — von 60 Sorten — 100 Kr.	10
— — gefüllte 100 Kr.	5
Digitalis alba, weißer Fingerhut	1
— ferruginea, roſtfarbiger	1
— hybrida, blaßgelber	1
— purpurea, purpurr.	1
Galega officinal., Geisraute, weiß und blau	1
Hedysarum coronarium fl. rubro, hochrother Hahnenkopf (muß im Winter bedeckt werden.)	1
— — fl. albo, weißer	1
Hemerocallis japonic., blaue Taglilie, ſchön	2
Hesperis matronalis, blaue Viole	1
— tristis, graue Nachtviole	1
Lathyrus latifolius, breitblättrige Wicke	1
Linum perenne, Staudenlein	1
— grandifl., großblumiger	1
Lunaria rediviva, ſpitzfrüchtige Mondviole	1
Lychnis chalcedonica, ſcharlachrothe Lychnis	1
— — ferruginea, roſtfarbige —	1
— — fulgens, glänzende —	1
Matricaria parthenium fl. pl., gefülltes Mutterkraut	1
☞ Primula auricula, engl. allerbeſter Aurikelſaamen von Topf-Nummer-Blumen	24
— — engl. und lücker Aurikelſaamen von Topf-Nummer-Blumen	4
— veris, engl. u. deutſcher Primelſaamen von den ſchönſten Blumen	2
Papaver orientale, morgenländiſcher Mohn	1
Polemonium coeruleum, blaues Sperrkraut; alb. weiß	1
Potentilla atrosanguinea, ſchwarzrothe Potentilla	1
— nepalense, nepaliſche	1
Valeriana rubra, rother Baldrian	1
☞ Ein Sortiment von 30 der ſchönſten Sorten in 30 Priſen	18

II. Pflanzen.

A. Blumenzwiebeln und Knollen,

welche bis April trocken verſandt werden können.

		ggl.	pf.
Amaryllis formosissima	à Stück	3	
— vittata w.	—	16	—
— Reginae	—	12	—
— undulata, doldentragende	—	3	—
Begonia discolor	—	3	—
Caladium bicolor w.	—	6	—
Canna indica w.	—	4	—
— coccinea	—	6	—
— glauca, graugrüne	—	6	—
— mexicana	—	4	—
— speciosa	—	4	—
Commelina coelestis	—	2	—
Cyrilla pulchella	8 Stück	4	—
Ferraria Tygridia	à Stück	1	6
Gloxinia coccinea	—	10	—
— formosa	—	6	—
— maculata	—	3	—
Kaempferia Galanga	—	6	—
☞ Polyanthes Tuberosa, gefüllte Tuberoſa	—	1	6
☞ Ranunkeln, holländiſche, gefüllte, 100 Stück	1 Thlr.	—	—

B. Ganz gefüllte Georginen,

vorzüglich ſchön und blühbar.

	ggl.	pf.
Georgina variab. atropurpurea, dunkelpurp. 5-6 Fuß hoch	6	—
— — — incomparabilis, unvergl. 3-4'	10	—
— — — nigricans, ſchwarzpurp. 4-5'	6	—
— — atrococcinea formosa, dunkelſcharlachr. 4-5'	10	—
— — — grandifl., dunkelſcharl. großbl. 4-5'	12	—
— — — illicis paradoxa, dunkelſcharl. 5-6'	8	—
— — aurant. rubra, orangenf. mit roth 5-6'	6	—
— — — maxima, größte orangenf. 4-5'	10	—
— — — rubr. maj., große orang. m. roth 3-4'	10	—
— — badia, kaſtanienbraun 6-7'	8	—
— — — rubr., kaſtanienbraun m. roth 5-6'	8	—
— — carnea, fleiſchfarbig 4-5'	8	—
— — — saturata, fleiſchfarb. ſpitzblättr. 6-7'	6	—
— — coccinea, ſcharlachroth 4-5'	6	—
— — — elegans, ſchön ſcharlachrothe 4-5'	8	—
— — — formosa, ſchönſte ſcharlachr. 4-5'	12	—
— — — splendens, glänzendſcharlachr. 4-6'	10	—
Georgina variab. cocc. lutea, ſcharl. m. gelb 4-5' à Stück	6	—
— — — speciosa, prächtig ſcharlach 7-8'	8	—
— — cuprea, kupferfarbig 4-5'	8	—
— — crocea grandifl., ſafrangelb großbl. 6-7'	6	—
— — ferruginea rubr., röthlich roſtfarbene 4-5'	6	—
— — flavescens, blaßgelbe 5-6'	8	—
— — fuscata miniata, brennendbraunroth 4-5'	6	—
— — ignescens formosa, ſchönſte feuerigr. 4-5'	10	—
— — incarnata, incarnatroth 6-7'	6	—
— — lillacina albida, blaßlilla 6-7'	8	—
— — — hyalina, durchſichtig lilla 4-5'	6	—
— — — grandifl., großblumig lilla 6-7'	6	—
— — — suavecoerulesc., lilla m. blau 6-7'	8	—
— — — lilla 5-6'	6	—
— — lutea ranunculoides, gelb ranunkelf. 3-4'	10	—
— — miniata, zinnoberroth 4-5'	8	—
— — ochroleuca lillacina, ockergelb m. lilla 4-5'	8	—
— — phoenicea, brennendroth 4-5'	6	—
— — purpurea, purpurrothe 5-6'	4	—
— — — formosa, ſchönſte purpurr. 5-6'	8	—
— — — maculata, purpurr. m. w Flecken 5-6'	8	—
— — — speciosa, prächt. purpurr. 5-6'	6	—
— — — ranunculoides, purpurranunkf. 4-5'	10	—
— — — speciosa, prächtig purpurroth 4-5'	6	—
— — rosea, roſenrothe 5-6'	6	—
— — — albida, roſa mit weiß 4-5'	8	—
— — — lillacina, roſenroth m. lilla 3-4'	6	—
— — — variegata, roſa m. weiß 5-6'	6	—
— — — rubricunda, röthlich	6	—
— — rubra aur. striata, roth m. gelb. Strichen 4-5'	8	—
— — ruberrima pulchra, röthlich ſchillernde 4-5'	8	—
— — sanguinea ranunculoides, blutroth 3-4	10	—
— — sulphurea vera, reinſchwefelgelb 5-6'	12	—
— — — grandifl., ſchwefelgelb großbl. 4-5'	6	—
— — — speciosa (unica), 4-5'	16	—
— — violacea, violette 6-7'	9	—
— — — pallida, blaßviolette 6-7'	6	—
— — xerampelina, rothbraun 3-4'	6	—
— — — grandifl., rothbr. großbl. 5-6'	8	—
30 Stück in 30 verſch. Farben meiner Wahl à 6 Thlr.	—	—
20 — 20 — ſehr ſchöne Farben à 5 —	—	—
12 Stück in 12 Sorten Prachtblumen à 4 Thlr.	—	—

C. Nelken-Senker,

aus einer prachtvollen Flor.

	ggl.	rl.
12 Stück in 12 Sorten vom erſten Rang, mit Namen und Characteriſtik 2 Thlr.	—	—
12 dergl. in 12 Sorten ohne Namen, ſchöne Topf-Nummer-Blumen . 1 Thlr.	—	—
12 dergl. ſchöne gefüllte auf Rabatten . . .	8	—

D. Aurikel- und Primel-Pflanzen,

nur ausgezeichnete.

	ggl.	rl.
12 Stück in 12 Sorten, Engliſche Aurikel mit Namen und Farbenbezeichnung 3 Thlr.	—	—
12 dergl. in 12 Sorten, Lücker-Aurikel mit Namen und Farbenbezeichnung 1 Thlr.	12	—
100 Stück Nummer-Blumen, dergl., ohne Namen 16 Thlr.	—	—
25 dergl. ordinaire	8	—
12 dergl. Engliſche Primeln, vorzüglich ſchön .	6	—
100 Stück Primeln, ſehr ſchöne . . . 1 Thlr.	12	—

E. Saat-Kartoffeln.

Nr. 1. Feine mehlige engl. ganz frühe,
— 2. — — — Winter,
— 3. — holländiſche blaublühende,
— 4. Vorzüglich große mehlige Futterkartoffel.
— 5. Lange-Ganz frühe Kartoffel.
— 6. Engl. Roastbeef-Kartoffel.
— 7. Frühe neue engl. Maylai's Early.
— 8. Sehr frühe engl. oder Miſtbeetekartoffel.
— 9. Sehr frühe neue Amerikaniſche.
— 10. Lange eſchenblättrige Nieren.
— 11. Immerw. od. engl. Everlasting.
— 12. Engl. Spargelkartoffel.
— 13. Wilde Kartoffel.
— 14. Lange frühe rothblaue.
— 15. Zwitter-Kartoffeln.
— 16. Neue Amerikaniſche.
— 17. Glolle weiße frühe.
— 18. Schottländiſche.
— 19. Beſte Speiſe-Kartoffel.
— 20. Preis von Holland.
— 21. Zwiebel-Kartoffel.
— 22. Gurken-Kartoffel.
— 23. Preis von Weſterwald.
— 24. Gelbe Patata.
— 25. Frühe hellrothe Pfälzer.
— 26. Große Vieh-Kartoffel.
— 27. Lercheneier.
— 28. Rothblaumarmorirte.
— 29. Weiße große.
— 30. Peruvianiſche.
— 31. Wachholder-Kartoffel.
— 32. Große Nuß —
— 33. Schwarze Horn —
— 34. Hellrothe Rocks —
— 35. Hellrothmarmorirte.
— 36. Schwarze runde.

Das ganze Sortiment 1 Thlr. (einzelne Sorten werden nicht gegeben.)

F. Neue engliſche großblumige Pelargonien.

	à Stück ggl.
Pelargonium amplissimum . .	4
— Augustum . . .	6
— Belladonna . . .	8
— Bethelina . .	8
— Baringtonii . .	6
— Chandlers purpureum	6
— clueni . . .	6
— Coronation . .	8
— Davianum . . .	6
— defiance . . .	8
— dentisslanum . .	5
— de Vere . . .	12
— du gallo . . .	6
— Emilie . . .	8
— eximium . . .	6
— expansum . .	6
— fulgidum . . .	6
— gothanum . .	10
— gloriosum . . .	10
— grandiflorum . .	6
— Helenium . . .	6
— Herzog von Oldenburg	4
— incomparabilis superbum	10
— inexprimable . .	8
— inquinans fulgidum	4
— involucratum . .	8
— Iphigenia . . .	8
— Lady Brougthon .	4
— Lady Morgan . .	6
— Lavalette . . .	4
— Ludovicianum . .	12
— macranthon superbum	8
— magnificum majus	4
— Mungo Park . .	12
— Nerui . . .	12
— Navarino . :	12
— nobile . . .	5
— pavoninum . .	6
— Prinz Leopold . .	6
— — Leopold der Neue	8
— Prinz Regent . .	6
— — Regent der Neue	8
— Roi Georg . . .	6
— rubescens . .	6
— Schmidts invicibile .	8
— scutatum superbum	6
— solubile . . .	6
— spectabile azureum .	8
— splendens . . .	6
— sanguineum . .	4
— supremum . . .	8
— princeps . . .	8
— triumphans . .	6
— veneris . . .	4
— Waterloo . . .	6
— Watsonii . .	4
— Wood Majestum .	6

G. Staudengewächſe, Sträucher, und Roſen.

a. Staudengewächſe.

	à Stück ggl.
Acanthus spinosissimus . . .	6
Achillea ageratum . . .	2
— millefolia purpurea . .	2
— — aurea . .	3
— magna	2
— mongolica . . .	2
Achillea speciosa	3
— sambucifolia	3
— ptarmica fl. pl. . .	2
— crithmifolia . . .	2
— tanacetifolia . . .	2
— tomentosa	2
Aconitum album	4
— Hevegynum . . .	4
— variegatum . . .	3
— bicolor	3
— humile	3
— Napellus	2
— Wildenowianum . .	4
Acinos rotundifolius . . .	2
Actea racemosa	4
Adonis vernalis	2
Allium narcissiflorum . . .	3
— odorum album . . .	2
Amobium alatum . . .	8
Anchusa versicolor . . .	2
Anemone hepatica fl. rubro . .	2
— — — — pleno	4
— — — coeruleo .	2
— — — — pleno	4
— nemorosa alba pl. .	3
Agrostemma coronaria fl. albo .	2
— — — rubro	2
— — — — pleno	4
Anthirhinum bicolor . . .	3
— majus . . .	1
Anthericum Liliago . . .	2
— liliastrum . . .	4
— racemosum . . .	3
Apocinum androsaemifolium .	4
Aquilegia speciosa . . .	3
— viridiflora . . .	3
— canadensis . . .	4
— vulgaris fl. pl.. . .	2
Athamantha sybirica . . .	2
Artemisia abrotanum . . .	2
Arabis albida	2
— bellidifol.	2
Aristolochia clematitis . .	2
— microphylla . . .	3
Asclepias incarnata . . .	4
— syriaca	2
Asarum europaeum . . .	2
Asperula odorata	2
Aster acris	2
— amellus	4
— alpinus	4
— amplexicaulis . . .	2
— bicolor	3
— bellidiflorus . . .	2
— canus	4
— cordifolius	2
— carneus	2
— convertus	2
— concinnus	3
— elegans	4
— ericoides	2
— glaucus	4
— grandiflorus . . .	3
— — roseus . . .	4
— humilis	4
— linifolius	2
— macrophyllus. . . .	3
— multiflorus . . .	2
— Novi Belgii	2
— nemoralis	2
— obliquus.	3
— pendulus	3
— praecox	3
— puniceus	3
— punctatus	3
— rubescens	2
— salignus	2
— spectabilis	4
— umbellatus	2
— undulatus	2
— virgatus	2
— versicolor	3
Asperula odorata	2
Astragalus galegiformis . . .	3
Astrantia major	4
— minor	4
Atragena alpina	8
Balsamita vulgaris . . .	2
Bellis perennis alba pl. . .	1
— — rubra pl. . .	1
Betonica hirsuta . . .	4
— grandiflora lil. . . .	4
— incana rosea . . .	4
— officinalis	2
— striata	2
Boltonia glastifolia. . . .	2
Buphthalmum grandiflorum .	4
— speciosum . . .	4
— cordatum . . .	2
— salicifolium . . .	3
— scabrum . . .	2
— helianthoides . .	3
Bryonia alba	3
Caltha palustris fl. pl. . . .	4
Campanula carpathica . . .	4
— elyptica	3
— fragilis	3
— glomerata fl. albo .	4
— grandiflora . . .	4
— medium	2
— nitida	2
— persicifolia alba pl. .	3
— coerulea pl. . .	2
Campanula liliacea pl. . . .	4
— pulla	2
— pyramidalis . . .	4
— speciosa	3
— urticaefolia . . .	2
— versicolor . . .	4
Centaurea dealbata . . .	3
— glastifolia . . .	3
— lutea	2
— quinquefolia . . .	2
— sensana . . .	2
Cerastium tomentosum . .	2
Chelone glabra	6
— pubescens . . .	6
Chrysanthemum coccineum . .	4
— serotinum . .	4
— rigescens . .	2
Chrysocoma linosyris . . .	2
Clematis aquilegioides . . .	4
— angustifolia . . .	4
— erecta	3
— flammea	3
— integrifolia . . .	3
Cineraria speciosa . . .	6
— alpina	4
— bicolor	4
Circaea alpina	2
Colchicum autumnale fl. pl. .	4
Collinsonia canadensis . .	4
Conyza thapsoides . . .	3
Convallaria polygonatum fl. pl. .	2
Coriaria myrtifolia . . .	3
Coronilla coronata . . .	4
— emerus	4
Coreopsis verticillata . . .	5
— auriculata . . .	3
— tenuifolia . . .	3
— tripteris	3
Corydalis formosa . . .	3
— capnoides	2
Delphinium ambiguum fl. pl. .	8
— elatum . . .	3
— azureum . . .	6
— exaltatum . . .	6
— grandiflorum . . .	4
— hirsutum	4
— intermedium . . .	3
— urceolatum . . .	3
— villosum . . .	6
— Wildenowianum .	4
Dianthus barbatus	1
— carthusianorum . .	4
— japonicus . . .	4
— splendens . . .	4
— superbus . . .	3
Dictamnus albus	4
— fl. rubro . . .	4
Digitalis alba	3
— lanata	2
— hybrida	2
— purpurea	2
Dodecatheon Meadia . . .	4
Doronicum austriacum . . .	2
— orientale . . .	2
Dracocephalum nutans . . .	4
Epilobium angustifolium . .	2
— hirsutum . . .	2
Eupatorium ageratoides . .	4
— caucasicum . . .	4
— purpureum . . .	4
— verticillatum . . .	4
Euphorbia palustris . . .	4
Fritillaria imperialis . . .	3
— — fl. sulphureo	4
Geranium tuberosum . . .	2
Gladiolus maximus . . .	1
Glaucium fulvum . . .	3
Galanthus nivalis fl. pl. . .	1
Geum macrophyllum . .	2
— canadense	3
— coccineum, (eine wahre Prachtblume.)	6
Galega officinalis . . .	2
— orientalis	2
Gentiana acaulis . . .	3
Glycine apios	4
Hedysarum canadense . . .	4
— coronarium . . .	2
Helleborus niger	2
Helianthus diffusus . . .	4
— giganteus . . .	2
— multiflorus fl. pl. .	4
Hemerocallis japonica . . .	4
— — fl. albo .	4
— flava . . .	2
— fulva . . .	2
Hesperis matronalis . . .	2
— — fl. pl. albo .	2
— — — — coeruleo	3
Hieracium aurantiacum . .	2
Hoppea suaveolens . . .	4
Iris aphylla	4
— azurea	4
— biflora	3
— germanica	2
— graminea	2
— holophylla	4
— pumila	2
— pallida	3
— plicata	3
— sambucina	3
— sibirica fl. lil. . . .	2
— squalens	2

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto-Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. X. Weißenſee, (in Thüringen). Mai 1833. VI. Jahrg.

Beſchreibung und Cultur ſchönblühender Glashaus- und Stubenpflanzen.

Magnolia discolor Vent. Die zweifarbige Magnolia. Magnolia obovata Willd. — Mag. purpurea Sims. (Beſchluß.)

Dieſe ſchöne Magnolia kann eben ſowohl im freien Lande wie im Topfe kultivirt werden. An einer geſchützten Stelle und bei einer Bedeckung der Wurzel mit Laub, und der Zweige durch eine leichte Umkleidung mit Nadelholzzweigen, Rohr-, Heide- oder Baſtmatten überſteht ſie auch unſre härteſten Winter ohne Nachtheil, auſſer daß ſie im Freien nicht gern blühen will. Am beſten gedeiht ſie in einer Erdmiſchung aus 2 Theilen guter Raſenerde, 1 Theil Moorerde, 1 Theil alten Lehm und 1 Theil Flußſand. Man wählt bei der Cultur im Freien eine ſchattige geſchützte Stelle, gräbt den Boden 1 1/2 Fuß tief aus, und füllt die Grube mit der angegebenen Erdmiſchung an. Man ſetzt die Pflanzen im Frühjahre ins freie Land und rechnet auf jede Pflanze 3 □ F. Fläche. Wer übrigens Gelegenheit hat, dieſe Magnolia in den freien Grund eines Winterhauſes zu pflanzen, wird gewiß durch die reichlichſten Blüthen erfreut werden. Bei der Cultur im Topfe muß die Größe deſſelben dem Umfange der Pflanze entſprechen, darf aber ja nicht zu klein ſein. Während des Sommers gräbt man die Pflanze mit dem Topfe im Freien an einer von der Mittagsſonne geſchützten Stelle in Sand ein. Man durchwintert ſie im Gewächshauſe oder im Zimmer bei 1 — 3, höchſtens 5° R. Wärme, und giebt ihr dabei reichlich Luft und Licht, aber nur mäßige Feuchtigkeit. Das Verpflanzen muß, wenn es nöthig iſt, im Februar vorgenommen werden, bevor die jungen Blätter zum Vorſchein kommen.

Die Vermehrung dieſer Magnolia geſchieht entweder durch Stecklinge, welche vor dem Austreiben der Blätter abgenommen werden, oder leichter durch das Ablegen der untern Zweige, die gleich Nelkenſenkern eingeſchnitten, mittelſt eines Hakens in der Erde befeſtigt und zur Verhütung des ſchnellen Austrocknens der Erde über derſelben mit feuchtem Moos belegt werden, wo ſie dann leicht bewurzeln. Am häufigſten erzieht man ſie aus Samen, der in Töpfe oder in Käſtchen voll lockerer etwas lehmiger Dammerde, 2 Linien tief geſäet, ſchattig, mäßig feucht und bis zum Keimen in einem kalten Miſtbeete gehalten wird. Man durchwintert die jungen Pflanzen an einem froſtfreien Orte und bringt ſie, um ſie abzuhärten, wenn kein Froſtwetter iſt, fleißig an die Luft.

Ein Blick auf den neueſten Zuſtand des Gartenweſens in den kaiſerl. königl. öſterreich. Staaten, mit beſonderer Rückſicht auf die Blumiſtik.

Eingeſandt von Hrn. Jakob Klier in Wien.

Das letztverfloſſene Decennium geſtaltet für die öſterreichiſche Blumiſtik eine neue anſehnliche Epoche. Es ſei mir erlaubt, dieſe näher zu beleuchten, weil ich ſie als die Epoche unſeres Aufſchwunges in dieſem Fache der Kunſtgewandtheit betrachte. Und fürwahr, wenn nicht eine greuliche Barbarei den Frieden Europens niederſchmettert, ſo werden ſich die ſchönen Früchte dieſes Zeitraums noch langehin auf die nachfolgenden Generationen vererben.

Zu dieſem ehrenvollen Aufſchwunge unſerer Induſtrie gab uns den mächtigen Impuls unſer erhabenes Herrſcherhaus. Die Vorliebe der Allerhöchſt kaiſerlichen Familie für das Gartenweſen verbreitete ſich von oben herab bis zu den geringſten Ständen, ja faſt bis zu allen Individuen. Es iſt aber auch ſehr begreiflich, daß eine ſolche Neigung ſich allgemein verbreiten mußte, wenn man ſich's zu Gemüth führt, wie zahlreich die Anſtalten ſind, in denen durch Anhäufung und Wechſel der Blumen für das öffentliche Vergnügen des Publikums geſorgt worden, und daß ſogar Privatperſonen, deren Gärten durch vorzügliche Leiſtungen ſich bekannt gemacht haben, durch die Gnade der Allerhöchſten Beſuche beglückt und beehrt worden. Um ganz fremde und neue Cultur-Gegenſtände aus fernen Welttheilen herbeizuſchaffen, ſind ſchon öfters auf kaiſerliche Koſten ehrwürdige Botaniker dahin geſandt worden, wie z. B. Jacquin der Vater, Boos und Bredemayer, Märter, Pohl und Mikan, Van der Schot, Scholl, Welle, Booms, Enslen, Schott, Ritter, Schicht, Antoin, ꝛc. Ebenſo werden auch öfters talentvolle junge Gärtner, die, um ſich auszubilden, die fremden Gärten Europens beſuchen, ſehr zweckmäßig unterſtützt, durch welche dann gewöhnlich neue Arten von Pflanzen, oder Samen zur Bereicherung unſerer Gärten angeſchafft werden.

Im Jahre 1814 nach hergeſtelltem allgemeinen europäiſchen Frieden, fand auch ein welthiſtoriſches Ereigniß ſtatt, dem ich mich geneigt fühle, großen Theils die Veranlaſſung unſerer blumiſtiſchen Aufſchwungs-Epoche zuzumuthen. Eine große Anzahl erlauchter Perſonen beſuchte damals England, deſſen Boden von Feinden nicht betreten worden, wo alſo die Pflanzen-Cultur wenigſtens keine materielle Störung erlitten hatte, wo im Gegentheile viele neue Eroberungen in andern Welttheilen den Fond noch vermehrten, und die Reize der Gartengenüſſe ſteigerten. (Fortſetzung folgt.)

Ueber die Cultur der Camellien.

Vom Kunſt- und Handelsgärtner Hrn. Fr. Jakob Seidel in Dresden.)

(Beſchluß.)

Die Vermehrungsart der Camellien iſt jetzt ziemlich allgemein bekannt und in der That auch wenig ſchwierig. Die Zeit, wenn die Stecklinge gemacht werden, iſt einerlei. Ein Haupterforderniß aber iſt reifes und geſundes Holz. Dieſes hat man im Winter vor dem erſten Triebe, im Mai vor dem zweiten Triebe, und im Auguſt nach dem zweiten Triebe, in welchen 3 Zeiträumen man alſo mit gleichem Vortheile Stecklinge machen kann. Die Erde dazu iſt dieſelbe, wie bei den großen Pflanzen, nur etwas ſandiger. Ich ſtecke die Zweige in Töpfe von ohngefähr 5 Zoll Durchmeſſer, welche mit Erde ſo feſt als möglich angefüllt ſein müſſen, und ſo müſſen auch die Stecklinge mit einem Pflanzenholz ſehr feſt geſteckt werden. Die Töpfe kommen in ein mit Miſt angewärmtes Beet und bekommen wenig Luft und keine Sonne, bis ſie Wurzeln gemacht haben, welches bei den meiſten Sorten in 6 bis 8 Wochen, und bei einigen, wie Lady Adm. Campbel, conchaeflora, paeoniflora oft ſchon in 3 Wochen geſchieht. Da man, um den Raum zu ſparen, gemeiniglich 10 bis 12 Stecklinge in einen Topf ſetzt, ſo müſſen dieſe, ſobald ſie Wurzeln haben, gleich einzeln auseinander gepflanzt werden und dann 3 Wochen lang in einem warmen Beete vor Luft und Sonne geſchützt ſtehen. Nachher fängt man an, ſie abzuhärten und allmählig an Luft und Sonne zu gewöhnen. Dieſe kleinen Pflänzchen blühen oft ſehr dankbar und erfreuen ihren Pfleger ſchon im nächſten Winter mit ſchönen Blumen, eine Folge daß ſie viel unter Glas geweſen ſind.

Einige Mittheilungen über Calceolarien*).

Die Calceolarien ſind eine wahrhafte Zierde unſerer Gewächshäuſer und Blumengärten. Aus dem Samen derſelben laſſen ſich hübſche Spielarten erzeugen, entweder durch künſtliches Uebertragen des Samenſtaubes, oder auch durch das enge Zuſammenpflanzen mehrerer Arten. Im Jahr 1810 wurden nur erſt zwei Arten in den engländiſchen Gärten kultivirt, nämlich C. pinnata und Fothergili. Jetzt iſt dieſe Pflanzengattung auf mehr als 50 Arten und Varietäten herangewachſen, die ſich in den engländiſchen, niederländiſchen und deutſchen Gärten befinden. In dem neueſten Pflanzenkatalog von J. Makoy zu Lüttich werden 45 verkäufliche Arten und Abarten aufgeführt.

Die Calceolarien lieben im Winter einen trockenen, ja nicht feuchten Standort, und eine mäßige Wärme von wenigen Graden iſt hinreichend ſie zu durchwintern. Werden ſie wärmer gehalten, ſo bildet ſich auf ihnen

ein ſchwarzer, ſchmutziger Ueberzug oder ein Pilz, wovon die Pflanze vertrocknet und zuletzt erſtirbt. Nur mäßige Wärme und viel Luft ſchützen dieſe Pflanze gegen dieſe Krankheit. Die meiſten Calceolarien verlangen einen Boden, welcher aus gleichen Theilen Heide-, Laub-, Lehm-, Dammerde und Flußſand beſteht. Auch wachſen ſie in gewöhnlichem Boden oder leichter Gartenerde den Sommer hindurch im freien Lande, und zwar gern in einem ſolchen, der ſich im urbarſten Zuſtande befindet; daß jedoch manche Arten einen anders zuſammengeſetzten Boden bedürfen und vertragen, iſt leicht begreiflich. Um Gruppen von dieſen ſchönen Pflanzen im freien Lande auf Raſenplätzen aufzuſtellen, welche einen vortefflichen Effekt machen und den ganzen Sommer hindurch in Blüthe ſtehen, wähle man die ſtrauchartigen Species und die älteſten Exemplare, die für die Gewächshaus-Kultur zu groß ſind und kaſſirt werden, als: C. integrifol., — integrif. β. angustifolia, — thyrſiflora Grah., — robusta, — bicolor, — excelsa. Auf Rabatten hingegen nur diejenigen Arten, welche krautartig bleiben, als: tricolor, pressi, purpurea, chiloensis, fulva, plantaginea etc.

Die Vermehrung iſt leicht; die ſtrauchartigen wachſen gern durch Zweige, Stecklinge, und die krautartigen bilden in den Frühlingsmonaten in den Gewächshäuſern gern Luftwurzeln, ſo daß die Zweige von der Mutterpflanze nur getrennt und in Töpfe gepflanzt werden dürfen.

Blumiſtiſche Bemerkungen.

Um die Ameiſen aus dem Treibkaſten und Garten zu vertilgen, bediente ich mich des gewöhnlichen Kochſalzes. In erſterem ſtreute ich daſſelbe zwiſchen die Töpfe, in letzterem auf die Gänge der Ameiſen, worauf dieſe verſchwanden. Dann ſtieß ich die Decke der unterirdiſchen Gänge durch, damit das Salz auch da hinein fiel, und nach einigen Stunden war der Garten frei von Ameiſen. Man hüte ſich jedoch, daß das Salz keine jungen Pflanzen berührt, weil dieſe ſogleich davon ſterben. —

Daß bei den Pelargonien nicht blos die obern, ſondern auch die untern Blüthenblätter gezeichnet ſind, habe ich vielfach gefunden; jedoch jedesmal nur an der erſten Blume junger Stöcke, welche zum erſtenmale blühten. —

Die in dieſem Jahre angeſtellten Räucherungen mit Taback, um die Blattläuſe zu vertilgen, haben ſich ebenfalls wieder als ganz zweckmäßig bewährt.

Heiligenſtadt. Böttner.

Ohnmaßgebliche Beantwortung.

Auf die Anfrage in Nro. XX. der Blumenzeitung 1832 Seite 156: ,,welches wohl die zweckmäßigſte Bekleidung einer Laube wäre?'' will auch Unterzeichneter ſeine Meinung mittheilen. Rund um die Laube werden weiße Maulbeerſträucher, in dreizölliger Entfernung geſetzt und an zwei Seiten pflanzt man eine Weinrebe, wozu ſich die Peterſilien-Traube, wegen ihrer häufigen krauſen Blätter, am beſten eignet. Den Maulbeer läßt man ſo hoch wachſen, daß er die erſten Schenkel der

---

*) Im Auszug aus der Berliner Gartenztg.

Rebe, welche rund um in gleicher Höhe befeſtigt werden, berührt. Der Rebſtock wird oben über geleitet, und wenn beides ſtark im Schnitt gehalten wird, ſo belaubt es ſchnell, bleibt lange grün und iſt frei von allem Ungeziefer. Daß beide keine ein- oder zweijährige Pflanzen ſein dürfen, um ſchnell Schutz zu haben, verſteht ſich von ſelbſt. Ich habe mir im verfloſſenen Frühjahre eine ſolche angelegt und habe mich ſchon in ihrem wonnigen Schatten erfreut.

Kirdorf bei Bergheim, im Mai 1833. **Buſch.**

Aus der Revue horticole.

Ueber die Cultur der Pelargonien.

(Von Poiteau). (Fortſetzung).

Unter dieſen Pelargonien giebt es einige mit knollenförmigen Wurzeln und krautartigen Stengeln, die ſich durch Samen und durch Theilung der Wurzelknollen vermehren, andere, und dieſe machen den bei Weitem größten Theil aus, ſind Sträucher von 1 — 4 Fuß Höhe, mit weichem, in der Jugend ſehr wäßrigem Holze, mit mehr oder weniger gelappten Blättern, können viel gewöhnlicher durch Stecklinge vermehrt werden, und erfordern eine beſondere Sorgfalt, nicht allein zu ihrer Erhaltung, ſondern auch, damit ſie lebhaft vegetiren und zahlreiche, große und auffallend ſchöne Blumen hervorbringen.

Dieſe **Pelargonien**, welche der Sprachgebrauch häufig mit den Namen **Geranien** bezeichnet, müſſen, um zu dieſer Schönheit zu gelangen, in einem mäßig warmen und ſehr hellen Gewächshauſe von der Mitte September bis gegen Ende Mai kultivirt werden; während ſie hier befindlich ſind, darf man ſie nur vorſichtig begießen, und zwar mit Rückſicht auf ihr Wachsthum, auf die örtliche Feuchtigkeit und auf die durch die Sonnenſtrahlen hervorgebrachte Wärme; man muß die größte Reinlichkeit in der Umgebung zu erhalten ſuchen und alle gelbgewordenen Blätter und ſchimmeligen Theile von den Pflanzen entfernen. Man verfehle nicht, öfters Luft zu geben, und bei milder Witterung und Sonnenſchein die Luft im Gewächshauſe zu erneuern. Die Temperatur im Glashauſe ſelbſt darf nicht unter 4° Reaum. Wärme ſinken und vor dem Monat April nicht über 10° ſteigen; um dieſe Zeit treiben die meiſten Pelargonien, und da die Sonne natürlich die Wärme im Glashauſe vermehrt, ſo muß man häufig Luft geben, um das Spindeln der Pflanzen zu verhüten. Haben die Pelargonien hinlänglich getrieben, ſo ſetzt man ſie geſchmackvoll und regelmäßig etwas weiter auseinander, entweder auf ihren Stellagen, oder auf horizontalen Tafeln, ſo daß die niedrigſten Pflanzen vornhin geſtellt werden. Wenn das Gewächshaus auf die Art gebaut iſt, daß alle Pflanzen nicht weiter als 2 — 4 Fuß vom Fenſter entfernt ſtehen, ſo iſt dies um ſo beſſer.

Die ſo behandelten Pelargonien werden meiſtentheils zwiſchen dem 15. April und Monat Juni blühen und durch ihre Pracht und die Verſchiedenheit der Farben eine bezaubernde Wirkung machen. Während dieſer ganzen Zeit darf man die Fenſter des Gewächshauſes nicht gänzlich entfernen, weil ſtarke Winde, heiße Sonnenſtrahlen, und Regengüſſe die Blüthe verderben. Wenn die Sonnenſtrahlen zu brennend ſind, ſo legt man eine leichte Leinwanddecke oder dünne durchbrochene Strohmatten über die Fenſter, in der Abſicht,

die Strahlen zu brechen, nicht eine gänzliche Dunkelheit hervorzubringen. (Beſchluß folgt.)

Neue oder wenig bekannte Pflanzen.

Dendrobium speciosum. Sm. **Prächtiger Baumwucher.** Eine perennirende Pflanze aus der Familie der Orchideen, in Neu-Südwallis einheimiſch, welches der heißeſte Theil Neuhollands iſt, weshalb ſie in unſerm Clima auch im Warmhauſe gehalten werden muß. Sie iſt eine prächtigblühende Pflanze, die den Blumenfreunden anempfohlen werden kann. Aus der bündelförmigen, weißlichen Wurzel entſtehen ein oder mehrere höckerige, ſpindelförmige, abſtehende, einfache, nach ihrem Alter 4 — 8 Zoll lange Stengel, die in ihrer Jugend mit weißen, papierartigen Deckblättern beſetzt ſind; der obere Theil dieſer jungen Stengel iſt mit 2 oder 3 eiförmig-länglichen, ſtumpfen, am Grunde halbſcheidenförmigen, divergirenden, verdickten, ſtrahlenförmigen, lederartigen, glänzenden, 4 — 6 Zoll langen Blättern beſetzt. Wenn ein 5- oder 6jähriger Stengel keine Blätter mehr treibt, ſo erſcheint er nackt, grün, geſtreift und mit 6 — 12 weißlichen Querſtrichen verſehen, welche die Stelle der abgefallenen Blätter bezeichnen; alsdann bemerkt man auch winkelſtändige Sproſſen am obern Theile des Stengels, welche nach und nach aufſchwellen, und in dem Vaterlande der Pflanze ſich wahrſcheinlich zugleich in blüthentragende Stengel verlängern; aber bei uns hat ſich nur eine einzige dieſer Sproſſen zu einem grünen, 15 — 18 Zoll langen, divergirenden Stengel entwickelt, der nicht ſo ſtark als ein kleiner Finger, am Grunde mit weißen Schuppen und am mittleren Theile mit ſehr kleinen grünen Schuppen beſetzt iſt. Die Spitze endigt ſich in einer einfachen, länglichen Blüthentraube, beſtehend aus ungefähr 30 zeiſiggelben Blumen, die 15 Linien breit, ausgehöhlt ſind, ſehr angenehm riechen, in mehrern Schneckenlinien geordnet ſtehen, eine jede auf einem einfachen, 15 Linien langen Blüthenſtiele. Die 3 äußern Abſchnitte ſind ſtumpf-lanzettförmig; der obere iſt gerade und die beiden untern nach inwendig gebogen. Die 2 inneren und Seiten-Abſchnitte ſind gerade, viel ſchmäler und gelber als die äußern. Die Lippe iſt kurz, nagelförmig, löffelartig ausgehöhlt, gelber als das Uebrige und mit kleinen purpurfarbigen Querlinien gezeichnet; ſie theilt ſich in drei Lappen, wovon die beiden Seitenlappen zugerundet und der mittlere eiförmig, an der Spitze ausgezackt iſt. Die Befruchtungsſäule iſt dick, kurz und endigt ſich in einer weißen Anthere mit vier Staubmaſſen.

Dieſe ſchöne Pflanze ſtand am 10ten Februar im Jardin des Plantes in voller Blüthe und ſchien ſich lange Zeit hindurch in dieſem Zuſtande zu erhalten. Man kultivirt ſie in einer nur wenig vermiſchten Heideerde im Topfe, und ſetzt den Topf in das Lohbeet eines Warmhauſes. Die Eigenthümlichkeit, auf ihren knolligen Stengeln außerhalb der Erde Wurzeln hervorzubringen, zeigt an, daß ſie Paraſytpflanze iſt und daß, wenn ſie in ein freies Heideerdebeet im Warmhauſe geſetzt würde, ſie eine weit vollkommnere Entwickelung erreichen und noch viel ſchöner blühen würde.

Syſtematiſche Namen der merkwürdigſten Pflanzen-Gattungen und Arten, ihr Genitiv ꝛc.

(Fortſetzung.)

Mitgetheilt von L. aus T.

Allophy̆lus. L. (Flor. zeylan. N. 140) i. masc. **Fremdling.**

Von ἀλλόφυλος, ein Fremder (von allos anderer und phylon Nation mithin eine ausländiſche Pflanze. Da Linné, der Taufpathe dieſer Gattung, obige Herleitung in ſeiner philosoph. bot. S. 186 ſelbſt angiebt, ſo unterliegt es keinem Zweifel, daß der in deſſen spec, plantar. Seite 496 befindlichen Benennung Allophyllus ein Druckfehler zum Grunde liegt, welcher zu der irrigen Auslegung von allos und phyllon — ein Strauch, deſſen Zweige mit abwechſelnden Blättern beſetzt ſind und deswegen Wechſelblatt genannt wird — Veranlaſſung gegeben hat.

Alnus. Gaert. i. F. Arle, Erle.

Nach der gewöhnlichen Abtheilung von amnis, der Fluß, aber wahrſcheinlicher aus dem Celtiſchen von al, bei, und lan, Fluß, Strom, zuſammengezogen aln. weil dieſer Baum (A. glutmòsa. Gaert. oder Betula Alnus L.) an Flüſſen oder feuchten Orten zu wachſen pflegt. Aus gleichem Grunde ſoll auch die deutſche Benennung Arle von dem altdeutſchen Al (Waſſer) hergenommen ſein. (Fortſetzung folgt.)

Varietäten.

Berlin. Des Hrn. Kunſt- u. Handelsgärtn. *Krauſe* Treibgärtnerei lieferte auch in dieſem Jahre herrlich blühende Centifolien und andre ſchöne Roſen. Auch die Hyacinthen, unter denen ſich viele nicht gewöhnliche Arten befanden, verdienen rühmliche Erwähnung. Frühe Tulpen, unter denen mehrere noch vor wenig Jahren ſeltene Arten, blühten vortrefflich.

Bei dem Kunſt- und Handelsgärtner Herrn *Touſſaint* zeichneten ſich die ſchon zu Weihnachten aufgeſtellten ſchönen *Blumen-Stellagen* in mehrern Formen aus; ſie ſind für jedes Putzzimmer ein ſchöner Fenſterſchmuck.

Berlin. In der ſchönen Camellienſammlung des Herrn Juſtizraths *Meyer* blühten im Monat März folgende ſchöne Camellien: Camellia var. Dorsetti, — Elphinstoniana, — gigantea, — Gousoniana, — Halesia, — Lehmanni, — pulchella, — papaveracea, — Reewesiana, — Rosa Mundi, — Rollinsoniana, - sanguinea, — splendens, — striata sinensis.

Unter den neuern Arten dieſer Camellienſammlung verdienen vorzüglich genannt zu werden: Cam. var. anemoneflora alba, — argentea, — atroviolacea, — Charles Auguste, — compacta, — Eclips (Pressi), — Gloria Mundi, — gloriosa, — Griffini, — Johnsonii, — Knightii, — Mlle. de Libert, — Oxoniensis, — Prince d'Orange, — punctata (Gray's invincible), — penicillata, — princeps, — Reine des Pays Bas, — Rossi, — spathulata, — venusta, — Wilbrahamia, — ornata, — Woodsii, — elegans, — imperialis.

Bollweiler. (Fortſetzung.) Verzeichniß der *Camellien*, welche in den Gärten der Herren Gebrüder *Baumann* daſelbſt kultivirt werden:

Camel. insignis.
- - fl. albo.
- punctata.
- involuta.
- Johnsonia.
- Kew-Blush.
- Kisii.
- Lankmannii.
- Lippoldii.
- lucida.
- macrophylla.
- myrthifolia.
- Nanettensis.
- Kew-importet.
- Oxoniensis.
- paeoniflora.
- - rosea.
- Palmerii.
- papaveracea.
- paradoxa.
- Parmentierii.
- Pearl.
- Pensillata.
- Pinck.
- hybrida coronat.

C. pomponia alba.
- praegnans.
- princeps.
- pulchella.
- pulcherrima.
- purple.
- Reine des Pays-Bas.
- Roi des Pays-Bas.
- Rives nova.
- Rivinii.
- Rosa Mundi.
- rosea grandifl.-simplex.
- Rosalie (belle).
- rosea flavescens.
- rosaeflora.
- rosaceflora grd.
- rosea plena.
- rotundifolia.
- rubricaulis.
- rubra plena.
- sanguinea.
- semi-duplex.
- Simsii.

C. spathulata.
- speciosa Pink.
- splendens.
- supina.
- variegata plena.
- venosa.
- Welbankii.
- Wilbrahamia.
- Willtonia.
- Yongsii.
- oleifera.
- oleifolia.
- oleifol. latifol.
- sasangua alba.
- - rosea pl.
- Lindbria.
- Rossiana superb.
- Lindbriata.
- monstrosa.
- rubra maxima.
- Masters double rad Graya.
- Carolus.
- Derbiana.

(Fortſ. folgt.)

Cöln a. Rh. im Mai 1833. Bei dem Kaufmann Hrn. *Neven* hieſelbſt, einem großen Verehrer der lieblichen Kinder Florens, fand ich eine Camellia punctata, die ich längſt zu ſehen gewünſcht hatte. Der Bau der Blume iſt nicht ſchön, aber die Farbe und das herrliche Kolorit übertrifft die meiſten ihrer Schweſtern. Der Grund iſt reinweiß mit roſenrothen Streifen, bis in das gelbe Herz gehend; vier Blättchen, die kreuzförmig ſtehen, ſind ganz roſenroth, was der Blume ein eigenes Anſehn gibt. — Bei dem Herrn *Engels*, der den Altar der Holden täglich mit neuen Gaben zu zieren vermag, ſah ich auch ein Exemplar in der Blüthe, welches aber ſchwach und Vieles zu wünſchen übrig ließ. Hr. *Neven* erwartete die Blüthe von der Camellia la Grandeur roseo-flore; die Blüthenknospe verſprach viel, was aber aus ihr geworden, weiß ich nicht. Auch vergönnte mir es die Zeit nicht, deſſen 21 Spezies Akazien zu bewundern. *Buſch.*

(*Gartenkunſt der Chineſen.*) Fortſetzung. — Uebrigens wird der Europäer mitten in der Verkehrung der Harmonie der Natur, die gewöhnlich in den Gärten der Chineſen vorherrſchend iſt, ungemeines Vergnügen an der Anordnung und Nettigkeit ihrer Pflanzſchulen, und der unabläſſigen Sorgfalt finden, die ſie auf ihre Topfpflanzen verwenden. Die Florimanie wird in China noch weiter getrieben, als in Europa, wie die hohen Preiſe beweiſen, welche daſelbſt für ſeltene Pflanzen gegeben werden; 100 Dollars (200 fl.) werden ohne Anſtand für ſchöne Exemplare ihrer Lieblingspflanzen bezahlt, z. B. für die Macklen (das ſo beſonders wohlriechende Epidendrum furcatum), die nicht einmal ſehr ſelten ſind, oder für Moutan (Paeonia Moutan) von beſonderer Farbe oder Blüthe; allein dieſe Pflanzen werden nicht in Canton ſelbſt gezogen, ſondern kommen aus den nördlichen Provinzen. In ihrer botaniſchen Nomenclatur folgen die Chineſen gar keiner Regel, man müßte die zwei Fälle ausnehmen wollen: nämlich alle Pflanzen mit narciſſenähnlichen Blättern, wie die Arten von Epidendron, Tankervillia, Amomium etc. führen das Wort *Lan*, das mit *Lilie* am beſten zu überſetzen wäre, als Vorname, und ihre Lieblingsfamilien, worunter der Thee, die Camelia, Pyrus etc. gehören, führen die Benennung *Tſcha* (Thee) als Gattungsnamen, und werden durch einen Trivialnamen, als *roth*, *weiß*, *niedrig*, *hoch* u. ſ. w. unterſchieden. (Fortſetzung folgt.)

Bibliographiſche Notiz über Blumiſtik.

Der Blumengärtner. Eine Zeitſchrift für Blumenfreunde; herausgegeben von F. L. *Finckh*, Dr. der Philoſophie, Prof. ꝛc. und G. F. *Ebner*, Kaufm. u. Blumiſt. 2r Jahrg. 4., 5. u. 6. Heft. Stuttgart. Verl. von C. Hoffmann 1831.

Der Umſtand, daß einige Hefte dieſer lehrreichen blumiſtiſchen Schrift uns nicht zugegangen waren, verzögerte die fernere Anzeige derſelben in unſern Blättern. Statt aller weitern Empfehlung theilen wir unſern geehrten Leſern das Inhaltsverzeichniß der vorzüglichern theoretiſchen und praktiſchen Abhandlungen mit: Aphorismen über die Erziehung von gefüllten Levkoyen-Samen. — Einige Worte über Erde-Miſchungen für Glas- und Treibhauspflanzen. (Recht gut und ſachgemäß.) — Cultur des Chrysanthemum indicum. — Ueber das Begießen der Topfgewächſe. (Ein Auszug aus der, dieſen Gegenſtand behandelnden Schrift von *Franz*). — Bemerkungen über die Cultur der Aloen. (Ganz richtige Bemerkungen!) — Die Erziehung und Wartung der Sommerlevkoyen in Töpfen. — Künſtliche Schutzmittel gegen das Erfrieren der Pflanzen. (Im Auszug aus *Göpperts* Abhandlung über die Wärme-Entwickelung in den Pflanzen). — Ueber die Anlegung der Lauben in Gärten und Park-Anlagen. (Ein aus C. Sprengels Gartenzeitung, Jahrg. 1804, entlehnter guter Aufſatz). — Neue Behandlungsart der in Zimmern zu treibenden Blumenzwiebeln! — Ueber die Cultur der Garten-Ranunkel und Anemone. — Zimmer und Fenſtergarten. — Miscellen. — Literatur. — Pflanzentauſch.

(Anzeige). Allen geehrten *Garten-* und *Blumenfreunden* widme ich die ergebenſte Anzeige meiner, mir zur Pflicht gemachten Wohnortsveränderung, mit der Bitte, die dem *Rector Buſch* in *Köln* am Rhein erwieſene Freundſchaft und Liebe dem *Pfarrer Buſch* in *Kirdorf* nicht zu entziehen! Auch fahre ich fort, Einſendungen in die *Blumen-Zeitung* und Frauendorfer Gartenzeitung für die Redaction in Empfang zu nehmen und monatlich abzuſenden. Dieſe Beiträge für obengenannte Zeitungen können entweder an mich direkt, *franco Bergheim*, oder durch Herrn Buchhändler *Peter Schmitz* in *Köln* abgegeben werden.

Kirdorf bei Bergheim 1833. *Pfarrer Buſch.*

Hierbei eine Beilage: Nro. 2. der weimariſchen Gartenbauverhandlungen.

No. 11. Mai. 1833.

Monatliche Berichte und Mittheilungen aus dem Verein für Blumiſtik und Gartenbau in Weimar.

Redacteur: Dr. Weiſſenborn in Weimar.

Ueber Acclimatiſirung exotiſcher Zier-Pflanzen.

Vom Herrn Garte-Cnonducteur L. Sckell zu Belvedere.

(Fortſetzung).

Will ſich jemand in ſeinem Garten ein Beet für Rhododendren, Kalmien ꝛc. anlegen, ſo wähle er ſich vor Allem einen ſchicklichen Ort. Die beſte Lage iſt gegen Morgen und Abend, wo von Norden her die Beete gegen die kalten Nordſtürme im Winter, und von Süden gegen die heißen Sonnenſtrahlen im Sommer geſchützt ſind, ſo daß die Pflanzen während des Sommers die Sonne von ihrem Aufgange bis gegen 10 Uhr Vormittags und von Nachmittags 4 Uhr an bis Sonnenuntergang haben können. Auf dieſer Stelle grabe man ſich ein Beet von beliebiger Länge und Breite, (jedoch wenigſtens 4 Fuß breit), ohngefähr 3 bis 3½ Fuß tief aus; alsdann bringe man in dieſe Grube ½ Fuß hoch Steine oder groben Kies, welches dem ſich im Beete ſammelnden Waſſer als Abzucht dient, und auf dieſe einen Fuß hoch Hau- oder Hobelſpäne und andern Holzabraum, hierauf bringt man den Abgang der durchgeworfenen Holzerde ebenfalls 1 Fuß hoch und zuletzt die feine Holzerde; worauf die Pflanzen eingepflanzt werden, wozu das Frühjahr die beſte Jahreszeit iſt.

Während des Sommers hat man fleißig nachzuſehen, daß die Erde nicht zu trocken werde und daß kein Unkraut, welches ſich gerne in dieſer Erde verbreitet, empor komme. Im Spätherbſt oder zu Anfang des Winters, wenn ſchon ſtarke Fröſte mit 2 bis 3 Grad Reaum. Kälte eintreten, bedecke man die Wurzeln der auf dem Beete ſtehenden Sträucher mit Laub oder, wenn man ſie haben kann, mit Fichten- oder Kiefer-Nadeln, mache dann von Stangen oder Bretern, welche man an in die Erde geſchlagene Pfähle befeſtigt, einen Rahmen um und über das Beet, und belege ſolchen mit Tannen- oder Fichten-Reißig dergeſtalt, daß von keiner Seite die Kälte zu ſtark auf die Pflanzen einwirken kann. Das Ganze belegt man alsdann 1 1/2 bis 2 Fuß hoch mit Laub; im Fall die Pflanzen zu hoch gewachſen wären und ſich daher nicht gut bedecken ließen, biegt man ſie behutſam um, und befeſtigt ſie vermittelſt hölzerner Haken an die Erde. Unter dieſer Bedeckung bleiben die Pflanzen bis zum Frühjahr ſtehen; ſollte im Winter einige Tage gelindes Wetter eintreten, ſo ſehe man nach, ob die Mäuſe keinen Schaden thun und treffe Vorkehrungen zu deren Vertilgung.*)

Im Frühjahr, zu Anfang des Märzes, kann man anfangen die Bedeckung etwas zu lichten, doch laſſe man ſich nicht verleiten, bei anhaltend ſchöner Witterung die Bedeckung wegzunehmen; nur erſt wenn keine bedeutenden Fröſte mehr zu fürchten ſind, und die Pflanzen ſich nach und nach wieder an die Luft gewöhnt haben, kann ſolches geſchehen.

(Beſchluß folgt).

Aufbewahrung der Zwetſchen im friſchen Zuſtande.

Die gewöhnliche blaue Zwetſche, welche in Thüringen vorzugsweiſe ſehr häufig gebauet wird, und vorzüglich gut gedeihet, eine der nutzbarſten und zugleich wegen ihrer leichten Kultur und großen Tragbarkeit werthvollſten Obſtſorten, iſt auch insbeſondere im friſchen Zuſtand, ihres Wohlgeſchmackes und vielſeitigen Gebrauchs halber, ſo allgemein beliebt, daß es der Mühe wohl lohnt, ſie in dieſem Zuſtand ſo lange als möglich zu erhalten.

Zu dieſem Zweck ſind ſchon mancherlei Mittel mit verſchiedener Verfahrungsweiſe empfohlen worden.

Zwei Mitglieder des Vereins hatten es ſich zum Geſchäft gemacht, ſowohl dieſe ſchon empfohlenen Mittel mehrfach an der Hand der Erfahrung zu prüfen, als auch noch andere Verſuche zur Erreichung des Zwekkes anzuſtellen.

Nach den jetzt vorgelegten Ergebniſſen der wiederholt gemachten Verſuche, ſcheint „die Aufbewahrung in feſtverſchloſſenen irdenen Gefäßen unter der Erde" das ſicherſte und leichteſte Mittel zum Zwecke zu ſeyn; wobei folgendes Verfahren ſich als ganz vorzüglich bewährt hat.

---

*) In irgend einer Schrift über Garten- oder Feldbau, deren Titel mir aber entfallen iſt, wurde das Laub der Wallnuß als Mittel zur Abhaltung der Mäuſe empfohlen. Verſuche, die ich vor zwei Jahren und voriges Jahr damit machte, haben mir gezeigt, daß die Mäuſe dieſes Laub eben ſo wenig ſcheuen, als jedes andere.

Die Zwetſchen werden bei trockenem Wetter vorſichtig, mit den Stielen, vom Baum gebrochen und in irdene, hartgebrannte, mit dergleichen Deckeln verſehene Büchſen (ſo genanntes Steingut *) ſchichtweiſe eingelegt. Zwiſchen jede Schicht legt man ſo viel friſche Zwetſchen=Blätter als nöthig ſind um die Oberfläche zu bedecken. Die ganz voll gefüllten Büchſen werden waſſer= und luftdicht verſchloſſen und ſo tief in die Erde gegraben, daß der Froſt nicht in dieſelben dringen kann.

Zu dieſem Verſchluß genügte bei mehreren Verſuchen vollkommen, daß der Falz an dem obern Rande der Büchſe mit weichem Wachs belegt und ſodann der Deckel aufgeſetzt und in das Wachs eingerieben wurde. Die Schwere der aufliegenden Erde hindert ſchon genugſam das Lockerwerden des Deckels; inzwiſchen kann man zu mehrerer Sicherheit den Deckel mit Draht von Eiſen oder anderm Metall an die Büchſe feſt anziehen. Wollte man zum Verſchluß eines noch feſtern und bindendern Kittes ſich bedienen, ſo würde der Zweck dadurch nur um ſo gewiſſer erreicht werden.

Um auch bei nicht allzutiefem Eingraben gegen den Froſt vollkommen geſichert zu ſein, und um auch bei ſtarkem Froſt die Büchſen ohne große Beſchwerde aus der Erde nehmen zu können, würde die letztere nur eine angemeſſene, leichte Bedeckung zu erhalten brauchen.

Die auf dieſe Weiſe bis in die Mitte des Winters und noch länger aufbewahrten Zwetſchen hatten, nach den vorgelegten Proben, alle Eigenſchaften eben vom Baum gebrochener Früchte; ſie waren vollkommen geſund, weder angefault, noch im mindeſten eingeſchrumpft; die Stiele ſaßen noch feſt; auch in Farbe ſowohl, als im Geſchmack, und ſelbſt im Geruch, waren ſie von friſchgebrochenen nicht zu unterſcheiden.

Die fraglichen, vollkommen gelungenen Verſuche wurden übrigens mit völlig reifen, einige ſogar mit ziemlich überreifen, jedoch noch ganz geſunden Früchten angeſtellt.

---

*) Die hier in Weimar und in ziemlich weitem Umkreiſe ſehr bekannten, wohlfeilen Geſchirre dieſer Art aus den Töpferwerkſtätten zu Stadtbürgel, die bis zu einer Höhe von 1½ Fuß und noch größer gefertigt werden, eignen ſich hierzu ganz vorzüglich.

Beſchreibung und Kultur der Lechenaultia formosa.

Vom

Herrn Hofgärtner J. C. Sckell zu Belvedere.

(Beſchluß.)

Am beſten gedeiht dieſe Pflanze in einem nicht zu großen Blumentopf. Die ihr am beſten zuſagende Erde beſteht aus 3 Theilen Haideerde und einem Theil Damm= oder fette Lehmerde mit feinem Waſſer=Sand vermiſcht. Im Sommer liebt ſie einen etwas ſchattigen Standort, im Winter hingegen gedeiht ſie am beſten, wenn ſie nicht weit von den Fenſtern entfernt iſt, und ſie befindet ſich bei 5 Grad Reaum. Wärme am beſten. Beim Begießen muß man ſehr vorſichtig ſein, weil ſie im Winter ungemein leicht abfault, wenn ſie zu naß gehalten wird; verſäumt man dagegen im Sommer ein einziges Mal, ſie zu rechter Zeit zu gießen, ſo iſt ſie unwiederbringlich verloren. Die beſte Zeit die alte Pflanze umzuſetzen iſt im Monat März bis Ende April, überhaupt wenn die Pflanze nicht in der Blüthe iſt. Stecklinge kann man dagegen vom Monat Februar bis September machen, d. h. wenn die Nebenzweige die dazu gehörige Stärke und Reife haben; man nehme dazu kleine Töpfe von ohngefähr 5 Zoll Tiefe und 4 Zoll Weite am oberen Rand, fülle ſolche 1 Zoll hoch mit feinem Kies, bedecke dieſen eben ſo hoch mit feingeſchnittenem Moos (oder in Ermangelung deſſelben mit Knoten der durchgeſiebten Haideerde), fülle den Reſt mit feiner Haideerde aus, und drücke dann das Ganze ſanft mit der flachen Hand zuſammen. Hierauf ſchneidet man die Stecklinge in ſchräger Richtung ab, wozu ſich die Seitenzweige am beſten eignen; nur ſehe man darauf, daß dieſe Zweige am untern Theil etwas feſtes Holz haben, ſtecke dieſe ohngefähr 1 — 2 Linien tief am Rande des Topfs in die Erde, drücke ſie mit den Fingern behutſam feſt an, begieße alsdann die Erde vermittelſt einer feinen Brauſe, und nachdem man eine paſſende Glasglocke oder ein Bierglas, das genau in den Rand der Töpfe, in welche die Stecklinge geſetzt ſind, paßt, darauf geſtellt hat, bringe man dieſe Töpfe in ein lauwarmes Miſtbeet (oder einen Kaſten). Nach Verlauf von 4 — 6 Wochen (während welcher Zeit man nichts zu thun hat, als darauf zu ſehen, daß die Erde nicht zu trocken wird, und das Glas täglich auszuwiſchen) werden die Stecklinge Wurzeln haben, was man daran gewahr wird, wenn die Stopfer anfangen zu treiben.

Man nimmt nun die angewachſenen Stecklinge behutſam auseinander, pflanzt ſie in die früher angegebene Erde in kleine Töpfe, ſtellt ſie alsdann noch einige Zeit in ein lauwarmes Beet, bis ſie ſich gehörig bewurzelt haben, gewöhnt ſie nach und nach an die Luft, und behandelt ſie alsdann wie die Mutterpflanze.

Belvedere, im Januar 1833.

Ueber den Einfluß des Mondes auf die Witterung und Vegetation.

Mitgetheilt vom Redacteur.

(Fortſetzung).

Dieſe einleitenden Bemerkungen waren vielleicht nöthig, um Diejenigen, die alle dem Monde insgemein aufgebürdeten Einflüſſe als durch Erfahrungen und Verſuche begründet betrachten, geneigter zu machen, dieſe Einflüſſe mit mißtrauiſchem Auge anzuſehn, ja an keinen einzigen derſelben unbedingt zu glauben, bis deſſen Exiſtenz durch eine hinreichend lange Reihe vergleichender Verſuche außer allen Zweifel geſetzt iſt. Eine der Aufgaben der Wiſſenſchaft iſt, diejenigen Anſichten zu unterſuchen und zu ſichten, die, obwohl allgemein geglaubt, auf Ueberlieferungen beruhen, deren urſprüngliche Quelle und Grundlage wir nicht kennen, und die ſich oft nur deßhalb erhalten, weil alle dafür ſprechende Erfahrungen als Beweiſe, und alle dagegen zeugende als Ausnahmen von einer durch ihr Alter geheiligten Regel angenommen werden.

Wir dürfen uns daher nicht wundern, daß, während der Mond in der Praxis vieler Aerzte noch eine bedeutende Rolle ſpielt, der berühmte Arzt und Aſtronom Olbers dieſem Trabanten unſrer Erde nicht den mindeſten Einfluß einräumte; daß während practiſche Forſtleute in und außer Deutſchland die Güte der Hölzer ſo ſehr von den Lichtgeſtalten des Mondes abhängen laſſen, während deren es gefällt iſt, einer der erſten Agronomen Frankreichs, Duhamel du Monceau, dieſen Einfluß durchaus leugnet; und wir dürfen es dem franzöſiſchen Akademiker Arago, aus deſſen in dem Annuaire pour l'an 1833. présenté au Roi par le bureau des longitudes mitgetheilter Abhandlung wir die nachſtehenden Materialien dieſes Artikels vorzüglich entlehnen, nicht verargen, wenn er frei bekennt, daß man die Tendenz, nach welcher er jene Abhandlung verfaßte, am beſten aus folgender Anekdote erkennen könne: „Plutarch wurde einſt gefragt, warum die Füllen, die einmal vom Wolfe verfolgt worden ſeyen, zu beſſern Rennern erwüchſen, als andere? Er antwortete: „Vielleicht deßhalb, weil an der Sache nichts Wahres iſt.“ Uebrigens bemerkt Arago ausdrücklich, daß er das Vielleicht nicht außer Acht gelaſſen. Mehr Wahrheit würde die Antwort Plutarchs enthalten haben, wenn er erwiedert hätte: „Vielleicht deßhalb, weil dergleichen Füllen ſchon bewieſen haben, daß ſie gut laufen können.“ Und auf ähnliche Weiſe mögen ſich viele meteorologiſche und phyſiologiſche Erſcheinungen unter irgend einer Mondphaſe entwickeln, die man fälſchlich dieſer beſtimmten Mondphaſe zuſchreibt, weil man bereits an deren Kraft glaubt.

Zur Vermeidung ſpäterer Erklärungen oder Umſchreibungen, wird hier an die genaue Bedeutung mehrerer aſtronomiſcher Ausdrücke erinnert.

Der Mond bewegt ſich im Raume in der Richtung einer Ellipſe, in deren einem Brennpunct die Erde ſich befindet; dieſe Kurve oder krumme Linie heißt die Mondbahn.

Befindet ſich der Mond an dem der Erde zunächſt liegenden Ende der großen Axe dieſer Ellipſe, ſo iſt die Zeit ſeiner Erdnähe (Perigeum). Befindet er ſich dagegen am andern Ende derſelben Axe, ſo iſt er am weiteſten von der Erde entfernt, oder in der Erdferne (Apogeum). Die Erdnähe und die Erdferne nennt man zuſammengenommen die Apſiden. Die Zeit, welche der Mond braucht um ſich einmal ganz um unſere Erde zu drehen, d. h. um wieder zu demſelben Sterne zu gelangen, von welchem er ausgegangen iſt, beträgt 27,31 Tage. Dieſe Zeit nennt man den ſideriſchen Umlauf. Die Apſiden ereignen ſich nicht immer bei denſelben Sternen, ſondern rücken von Weſten nach Oſten. Die Zeit, welche zwiſchen zwei auf einander folgenden Durchgängen des Mondes durch die Erdnähe verſtreicht, dauert daher länger als der ſideriſche Umlauf. Man nennt dieſe Zeit den anomaliſtiſchen Umlauf.

Da die Sonne, von der Erde aus geſehen, ſich, wie der Mond, von Oſten nach Weſten zu bewegen ſcheint, ſo muß, bis der Mond wieder zur Sonne gelangt, ebenfalls ein größerer Zeitraum verſtreichen, als der ſideriſche Umlauf. Die mittlere Dauer dieſer Periode iſt 29,53 Tage, und man nennt ſie den ſynodiſchen Umlauf. Sie iſt mit andern Worten der Mondmonat.

Während jedes ſynodiſchen Umlaufs nimmt der Mond verſchiedene Lichtgeſtalten oder Phaſen an.

Befindet ſich derſelbe gerade zwiſchen der Sonne und der Erde, ſo wird deſſen ganze von der Erde weggewandte Halbkugel erleuchtet, und wir ſehen daher nichts von ihm, oder es iſt dann Neumond. Der Mond befindet ſich dann in ſeiner Conjunction mit der Sonne.

14,76 Tage (als Mittel) nach der Conjunction iſt die der Erde zugekehrte Halbkugel des Mondes ganz von der Sonne beleuchtet. Er befindet ſich dann in ſeiner Oppoſition zur Sonne und ſtellt ſich uns als Vollmond dar. Zur Bezeichnung ſowohl des Voll- als Neumondes bedient man ſich des Ausdrucks Syzygien.

Zu der Zeit, welche die zwiſchen dem Neu- und Vollmonde verſtreichende Periode halbirt, ſtellt ſich der Mond als ein leuchtender Halbkreis dar. Sein weſtlicher Theil erſcheint bogenförmig, ſein öſtlicher geradlinig. Er befindet ſich dann im erſten Viertel oder der erſten Quadratur, indem ſein Winkelabſtand von der Sonne ungefähr 90° oder 1/4 Kreis beträgt.

Die zweite Quadratur (das zweite oder letzte Viertel) findet 7, 4 Tage nach dem Vollmond ſtatt. Alsdann erſcheint der Mond, zum zweitenmal während eines einmaligen Umlaufs, in Geſtalt eines leuchtenden Halbkreiſes; allein dießmahl iſt die bogenförmige Grenzlinie nach Oſten, und die gerade nach Weſten gekehrt.

Behufs gewiſſer Unterſuchungen, hat man im Umlauf des Mondes noch 4 Punkte, den 1ſten, 2ten, 3ten und 4ten Octanten zu bezeichnen für nöthig gefunden. Dieſe halbiren, wie man ſich ſchon nach deren Namen denken kann, die 4 Viertel, und zwar befindet ſich der erſte Octant zwiſchen dem Neumond und dem erſten Viertel, der zweite zwiſchen dem erſten Viertel und dem Vollmond u. ſ. w. Natürlich hat der Mond bei jedem Octanten eine beſondere Form, die wir hier nicht weiter anzuführen brauchen.

Der Zeitraum welcher zwiſchen dem Neu- und Vollmond verſtreicht, und wo der uns ſichtbar beleuchtete Theil des Mondes beſtändig größer wird, heißt die Periode des zunehmenden Mondes, und die Zeit vom Vollmond bis zum Neumond die des abnehmenden Mondes. *)

(Fortſetzung folgt.)

---

*) Um zu wiſſen ob der Mond zu- oder abnehme, hält man ſich gewöhnlich an die Regel, daß wenn der hohle oder anbrüchige Theil deſſelben ſich links befindet, derſelbe zunimmt, und wenn jener ſich rechter Hand befindet, der Mond abnimmt. Practiſcher und der Verwechslung weniger ausgeſetzt iſt die Lateiniſche Regel: Luna est mendax (der Mond iſt ein Lügner). Bildet er nämlich ein C, d. h. ſagt er: Cresco (ich nehme zu), ſo nimmt er ab; bildet er ein D, d. h. ſagt er: Decresco (ich nehme ab), ſo nimmt er zu.

Einige Winke über die Weinbereitung aus Obſt und Beeren, wie auch aus Weintrauben,

nach den Erfahrungen und Verſuchen

des Dr. **Macculloch.**

(Fortſetzung).

Die Wirkung der Aepfelſäure iſt ſehr verſchieden von derjenigen des Weinſteines, ja man hat gefunden, daß ſie bei der Weinbereitung nachtheilig ſei. Man hat die Bemerkung gemacht, daß alle Weine, welche viel Aepfelſäure enthalten, von ſchlechter Qualität ſind, obſchon in vielen Fällen es nicht entſchieden worden iſt, ob dieſe Säure ein urſprünglicher Beſtandtheil der Traube geweſen, oder ob ſie während des Gährungsprozeſſes erzeugt worden ſei. Jedenfalls iſt es aber von Wichtigkeit, den Umſtand im Auge zu haben, daß die Anweſenheit der Aepfelſäure im Weine nachtheilig ſei, weil alle die Obſtſorten, aus welchen man Wein zu bereiten pflegt, ſich durch einen Ueberſchuß an Aepfelſäure charakteriſiren. Darin liegt vielleicht einer der Hauptfehler des Obſtweins, der am wenigſten eine Verbeſſerung zuläßt. Der weſentliche Unterſchied zwiſchen Cider und Wein beruht nun eben in der Quantität der Aepfelſäure, die einen Beſtandtheil des erſtern ausmacht. Alle unſere Obſtweine ſtehen deshalb dem Cider näher, als dem Traubenwein, obſchon das Vorherrſchen von unzerſetztem Zucker, Branntwein und andern fremden Subſtanzen, die zu ihrer Bereitung genommen werden, jenen Fehler etwas verdecken, aber nicht beſeitigen.

Es iſt eine Frage von nicht geringem Belang, ob nicht durch chemiſche Mittel ein Theil dieſer Säure entweder vor, oder nach dem Gährungsprozeſſe getilgt werden könnte? Bei der Bereitung des Xeresweines wird den Trauben vor dem Eintritte des Gährungsprozeſſes Kalk zugeſetzt. Wie empiriſch dieſes Verfahren auch ſein möge, ſo wirkt es doch wahrſcheinlich dahin, einen Theil der Aepfelſäure und der Weinſteinſäure zu neutraliſiren, und daraus erklärt ſich wohl die eigenthümliche trockne Beſchaffenheit dieſes Weines. Dieſes Verfahren dürfte vielleicht auch bei der Bereitung unſerer Obſtweine der Nachahmung, wenigſtens eines ſorgfältigen Verſuches, werth ſein.

Unter allen Subſtanzen, welche zur Weinerzeugung beitragen, iſt der Zucker die wichtigſte, denn von ihm hängt die Stärke des Weines ab. Diejenigen Obſtarten, welche das größte Verhältniß Zucker enthalten, geben den ſtärkſten Wein, denn der Alkohol, welcher durch die Gährung erzeugt wird, ſteht immer im Verhältniſſe zu dem früher anweſenden Zucker. Der Hauptfehler unſerer Obſtarten iſt ihr geringer Zuckergehalt, aber dieſem Fehler läßt ſich zugleich am leichteſten abhelfen, und darauf gründet ſich auch eigentlich ein wichtiger Theil des Verfahrens bei der Weinbereitung aus Obſt. Aber ſelbſt in dieſem Theile des Prozeſſes kommen Schwierigkeiten vor, welche eine unvollkommene Gährung herbeiführen, und die Folge davon iſt die Süßigkeit, durch welche ſich unſere Obſtweine nur zu oft charakteriſiren.

Der Zucker iſt eine ſalzartige Subſtanz, zuſammengeſetzt aus gleichen Raumtheilen Kohlenſäure und Kohlenwaſſerſtoffgas, oder aus:

3 Raumtheilen Kohlendunſt,
3 — Waſſerſtoff,
1½ Raumtheilen Sauerſtoff,

und 100 Theile deſſelben beſtehen aus:

40,3 Gewichtstheilen Kohle und
59,7 — Waſſer,

oder vielmehr aus

40,3 Gewichtstheilen Kohlenſtoff,
6,9 Waſſerſtoff,
52,8 Sauerſtoff

und er muß betrachtet werden als eine Zuſammenſetzung aus:

26,8 Gewichtstheilen Kohlenwaſſerſtoff und
73,2 — Kohlenſäure.

Im Prozeſſe der Weingährung verliert der Zucker genau ⅓ ſeines Kohlenſtoffes, aber mit dieſem zugleich auch ⅔ ſeines Gehaltes an Sauerſtoff, welcher, mit dem Kohlenſtoffe verbunden, als Kohlenſäuregas auftritt; der Rückſtand iſt Alkohol, beſtehend aus:

2 Raumtheilen Kohlendunſt,
3 — Waſſerſtoff,
½ — Sauerſtoff.

(Fortſetzung folgt).

Miscellen.

Fortpflanzung einjähriger Gewächſe durch Stecklinge. Viele der beſten einjährigen Gewächſe laſſen ſich durch Stecklinge fortpflanzen, und die Blumengärtnerei könnte hieraus viel mehr Vortheil ziehen, als es bisher geſchehen iſt. Die Hauptvortheile ſind, daß man im Herbſte Stecklinge machen kann, die weit leichter durchzuwintern ſind, als junge Samenpflanzen, und daß die Blüthezeit dadurch auf eine für den Gärtner höchſt wichtige Weiſe verändert wird. Stecklinge von Balſaminen und der ſchönen Coreopsis tinctoria wurden in England im September gemacht, in einem Ananasbeete bei 5 — 8° R. Temperatur durgewintert, und Anfang Mai blühten beide Gewächſe. Seltene einjährige Gewächſe, welche in den Gärten oft erſt ſehr ſpät zur Blüthe kommen, und deren Samen daher nicht reift, würden auf dieſe Weiſe leicht fortgepflanzt werden können. (Horticultural Register.)

Säfte des Roſenſtocks. — Aus einer Rosa rubiflora zu Hammerſmith mit einem 3½ Fuß hohen Stamme von 2¼ Zoll Durchm., den man ſeiner Zweige beraubte, und dem man am 29. Juli die Krone abſägte, floß in etwa einer Woche 31 Unzen Saft ab, mit dem durch Verdünſtung verurſachten Verluſt wahrſcheinlich mehr als drei Nöſel; die chemiſche Analyſe gab folgende Beſtandtheile:

Sauerkleeſaurer Kalk	1,9	Gran
Eſſigſaurer Kalk	4,097	=
Eſſigſaures Kali	0,7	=
Gummi und Extractieſtoff	2,1	=
Zucker (?) in Alkohol auflöslich . . .	0,1	=
Verluſt	0,353	=
	7,25	Gran.

(Adams in Brande's Journal).

Ein neuer botaniſcher Garten in London wird in der Nähe von Regents Park angelegt, und es ſind dazu etwa zwanzig engl. Acker Land um Primroſehill ausgewählt. Es werden nicht allein die nöthigen Gewächs- und Treibhäuſer errichtet werden, ſondern man hat die Abſicht, daſelbſt, wie in dem Iardins des Plantes zu Paris, ein Muſeum, ein Amphitheater für Vorleſungen und eine Bibliothek für Botanik, Horticultur und Agricultur anzulegen. Die Vorleſungen in den Sommermonaten werden ſich auf Botanik, Pflanzenphyſiologie und Agricultur erſtrecken.

Hierbei Nr. 8 der Blumenzeitung als Probeblatt.

Gedruckt bei Friedrich Häßler zu Weißenſee.

Preißverzeichniß von 1833
der Saamen von nachverzeichneten Gartenzierpflanzen, welcher friſch und echt zu haben iſt
bei
Chriſtian Deegen zu Köſtritz bei Gera.

Vorbemerkungen. Von denjenigen Saamen, wo der Preiß nicht beigeſetzt iſt, koſtet die Priſe 1 Gr. Die Zahlung iſt zu preuß. Cour. berechnet, und es wird höflichſt gebeten, die Beſtellung nebſt Betrag frankirt zu überſenden. — Die einjährigen Pflanzen, welche mit w. bezeichnet, wollen warm ſtehen; die mit T. und M. bemerklich gemachten verlangen warmen oder geſchützten Standort von der Ausſaat bis Mitte oder Ende Mai, von der Zeit an aber freie Natur, wovon die mit T. bezeichneten beſſer in Töpfen gedeihen, die mit M. angegebenen aber ins Land verpflanzt werden können. Alle nicht bezeichneten Sorten können ſofort ins freie Land ausgeſäet und verpflanzt werden. N. bezeichnet niedrige, zu Einfaſſungen taugliche, und St. ſolche Pflanzen, deren Saame ſofort an den Blüthe- oder Standort auszuſäen iſt und deren Verpflanzen ſelten gelingt. Die perennirenden Pflanzen, mit O. bemerklich gemacht, blühen bei zeitiger Ausſaat ſchon im erſten Sommer, diejenigen davon, mit B. angegeben, verlangen einigen Winterſchutz.

---

1. Saamen von beſond. zierenden Pflanzen u. Früchten in Varietäten, als:

Cheiranthus annuus, Sommerlevcoy. Von dieſer in jeder Hinſicht ausgezeichneten Gartenſchmuckpflanze habe ich vergangenen Sommer eine vorzügliche Ernte ſowohl in Quantität als Qualität erlangt, ſo daß ich verſichern kann, daß aus dieſen Saamen meiſt gefüllte Stöcke erlangt werden; nämlich:

a) Engliſche. 1. gz.blaßgraubraun. 2. blaßgraubraun. 3. mohngrau. 4. hellgrau. 5. aſchgrau. 6. mordoree. 7. dkl.mordoree. 8. gz.dkl.mordoree. 10. rothbraun. 11. dkl. leberfarbig. 12. graubraun. 13. zimmtbraun. 14. hochziegelroth. 15. ziegelroth. frühbl. 16. hochchamois. 17. chamois. 18. hautfarbig. 19. hautfarb. frühbl. 20. weiß. 22. blaßpfirſichblüthfarben. 23. hellroſa. 24. roſa. 25. hellcarmin. 26. carmin. 27. wienerroth. 28. carmoſin. 29. gz.dkl.violet, ſpät. 30. dkl.violet. 33. hellviolet. 35. lichtblau.

b) Engl. m. d. Lackblatt. 36. ganz blaßgraubraun. 38. mordoree. 39 gz.dkl. mordoree. 40. rothbraun, ſpät. 41. zimmtbraun. 42. chamois. 43. hautfarben. 44. weiß. 45. hellpfirſichblüthfarb. 46. carmin. 47. hochcarmin. 48. dkl.violet.

c) Halbengliſche. 51. blaßgraubraun. 52. mohngrau. 53. blaßgrau. 56. ſchwarzbraun. 57. dkl.kaſtanienbraun. 60. kupferf. 61. ziegelroth. 62. chamois. 63. hautfarb. 64. weiß. 66. roſa. 68. hochcarmin. 69. carmoſin. 70. violet. 71. blaßblau.

d) Halbengliſche mit d. Lackblatt. 73. hellziegelroth. 74. blaßhautf. 75. weiß. 77. roſa. 80. blaßblau.

Cheiranthus autumnalis, Herbſtlevcoyen. Dieſe prächtige Art, welche aus Uebertragung des Saamenſtaubes von der Winter- auf die Sommer-Levcoy entſtanden iſt, läßt ſich zur Nachflor der Sommer-Levcoy eben ſo gut benutzen, als ſie durch den niedlichen Bau der Stöcke u. das frühe Erſcheinen der Blumen eine vortreffliche Acquiſition zur Winterflor iſt; folgende Sorten ſind beſonders empfehlensw. als:

e) Engl. f. dkl.rothbraun. ff. rothbraun m. d. Lackbl. i. ziegelroth. ck. hautfarben. l. weiß. p. blaßroſa. q. hellpfirſichblüthf. m. d. Lackbl. s. hellcarmin. ss. hochcarmin. u. gz.dkl.violet. v. dkl.violet. w. hellblau.

Halbengl. a. blaßgraubraun. c. hellaſchgrau. d. caſtanienbraun. h. dkl.ziegelroth. k. hellhautfarben. ll. weiß mit. d. Lackbl. m. weiß. n. weißroſa. o. blaßroſa. r. roſa, großblättr. t. hochroth, frankfurther. x. lichtblau m. d. Lackbl.

Von obigen Sommer- u. Herbſtlevcoyen koſtet die Priſe zu 100 K. von der Sorte 18 Pf.

1 Sort. v. 36 Farb. n. m. Wahl 2 Thlr.
1 = = 24 = = = = 1⅓ =
1 = = 18 = = = = 1 =

Cheiranthus incanus, Winterlevcoyen, ebenfalls vorzüglich, in: C. ziegelroth. D. chamois. E. weiß. F. roſa. G. pfirſichblüth. engl. H. hochroth. K. carmin. L. dkl.violet, engl. M. violet.

d. Priſe 18 Pf. 8 Sorten 10 Gr.

Aſter ſinenſis fiſt. pl. ausgezeichnete gefüllte Röhraſtern in nachbeſchriebenen Farben, als:

a) Einfarbige. 1. weiß. 2. weißgelb. 3. chamois. 4. hautfarben. 5. blaßincarnat. 6. hellroſa. 7. roſa. 8. carmin. 9. dkl.carmin. 10. carmoſin. 11. milchblau. 12. perlfarben. 13. blaßgrau. 14. blaßblau. 15. hellblau. 16. lilla. 17. indigblau. 18. dkl.violet.

b) Zweifarbige. 19. carminrothe Bandaſter. 20. roſaf. B.A. 21. blaue B.A. 22. a) hellblaue B.A. 22. b) blaßroſa, Rand weiß u. blaßroſa. 23. carmin, R. abgeſetzt weiß. 24. carmin, R. weiß u. carmin. 25. carmin und weiß geſprengelt. 26. carmoſin, R. weiß u. carmoſin. 27. blaßgrau, R. weiß u. blaßgrau. 28. weiß m. hellblauen Blattſpitzen. 29. hellblau, R. weiß u. hellblau. 30. indigblau, R. weiß u. indigblau. 31. dkl.violet, R. abgeſetzt weiß. 32. dkl.violet u. weiß geſprengelt. 33. dkl.violet, R. weiß u. dklviolet.

d. Priſe zu 100 K. 18 Pf.

1 Sort. v. 24 Farb. n. m. Wahl 1⅙ Thlr.
1 = = 16 = = = = 18 Gr.

M. Impatiens balſamina fl. pleniſſ. dichtgefüllteſte Balſaminen mit beſonders großen Blumen, als:

a) Einfarbige. 1. weiß. 3. apfelblüthf 5. hautfarben. 7. incarnat. 9. hellziegelroſa. 10. ziegelroſa. 11. hellſcharlach. 12. ſcharlach. 13. dkl.ſcharlach. 14. carmin. 16. blaßlilla. 17. lilla. 19. blaßpurpur. 20. purpur. 21. hellviolet. 23. hellkupferf. 24. dkl.kupferf.

b) Zweifarbige. 27. weiß u. hellkupf. 29. weiß, purpur und ſcharlach. 31. weiß u. hellviolet. 33. incarnat u. ſcharl. 34. ziegelroſa u. ſcharlach. 35. blaßlilla u. kupferf. 36. lilla u. ſcharlach.

d. Priſe zu 10 K. 18 Pf.

1 Sort. v. 18 F.-n. m. Wahl 1 Thlr.
1 = = 12 = = = = 16 Gr.

Ipomoea purpurea, ſchöne Trichterwinde, in 10 Farb. mel. d. Lth. 6 Gr. d. Priſe 18 Pf.

Scabioſa major, große, prächtige Scabioſe, in folgenden Farben, als:

1. hautfarben. 2. incarnat. 3. hellcarmoſin. 5. carmoſin. 6. dkl.purpur. 7. kirſchroth. 8. ſchwarzpurpurbraun. 9. violetlilla. 10. carmoſin u. weiß.

d. gz. Sort. in 10 Priſen 12 Gr.

d. Pr. mel. 2 Gr. d. Lth. 8 Gr.

St. Delphinium Ajacis fl. pl. niedriger, gefüllter Ritterſporn, vorzüglich ſchön in 10 Farben, als:

1. aſchblau. 2. blaßleberfarb. 3. dkl.ziegelroth. 4. blaßziegelroth. 5. ganz blaßlilla. 6. milchblau. 7. weiß. 8. blaßroſa. 9. violet. 10. blaßblau.

d. Sort. in 10 Pr. 12 Gr.

d. Lth. mel. 6 Gr. d. Pr. 18 Pf.

Delphinium conſolida fl. pl. hoher gefüllter Levcoyenritterſporn, in 5 Farben und 5 Pr. 6 Gr. d. Lth. mel. 8 Gr. d. Pr. 18 Pf.

Centaurea cyanus, verſchiedenfarbige Kornflockenblume, als:

1. türkiſchblau. 2. himmelblau. 3. weiß, innen himmelblau. 4. weiß mit hellblau überzogen. 5. himmelblau m. purpur überzogen. 6. weiß m. röthlich-purpur überz. 7. weiß, innen ziegelroſa. 8. weiß m. ziegelr. überz. 9. blaßziegelroth. 10 ziegelroth. 11. purpurbraun. 12. himmelblau u. purpurbraun.

d. Pr. einzeln 1 Gr. d. Sort. in 12 Pr. 10 Gr. d. Loth. mel. 6 Gr.

T. Celoſia criſtata Engl. engl. Hahnenkämme, in vorzügl. Größe u. folgenden Farben, als:

1. gelblichweiß. 2. ſtrohgelb. 3. ſchwefelgelb. 4. a) goldgelb. 4. b) orange. 5. verſilbert-roſa. 6. dkl.roſa. 7. hellcarmin. 8. feuerroth. 9. bräunlichfeuerroth. 10. fahlroth. 11. amaranthf. 12. dkl.amaranthf. 13. bräunl. purpur. 14. hellpurpur. 15. glänz.purpur. 17. purpur m. carmoſinr. Kamm. 17. carmoſin. 18. kirſchroth.

Die Priſe einzeln 18 Pf. d. ganze Sort. 1 Thlr. mel. die Priſe 2 Gr.

St. Papaver Rhoeas fl. pleniſſimo, dichtgefüllteſter, prächtiger Ranunkelmohn in den auserwählteſten Farb. m. Zeichnungen. mel. die Prieſe 2 Gr. das Lth. 9 Gr.

St. Papaver ſomniferum fl. pl. gef. buntf. Gartenmohn, mel. die Pr. 1 Gr. d. Lth. 5 Gr. in 1 Sort. in 20 ſep. Farb. 12 Gr.

St. Papaver pleniſſimum, dichtgef. Feder-Gartenmohn, in vielen Farb. mel. d. Pr. 18 Pf. d. Lth. 6 Gr. u. 1 Sort. in 20 ſchön. Farb. u. Pr. 16 Gr.

St. Papaver ſtriatum fl. pl. gef. ſchönſtreif. Gartenmohn in vielen Farbenabwechſelungen, mel. d. Pr. 2 Gr. d. Lth. 8 Gr.

O.B. Georgina variabilis fl. pl. Saamen von folgenden ausgezeichnet großen Georginen gewonnen, als:

1. weiß. 12. roſa. 15. prächtigſcharlach. 25. ſchwärzlichſcharlachpurpur. 31. incarnat. 36. ſchwärzlichblutrothpurpur. 37. feuerröthlich. 38. ſanftlilla. 45. carmin. 57. ſchönſcharlach. 61. ſelten-roſa. 62. aſterähnlichlillaf. 64. geadert-purpur. 65. carmoſin. 75. hautf. 76. prächtig-roſa. 86. bräunl. blutroth. 91. lillaroſa. 96. amaranthfarb. 99. goldfarb. 100. rein weiß. 103. ſchwärzl. braun. 121. gelbziegelroth. 134. ſchwarzamaranthf. 136. ſchneeweiß. 138. ockergelb. 144. prächtig-carmin. 157. trüb-dunkelroth. 160. weiß m. blauen Spitzen. 164. ſcharlach. 168. geadert-lilla. 190. rein blauroth. 208.

ſcharlachfeuerf. 218. ſchwarzblau. 221. violetroſa. 222. rieſige gelbe. 228. grauroth. 229. ſcharlachblutroth.

Das gz. Sort. in 38 Pr. 3 Thlr. 12 Gr.
24 Farben in 24 Priſen 2 Thlr. 6 Gr
15 : : 15 : 1 : 12 :
Von den beſten Sorten mel. geſammelt das Lth. 2 Thlr. die Pr. 4 Gr.

Althaea roſea fl. pl. Wintermalven in folgenden Farben von ganz gefüllten Blumen gewonnen, als:

1. ſchwarz. 2. ſchwarzbraun. 3. purpurbraun. 4. violetgrau. 5. röthlichgrau. 6. graubraun. 7. ziegelroth. 8. incarnat. 9. fleiſchroth. 10. kameelf. 11. Goldmalve 12. blaßockergelb. 13. nankinfarb. 14. citrongelb. 15. ſtrohgelb. 16. ſchwefelgelb. 17. weiß. 18. weißl. inn. geröth. 19. blaßroſa. 20. dkl. roſa. 21. carmin. 22. ſchönroth. 23. blaßcarmoſin. 24. dkl.blutroth. 25. carmoſin. 26. purpur. 27. purpur u. weiß eingefaßt. 28. purpurviolet. 29. lilla. 30. blaßlilla. 31. röthlich. 32. dkl.lilla u. grau marmorirt.

1 Pr. 1 Gr. d. ganze Sort. 1 Thlr.

M. Cucurbita, Kürbisarten.

a) Figurenkürbiſſe. 1. Herkuleskeule. 2. Herkulesk. ohne Ranken. 3. Flaſchenkürbis. 4. a) Sternk. 4. b) bunter Schirmk. 4. c) gelb. Schirmk. 5. eckiger Gurkenkürbis. 6. bunt. Apfelk. 7. a) Türkenbundk. 7. b) kleiner Türkenbundk. 8. Zuckerhutk. 9. Zitronenk. 10. runder goldf. 11. herzförmiger. 12. indiſcher, weißer Apfelk. 13. kleiner warziger Walzenk. 14. zitrongelber. 15. gelber Apfelk. 16. weißer Birnk. 17. Orangek. m. grünen Warzen. 18. bunt. Birnk. 19. größter Birnk. 20. gelber Birnk. 21. orange Eierk. 22. Straußkürb. 23. Apfelſinenkürb. 24. großer Pomeranzenk. 25. längl. Wachsk. 26. Walzenk. 27. langer kantirter. 28. großer gelber cylinderf. Höckerk. 29. bemahlter Warzenk. 30. goldf. punktirter. 31. weißer Birnk. 32. halb orange halb ſchwarzgrüner Birnk. 33. Hieroglyphenk. 34. orange Warzenk. 35. fünfſtreifiger Marmork. 36. birnf. Warzenk. 37. Gurkenk. 58. Tannenzapfenk. 39. amerikaniſcher. 40. Glockenk. 41. Paſtetenk. 42. Kronenk. 43. Napfk. 44. Zehneckk. 45. Doſenk. 46. Chineſermütze. 47. Kugelk. 48. Terrinenk. 49. brillantirter Türkenbundk. 50 polniſche Mütze. 51. Sonnenk. 52. weißer chineſiſcher. 53. weißer Apfelk. 54. Beutelk. 55. bunt. Beutelk. 56. runder Hieroglyphenk. 57. ſchwarzgrüner Apfelkürb. 58. geſcheckter ſiciliſcher. 59. Roſettenkürb. 60. a) Pomeſinenkürb. 60. b) Weberkartenk. 60. c) Stachelbeerk.

b) Eßbare Kürbisſorten. 61. 200 Pfund ſchwerer Rieſenk. 62. ſchmackhafteſter Melonenk. 63. aſchgrauer ſtarkfleiſchiger Melonenk. 64. bunter Portalk. 65. Säulenk. 66—70. fünf der beſten u. bunt. Feldkürbiſſe.

Die Pr. zu 4—6 K. 18 Pf.
d. ganze Sort. 4 Thlr. 30 Sorten n. m. Wahl 1¼ Thlr.

M.w. Cucumis, Melonenſorten. 6 Sorten Netzmel. 6 Sorten Cantaloupen. 6 Sorten glatte Melonen.

Die Pr. 18 Pf. das ganze Sort. 20 Gr.

---

2. Saamen von verſchiedenen Sommerpflanzen.

Achyropaphus ſcurioides. 2 Gr.
Adonis aeſtivalis, Sommerröschen.
: autumnalis, Herbſtröschen.
: flammea, flammendes.
M. Ageratum coryzoides, Ageratum. 18 Pf.
M. : Houstoniana, Houſtons: 2 Gr.
M. : mexicanum, ſchönes. 2 Gr.
M. Ageratum odoratum, wohlriech. 18 Pf.
N. Agroſtemma coeli roſa, Lichtröschen.
: githago, Kornrade.
: nicenſis, nicäiſche.
Amaranthus caudatus, geſchwänzter Amaranth
: cruentus, blutiger.
: glomeratus, ſchöner kugelf. 2 Gr.
: paniculatus, rispenblüthiger.
M. : ſanguineus, blutrother.
M. : ſpecioſus, prächtiger.
w. : bicolor, zweifarbiger. 2 Gr.
w. : tricolor, dreifarbiger. 2 Gr.
T. Amethyſtea caerulea, Bläuling.
Anacyclus valentinus, Ringblume.
: : bicolor, zweifarbige.
Anchuſa officinalis, Ochſenzunge.
Anagallis indica, indiſcher Gauchheil.
: latifolia, breitblättr.
Anoda dilleniana, Anoda.
: incarnata, incarnatrothe.
Anthemis arabica, arabiſche Chamille. 2 Gr.
Anthericum annuum, einjähr. Zaunlilie.
Antirrhinum calycinum, Löwenmaul.
: ſempervirens, immergrünes.
: orontium, Dorant.
Arctotis hypochondriaca, Bärohr.
M. Argemone albiflora, Stachelmohn.
M. : Bargleyana, Bargleys: 2 Gr.
M. : grandiflora, großblum. 2 Gr.
M. : mexicana, mexicaniſcher.
M. : ochroleuca, ſtrohgelber.
Arnopogon glaber, glatter Graubart.
: picrioides, bitterer.
T. Ascardia indica, Ascardie. 2 Gr.
N. Aſter tenellus, zarte, kleinſte Aſter.
: brachypetalus, ſtumpfblättrige, in 6 Sorten u. Pr. 6 Gr. die Pr. 1 Gr.
T. : cymbalaria, cymbelkrautbl. 2 Gr.
: ſinenſis pl. gefüllte Röhraſter, mel. die Pr. 2 Gr. das Lth. 8 Gr.
M. Athanaſia annua, einjähr. Athanaſie.
Atriplex hortenſis ſanguin. blutrothe Melde.
T. Baſella alba, weiße Baſelle. 18 Pf.
T. : cordifolia, herzblättr. 18 Pf.
T. : lucida, glänzende. 18 Pf.
T. : ramoſa, äſtige. 18 Pf.
T. : rubra, rothe. 18 Pf.
w. Begonia hirtella, rauhe Begonie. 2 Gr.
w. Benincaſa cerifera, Wachsgurke. 2 Gr.
w. : cylindriaca, cylinderf. 2 Gr.
M. Bidens grandifl. großbl. Zweizahn. 2 Gr.
Blitum capitatum, Erdbeerſpinat.
: virgatum, ruthenförmiger.
T. Browallia demiſſa, Browallie. 2 Gr.
T. : elata alba, weiße.
T. : : caerulea, blaue.
T. : elongata, zweigige. 2 Gr.
T. : linnaea, blaßblaue. 2 Gr.
T. Bryonia grandis, große Zaunrübe. 2 Gr.
Bryza major, großes Zittergras.
: minor, kleines.
Cacalia ſonchifolia, Ducatenblümchen.
T. Calceolaria pinnata, Pantoffelbl. 2 Gr.
T. : ſcabiosaefol. ſcabioſenbl. 2 Gr.
M. Calendrina adcendens, Calendrinie.
M. : compreſſa, gedrungene.
T. : ſpecioſa, prächtige. 4 Gr.
Calendula grandifl. große Ringelblume.
: : aurant. orangefarb.
: : ſulphur. ſchwefelgelbe.
: mexicana, mexicaniſche.
: pluvialis, regenanzeigende.
: prolifera, überſetzte.
: ſtellata, ſternförmige.
M. Calliopſis bicolor, ſchöne Calliopſis.
N. Campanula ſpecul. alb. Venusſpiegel.
N. : : caerul. blauer.
N. : : roſ. roſafarb.
M. : Lorei, Loreiglockenbl. 2 Gr.
M. : : atrocaerulea. 4 Gr.
T. Capſicum ann. fr. rubr. ſpan. Pfeffer.
T. : : : lut. gelber.
T. : angulosum, eckiger.
T. : baccatum, beerentragend. 2 Gr.
T. : ceraſif. lut. kirſchähnl. gelber.
T. : : rubr. rother.
T. : conicum, kegelgeſtaltiger.
T. : falcatum, ſichelförmiger. 2 Gr.
T. : erectum, aufrechter.
T. : longum, langer.
T. : marmor. gelb u. ſchwarz. 2 Gr.
T. : : roth u. ſchwarz. 2 Gr.
T. : maximum, größter. 2 Gr.
T. : nigrum, ſchwarzer. 2 Gr.
T. : torruloſum. torlähnl. 2 Gr.
M. Cardioſperm. halicacab. Herzſaame. 2 Gr.
Carduus marianus, Mariendiſtel.
Carthamus tinctorius, gelber Saflor.
Catananche caerul. blaues Zwangskraut. 2 Gr.
: lutea, gelbes.
M. Celoſia albida. weißl. Hahnenkamm. 18 Pf.
M. : argentea, ſilberfarbiger. 18 Pf.
M. : connata, kammähnl. 18 Pf.
M. : elongata, zweigiger. 18 Pf.
M. : pyramid. ſang. ſchöner. 2 Gr.
M. : : lut. gelber. 2 Gr.
M. : pendula ſang. ſchweifiger. 2 Gr.
M. : : lut. gelber. 2 Gr.
Centaurea aurea, goldf. Flockenblume. 2 Gr.
: babylonica, babyloniſche.
: crupina, kleine.
: cyanus, Kornbl. mel. d. Lth. 6 Gr.
: elongata, vielzweigige. 2 Gr.
: moſchata alb. weiße.
: : lilac. lillafarb.
: ſalamant. alb. weiße. 2 Gr.
: : caerul. blaue. 2 Gr.
M. : ſuaveolens, wohlriechende. 2 Gr.
Centroſprem. chryſanth. Centroſperme.
Cephalaria tranſylvanica, Knopfblume. 2 Gr.
Ceraſtium perfoliatum, Hornkraut.
Cerinthe maculata, gefleckte Wachsblume.
: minor, kleine.
Cheiranthus cheiri, Stangenlack. 20 K. 18 Pf.
: : gelbgef. 20 K. 18 Pf.
: : echter wiener. 20 K. 2 Gr.
: : gef. wiener. 20 K. 2 Gr.
: : 8 Sorten dichtgef. wiener Stangenlack in 8 Priſen à 20 K. 12 Gr.
: : blauer. 20 K. 2 Gr.
: : wohlriechendſter.
N. : maritimus, Meerſtrandslevcoy.
N. : : albus, weiße.
M. : tricuspidatus, dreiſpitzige.
Chelidonium (Papaver) hybridum.
: fimbriatum, gefranzt. Schöllkr.
Chenopodium ambroſioides, Gewürzkraut.
: botrys, traubenblüthiges.
M. Chryſanth. carinat. alb. Wucherbl. 2 Gr.
M. : : lut. gelbe. 3 Gr.
: coronarium, weißgefüllte.
: : gelbgefüllte.
: hybridum, Baſtard:
: inodorum, geruchloſe.
: myconis, ſpaniſche.
: pectinatum, kammartige.
T. : ſpecioſum, prächtige. 2 Gr.
M. Clarkia pulchella, ſchöne Clarkie.
w. Cleome canadenſis, hohe Pillenbl. 2 Gr.
w. : gigantea, riſige. 2 Gr.
w. : micrantha, kleinſte. 2 Gr.
w. : pentaphylla, fünfblättr. 2 Gr.
w. : ſpinoſa, dornige. 2 Gr.
w. : viscoſa, klebrige. 2 Gr.
M. Collinſonia grandifl. Collinſonie. 2 Gr.
T. Coix lacrima, Hiobsthräne. 2 Gr.
M. Collomia grandifl. großbl. Collomie. 2 Gr.
M. : linearis, leinblättrige. 2 Gr.
M. Commelina anguſtifol. Commeline. 2 Gr.

M. Commelina coeleſtis, himmliſche. 2 Gr.
M. : erecta, aufrechte. 2 Gr.
M. : polygama, umgebogene. 2 Gr.
M. : ſtricta, ſteife. 2 Gr.
M. : tuberoſa, knollige. 2 Gr.
Convolvulus elongatus, zweigige Winde.
M. : ſiculus, ſicilianiſche. 2 Gr.
: tricolor, dreifarbige.
: : albesc. weißliche.
Coronilla ſecudaria, Pelzchen.
Cotula coronopifolia, krähenfußblättr. Cotula.
M. Cosmea bipinnata, gefied. Cosme. 2 Gr.
M. : ſulphurea, gelbe. 2 Gr.
N. Crepis rubra, rothe Grundfeſte.
N. : : alba, weiße.
: barbata, bärtige.
: : albesc. weißliche.
: Sprengeriana, Sprenger'ſche. 2 Gr.
T. Crotolaria hirſuta, zottige Klapperſchote.
T. : incana, beſtäubte.
M. Cucumis anquin. Rieſengurke. 2 Gr.
M. : : fr. alb. weißfr. 2 Gr.
w. : Dudaim, wohlriechende. 2 Gr.
w. : Chate, arabiſche. 2 Gr.
M. Cuphaea viscoſiſſima, klebrige Cuphäe.
T. Datura faſtuoſa pl. gef. Stechapfel. 2 Gr.
T. : ceratocaule, ſchöner, groß bl. 2 Gr.
M. : Metel, ſchneeweißer. 2 Gr.
M. : hybrida, unechter. 2 Gr.
: ferox, langdorniger.
: laevis, glatter.
: loricata, überzogener.
: quercifol. eichenblättr. 2 Gr.
: ſtramonium, betäubender.
M. : Tatula gigantea, weißer. 2 Gr.
w. Desmanthus ſtrictus, Sinnpflanze. 2 Gr.
Dianthus prolifer, überſetzte Nelke.
w. Dolichos Lablab, egyptiſche Faſel. 2 Gr.
w. : pratenſis, weiße. 2 Gr.
w. : ſpecioſus, prächtige. 2 Gr.
Dracocephalum canesc. Drachenkopf. 2 Gr.
: moldavic. moldauiſcher.
: : alb. weißer.
: parvifl. kleinblumiger.
Dyſodium (Melampyrum) divaricatum.
M. Eccremocarpos ſcaber, Hängefrucht. 2 Gr.
Echium creticum, kretiſcher Natterkopf.
: violaceum, violetter.
: : grandifl. großblumiger.
M. Elichryſum lucidum, Strohblume. 18 Pf.
M. Elsholzia criſtata, kammart. Elsholzie.
Erodium gruinum, Reiherſchnabel.
: moſchatum, wohlriechender.
M. Erythraea pulchella rubr. Eryth. 5 Gr.
Euphorbia littorata, gezeichnete Wolfsmilch.
M. Eutoca multifl. vielblum. Eutoka.
Fedia cornucopiae, reichſaamige Fedia.
: uncinata, widerhakige.
Flaveria contrajerva, entgegenäſtige Flaverie.
Fumaria (Adlumia) ſempervirens, Erdrauch.
T. : veſicaria, blaſiger.
M. Galardia bicolor, ſchöne Galardie. 5 Gr.
Galinſogea triloba, dreilappige Galinſogea.
Garidella nigellaſtrum, ſchwarzk.art. Garidelle
Gilia capitata (Gymnostiles anthemoides).
Glaucium corniculatum. gehörnter Mohn.
: phoeniceum, blaurother.
: violaceum, blauer.
M. Gnaphal. foetidum, Ruhrkraut. 2 Gr.
M. : odoratiſſ. wohlriechendes. 2 Gr.
M. Grahamia aromatica, Gewürzkraut.
T. Gomph. globoſ. alba, weißer Kugelamar.
T. : : purpur. purpurf. 2 Gr.
T. : : roſea, roſenrother. 2 Gr.
M. : procumbens, umgebogener.
M. Hebenſtreitia aurea, gelbe Hebenſtr. 18 Pf.
M. : dentata, gezähnte. 18 Pf.
M. : tenuifol. feinblättr. 18 Pf.
Hedypnois pendula, hängendes Öhrlein
M. Helenium mexicanum, Helenie. 2 Gr.
M. Helenium quadripart. viertheil. 2 Gr.
Helianthus annuus fl. pl. aur. gef. Sonnenbl.
: : : : ſulph. ſchwefelg.
: : gigant. großblum.
M. : lenticularis, ſchöne ſtrauchart. 4 Gr.
M. : breviſtylaris, kurzſtiel. 4 Gr.
: indicus, mittelhohe, indiſche.
: nanus, niedrige, 12 Zoll hohe.
Hibiscus Humboldi, Humbolds-Hibiscus.
M. : ſabdariffa. 2 Gr.
: ternatus, dreitheil.
: trionum, Stunden-
: veſicarius, blaſiger.
Hippocrep. multiſiliquoſ. Hufeiſenkraut.
T. Horneman. bicol. zweifarb. Hornem. 2 Gr.
Hyoscyamus aureus, gelbes Bilſenkr.
: nigra, graues.
Iberis amara, bittere Schleifenblume.
N. : Lagascana, gekerbte.
N. : odorata, duftende.
N. : umbellata, doldenblumige.
N. : : fl. alba, weiße.
N. : : : lilac. lillafarb.
N. : : : purpur. purpurfarb.
M. Ipomoea coccin. ſcharlachr. Winde. 18 Pf.
M. : : fl. alba, weiße. 2 Gr.
: discolor, zweifarb.
w. : hederacea, epheublättr. 2 Gr.
w. : hepaticifol. leberkrautbl. 2 Gr.
w. : Nil, ſchöne blaue. 3 K. 2 Gr.
w. : quamoclit, prächt. blutrothe. 2 Gr.
: ſtriata, ſtreifige. 18 Pf.
: triloba, indigblaue. 18 Pf.
: purpurea, in vielen Couleuren d. Lth. 4 Gr. d. Pr. 18 Pf.
N. Iſopyrum fumaroides, fumarienblättr.
N. Kaulfuſia amelloides, Kaulfuſia.
M. Ketmia veſicaria, ſchöne Ketmie. 2 Gr.
Knautia orientalis, morgenländ. Knautie.
Lagoſericea cernua, hängende Lagoſericea.
Lathyrus angulatus, eckige Wicke.
: articulatus, gegliederte.
: clymenum, bunte.
: odorat. wohlriechende, d. Lth. 4 Gr.
: : ſtriata, geſtreifte. 18 Pf.
: ſativus, himmelblaue.
: : fl. alba, weißbl. 18 Pf.
: tingitanus, große, purpurfarb.
: zeylanicus, blaßblaue.
Lavatera trimeſtris fl. alba, weiße Lavatere.
: : fl. roſea, roſafarb.
: Weinmannia, Weinmann'ſche.
Leonurus heterophyllus, Mutterwurzel.
: occidental. ſchöne occidental. 2 Gr.
T. Leucas aspera, ſcharfe Leucas.
T. : martinicenſis, Martins-
Linaria alpina, Alpenleinkraut. 5 Gr.
N. : elegans, zierliches.
N. : bipartita, zweitheil. buntes.
: luſitanica, portugieſiſches.
N. : purpurea, purpurfarbiges.
N. : juncea, binſenförmiges.
N. : reflexa, zurückgebogenes.
N. : ſpuria, unechtes.
N. : tristis, trauriges.
N. : : fusca, braunlippig.
N. : triphyllos, dreifarbiges.
N. : verſicolor, verſchiedenfarb.
Linum grandiflorum. großblum. Lein. 2 Gr.
: humile, niedriger. 2 Gr.
: multiflorum, vielblumiger.
T. Lobelia bicolor, zweifarb. Lobelie.
T. : canarienſ. canariſche.
N. : erinoides, feinblättrige.
N. : ſecunda, größerblühende.
T. Loaſa tricolor, ſchöne, dreifarb. Loaſe 5 Gr.
Lolium ſpecioſum, ſchönſtes Gras. 6 Pf.
M. Lopecia mexicana, mexicaniſche Lopezie.
Lotus coimbrienſis, Schotenklee.
: tetragonolobus, Spargelerbſe.
Lotus tetragonolobus luteus, gelbblühende.
Lupinus albus, weiße Lupine.
: anguſtifolius, ſchmalblättrige.
: canaliculatus, rinnenähnliche.
: bicolor, kleine, zweifarbige. 2 Gr.
: linifolius, leinblättr. 2 Gr.
: luteus odoratus, wohlriechende.
: : minus, niedrige.
: odor. ſemina alba, weißſaamige.
: micranthus, kleine. 2 Gr.
: Termis, höchſte. 2 Gr.
: varius, rauhe. 2 Gr.
Lychnis corſica, corſicaniſches Lichtröschen.
Madia viscoſa, klebrige Madie.
Malope malacoid, malvenähnl. Malope. 2 Gr.
: trifida, dreitheilige. 2 Gr.
Malva crispa, krauſe Malve.
: mauritiana, Mauritziſche.
: : variegata, bunte.
: media, mittelhohe.
: morenii, roſafarbige. 2 Gr.
: pulchella, ſchönſtengel.
T. Manuela violacea, blaue Manuela. 2 Gr.
T. Martyn. proboſc. Elephantenrüſſel. 2 Gr.
Medicago maculata, gefleckter Schneckenklee.
T. Meſembrianth. cryſtall. Eiskraut. 2 Gr.
T. : pinnatif. gefiedertes. 2 Gr.
T. : pomm. pommeranz. 2 Gr.
M. Mimulus floribund. vielbl. Gaukler. 2 Gr.
M. : moſchat. wohlriechender. 2 Gr.
M. : parviflor. kleinblüthiger. 2 Gr.
M. Mirab. dychotoma, zweitheil. Jalappe. 2 Gr.
M.B. : hybrida, Baſtard- 2 Gr.
M.B. : jalappa, in 7 Farben mel. 2 Gr.
M.B. : longiflora, langblumige. 2 Gr.
M. Moluccella laevis, glattes Herzkraut. 2 Gr.
w. Momordica balſamea, Balſamapfel. 2 Gr.
: Elaterium, Spritzgurke.
T. Naſturtium Clandeſtinum. 18 Pf.
M. Nemophila phacel. bohnenartige. 2 Gr.
Nicandra phyſaloides, Bergſchlotte.
M. Nicotiana anguſtifol. ſchmalbl. Taback.
M. : fl. alba, weißblüh.
M. : cerinthoides, wachsbl.
M. : fruticoſa, ſtrauchiger.
M. : gigantea, hoher.
M. : glutinoſa, klebriger.
M. : glauca, ſchöner, graublättr. 2 Gr.
M. : Kospolockia, Kospolock'ſcher.
M. : Langsdorfii, Langsdorf'ſcher.
M. : Lehmannii, Lehmann'ſcher.
M. : macrophylla, breitblättriger.
M. : nyctaginea, nächtlichblühender.
M. : quadrivalvis, vierſchaaliger.
M. : ſanguinea, blutrother. 2 Gr.
M. : ſuaveolens, wohlriech. 2 Gr.
M. : Tabacum, gebräuchlicher.
M. : : decurr. ſchönbl. 2 Gr.
M. : tartarica, tartariſcher.
Nigella criſtata, Schwarzkümmel.
: coarcta, niedrigſter. 2 Gr.
: damascena, damascener.
: foeniculata, fenchelartiger.
: hispanica, ſpaniſcher 2 Gr.
: : fl. alba, weißer. 2 Gr.
: : fl. caerul. blauer. 2 Gr.
N. : nana pl. niedriger, gefüllter. 2 Gr.
: romana, römiſcher.
: ſativa. Acker-
M. Nolana paradoxa, graue Nolane. 2 Gr.
M. : proſtrata, liegende. 2 Gr.
Nonea roſea, roſafarbige Nonea.
T. Ocimum aniſatum, Anispaſilicum. 2 Gr.
M. : baſilicum, gebräuchliches.
T. : bullatum, ſchiffsblättriges. 2 Gr.
T. : gratiſſimum, angenehmes. 2 Gr.
T. : laciniat. ſchlitzblättriges. 2 Gr.
T. : minimum, kleinblättriges.
T. : : nigrum, ſchwarzbl.
T. : monachorum, zimmtduft. 2 Gr.

T. Ocimum mucronatum, ſpitziges.
T. = polyſtachium, Biſam= 2 Gr.
T. = thyrſiflorum, ſtraußbl. 2 Gr.
T. = urticifolium, neſſelblättr. 2 Gr.
Oenothera amoena, ſchöne Nachtkerze. 2 Gr.
= grandiflora, großblumige.
= friticoſa, ſtrauchige. 2 Gr.
= Lindleyana, Lindleys= 2 Gr.
= longiflora, langblumige.
= longifolia, langblättrige.
= molliſſima, weichſte.
= odorata, primelduftende.
= nocturna, nächtlichblühende.
= parvifl. kleinblumige.
= purpurea, purpurrothe.
= rhyzocarpa, ſtielloſe.
= Romanzowii, Romanzow'ſche.
= ſpecioſa, prächtige.
= ſtricta, ſteife.
= tenella, zarte. 2 Gr.
= tetraptera, weißblumige.
= undulata, wellenblättrige.
Orobus atropurp. purpurrothe Wicke. 2 Gr.
w. Paſſiflora foetida, Paſſionsblume. 2 Gr.
w. = gracilis, ſchlanke. 2 Gr.
T. Pavonia haſtata, Pavonie. 2 Gr.
w. Pentapetes ovatifolia, Pentapetes. 2 Gr.
w. = phoenicea, ſchöne, blaue. 2 Gr.
Phlomis zeylanica, ſchönes Windkraut. 2 Gr.
Picridium dentatum, gezähnte Picritie.
Pocockia cretica, cretiſche Pocockie.
Polygonum orientale, oriental. Knöterich.
= = elatum, hoher. 2 Gr.
= = = album, weißer.
= = ocimoſum, äſtiger.
M. Polymnium abyſſinic. Polymnie. 3 Gr.
St. Reſeda odorata, wohlr. Reſede. d. Lth. 6 Gr.
= alba, weiße.
M. Ricinus communis, Wunderbaum. 2 Gr.
M. = glaucus, graublättriger. 2 Gr.
w. Rivinia purpurea, rothe Revinie. 2 Gr.
M. Roemeria hybrida, Baſtardmohn.
Rudbeckia amplexicaulis, Rudbeckie.
= oppoſitifol. ſägeblättr.
T. Salpigloſſis ſtraminium, Salpigloſſe. 3 Gr.
T. Salvia coccinea, ſcharlachr. Salbey.
= Hormin. rubr. rothſchopfige.
= = caerul. blauſchopfige.

Salvia prismatocarpos.
= viridis, grüne.
M. Sanvital. procumb. lieg. Sanvit. 2 Gr.
M. Saponaria vaccin. grandifl. Seifenbl. 2 Gr,
Scabioſa amplexicaul. ſtengelumfaſſ. Scabioſe.
= integrifol. ganzblättr.
= prolifera, überſetzte.
= ratula, radförmige. 2 Gr.
= ſtellata, ſternförmige.
= atropurpurea, in vielen Farb. melirt.
M. Schizanth. pinnatus, Schizanthus. 18 Pf.
M. = porrigens, ausgebreitete. 18 Pf.
Scolymus maculatus, geflecktе Golddiſtel.
Scorpiurus muricata, Wurmkraut.
= vermiculata, raupenförmiges.
M. Senecio eleg. alb. pl. weißgef. Kreuzkr. 2 Gr.
M. = = rubr. pl. rothgefülltes. 2 Gr.
M. = = purpur. pl. purpurgef. 2 Gr.
M. = = roſea, roſafarbiges.
M. = valerianifolia, baldrianblättr. 2 Gr.
Setaria italica altiſſima, hoher Hirſen.
Seriola aetnenſis, Kugelträger.
N. Silene armeria alba, weiße Silene.
N. = = roſea, roſafarb.
N. = = rubr. rothe.
N. = orchidea, ragwurzähnliche. 2 Gr.
= ornata, geſchmückte. 4 Gr.
N. = pendula, hängende.
N. = quinquevulnera, fünffleckige.
= trinervata, dreinervige. 3 Gr.
Solanum decurrens, Nachtſchatten.
M. = formoſum, prächtiger. 3 Gr.
M. = heterodorum. 2 Gr.
M. = lycoperſ. fr. lut. Liebesapfel.
M. = = fr. rubr. rothfrücht.
M. = = birnfrüchtiger. 2 Gr.
M. = = kirſchähnl. gelber. 18 Pf.
M. = = = rother. 18 Pf.
M. = atropurp. purpurfarb. 18 Pf.
T. = melong. fr. alb. weißes Ei. 2 Gr.
T. = = fr. violac. violettes. 2 Gr.
M. = ochroleuca, ockergelb. Nachtſch.
T. Spermacoce rubra, rother Zahnwirbel. 2 Gr.
M. Spilanthus acmella, Huſarenknopf. 18 Pf.
M. = multifl. vielblumiger. 2 Gr.
M. = oleraceus, gemuſterter. 2 Gr.
Stachys arabica, arabiſches Wollblatt. 2 Gr.
M. Sycios angulata, eckige Haargurke. 18 Pf.

M. Tagetes erecta, orangegef. Sammtbl. 18 Pf.
M. = = goldfarb. gefüllte. 18 Pf.
M. = = ſchwefelgelbe, gef. 18 Pf.
M. = = röhrige, gefüllte. 18 Pf.
M. = = rieſige, gefüllte. 18 Pf.
M. = = niedrigſte, gefüllte. 18 Pf.
M. = foetida, ſchönbelaubte. 18 Pf.
M. = maculata, gefleckte. 18 Pf.
M. = minima, niedrige. 18 Pf.
M. = patula pl. braungef.
M. = ſtriata, geſtreifte. 18 Pf.
Tetragonia cryſtallina, Vierling.
= expanſa, gehörnter.
Teucrium betonicum, Gamander.
M. Tiaridium indicum, indiſches Tiaridium.
w. Tithonia tagetiflora, Tithonie. 2 Gr.
w. = = fl. aurea, goldf. 3 Gr.
T. Trachimena caerul. Trachimene. 3 Gr.
T. Tradescant. undul. Stundenblume. 18 Pf.
T. = = roſea, roſafarb. 18 Pf.
T. = latifol. breitblättr. 18 Pf.
Trifolium caeruleum, blauer Igelklee.
= elegans, zierlicher.
M. = Gouſſonii, Gouſſons= 2 Gr.
M. = incarnatum, ſchöner, rother.
Trigonella platicarpos, Bockshorn.
M. Tropaeolum majus, große Kreſſe.
M. = minus, kleine. 2 Gr.
Urſina paleacea, Urſine. 2 Gr.
Valeriana calcitrapa, Baldrian.
M. Verbena aubletia, ſchönes Eiſenkr. 18 Pf.
Vicia faba rubra, neurothe Wicke.
Viola tricolor, ſchönes Pfauenauge.
Ximeneſia enceloides, geährte Ximeneſie.
Zea altiſſima, hoher ſcharlachfrücht. Mais. 3 Gr.
Zaluzania triloba, Zitronkraut. 18 Pf.
M. Zinnia ambigua, zurückgeb. Zinnie.
M. = aurea, goldfarbige.
M. = coccinea, prachtvolle. 3 Gr.
M. = elegans, ſchöne, lillafarb. 2 Gr.
M. = = fl. alba, weiße. 3 Gr.
M. = = fl. purp. purpurf. 3 Gr.
M. = grandifl. großblumige. 2 Gr.
M. = paucifl. wenigblumige.
M. = multifl. vielblumige.
M. = revoluta, umgebogene.
M. = tenuiflora, feinblüthige.
M. = verticillata, wirbelförmige.

3. Saamen von einigen perennirenden Pflanzen.

Aconitum anthora. 2 Gr.
= barbatum. 2 Gr.
= nitidum. 2 Gr.
= napellus.
= ſtrictum. 2 Gr.
= volubile. 2 Gr.
= Wildenowianum. 2 Gr.
Achillea Ageratum. 2 Gr.
= grandiflora.
= Impatiens.
= ſpecioſa.
= tanacetifol. 2 Gr.
= tomentoſa. 2 Gr.
Actaea racemoſa. 2 Gr.
Adenophora denticulata. 2 Gr.
= communis. 2 Gr.
Adlumia cirrhoſa. 2 Gr.
Adonis vernalis. 2 Gr.
Agrimonia odorata.
Agroſtemma coronaria.
= flos Jovis. 2 Gr.
Allione nyctaginiflora.
Allium globoſum. 2 Gr.
= carneum. 2 Gr.
= odorum. 2 Gr.
= roſeum. 2 Gr.
Althaea ficifolia. 2 Gr.

Althaea marmorca. 2 Gr.
O. = chinenſis. 2 Gr.
O.B. Amobium alatum. 2 Gr.
O. Anchuſa capenſis. 2 Gr.
= italica. 2 Gr.
Anthericum Liliago. 2 Gr.
Antirrhinum bicolor. 2 Gr.
= jamaicenſe. 2 Gr.
O. = maj. div. Coul. 2 Gr
O. = maj. bicolor. 2 Gr.
O. = montevidenſe.
O.B. Anthyllis tetraphylla. 2 Gr.
Aquil. atropurpurea. 2 Gr.
= canadenſis. 2 Gr.
= grandifl. 2 Gr.
= praecox.
= ſtellata pl. 2 Gr.
= ſtriata pl. 2 Gr.
= vulg. pl. 2 Gr.
= = alba pl. 2 Gr.
= viscoſa pl. 2 Gr.
Arabis collina.
Armeria latifol. 2 Gr.
= plantaginea. 2 Gr.
Asclepias pulchellus. 2 Gr.
Asphodelus fiſtuloſus. 2 Gr.
= luteus. 2 Gr.
= maculatus. 2 Gr.
Aſter altaicus.
= amygdalinus.

Aſtragalus alopecuroides. 2 Gr.
= galegiformis. 2 Gr.
O. = Laxmannii. 2 Gr.
O. = monſpeſſulan. 2 Gr.
Aſtrantia heterophylla. 3 Gr.
Aubritia deltoides.
Baltonia aſterivides. 2 Gr.
B. Beta braſilienſis. 2 Gr.
Betonica grandiflora. 2 Gr.
Buphthalm. helianthoides. 2 Gr.
O. = ſalicifolium. 2 Gr.
= ſpecioſum.
Caltha paluſtris.
Campan. farinoſa. 2 Gr.
= lilifol. 2 Gr.
= macrantha. 2 Gr.
= marſupiflora. 2 Gr.
= media alba pl. 2 Gr.
= = caerul. pl. 2 Gr.
= = lilac. pl. 2 Gr.
= pyramid. 3 Gr.
= ſibirica. 3 Gr.
= ſpecioſa. 3 Gr.
= ſuaveolens. 2 Gr.
= verſicolor. 3 Gr.
= trachelioides.
Centaurea macrocephala. 2 Gr.
O. = orientalis. 2 Gr.
O. = ſplendens. 2 Gr.
O. Centranthus rubra. 2 Gr.

Chelone obliqua. 2 Gr.
= = fl. alba. 3 Gr.
Chryſanthemum leucanthemum.
Clematis flammula. 2 Gr.
Cineraria corymboſa. 2 Gr.
B. = glabrata. 2 Gr.
= ſibirica. 2 Gr.
Coreopſis undulata. 2 Gr.
= verticillata. 2 Gr.
B. = Atkinconia. 2 Gr.
B. Cortuſa Mathioli. 3 Gr.
O. Corydalis aurea.
O. = fungoſa.
Cynanchum fuscum.
O. Cynogloſſum pictum.
O. = virginicum.
Delphinium perenne, von 8 der ſchönſt. Arten 2 Gr.
= Stagiſagria. 3 Gr.
Dianth. Carthuſ. div. Coul. 2 Gr.
= = pl. div. C. 3 Gr.
= Caryoph. pl. Gartennelk.
100 K. v. 1ſten R. 12 Gr.
100 = = 2ten = 8 Gr.
400 = v. gef. Land= 6 Gr.
O. = caucaſicus. 2 Gr.
O. = chinenſis pl. 2 Gr.
O. = = nov. maj. 3 Gr.
= glaucus. 2 Gr.
= plumarius.

O. Dianthus pulchellus. 2 Gr.
Dictamnus fraxinellus. 2 Gr.
Digitalis alba.
: ambigua.
: aurea.
: Erioſtachis.
: ferruginea.
: fuſceſcens.
: grandiflora.
: hybrida.
: laevigata.
: lanata. 2 Gr.
: purpureſcens. 2 Gr.
: purpurea.
: : fl. roſea.
: Thapſi.
Doronicum macrophylla.
: pardalianches.
Dracocephal. auſtral. viol. 2 Gr.
: peregrinum. 2 Gr.
: ſpecioſum. 4 Gr.
: virg. grandifl. 3 Gr.
Echinops paniculata. 2 Gr.
: Ritro. 2 Gr.
Echium plantagineum. 2 Gr.
: pyraenaicum.
: italicum.
Epilobium anguſtifol. fl. alb.
O. Erigeron purpureum. 2 Gr.
: alpinum.
: caucaſicum.
O. : Ricardſonii. 2 Gr.
Erinus alpinus. 2 Gr.
O.B. Eſchholzia californica. 2 Gr.
B. Francoa ſonchifolia. 2 Gr.
Funckia japonica. 2 Gr.
Galium purpureum. 2 Gr.
: rectum fl. lut. 2 Gr.
Gaurea mutabilis.
: tripetala.
Gentiana cruciata. 2 Gr.
: pavonia. 2 Gr.
O. Geranium phaeum.
: pratenſe ſtriat. 2 Gr
: reflexum.
: ſylvaticum.
Geum chilenſe. 3 Gr.
: coccineum. 2 Gr.
: macrophyllum.
O. Grindelia inciſa. 2 Gr.
O. : : fl. roſ. 2 Gr.
O. Gypſophila paniculata.
O. : perfoliata.
Hedyſarum canadenſe. 2 Gr.
O.B. : coronarium.
O.B. : : fl. album.
O. Helenium mexicanum. 2 Gr.
: pinnatum. 2 Gr.
Helianthus minſurii. 3 Gr.
: laetus.
Helleborus hyemalis. 2 Gr.
O. Hesperis matronalis.
O. : triſtis edorat. 2 Gr.
Hieracium aurantiacum.
: Lawſanii.
: paduloſum.
O. : ſpecioſum.
Hypericum androſaemifolium.
B. : Aſcyron.
: Gebleri.
: pyramidalis. 2 Gr.
Inula helenium.
: ſuaveolens.
Iris ſibirica fl. alb.
O. Laſioſpermum radiat.
Lathyrus heterophyllus.
: latifolius.
Lavatera ſalvitellenſis. 3 Gr.
: thuringiaca.
Lilium Martagon.
O. Linaria dalmatica. 2 Gr.
O. Linaria virgata. 2 Gr.
B. Linum flavum. 3 Gr.
O. : verticillatum.
B. Lobelia inflata. 2 Gr.
: ſyphilitica. 2 Gr.
O. Lunaria annua.
O. : rediviva.
Lupinus perennis. 2 Gr.
: palophyllus. 3 Gr.
Lychnis calcedonica.
: : fl. alb.
: : fl. ferrug.
O. : fulgens. 2 Gr.
: mutabilis.
: ſibirica. 2 Gr.
Lyſimachia punctata.
: quadrifolia.
: verticillata.
Malva faſtiguata. 2 Gr.
O. : moſchata. 2 Gr.
O. : : fl. rubr. 2 Gr.
O. Matricaria Mantua pl. 2 Gr.
O. Mimulus luteus.
O.B. : floribundus. 2 Gr.
O.B. : moſchatus. 2 Gr.
O. : rivularis. 2 Gr.
O. : ringens. 2 Gr.
Monarda dydima. 2 Gr.
: Kalmiana. 2 Gr.
: mollis. 2 Gr.
B. Moraea chinenſis. 3 Gr.
Nepeta violacea. 2 Gr.
O. Oenothera acaulis. 3 Gr.
O. : auſtralica. 3 Gr.
O. : Traſeri. 2 Gr.
O. : minima 2 Gr.
O. : ſplendens. 3 Gr.
O. Ononis hircina. 2 Gr.
O. : natrix. 2 Gr.
Paeonia albiflora odorata. 5 Gr.
: arietina. 2 Gr.
: corallina. 2 Gr.
: foemina. 2 Gr.
: officinalis. 2 Gr.
: paradoxa. 2 Gr.
Papaver caucaſica. 2 Gr.
O. : crocea. 2 Gr.
: bracteata. 2 Gr.
O. : nudicaule. 2 Gr.
: orientalis.
Patrinia ſibirica. 2 Gr.
O. Penſtemon campanulata. 2 Gr.
O.B. : atropurpurea. 2 Gr.
O. : Digitalis. 3 Gr.
O. : pubeſcens. 2 Gr.
O.B. : pulchellus. 3 Gr.
Phyteuma caneſcens.
: fiſtuloſa. 2 Gr.
: haemiſpharica.
Podaliria auſtralis. 2 Gr.
Potentilla atroſanguinea. 2 Gr.
: eroſa. 2 Gr.
O. : formoſa. 2 Gr.
: obſcura. 2 Gr.
O. : pedata. 3 Gr.
: recta. 2 Gr.
: Simerſiana. 3 Gr.
: rupeſtris. 2 Gr.
: ſplendens. 2 Gr.
Polemon. caeruleum.
: : fl. album.
O. : lacteum. 2 Gr.
: ſibiricum.
: : fl. album.
O. : americanum. 2 Gr.
Primula auricula div. gute 3 Gr.
Luiker 1ſten Ranges 6 Gr.
Engl. : : 8 Gr.
Primula elatior Engl. hochſtengel.
engl. ausgezeichn. Sort. 3 Gr.
v. 20 Prachtſort. d. Pr. 6 Gr.
Primula farinoſa. 2 Gr.
Pulſatilla pratenſis. 2 Gr.
Pupleurum aureum.
Ranunculus caucaſicus.
O. : illiricus.
B. : millefoliatus. 4 Gr.
Rudbeckia anguſtifolia.
O. : fulgida. 2 Gr.
O. : hirta. 2 Gr.
: laciniata.
: pinnata. 2 Gr.
O. : ſpecioſa. 3 Gr.
O. : triloba. 5 Gr.
Salvia argentea.
: bracteata.
: grandiflora. 2 Gr.
: glutinoſa. 2 Gr.
: nutans. 2 Gr.
: pratenſis.
: : fl. alb. 2 Gr.
: ſcalearea.
Saxifraga longiflora.
Scabioſa auſtralis.
: caucaſica. 2 Gr.
: ciliata.
Scutellaria lateriflora.
: lupulina.
: minor.
: peregrina.
Senecio abrotanifolia.
Seſeli glauca.
Silene cuprea. 3 Gr.
O. : gracilis. 2 Gr.
O. : multiflora. 2 Gr.
Siſymbrium tartaricum.
Spiraea ulmaria.
Stachys paluſtris, eßbar. 2 Gr.
Statice armeria elata.
O.B. Stevia purpurea. 3 Gr.
O.B. : ſerrata. 3 Gr.
Thalictrum concinnum.
: nigricans.
: ſpecioſum. 2 Gr.
Theſium alpinum. 2 Gr.
O. Trifolium Lupinaſter. 3 Gr.
: pavonium. 2 Gr.
Trollius aconitifolius. 2 Gr.
: aſiaticus. 2 Gr.
: europaeus. 2 Gr.
: tauricus. 2 Gr.
Veratrum nigrum. 2 Gr.
: album. 2 Gr.
O. Valeriana officin. odor. 2 Gr.
Verbaſcum blattaria.
: ſpecioſa. 2 Gr.
: Thapſi.
Verbena caroliniana.
: bonarienſis.
: haſtata.
O. : paniculata.
: ſtricta.
Veronica gentianoides.
O. : graſſa. 2 Gr.
O. : incana. 2 Gr.
: longifolia alba.
: ſibirica.
Viola italica.
: perſicifolia. 2 Gr.
: tricolor. 2 Gr.
B. Wulfenia carinthiaca. 2 Gr.
Ziziphora daſyantha odor. 2 Gr.
Zygophyllum fabago. 2 Gr.
: foetidum. 2 Gr.

4. Saamen von einigen exotiſchen Pflanzen.

Acacia armata. 2 K. 3 Gr.
: anguſtifolia. 1 K. 2 Gr.
: lophanta. 3 K. 2 Gr.
: verticillata. 3 K. 1 Gr.
Agapanthus umbellatus. 2 Gr.
Ardiſia crenulata. 2 Gr.
Ajuga fuſcata. 2 Gr.
Azalea pontica. 4 Gr.
Arctotis omoena. 2 Gr.
: grandiflora. 2 Gr.
: ſuperba. 2 Gr.
O. Aſclepias curaſſavica. 2 Gr.
O. : nivea. 2 Gr.
Aſter argenteus. 2 Gr.
: aculeatus. 2 Gr.
: mexicanus. 2 Gr.
: exaſperata. 2 Gr.
Ariſtolochia altiſſima. 2 K. 3 Gr.
: ſempervirens. 2 Gr.
Begonia bulbifera. 2 Gr.
O. : ſemperflorens. 2 Gr.
Blumenbachia inſignis. 3 Gr.
Campanula aurea. 4 Gr.
O. Canna coccinea. 2 K. 2 Gr.
O. : gigantea. 2 K. 2 Gr.
O. : indica. 4 K. 2 Gr.
O. : mexicana. 2 K. 2 Gr.
O. : limbata. 2 K. 2 Gr.
O. : patens. 2 K. 2 Gr.
O. : pruinoſa. 2 K. 5 Gr.
O. : ſanguinea. 2 K. 2 Gr.
O. : ſpecioſa. 3 K. 2 Gr.
Calothamnus heterophyllus. 2 Gr.
Caſſia alata. 2 Gr.
: glanduloſa. 2 Gr.
: grandis. 4 Gr.
: Havana. 2 Gr.
: ſophora. 2 Gr.
Caſſinia ſpectabilis. 2 Gr.
Celſia arcturus. 2 Gr.
O. : grandiflorus. 2 Gr.
Cheiranthus feneſtralis. 2 Gr.
Colutea fruteſcens. 2 Gr.
Cyclamen perſicum. 3 Gr.
Cytiſus argenteus. 2 Gr.
: canarienſe. 2 Gr.
Cupreſſus ſempervirens. 2 Gr.
Didymocarpos Rhexii. 6 Gr.
Echium faſtuoſum. 3 Gr.
Geſsneria bulboſa. 2 Gr.
Glycine caribaea. 3 K. 2 Gr.
: rubicunda. 1 K. 1 Gr.
Gloxinia formoſa. 2 Gr.
Goſſipium vitifolium. 5 K. 2 Gr.
Hedychium longifolium. 2 Gr.
Hedyſarum gyrans. 2 K. 3 Gr.
: pictum. 2 K. 1 Gr.
: maculatum. 3 K 1 Gr.
: veſpertilionis. 2 Gr.
Hemimeris urticifolia. 2 Gr.
Hibiſcus abelmoſchus. 3 K. 2 Gr.
: Manihot. 3 K. 2 Gr.
: palmatus. 2 Gr.
: radiatus. 2 K. 5 Gr.
: calloſus. 3 K. 2 Gr.
Iberis Gibraltarica. 4 Gr.
Lantana odorata. 2 Gr.
: trifoliata. 2 Gr.
Lavendula multifida. 2 Gr.
: ſerrata. 2 Gr.
Leptoſperm. althaeifolium. 2 Gr.
: attenuatum. 4 Gr.
: baccatum. 2 Gr.
: flaveſcens. 2 Gr.
: grandiflorum. 2 Gr.
: lanigrum. 4 Gr.
: juniperum. 2 Gr.
: lucidum. 2 Gr.
: myrtifolium. 2 Gr.
: ſcoparium. 4 Gr.
: Thea. 2 Gr.
Lobelia longiflora. 2 Gr.
Lotus Jacobaeus. 2 Gr.
Maurantia antirrhiniflora. 2 Gr.
: Bargleyana. 2 Gr.

Maurantia ſemperflorens. 2 Gr.
Melaleuca anguſtifolia. 2 Gr.
= diosmaefolia. 2 Gr.
= hypericifolia. 2 Gr.
Metroſideros anguſtifolia. 2 Gr.
= anguloſum. 2 Gr.
= citrina. 2 Gr.
= craſſifolia. 2 Gr.
Metroſideros glanduloſa. 2 Gr.
= lanceolata. 2 Gr.
= lophanta. 2 Gr.
= nodoſa. 2 Gr.
= ſaligna. 2 Gr.
= ſpecioſa glauca. 2 Gr.
= ſtricta. 2 Gr.
O. Mimoſa pudica. 3 K. 2 Gr.
Myrica ſerrata. 2 Gr.
Myrſinia africana. 2 Gr.
Neottia ſpecioſa. 4 Gr.
Paſſiflora alba. 2 K. 3 Gr.
= anguſtifolia. 2 Gr.
= capſularis. 3 K. 2 Gr.
Phyllis nobilis. 2 Gr.
Plumbago zeylanica. 2 Gr.
O. Primula praenitens. 4 Gr.
O. Rivinia purpurea. 2 Gr.
O. Senecio purpurea. 2 Gr.
Siſyrinchium Bermudian. 2 Gr.
= ſtriatum. 2 Gr.
Trachelium caeruleum. 2 Gr.
Tamarix germanica. 2 Gr.
Xeranthemum fulgidum. 2 Gr.

Gemüſeſaamen.

Kohlſaamen.

à Loth.	gr
Blumenkohl, aſiatiſcher, größter	8
= cypriſcher, früher	8
= engliſcher, großer, früher	8
= holländiſcher, ſpäter	5
Meerkohl, Crambe maritima	3
Spargelkohl, italieniſcher, weißer	2
= franzöſiſcher, violetter	2
Kraut, großes Zuckerhut=	2
= angelberger, frühes, weißes	2
= ulmer, kleines, weißes, früheſtes	2
= = rothes Salat=	1½
= = ſpätes Centner=	1½
= Butter= oder Carminat=	2
= niedriges, früheſtes, rothes Salat=	1½
= engliſches, feines Zucker=	2½
= braunſchweiger, größtes	1½
= großes, vorzügliches Feld=	1½
Herzkohl, erfurter, großer Winter=	1½
= ulmer, früher, niedriger	2
= = halbfrüher	2
= = größter, ſpäter	1½
= wiener, niedriger, früheſter	2
= utrechter, früher, gelber	2
= ſavoyer, gelber, großer	1½
Kohl, Roſen= oder Sproſſen=	2
= bunter Plumage=	1
= blauer, hoher Winter=	1
= grüner, = =	1
= blauer, niedriger Dachs=	¾
= grüner, = =	¾
= blauer Blatt=	1
= blumenkohlblättriger Schnitt=	½
= krauſer Schnitt=	½
Glaskohlrabi, wiener, früheſter, weiß. vorzügl.	2⅓
= wiener, blauer (extra)	2½
= engliſcher, weißer, früher	1½
= = blauer =	1½
Feldkohlrabi, mittelfrüher, weißer	1
= ſpäter, größter, weißer	¾
= = = blauer	¾
Kohlrüben, große, weiße Feld=	¾
= gelbe, ſchwediſche	¾

Wurzel= u. Rübenſaamen.

	gr
Carotten oder Möhren, holländiſche, kurze, rothe, früheſte	1½
= Horn'ſche, lange, frühe	1½
= braunſchweiger, lange, rothe	1
= frankfurter, lange	1
= blaßgelbe, zarte Spargel=	1
Wurzeln, Paſtinat=	½
= lange, ſtarke Peterſilien=	1
= Cichorien=	¾
= Rapontica=	1
= Zucker=	1
= Sellerie=, holländ. Knoll=	1½
= = leipziger, größte	1½
Rüben, lange, weiße Herbſt=, das Pfd. 4 Gr.	½
= blaue Herbſt=	1
= frühe, weiße, holländiſche Mai=	1
= teltower	1
= kleine, ſchwarze	1
= gelbe, lange, batfelder	¾
= runde, ſchwarzrothe Salat=	1
= längliche, = =	¾
Runkeln, lange, das Pfd. 7 Gr.	½

à Loth.	gr
Runkeln, runde, würzburger, das Pfd. 7 Gr.	½
= gelbe Zucker=, das Pfd. 4 Gr.	½
= ſtarke Feld=, das Pfd. 4 Gr.	¼

Salatſaamen.

	gr
Kopfſalat, früheſter Steinkopf=	3
= = Franz=	1½
= früher, weißer	2
= gelber Dauer=	3
= = Prahl=	3
= gelber, aſiatiſcher	2
= Prinzenkopf=, weiß K.	3
= = braun K.	3
= Forellen=, weiß K.	5
= = braun K.	5
= Schwedenkopf=, braun K.	4
= eichenblättriger, neuer, die Pr.	2
= Winter= . . das Loth	3
Schnittſalat, krauſer	2
Streuſalat, weicher	1
Bindeſalat, römiſcher	1½
= panaſchirter . . die Pr.	1½
= gelbe Endivien . das Loth	1½
= feine Winterendivien	1½
= große Escurialendivien	1½
Rabinschen	½

Zwiebelſaamen.

	gr
Zwiebel, blaßrothe, harte Kopf=	1½
= gelbe Birn= (extra)	2½
= gelbe, holländiſche, ſüße	2
= weiße, =	3
= rothe, =	2
= weiße, ſpaniſche	3
= rothe, =	2
= weiße Winter=	2½
Porrée, Sommer=	2
= Winter=	2

Radies= u. Rettigſaamen.

	gr
Radies, holländiſcher, runder, weißer	1
= = = rother	1
= = = roſafarbiger	1
= = langer, weißer	1
= = = rother	1
= = = roſafarbiger	1
Rettig, langer, ſchwarzer Winter=	1½
= = weißer =	1½
= runder, ſchwarzer	1½
= rother Herbſt=	1½
= bunter Sommer=	1½

Küchenkräuter.

	gr
Stragelkaffee	½
Baſilicum, großes Küchen=	1
= kleines =	2
Bohnenkraut	1
Dill	½
Fenchel, großer Anis=	1
Gartenkreſſe, krausblättrige	1
= engliſche	1
Iſop	1
Kerbel, krauſer	½
= großer, römiſcher, wohlriechender	4
Lavendel	1½
Löffelkraut	1½
Mangold	¾
Majoran, buſchiger	1½
Meliſſe, Zitron=	2

à Loth.	gr
Melde, Garten=	½
Peterſilie, gewöhnliche	½
= krausblättrige	1
Pimpinelle	1
Portulack, gelber	1½
= grüner	1½
Rosmarin	2
Salbei	2
Spinat, engl. breitblättiger, d. Pfd. 7 Gr.	½
= langblättriger, das Pfd. 5 Gr.	⅓
= ſtachelkörniger, das Pfd. 4 Gr.	¼
Thimian	1½
Weinraute	2

Kernſorten.

	gr
Gurkenkerne, erfurter Trauben=	1½
= Schlangen=	5
= halle'ſche, volltragende	2
= frühe (zum Treiben), die Priſe	1½
= weiße Schlangen=, die Priſe	1½
= lange, ſtahlgrn. glatte, die Priſe	1½
Speiſekürbiſſe und Melonen, ſiehe das Blumenſaamenverzeichniß.	
Spargelkerne, ulmer	1
= darmſtädter, weiße	1

Erbſenſorten.

	gr
Zuckererbſen, engliſche, frühe	5
= große Nompareille	7
= große, buntblühende	5
= frühe Zwerg=	5
Ausläufererbſen, früheſte Mai=	4
= franzöſiſche, 8 Zoll hohe	8
= volltragende Juni=	4
= ulmer, ſpäte	4
= = grüne	5
= ſpäte Wachs=	5
Spargelerbſen . . . das Loth	½

Bohnenſorten.

	gr
Stangenbohnen, arabiſche Feuer=	3
= lange, weiße Schwert=	6
= = bunte =	6
= engliſche Zucker=	5
= graue Spargel (extra)	8
= gelbe, reichlichtragende	6
= kleine Perl=	5
= dergl. ohne Faſern	8
Buſchbohnen, Krebs=	4
= früheſte, ſchwarze	5
= = ſchwarzbunte	4
= frühe, weiße Schwert=	4
= = gelbe =	4
= bunte Speck=	4
= graue Zucker=	4
Puffbohnen, große Windſor=	4
= engliſche, rothe	4
= mailänder, grüne	4
= niedrige Maſagan=	5

Ferner:

	gr
Raigras, engliſches	7
= franzöſiſches	6

Obſtbäume,

veredelte in ſchön gezogenen Stämmen zu 7 Fuß Höhe im Schaft, von vorzüglich guten Sorten.

		gr
Aepfel, das Schock 10 Thlr.	1 Stück	5
Birnen, = = 12 =	1 =	6

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion ubernommen.

Der Porto-Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. XI. Weißenſee, (in Thüringen). Juni 1833. VI. Jahrg.

Beſchreibung und Cultur ſchönblühender Glashaus- und Stubenpflanzen.

Fuchsia gracilis, Lindl. F. decusata, Graham. Die ſchlanke Fuchſie.

Gehört zur 8ten Kl. 1ten Ordn. (Octandria. Monogynia) des Linn. Syſt. Das Vaterland dieſer zierlichen Pflanze iſt Chili; ſie kam im Jahr 1822 zuerſt in die engliſchen Gärten und iſt jetzt ſchon allgemein in Deutſchland verbreitet.

Sie bildet einen kleinen Strauch mit ſchlanken, dünnen, ausgebreiteten oder überhängenden Aeſten. Die jungen Zweige ſind purpurröthlich, die Rinde des Stämmchens iſt gelblichgrau und glatt. Die Blätter ſtehen zu drei quirlförmig, ſelten gegenſtändig, auf röthlichen, einen halben Zoll langen Blattſtielen; ſie ſind länglich-lanzettförmig, ſpitz, durch vertiefte Nerven und entfernte ſtumpfe Zähnchen am Rande ausgezeichnet, glatt, dunkelgrün, $1\frac{1}{2}$ bis 2 Zoll lang, und einen halben Zoll breit. Die ſchönen Blüthen hängen gewöhnlich zu zwei aus den Blattwinkeln an zwei Zoll langen, dünnen, fadenförmigen Stielen von den Spitzen der Aeſte herab. Der Kelch iſt mit dem untern Fruchtknoten über $1\frac{1}{2}$ Zoll lang; der Fruchtknoten iſt verkehrt kegelförmig, bräunlich grün, ſchwach behaart, 4 bis 5 Linien lang. Der Saum des Kelchs beſteht aus 4 lanzettförmigen, ſchmalen, langzugeſpitzten, etwas fleiſchigen, und wie das walzenförmige Rohr, ſehr ſchön hochroth gefärbten Abſchnitten, die faſt noch einmal ſo lang als das Rohr ſind. Auf dem Rand des Kelchrohrs anſitzend und mit dieſen 4 Abſchnitten abwechſelnd ſtehen 4 keilförmige, an der Spitze abgerundete, anfangs beim Aufblühen ſchön dunkelblaue, ſpäter mehr purpurfarbige Blumenblätter, die ungefähr halb ſo lang als die Kelchabſchnitte und ſpiralförmig um die Staubfäden gewickelt ſind. Aus dem Rande des Kelchs, an der innern behaarten Seite des Rohrs herablaufend, erheben ſich 8 glatte, rothe Staubfäden, von ungleicher Länge; einige derſelben erreichen die Länge der Kelchabſchnitte. Die großen, blaßröthlichen, 2fächerigen Staubbeutel ſind auf dem Rücken angeheftet. Der Fruchtknoten iſt 4fächerig, mit zahlreichen an einem Mittelſäulchen ſitzenden Eierchen; an ſeiner Spitze, innerhalb im Grunde des Kelchrohrs ſind 8 gelbe drüſenförmige Verdickungen, aus denen die Staubfäden hervorkommen. Der rothe, an ſeinem untern Theil mit weißen Haaren beſetzte Griffel iſt länger als die Staubgefäße. Die keulenförmige Narbe iſt in 4 kurze zuſammenneigende Lappen geſpalten. Die Frucht iſt eine faſt walzenförmige, ſtumpfe, glatte, beerenartige Kapſel.

Die Blüthezeit dauert faſt ununterbrochen vom Monat Juni bis in den November. (Beſchl. folgt).

Ein Blick auf den neueſten Zuſtand des Gartenweſens in den kaiſerl. königl. öſterreich. Staaten, mit beſonderer Rückſicht auf die Blumiſtik.

Eingeſandt von Hrn. Jakob Klier in Wien.

(Fortſetzung.)

Dadurch mußte wohl in jenen erhabenen Gäſten das Verlangen rege werden, auch in ihrer Heimath analoge Blumen-Aſyle zu ſtiften. Kein Wunder alſo, daß nun bald darauf die übrigen Staaten Europens ihre Gärten und Gewächshäuſer mit vielen, bisher nur aus botaniſchen Bilderwerken bekannten, Gewächs-Arten oder auch noch gänzlich neuen und unbekannten vegetabiliſchen Schätzen anfüllten und verſchönerten.

Unter dieſen botaniſchen Eroberungen befanden ſich dann auch ſo manche Prachtſtücke, die von den Blumiſten mit Haſt ergriffen wurden, um auch an ihnen ihre Verſchönerungs-Kunſtgriffe zu verſuchen, und damit unſer Gartenweſen zu erheben. So wuchſen ſeit der Zeit ihren Schätzen ſo vielerlei auffallende Schauſtücke aus den Gattungen *Acacia*, *Alstroemeria*, *Amaryllis*, *Azalea*, *Banksia*, *Baueria*, *Begonia*, *Cactus*, *Calceolaria*, *Camellia*, *Cistus*, *Crassula*, *Crinum*, *Daphne*, *Digitalis*, *Dryandra*, *Erica*, *Erythrina*, *Georgia*, *Geum*, *Gloriosa*, *Iris*, *Iusticea*, *Ixia*, *Kalmia*, *Macluria*, *Magnolia*, *Melaleuca*, *Metrosideros*, *Morea*, *Musa*, *Nerium*, *Olea*, *Oxalis*, *Paeonia*, *Pandanus*, *Passiflora*, *Pelargonium*, *Plumieria*, *Potentila*, *Primula*, *Protea*, *Reneaulmia*, *Rhododendron*, *Rosa*, *Salvia*, *Spigelia*, *Strelitzia*, *Tigridia etc.* und beſonders aus der Familie der Muſaceen, der Orchideen, der Palmen, der Rubiaceen, der Scitaminaceen, u. ſ. w. zu.

In den Verehrern der Gärten, die ſolche Blumengeſchmeide bis dahin nur zerſtreut, nicht allein bei verſchiedenen Beſitzern, ſondern auch durch die Erſcheinungszeit ihrer Blüthe von einander geſchieden bewundern lernten, entſtand nun auch der Wunſch, jene Gewächſe, die zu gleicher Zeit blühen, in einem Lokal verſammelt, und äſthetiſch geordnet zu erblicken. Eine dunkle Ahnung der aus einer ſolchen Vereinigung entſpringenden und zu erwartenden Schönheit erregten hauptſächlich die ſchon damals in unſeren Gärten beſtandenen Sammelplätze von den Raçen und Varietäten der Anemonen, Aurikeln, Aſtern, Chryſanthemen, Hyacinthen, Nelken, Pelargonien, Ranunkeln und Tulpen. In unſerer Kaiſerſtadt gehört das Verdienſt, eine ſolche, und zwar öffentliche Ausſtellung bewirkt zu haben, dem Freiherrn Carl von Hügel, der um die Horticultur, und um die Herbeiſchaffung von ſeltenen Pflanzen zu befördern, durch die Allerhöchſte Antheilnehmung, ſo wie auch durch die Mitwirkung mehrerer hoher Gönner und anderer Gartenfreunde in den Stand geſetzt wurde, mehrere Preiſe zu creiren, die dann allerdings aneifernd auf Cultur und Herbeiſchaffung von Pflanzen für die Gegenwart und Zukunft einwirken mußten.

Die nächſten Folgen dieſer Erſcheinung waren Nachahmungen derſelben von Privaten, bedeutende Ankäufe von Handelsſpeculanten, die fremde Pflanzen hieher gebracht hatten, häufige Beſtellungen exotiſcher Pflanzen, aus den vorzüglichſten Gärten Europens, und endlich ſogar perſönliche Reiſen nach denſelben von Perſonen, die den Ruf ihrer Gärten um jeden Preis zu vergrößern trachteten. Wieder andere bemühten ſich nach den berufenen Beiſpielen der Engländer und der Holländer, durch künſtliche Befruchtung neue Raçen und veredelte Gebilde zu erzeugen, und auch ihre Leiſtungen fanden ihre Verehrer und ihre Nachahmer. (Fortſ. f.)

Blumiſtiſche Bemerkungen.

Im vorigen Frühjahr ſetzte ich meine Hortenſien in die gewöhnliche, ſich dazu eignende Holz-Moor-Erde. Sie blühten ſchön hochroth. Vorigen Monat Februar nahm ich ein Exemplar in das warme Wohnzimmer, um ſolche zeitig zur Blüthe zu bringen. Es gelang ganz nach Wunſche, die Pflanze trieb ſchnell und ſetzte Blumen an. Bei der Entfaltung der Blüthen bemerkte ich inzwiſchen, daß die Blumen nicht roth, ſondern blau werden würden; ich hütete ſie daher vor der Sonne, und jetzt blüht die Pflanze ganz ſchön blau, ohne daß ich mir im Mindeſten erklären kann, woher dies kommt, da ich durchaus jede Künſtelei vermied, und die Pflanze blos mit klarem Brunnen-Waſſer begoß.

⁂

Im Herbſte des verfloſſenen Jahres bemerkte man hier in einem öffentlichen Garten einen Sommerlevkoienſtock, welcher reife Samenſchoten trug, und aus der Mitte des Stämmchens einen friſchen Stengel trieb, woran volle Blüthen waren.

Freiburg. St.

Dem Herrn Einſender der blumiſtiſchen Bemerkung in Nr. 11. 1832. S. 83. d. Bl diene zur Gegenantwort, daß er ſich in ſeiner Behauptung doch wohl habe irren können, denn wirklich iſt Metrosideros floribunda mit rothen Blumen in Köln an verſchiedenen Platzen anzutreffen. Auch in Bonn ſah ich dieſelbe als Varietät. Nicht alle botaniſchen Gärten beſitzen einen kritiſchen Vorſtand. Uebrigens haben Pflanzen verſchiedener Klaſſen oft ſo viele Aehnlichkeit, daß ſie leicht für Verwandte angeſehen werden können; wie es noch oft mit den Melaleuken und Metroſideren der Fall iſt. Uebrigens war ja nur ein Dafürhalten ausgeſprochen, und dies ſoll jetzt und nimmer Veranlaſſung zum Hadern ſein.

Kirdorf. Busch.

Einige Mittheilungen über die Georginen *) (Dahlien.)

Von Hrn. J. Wallner zu Genf.

Die fortwährende Trockenheit und Dürre im vergangnen Sommer **) hat den Dahlien ſehr geſchadet; die Blüthenknoſpen haben ſich ſehr gehörig entfaltet; die Stengel der zärtlichen Varietäten ſind vertrocknet und im Ganzen ſind die Wurzelknollen ſehr klein geblieben. Die im Monat Juni in die Erde geſetzten Pflanzen haben weniger gelitten und auch ſehr ſchöne Blüthen gebracht, weil ſie ſich erſt nach der etwas geminderten Hitze entwickelt hatten. Das Begießen der Dahlien, wie es gewöhnlich ausgeführt wird, hat wenig Einfluß auf die Blüthen gehabt; diejenigen Gartenfreunde, welche die Blätter mit der auf die Gießkanne geſteckten Seihe öfters begoſſen haben, erfreuten ſich viel ſchönerer Blumen.

Es iſt wahrſcheinlich, daß die Knollen, diesmal viel kleiner als gewöhnlich, leicht aufbewahrt werden können, und man wird ſich vor der Fäulniß und dem trocknem Brande, der ſehr oft den Wurzelhals der ſtarken Pflanzen ergreift, nicht zu fürchten brauchen. Bei der letztern Krankheit vertrocknet die Oberhaut, die halbholzige Subſtanz wird wie Feuerſchwamm, und die Keime werden gänzlich zerſtört, ohne daß die Wurzeln viel davon gelitten zu haben ſcheinen.

Ich habe bemerkt, daß die durch Stecklinge hervorgebrachten Pflanzen, die nur kleine Wurzeln haben, dieſer Krankheit weniger unterworfen ſind. Auch habe ich in dieſem Jahre die Erfahrung gemacht, daß manche ganz entartete Varietäten ihre frühere Pracht wieder erhielten, wenn ſie in eine ſandige mit Pferdedünger gemiſchte Erde gepflanzt wurden. Von dieſer Art waren: Black Turban, Georg IV., Grand Monarque, etc. Der ſonſt ſo ſchöne Comte de Rouvroy, Nro. 676 hat in dieſem Jahre eine Pflanze mit einfachen Blumen geliefert; alle andern waren gefüllt.

Meine Samenpflanzen haben von der Dürrung wenig gelitten, weil ihre hauptſächliche Blüthe nicht eher als im Monat September ſtatt fand. Ich habe ungefähr 1200 Samenpflanzen von kugel- und anemonenblüthigen Dahlien gehabt, aber der größte Theil derſelben hat nur einfache und unanſehnliche Blumen geliefert. Es kommt nicht ſelten vor, daß die im erſten Jahre mittelmäßigen Samenpflanzen in den folgenden

---

*) Im Auszug aus der Vorrede des Cinquième Catalogue des Dahlia, cultivés à Genéve, chez I, Wallner. 1832.

**) Die Bemerkungen des Hrn. W. werden den Georginenfreunden um ſo intereſſanter ſein, da der diesjährige Sommer mit dem vorjährigen, rückſichtlich des mangelnden Regens, ſehr viel Aehnlichkeit hat. D. R.

Jahren recht ſchön werden, und anderntheils, daß die in ihren erſten Blumen prächtigen Samenpflanzen in der Folge nur höchſt mittelmäßige Blumen bekommen.

Die erſten kugel= und anemonen=blüthigen Dahlien ſind aus Irland gekommen, und ſind in England unter dem Namen der irländiſchen Dahlien bekannt. Der Geſchmack an dieſen Varietäten iſt ſehr getheilt; aber ich glaube behaupten zu können, daß wenn man viele Pflanzen mit ſo ſchönen Blumen erhält, wie le Dark, Black Crimson, le lilac, le new Scarlett etc. dieſe gewiß recht ſehr geſucht werden. In England findet man an den regelmäßigen Varietäten mit kleinen Blumen, als: Scarlett Ranunculus, Lord Ruſsel etc. jetzt den größten Wohlgefallen.

Die Erfahrung hat mich gelehrt, daß die Cultur eines zu großen Samenbeets nur mittelmäßige Reſultate liefert. Ein Morgen Landes, gut kultivirt, giebt weit ſchönere Varietäten als 10 Morgen, weil es ſehr ſchwierig iſt, die nöthige Sorgfalt auf die Cultur einer ſo großen Fläche zu verwenden.

In dem Dahlien=Verzeichniſſe des Hrn. **Wallner** ſind folgende Sorten aufgeführt:

I. Kugelblüthige D. (Globe Flowered). II. Halbkugelblüthige D. (Annemone Flowered.) III. Zwerg=D., 4 Fuß hoch und niedriger, in folgenden Farben: 1) mit weißem Grunde, ſelten ins Roſafarbige ſpielend. 2) mit weiß gemiſchtem, geſtreiftem, geſtricheltem und fleiſchfarbenem Grunde. 3) mit roſafarb. Grunde. 4) lilafarbig. 5) violet. 6) punſchflammig. 7) amethyſtfarben. 8) purpurfarbig. 9) amaranthfarbig. 10) granatfarbig. 11) braun. 12) karmoiſin. 13) kirſchroth. 14) carminfarbig. 15) roth. 16) hellroth. 17) ponceauroth. 18) ſcharlachfarbig. 19) zinnoberroth. 20) orangegelb. 21) fahlgelb. 22) gelb. IV. Hohe Dahlien, mit 4½ F. hohen und noch höhern Stengeln, in einer noch zahlreichern Farbenauswahl als die Zwerg=Dahlien.

Aus der Revue horticole.

Ueber die Cultur der Pelargonien.

(Von Poiteau.) Beſchluß.

Wenn die Blüthezeit faſt vorüber iſt, ſtellt man die Pelargonien aus dem Gewächshauſe ins Freie an einen halbſchattigen Ort und ſenkt die Töpfe in die Erde, um die Pflanzen abzuhärten und das Reifwerden des Holzes zu begünſtigen. Kurze Zeit nachher kann man die Zweige abſchneiden und zu Stecklingen benutzen.

Das Beſchneiden und Verpflanzen der Pelargonien. Dieſe beiden Verrichtungen ſind unumgänglich nothwendig, wenn man ſchöne Pflanzen erhalten will; ſie werden im Auguſt entweder zu gleicher Zeit, oder die eine ungefähr 14 Tage nach der andern vorgenommen. Das Befinden beſteht im Wegnehmen der kleinen dünnen oder an einer unpaſſenden Stelle zum Vorſchein kommenden Zweige, im Zurückſchneiden der ſtärkern Zweige auf 8 — 12 Linien Länge, mit der beſondern Rückſicht, daß die Pflanze eine gerundete regelmäßige Krone aus 4 bis 8 Zweigen bekömmt.

Beim Verpflanzen giebt man den Pelargonienſtöcken, wo es nöthig iſt, größere Töpfe und eine leichte, recht fruchtbare und dungreiche Erde.

Die Vermehrung und Fortpflanzung. In ihrem Culturzuſtande bringen nicht alle Pelargonien Samen hervor, und diejenigen, welche Samen erzeugen, pflanzen dadurch nicht immer ihre eigenthümliche Art fort. Man ſäet den Samen beſonders in der Abſicht aus, um neue Varietäten zu erhalten, und zwar entweder in ein Miſtbeet, oder in einem mit leichter Erde gefüllten Saatnapf, den man ebenfalls in ein Miſtbeet ſtellt und in gleichmäßiger Befruchtung erhält. Wenn man die Ausſaat nicht ſogleich, nachdem der Same reif geworden, vornehmen kann, ſo geſchieht ſie im

nächſten Frühjahre, und nach Maßgabe der Stärke der jungen Pflanzen verſetzt man ſie einzeln in kleine Töpfe. Die meiſten Pelargonien pflanzen ſich ſehr leicht durch Stecklinge fort, beſonders wenn ſie in ein Miſtbeet geſteckt werden; die beſte Zeit hierzu iſt vom Juli bis zum September; allein man kann auch zu jeder Zeit mit der nöthigen Sorgfalt dieſe Verrichtung vornehmen. In 3—4 Wochen ſind die Stecklinge hinlänglich bewurzelt, um einzeln in Töpfe verpflanzt und wie die andern Pflanzen behandelt werden zu können.

Man ſtellt die Pelargonien Anfangs October ins Gewächshaus, und, obwohl ſie eine reichliche Anzahl Jahre leben können, ſo iſt es doch rathſamer nur 2—4 jährige Pflanzen zu kultiviren, weil ſie in dieſem Alter die angenehmſte Form haben und die ſchönſten Bluthen hervorbringen.

Neue oder wenig bekannte Pflanzen.

Begonia heracleifolia. H. R. P. Alle ſeither bekannten Arten der Begonia haben ſo viel Uebereinſtimmendes in Geſtalt, Blättern, Afterblättern u. ſ. w., daß man ſchon daraus ihre Gattung beſtimmen kann, ohne die Blüthe geſehen zu haben; aber hier haben wir es mit einer neuen Art zu thun, die ſo wenig als möglich von dieſen Charakteren aufweiſet, daß es unmöglich iſt, ſie, ohne die Blüthe geſehen zu haben, der Gattung Begonia beizuzählen. Sie bildet eine kräftige, ſtengelloſe Pflanze und hat mehrere ausgebreitete Wurzelblätter, die ſechs bis acht Zoll breit, tief in 8, mehr oder weniger ausgeſchweifte, Lappen getheilt, unten ein wenig rauh ſind, auf dicken, walzenförmigen, acht bis zwölf Zoll langen Blattſtielen ſtehen, nach dem Laufe der Mittelrippe des Blattes ſeitwärts leicht kahnförmig gebogen, mit rothen ſymmetriſch geordneten Linien marmorirt, und mit langen, weißen, ungleichen, divergirend horizontal ſtehenden Haaren beſetzt ſind. Wenn die Pflanze ſich zur Bluthe anſchickt, ſo erhebt ſich aus der Mitte der Blätter ein 2 bis 4 Fuß hoher Stengel, marmorirt und rauchhaarig, wie die Blattſtiele, an der Spitze eine Blumenſcheide von 2 großen, eiförmigen, ſägeförmig gezähnten Nebenblättern, zwiſchen welchen eine gabelförmige Theilung der Aeſte zum Vorſchein kommt; dieſe Aeſte ſind 2 — 3 Zoll lang, endigen ſich ebenfalls in zweiblättrigen Scheiden, theilen ſich nochmals 2zeilig und tragen an ihrer Spitze eine Art riſpenartigen Büſchel von großen roſarothen Blüthen; und was das ganz Beſondere daran iſt, daß den männlichen und weiblichen Blüthen die Blumenblätter gänzlich fehlen; ſie ſind auf ihre zwei großen Kelchblätter beſchränkt. Die anfangs ganz grünen Staubfäden werden in der Folge orangegelb. Die weiblichen Blüthen haben große eiförmige Nebenblätter.

Dieſe ſchöne und ganz beſondere Pflanze fing im Jardin des Plantes ſchon im Februar zu blühen an, und blühte fortwährend im März und April. Man hält ſie im Warmhauſe in einer leichten Erde. Durch Theilung der ſich ſtark vermehrenden Wurzeln kann man ſie unterdeſſen fortpflanzen, bis man Samen davon bekömmt. Sie ſoll in Braſilien einheimiſch ſein.

Prunus mahaleb nana. Hortul. Madame Eliſa le Brun hatte unter der Direktion des Hrn. d' Herou zu Chateauneuf-sur-Loire bei Orleans einen engliſchen Park anlegen laſſen, zu welchem Zweck im Jahre 1828 eine große Anzahl Bäume ausgeſäet worden waren. Aus dieſem Samenbeete ging auch ein Prunus mahaleb hervor, der ſich durch ſeinen ganz kleinen Wuchs bald als ein von den andern verſchiedenes Exemplar zeigte. Herr d'Herou, der dies erkannte, vermehrte ihn durch Pfropfen und ſchickte auch dem Jardin des Plantes ein Exemplar. Es bildet ein ſehr äſtiges Büſchchen, welches nicht über 2 — 3 Fuß hoch zu werden ſcheint. In die Krone gepfropft wie ein Roſenſtock, kann dieſe Pflanze mit den Cytiſen, Robinien und andern Pflanzen die Rabatten ſchmücken; indeſſen iſt zu fürchten, daß ſie wegen ihrer Ausartung niemals blühen wird.

Varietäten.

Berlin. In dem Königl. botaniſchen Garten blühten vom 1ten bis 15ten April folgende bemerkenswerthe Pflanzen: Helonias bullata L. — Colchicum montanum L. — Adamsia scilloides Willd. — Iris reticulata M. a B. — Marica Sabini Lindl. — Epidendron elongatum Jacq. — Canna Sellowi Hort. ber. — Musa rosacea Jacq. — Pimelia incana R. Br. — P. glauca P. Br. — P. linifolia Smith. — Gnidia imbricata. — Lachnaea eriocephala L. — Hakea linearis R. Br. — Dryandra floribunda R. Br. — Cinnamomum nitidum Hooker. — Franciscea Hopeana Hock. — Elichrysum sesamoides Willd. — E. proliferum Willd. — E. superbum Lodd. — E. spectabile Lodd. — Gnaphalium variegat. Willd. — Pomaderris elliptica Labill. — P. ambigua Hort. angl. — Neaea lancaefolia Hort. — Brachysema undulatum Ker. — Hovea Celsii Boupl. — Acacia graveolens Cunningh. — A. pubescens P. R. — A. diffusa Ker. · A. longissima Wendl. — Adenandra umbellata Willd. — Dodonaea attenuata Cunningh. — Polygala umbellata Thunb. — P. bracteolata L. — P. obcordata Hort. — P. linariaefol. Hort. — Corydalis bracteata Pers. — Leontice altaica Pall. — Mahonia repens Don. — — M. glumacea Hort. angl. —

Von merkwürdigen Farrenkräutern fructificirten in dieſer Zeit: Marratia cicutariaefol. Kaulf. — Polybotrya Raddiana Kaulf. — Diplacium obtusum Kaulf.

In Berlin blühte v. M. in dem Gewächshauſe des Hrn. Juſtizraths Meyer ein ſchönes Exemplar von Rhododendron arboreum Smith.

Wien, im Juni 1833. Die Tulpenflor, welche unlängſt hierſelbſt in dem Garten des Berlinerblau-Fabrikanten auf der Siebenbrünner-Wieſe Nr. 105, Hrn. Johann Adam, Statt hatte, verdient einer vorzüglichen Würdigung unterzogen zu werden. Der prächtige Farbenſchmuck, die ſchönen Zeichnungen und Schattirungen, welche ſich auf den Blumenblättern befinden und zuſammen die Blumenkrone ausmachen, überraſcht den Blumenfreund um ſo angenehmer, wenn dieſelben durch menſchliches Bemühen auf einen höhern Grad der Entwickelung gebracht werden. Dieſem folgend, ließ Hr. Adam vor ungefähr zwölf Jahren ſeine damaligen wenigen Tulpen in Samen übergehen, den er, als derſelbe reifte, abnahm, ſäete und dieſes Verfahren von Jahr zu Jahr fortſetzte, auf welche Weiſe er durch unermüdeten Fleiß, ausdauernde Geduld und thätige Mitwirkung ſeiner drei Söhne zu dem gegenwärtig erreichten Zwecke gelang, und bei 12000 Tulpen in ſchönſter Blüthe und größter Mannichfaltigkeit zur Anſicht bringen konnte. Dieſe Tulpen beſtanden aus einfachen und gefüllten, dann monſtröſen, einfarbigen und colorirten, von wenigſtens tauſend Gattungen, dergleichen vielleicht nicht in ganz Deutſchland, ja ſelbſt in deren Mutterland zu Harlem, wenigſtens nicht eine ähnliche Anzahl auf einem Platze beiſammen ſtehen werden. — Mehrere dieſer einfarbigen Tulpen ſtellten eine neu geartete, Bewunderung erregende, noch nie geſehene Farbe dar. Dieſes blumige Moſaikgemälde wurde von vielen Blumenliebhabern, in den wirklich ſehr ſchönen Tagen bewundert, und von der humanen Familie wurde auch jeder Blumenfreund liebevoll aufgenommen. In dem ſehr zweckmäßig angelegten Garten, welcher einige Glashäuſer enthält, in denen gewählte Roſen, Pelargonien, Cappflanzen u. ſ. w. untergebracht werden, ſind viele, darunter auch vorzügliche, ausdauernde Pflanzen und Sommergewächſe angepflanzt und bei 1000 Arten ebenfalls von demſelben aus Samen gezogenen Aurikeln vorhanden, deren Flur eine impoſante Augenweide gewährt hat, was ſowohl viele Kenntniſſe in der Gartencultur, als auch ungemeinen Fleiß und Thätigkeit beurkundet, dem jedoch hoher Lohn ward; denn Ihre Majeſtäten der Kaiſer und die Kaiſerin, ſo wie Ihre kaiſerlichen Hoheiten die Erzherzoge Karl und Anton geruhten dieſes allgemein Bewunderung erregende Blumenbild, deſſen Mannichfaltigkeit der Farben ins Unendliche überzugehen ſchien, allergnädigſt zu beſichtigen und den Erzeugern die herablaſſendſten Beweiſe des höchſten Wohlgefallens angedeihen zu laſſen. J. F. Kolb.

(Vom Niederrhein.) Bei einem Beſuche in Köln a. Rh. traf ich bei Hrn. Dr. Klöcker eine canadenſiſche Flammenblume „Phlox canadensis" welche im März im ſchönſten Bluthenſchmucke prangte. Sie ſtand im Glashauſe, kann

aber den Winter auch im Freien aushalten; war ½ Fuß hoch mit ſchlanken, ausgebreiteten Stengeln und ſchmalen lanzettförmigen dunkelgrünen Blättern. Die ſchönen lillafarbigen Blumen ſtanden in lockern Doldentrauben. Ich habe dieſelbe noch in keinem Syſtem verzeichnet gefunden.

Auch blühte bei dem Hrn. Doktor eine Templetonia retusa, oder nach dem däniſchen Botaniker C. G. Rafa, Rafaia retusa benamſet. Eine nette Pflanze mit immer grünen, keilförmigen, geſtumpften Blättern und 2½ Fuß Höhe. Die ſchönen großen purpurfarbnen Blumen ſtehen einzeln. Buſch.

Bibliographiſche Notiz über Blumiſtik.

Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den königl. preuß. Staaten, 18te Lieferung. gr. 4., in farb. Umſchlage geheftet, mit 2 Holzſchnitten. Preis 1⅔ Rthlr., im Selbſtverlage des Vereins, zu haben durch die Nicolaiſche Buchhandlung in Berlin und Stettin, und bei dem Sekretär der Geſellſchaft, Heynich, Zimmerſtraße Nr. 81 a. in Berlin. Desgleichen:

17te	Lieferung	mit	3	Kupfern.	Preis	1⅔	rℓ
16te	„	„	3	„	„	2	„
15te	„	„	2	„	„	2⅙	„
14te	„	„	1	„	„	2	„
13te	„	„	1	„	„	2⅚	„
12te	„	„	—	„	„	2	„
11te	„	„	2	„	„	2	„
10te	„	„	1	„	„	2	„
9te	„	„	2	„	„	1⅔	„
8te	„	„	1	„	„	2	„
7te	„	„	18	„	„	2⅓	„
6te	„	„	2	„	„	1	„
5te	„	„	8	„	„	3	„

Die ununterbrochene Fortſetzung dieſes ſchätzbaren Werkes giebt den erfreulichen Beweis, daß die meiſten Mitglieder des ſeit 10 Jahren beſtehenden Vereins an den Verhandlungen thätigen Antheil nehmen, und ſich beſtreben, den Gartenbau zu verbeſſern und auf eine höhere Stufe der Ausbildung zu erheben. Die erwählten Mitglieder, deren Geſammtzahl in der 18ten Lieferung 1090 angegeben iſt, leben und wirken nicht alle in den preußiſchen Staaten, ſondern in verſchiedenen Gegenden und Provinzen, faſt in ganz Europa; daher bemerkt der ſehr hoch geehrte Direktor des Vereins, Herr Geh. Ober-Finanz-Rath Ludolff (Band IX. S. 220), „daß der Verein, von Anfang an, vermöge der „Natur und des Weſens ſeiner Zwecke, der ganzen kultivir„ten Welt angehörte." Dieſe Bemerkungen ſind allerdings ſehr richtig, denn ſeit der Entſtehung des Vereins bis 1832 haben ſich 45 auswärtige „gleiche Zwecke befördernde Geſellſchaften" angeſchloſſen und Verbindungen angeknüpft. Demnach iſt der Berliner Gartenbau-Verein gleichſam als Centralpunkt zu betrachten, von dem alle neuen und beachtungswerthen Regeln, Vorſchläge und Anleitungen zur Pflanzenkultur ausgehen, die man in andern entfernten Ländern nachahmt, in erforderlichen Fällen, nach Beſchaffenheit des Bodens, Klimas und der Lokalverhältniſſe modificirt, dann zu dem vorgeſetzten Zwecke benutzt.

Was die Correctheit der eingeſandten und zum Drucke beſtimmten Abhandlungen betrifft, beſonders von einigen Mitgliedern, die ihre gemachten Verſuche und Erfahrungen in einem deutlichen und leicht faßlichen Vortrage nicht darſtellen können, ſo iſt der treffliche geiſtreiche Geh. Med.-Rath Dr. Link jeder Zeit bereitwillig, die Irrthümer, die ſie enthalten, zu berichtigen, und durch Anwendung der kritiſchen Feile Licht und Ordnung ins Ganze zu bringen. Auf gleiche Weiſe ſorgt Herr Geh. Sekretär Heynich für correcten Druck, und ſo kann ich auch in dieſer Beziehung ein Werk empfehlen, deſſen Inhalt über alle Zweige des Gartenbaues ſich verbreitet und gewiß jedem Freunde der reichen Natur, inſonderheit den Gartenbeſitzern und Gärtnern mannichfaltige Belehrungen darbietet.

Eiſenach, im Mai 1833.

Dr. F. G. Dietrich, Profeſſor der Botanik.

Hierbei eine Beilage, Nr. 3 der weimar. Gartenbauverhandl.

Nro. III. Juni. 1833.

Monatliche Berichte und Mittheilungen
aus dem
Verein für Blumiſtik und Gartenbau in Weimar.

Redacteur: Dr. Weiſſenborn in Weimar.

Ueber
Acclimatiſirung exotiſcher Zier-Pflanzen.

Vom Herrn Garten-Conducteur L. Sckell zu Belvedere.

(Beſchluß.)

Auf dieſe Art behandelt, gedeihen im hieſigen Großherzogl. Hofgarten nachſtehend beſchriebene Pflanzen ſehr gut, und gewähren zur Zeit der Blüthe einen wahrhaft herrlichen Anblick.

Azalea aurantiaca, bicolor, calendulacea, canescens, cuprea, glauca, nudiflora, viscosa, nebſt noch einer Menge anderer Spielarten, welche ſämmtlich in Nord-Amerika, theils auf den höchſten Gebirgen, theils an den Ufern der Flüſſe vorkommen; ferner Azalea pontica, nebſt mehreren Varietäten, am ſchwarzen Meer zu Hauſe. Dieſe Azaleen (deutſch Felſenſtrauch genannt) bringen alle ſehr ſchöne Blüthen in rothen, weißen und gelben Farben hervor.

Alsdann Andromeda acuminata aus Georgien und Florida; Andromeda axillaris, auf den Gebirgen Virginiens einheimiſch; Andromeda nitida, in ſandigen Wäldern Virginiens und Florida's, Andromeda paniculata, in Canada und den beiden Carolinas ſehr gemein; Andromeda speciosa, nebſt ihren beiden ſchönen Varietäten pulverulenta und cassinaefolia in Nordcarolina zu Hauſe. Dieſe Andromeden gewähren in der Blüthe mit ihren ſchönen weißen glockenähnlichen Blumen einen ſehr hübſchen Anblick.

Nicht minder ſchön ſind die Kalmien, wovon hier nachſtehend benannte ebenfalls im freien Lande kultivirt werden: Kalmia angustifolia und Kalmia glauca; dieſe beiden niedlichen, in den Wäldern und an den Ufern der Gebirgsſeen Canada's und der Carolinas lebenden Sträucher, werden nicht viel über zwei Fuß hoch und ſind dabei vom Monat Mai bis Ende Juni, erſterer mit dunkelrothen, letzterer mit hellrothen Blumen bedeckt. Einen wirklich imponirenden Anblick aber gewährt zur Zeit der Blüthe Kalmia latifolia, ein Strauch von 5 bis 7 Fuß Höhe und in ſteinigen Gebirgen Canada's und der Carolinas zu Hauſe. Die in dichten Dolden ſtehenden Blumen, welche anfänglich ſchön roth ſind, zuletzt aber beinahe ganz weiß werden, entfalten ſich Ende Juni, blühen beinahe bis Ende Juli, und machen mit den ſchönen dunkelgrünen lorbeerartigen Blättern einen recht angenehmen Contraſt.

Ferner ſteht auf oben erwähnten Beeten Rhododendron maximum, deſſen Vaterland die Gebirge Canada's und der Carolinas ſind, nebſt vier Spielarten, Rhododendron punctatum, Rhododendron Catabiense, eben daher, Rhododendron ponticum, in der Levante und dem ſüdlichen Spanien einheimiſch, Rhododendron Dauricum, deſſen Vaterland die ſibiriſche Landſchaft Daurien iſt, und die auf den Schweizer Alpen einheimiſchen Rhododendron hirsutum und ferrugineum. Welch' einen herrlichen Anblick gewährt nicht ſchon eine Gruppe, die nur aus Rhododendron-Arten beſteht! Das dunkelgrüne glänzende Laub ſticht gegen die prächtigen Blüthenbüſchel, die die verſchiedenſten Abſtufungen vom dunkelſten Feuerroth (Rhododendron hirsutum und ferrugineum) bis zum ſanften Blaßroſa darbieten, ungemein lieblich ab.

Ferner befinden ſich auch auf dieſen mehrmals erwähnten Beeten Rhodora Canadensis, auf den hohen Gebirgen Neu-Yorks und Pennſylvaniens einheimiſch, ebenfalls ein niedlicher Strauch; ferner mehre Species von Vaccinium, welche Blumen wie die der Andromeden hervorbringen und meiſtens Nordamerika zum Vaterland haben.

Dirca palustris, Lederholz, deſſen Vaterland die ſchattigen Wälder Neu-Yorks und der Carolinas ſind.

Clethra alnifolia, acuminata und pubescens, ebenfalls in Nordamerika zu Hauſe, gedeihen ganz vorzüglich gut und beleben mit ihren ſchönen weißen Blumen die ganze Gruppe.

Auch ſteht ſchon ſeit vier Jahren eine Pinus lanceolata, Lamb. aus China unter den oben erwähnten Pflanzen. Ihr geſundes Ausſehen beweiſ't, daß es ihr hier ſehr wohl gefällt, und ein Froſt von beinahe vier Grad Reaum. Kälte, als ſchon alle Bedeckung weggenommen war, hat ihr nicht im Geringſten geſchadet.

Zuſatz des Redacteurs.

Indem ich hier im Allgemeinen daran erinnere, daß den Verſuchen, exotiſche Gewächſe vollkommen zu acclimatiſiren, wenn man nicht vielfachen Täuſchungen ausgeſetzt ſeyn will, immer eine möglich genaue Kenntniß der Umſtände vorhergehen muß, unter welchen jedes Gewächs in ſeinem Vaterlande vegetirt, wohin namentlich die mittlere Temperatur, die Extreme der letztern, *) die Beſchaffenheit des Bodens nach Art und Feuchtigkeit, der hygrometriſche Zuſtand der Atmoſphäre, die Expoſition oder Himmelsgegend, nach welcher das Gewächs ſeinen natürlichen Standpunkt wählt, zu rechnen ſind, glaube ich insbeſondere darauf aufmerkſam machen zu müſſen, welchen Schwierigkeiten die Acclimatiſirung zärtlicher Gewächſe zumal in Thüringen unterliegt, welches durch den Umſtand, daß es zwiſchen dem Thüringerwaldgebirge und dem Harz liegt, einer ungemein veränderlichen Temperatur, und zumal den Spätfröſten ſehr ausgeſetzt iſt. Der Nachtheil, der ihm aus der Nähe des ſüdlich gelegenen Thüringerwaldgebirges entſpringt, wird nicht etwa durch einen vom Harz herrührendem Schutz gegen die Nordwinde ausgeglichen, ſondern vermehrt, indem der Harz eine Schranke gegen die von der Nordſee ausgehende Ausgleichung der Temperatur bildet, der ſich die nördlich vom letztern Gebirge liegenden deutſchen Länder erfreuen, während Thüringen zugleich nach ſeiner ganzen Länge dem Ungeſtüm der Weſtwinde und der Rauhheit der Oſtwinde bloßgeſtellt iſt. Wir dürfen alſo, obgleich z. B. Allſtedt, unter 51°25′ N. B. und bei 450 par. F. Meereshöhe, eine mittlere Jahrestemperatur von + 7,4° R., Eiſenach, unter 51° N. B., bei 669 par. F. Meereshöhe, eine ſolche von + 6,99° R., und Schöndorf bei Weimar, unter 51°1′ N. B., bei 974 p. F. Meereshöhe, eine ſolche von + 5,88° darbietet, nie hoffen, die Myrthe, die Pelargonien, ja ſelbſt Agave Americana Jahr aus Jahr ein im Freien erhalten zu können, wie es an beſonders geſchützten Stellen der engliſchen Inſel Wight und an andern begünſtigten Punkten der engliſchen Südküſte geſchieht. Nehmen wir z. B. Penzance an der Küſte von Cornwallis, einen Ort, der ſich eines vorzüglich milden Clima's erfreut, ſo ſtellt ſich dort, unter 50° 10′ N. B., die mittlere Jahrestemperatur ſchon weit günſtiger, zu + 9,8 R. Noch vortheilhafter zeigt ſich das Verhältniß des dortigen Clima's zu dem unſern, wenn man die mittlere Temperatur der 5 Wintermonate (November — März) hier und dort vergleicht. Sie beträgt, trotz des geringen Unterſchieds in der geogr. Breite, zu Penzance + 6⅔°, zu Allſtädt + 1,11, zu Eiſenach + 1,04 und zu Schöndorf — 0,34°; und die Extreme der Winterkälte liegen natürlich noch viel weiter auseinander; denn betrachtet man den Januar für ſich, ſo beträgt deſſen mittlere Temp. zu Penzance + 4,72°, zu Allſtedt — 2,28° zu Eiſenach — 2,26 und zu Schöndorf — 3,12°. Auf das Extrem der Kälte kommt es aber bei dem uns hier beſchäftigenden Gegenſtande vorzüglich an. Denn jede Pflanze verträgt im Allgemeinen, bei günſtiger Beſchaffenheit des Bodens, ein Clima, wo ſie auf der einen Seite nicht geradezu verbrennt, und auf der andern keinem Kältegrad ausgeſetzt iſt, welcher ihre Säfte durch Froſt in der Art ausdehnt, daß ihre innere Organiſation zerſtört und ihre Lebensthätigkeit dadurch unmöglich gemacht wird, welcher Kältegrad nach der chemiſchen Zuſammenſetzung der Säfte, ſo wie der Zähigkeit und Elaſticität der Gewebe bekanntlich nach den Familien und Species ſehr veränderlich iſt.

So willkommen jedem Gartenfreunde die Belehrung ſeyn wird, welche der Hr. Gartenconducteur **Sckell** im obigen Artikel über die Cultur verſchiedener Zierpflanzen im Freien mittheilt, und ſo ſehr es der Mühe lohnt, dieſen Gewächſen die hierzu nöthige Sorgfalt angedeihen zu laſſen, ſo kann man dieſelben, eben weil ſie dieſes Grades von Sorgfalt noch bedürfen, doch noch nicht acclimatiſirt nennen, und wir dürfen dieſes Reſultat nur bei ſolchen Pflanzen zu erreichen hoffen, die ſich noch beſſer für unſer Clima eignen, als der größte Theil der oben angeführten. Doch werden wir auch in jenen Familien nicht vergebens nach Species forſchen, die ſich vollkommen an unſern Himmelsſtrich gewöhnen können, indem z. B. Rhododendrum Caucasicum, auf dem Caucaſus, unter 42½° N. B., bis 8236 par. Fuß, R. ferrugineum, auf den Schweizer-Alpen, unter 45½ — 46° N. B., bis 7026 par. Fuß und R. Lapponicum, in Lappland, unter 67 — 70° N. B., bis 2700 par. F. Höhe angetroffen werden, und ſich folglich bei uns in angemeſſenem Boden ohne groſe Sorgfalt in Bezug auf Schutz gegen Froſt, aber unter gehöriger Beſchattung, ziehen laſſen dürften.

Schließlich nehme ich Gelegenheit, dem Herrn Dr. **Schrön**, Inſpector und Obſervator der Sternwarte zu Jena, meinen Dank für die Gefälligkeit darzubringen, mit welcher er die auf die inländiſchen Ortſchaften bezüglichen Angaben der Temperatur mir mitzutheilen die Güte hatte.

Ueber den Einfluß des Mondes auf die Witterung und Vegetation.

Mitgetheilt vom Redacteur.

(Fortſetzung).

Bevor wir die von Arago unterſuchten einzelnen Punkte betrachten, wollen wir kürzlich angeben, worin, nach dem jetzigen Standpunkte der Meteorologie, die Wirkungen beſtehen ſollen, die der Mond auf unſere Atmoſphäre ausübt. Man ſchreibt dem Monde vornehmlich deshalb einen ſtärkern Einfluß auf die Witterungsverhältniſſe zu, als der Sonne und den Planeten, weil derſelbe auf die Bewegung des Erdkörpers ſelbſt und die Ebbe und Fluth des Meeres eine deutlich erkennbare Einwirkung äußert. Die Hauptwitterungsveränderungen, heißt es, treten wie die ſtärkeren Meresfluthen mit den Hauptlunationen, (dem Neu- und Vollmond, vorzüglich mit erſterem) gewöhnlich ein. An-

---

*) Wenn rückſichtlich irgend eines gegebenen Gewächſes über dieſe beiden Punkte keine genaue Beobachtungen vorliegen, hat man dieſelben nach den localen Verhältniſſen annäherend zu beſtimmen. Hierbei ſind die geographiſche Breite und Länge, die Höhe über der Meeresfläche, der Abſtand des Meeres und höherer oder niedrigerer Gebirge, auch die Lage der letztern in Bezug auf die Himmelsgegend zu berückſichtigen.

Die mittlere Temperatur beträgt, bei der Höhe der Meeresfläche,

		nach Kirwan	nach Mayer
unterm	Aequator	+ 23,1	+ 24,0 Réaum.
—	5° d. Breite	+ 22,9	+ 23¾
—	10° „ „	+ 22,4	+ 23¼
—	15° „ „	+ 21,5	+ 22½
—	20° „ „	+ 20,4	+ 21¼
—	25° „ „	+ 18,8	+ 19¾
—	30° „ „	+ 17,2	+ 18
—	35° „ „	+ 15,4	+ 16
—	40° „ „	+ 13,4	+ 14
—	45° „ „	+ 11,4	+ 12
—	50° „ „	+ 9,3	+ 10
—	55° „ „	+ 7,3	+ 8
—	60° „ „	+ 5,5	+ 6
—	65° „ „	+ 3,7	+ 4½
—	70° „ „	+ 2,4	+ 2¾
—	75° „ „	+ 1,1	+ 1½
—	80° „ „	+ 0,3	+ 0¾
—	85° „ „	+ 0,3	+ 0¼
—	90° od. u. d. Pole	+ 0,4	0

Die beſtändige Schneegrenze iſt, nach Kirwan, unterm Aequator bei 15036′ Wiener Schuh; unterm 5ten Breitegrade, bei 14886′; unter 10°, bei 14514′; unter 15°, bei 13968′; unter 20°, bei 13248′; unter 25°, bei 12402′; unter 30°, bei 11190′; unter 35°, bei 10236′; unter 40°, bei 8706′; unter 45°, bei 7392′; unter 50°, bei 6042′; unter 55°, bei 4740′; unter 60°, bei 3558′; unter 65°, bei 2430′; unter 70°, bei 1506′; unter 75°, bei 720′ und unter 80° ſchon bei einer Meereshöhe von 114′. Aus der Vergleichung der mittlern Temperatur bei der Meereshöhe mit der Höhe der Schneelinie für den betroffenen Ort, wird ſich für jede gegebne Höhe über der Meeresfläche die mittlere Temperatur annähernd beſtimmen laſſen, indem man eine einfache Proportion bildet. Im allgemeinen ſtehen 300 pariſ. Fuß ſenkrechte Höhe einem halben Breitegrad in der Wirkung gleich. Doch iſt nicht zu überſehn, daß, während in der heißen Zone die Luftſchicht bei der Meereshöhe die heißeſte iſt, in der gemäßigten die einige hundert Fuß hohen Luftſchichten mehrentheils die wärmſten ſind, ſo daß ſich in ihnen zärtliche Pflanzen am leichteſten erhalten. Auch nimmt in unſerer gemäßigten Zone die Winter-Kälte nach Norden in einem viel größeren Verhältniß zu, als die Sommer-Wärme ab, ſo daß z. B. zu Enonlekis, unter 68 1/2° N. B., die Julitemperatur ſo hoch iſt, wie zu Edinburg, unter 55 5/6° N. B. Die geogr. Länge hat auch einen, jedoch weniger wichtigen und ſtetigen Einfluß, daher wir deſſen hier nicht näher gedenken können. Die Nähe von Gebirgen wirkt auf Erkältung und Vergrößerung der Unterſchiede der Temperatur, die Nähe des Meeres auf Ausgleichung derſelben hin. Doch können nördlich gelegene Gebirgszüge und Gebirgskeſſel ſehr zur Erhöhung und Gleichformigkeit der Temperatur beitragen.

meiſten ändert der Mond in ſeiner größten Erdnähe das Wetter zur Zeit des Neulichts und Vollmonds. Trifft das Erſtere mit dem Perigeo zuſammen, ſo iſt es mehrmals feucht und trübe, als trocken und heiter; dieſe letztere Witterung hingegen iſt gewöhnlich bei dem Neumonde im Apogeo und zur Zeit ſeiner größten ſüdlichen Abweichung. Treffen die Lunationen mit einer trüben Witterung zuſammen, ſo iſt es ſehr wahrſcheinlich, daß eine feuchte folgt; iſt hingegen dieſe ſchon vorhanden, ſo iſt die Wahrſcheinlichkeit größer, daß ſie ſich in eine trockene umändere. Die Veränderungen der Witterung erfolgen gewöhnlich innerhalb drei Tagen nach jeder Mondsſtation: die Veränderungen, welche der Neumond hervorbringt, aber innerhalb fünf Tagen.*) Alle dieſe Annahmen werden durch Arago's Beleuchtung der durch Beobachtung gewonnenen Reſultate mehr oder weniger entkräftet.

Spielt der Einfluß des Mondes beim Regen irgend eine Rolle?

Dieſe Frage iſt vom Prof. Schübler zu Tübingen in einem 1830 erſchienenen Werke höchſt ſorgfältig beleuchtet worden. Die dort zuſammengeſtellten Reſultate beruhen auf 28jährigen meteorologiſchen Beobachtungen, die von 1781 — 1788 zu München, von 1809 — 1812 zu Stuttgard und von 1813 — 1828 zu Augsburg gemacht wurden.

Zahl der Regentage.

	In 20 Jahren.	Von 1809 bis 1812.	Von 1813 bis 1816.	Von 1817 bis 1820.	Von 1821 bis 1824.	Von 1825 bis 1828.
Vom Neumond bis zum erſten Viertel	764	132	142	145	179	166
Vom erſten Viertel bis zum Vollmond	845	145	169	173	180	178
Vom Vollmond bis zum letzten Viertel	761	124	145	162	166	164
Vom letzten Viertel bis zum Neumond	696	110	139	135	153	159
Beim Zunehmen des Mondes	1603	277	311	318	359	344
Beim Abnehmen des Mondes	1457	234	284	297	319	323
Ueberſchuß zu Gunſten des erſtern Zeitraums	152	43	27	21	40	21

Das Maximum der Zahl der Regentage findet alſo zwiſchen dem erſten Viertel und dem Vollmond, das Minimum zwiſchen dem letzten Viertel und dem Neumond ſtatt. Die Zahl der Regentage des letztern Zeitraums verhält ſich zur Zahl der Regentage des erſtern wie 696 : 845, oder wie 100 zu 121,4, oder in runden Zahlen wie 5 : 6. Die Mittelzahlen vierjähriger Perioden geben ähnliche Verhältniſſe.

Es ſcheint alſo ausgemacht, daß es bei zunehmendem Monde mehr regnet, als bei abnehmendem.

Durch dieſe erſten Reſultate wurde Prof. Schübler aufgemuntert, die Beobachtungen mehr im Detail zu betrachten, und den Maxima und Minima in noch kleinern Zeiträumen als 6 — 7 Tage nachzuforſchen.

Zahl der Regentage nach den Mondphaſen.

Für Regentage hat man alle diejenigen Tage gerechnet, für welche in den meteorologiſchen Regiſtern ein Fall von Schnee oder Regen angezeigt war, wenn nämlich die Höhe der geſammelten Quantität 2/100 Linien überſtieg. Bei der Bildung der Gruppen hat man den Tag des erſten Viertels mit zu dem Zeitraum vom Neumond bis zum erſten Viertel, den Tag des Vollmonds aber mit zum Zeitraum vom erſten Viertel bis zum Vollmond gerechnet u. ſ. w.

Die Tabelle enthält die Reſultate 1) der 20 letzten Jahre, und 2) der ſämmtlichen 28 Jahre, über welche Prof. Schübler urtheilen konnte, und indem er für jeden Zeitraum das Mittel zweier aufeinanderfolgender Tage nahm, ſuchte er die Wirkungen zufälliger Störungen zu corrigiren, und zu einer etwas regelmäßigern Zahlenreihe zu gelangen.

Zahl der Regentage.

	Am Tage ſelbſt	Mittel zweier Tage	Am Tage ſelbſt	Mittel zweier Tage
Am Tage des Neumonds	105		148	
Am folgenden Tage	113	109	148	148
Am Tage des 1. Octanten	119		152	
Am folgenden Tage	115	117	148	150
Am Tage des 1. Viertels	111		156	
Am folgenden Tage	113	112	151	153
Am Tage des 2. Octanten	124		164	
Am folgenden Tage	128	126	167	165
Am Tage des Vollmonds	116		162	
Am folgenden Tage	113	115	161	161
Am Tage des 3. Octanten	125		161	
Am folgenden Tage	109	117	150	155
Am T. d. letzten Viertels	92		130	
Am folgenden Tage	96	94	140	135
Am Tage des 4. Octanten	100		138	
Am folgenden Tage	88	94	129	133

Wir wollen bemerken, daß binnen 20 Jahren 249, und binnen 28 Jahren 348 ſynodiſche Umläufe des Mondes ſtattgefunden haben, ſo daß alſo dieſer Trabant eben ſo oft in jede der hier betrachteten Stellungen gelangt iſt.

Dieſe Mittelzahlen, ſowohl für 20 als 28 Jahre, zeigen eine ziemlich regelmäßige Zunahme der Regentage vom Neumond bis zum 2ten Octanten; alsdann eine allmählige Abnahme, endlich ein Minimum an, welches ſich zwiſchen dem letzten Viertel und 4. Octanten befindet.

Wenn wir erſt eine längere Reihe von Beobachtungen beſitzen, wird es leicht ſein, dieſelben Berechnungen auf alle Theile des Mondmonats auszudehnen; um dann die Wirkungen der zufälligen Urſachen ganz unfühlbar zu machen, wird es hinreichen, daß man zahlreiche beſondere Beobachtungen zuſammenſtellt, die am Tage des Neumonds, ſo wie an dem vorhergehenden und nachfolgenden Tage anzuſtellen ſind. Mittlerweile hat Prof. Schübler annähernde Reſultate dadurch zu erlangen geſucht, daß er die abgeſonderten Mittelzahlen mehrer vorhergehenden und nachfolgenden Tage zur Beſtimmung der den verſchiedenen charakteriſtiſchen Zeitpunkten des Mondumlaufs entſprechenden Quantitäten benutzt hat.

---

*) Von Liechtenſtern, Handbuch der allgemeinen Welt- und Staatenkunde; S. 297.

(Fortſetzung folgt.)

Einige Winke über die Weinbereitung aus Obſt und Beeren, wie auch aus Weintrauben,

nach den Erfahrungen und Verſuchen
des Dr. Macculloch.

(Fortſetzung).

Den Zucker trifft man, wie allgemein bekannt, in allen Pflanzenſubſtanzen an, welche ſich durch einen ſüßen Geſchmack auszeichnen und fähig ſind, bei Einwirkung von Waſſer, Gährungsſtoff und gelinder Wärme in Gährung überzugehen. Am reichlichſten enthält ihn der Saft des Zuckerrohres, des Zuckerahorns, der Runkelruben ꝛc. aus welchem er ſich in ſtarrer und, nach erfolgter Reinigung, in kryſtalliſcher Geſtalt darſtellen läßt. Der aus dem Safte der Trauben und anderer ſüßen Früchte gewonnene Zucker kryſtalliſirt nicht regelmäßig, ſondern bildet bei ſeinem Erſtarren blumenkohlähnliche Körner, ſchmeckt auch nicht ſo ſüß, wie der kryſtalliſirbare Zucker, unterſcheidet ſich aber in ſeinen übrigen Eigenſchaften nicht von letzterem. Andere ſüße Pflanzenſäfte enthalten endlich blos flüſſigen, d. h. ſolchen Zucker, welcher gar nicht erſtarrt, ſondern nur honig- oder ſyrupartig erſcheint. Dieſer befindet ſich beſonders häufig in den Säften der Aepfel, Pflaumen, Birnen und anderer Früchte und iſt auch in den Säften vorhanden, welche feſten Zucker aufgelößt enthalten. Er iſt übrigens eben ſo gährungsfähig, wie die beiden andern Arten des ſtarren Zuckers.

Im nördlichen Europa kann aller Zucker, den man zur Darſtellung weiniger Flüſſigkeiten u. ſ. w. nöthig hat, entweder aus Runkelrüben gezogen, oder künſtlich aus Holz und Stärkemehl*) dargeſtellt werden.

Der Gährungsſtoff iſt ein eigenthümliches, aus Stickſtoffkohle und Waſſer zuſammengeſetztes Pflanzenerzeugniß, das in den meiſten Pflanzenkörpern vorkommt, welche Zucker und Stärke enthalten. Er beſitzt, wie Döbreiner ſagt, die merkwürdige Eigenſchaft, daß er, beſonders im geronnenen Zuſtande, auf den im Waſſer aufgelößten Zucker wie eine elektriſche Säule auf Salzauflöſungen wirkt: er verwandelt nämlich denſelben, ohne ſelbſt eine merkliche Veränderung zu erleiden, in Kohlenſäure und Alkohol. Durch dieſe Eigenſchaft aber, den im Waſſer aufgelößten Zucker in Gährung zu verſetzen, unterſcheidet er ſich von allen übrigen Pflanzenſubſtanzen und verkündigt auch dadurch zugleich ſein Daſeyn. Fünf Theile Gährungsſtoff verſetzen 200 Theile Zucker in vollkommene Gährung.

In den zuckerhaltigen Pflanzenſäften iſt der Gährungsſtoff im flüſſigen Zuſtande vorhanden. Bleiben dieſe Flüſſigkeiten einige Zeit mit der Luft in Berührung, ſo abſorbiren ſie aus dieſer etwas Sauerſtoff, entlaſſen hierauf einen Theil des Gährungsſtoffes und gehen dann in Gährung über, wodurch der letzte Antheil des Gährungsſtoffes ausgeſchieden und als eine ſchleimige oder breiartige Maſſe zur Erſcheinung gebracht wird. Eine kleine Quantität des Gährungsſtoffes wird indeſſen während der Gährung zerſetzt. Sie fällt in Geſtalt weißer Flocken zu Boden und enthält keinen Stickſtoff mehr; und da man denſelben in keinem der Produkte der Gährung antrifft, ſo iſt vielleicht Ammoniak oder ein Ammoniakſalz gebildet worden, woraus ſich, wenn dieſe Annahme richtig iſt, der häufige Ammoniakgeſchmack des Obſtweines erklären ließe.

Der Gährungsſtoff findet ſich auch in vielen Blumen, z. B. in den Hollunderblüthen, in den Weinblättern, in der Traube, in der Stachelbeere und in vielen andern Früchten und Blättern. Man hat die Bemerkung gemacht, daß er hauptſächlich in denjenigen vegetabiliſchen Säften reichlich anweſend ſei, welche durch Kochen ſich in eine Gallerte verwandeln laſſen.

Der Gährungsſtoff iſt im feuchten Zuſtande ſehr zur Säuerung, oder vielmehr zur Veränderung geneigt und kann nur dadurch auf lange Zeit vor Verderben geſchützt werden, daß man ihn zu wiederholten Malen mit kaltem Waſſer behandelt, ſodann durch ſtarkes Preſſen von allem Waſſer befreit und endlich an warmer Luft trocknet.

(Fortſetzung folgt).

Miſcellen.

Ueber das **verhältnißmäßige Wachſen der Theile der Pflanzen**, hat Prof. Meyer in Königsberg intereſſante Verſuche an Amaryllis und an jungen Getreidepflanzen angeſtellt, aus denen ſich ergiebt, daß das Wachsthum des Nachts etwas geringer iſt als bei Tage, und bei Tage von 8 — 2 ſtärker, als von 2 — 8 Uhr Nachmittags; auch wird es abwechſelnd beſchleunigt und verzögert, ſo daß nach dem ſtärkern Wachſen von 8 — 10 Uhr Vormittags ein langſameres von 10 — 12 Uhr folgt, darauf ein ſtärkeres von 12 — 4 Uhr, dem wieder ein ſchwächeres nachfolgt. (Allg. botaniſche Zeitung 16.)

Die **chineſiſche Theepflanze** iſt von Hrn. J. Roukey zu Briſtol in den Welchbergen, ſodann in Brecouſhire, nicht weit von der Quelle des Uſk, etwa 1000 Fuß über der Meeresfläche, höher als die gewöhnlichen Stellen für einheimiſche Bäume, z. B. Ellern und Birken, gepflanzt worden. Sie hat die Winterkälte ertragen, und trieb im Frühjahr kräftige Schößlinge. (Monthly Review.)

(**Einfluß der Dunkelheit und des Lichtes auf die Vegetation.**) Die Abweſenheit des Lichtes iſt zur Bildung des Zuckers beim Keimen der Sämerein, und die Anweſenheit deſſelben zur Erzeugung des Zuckers in den Früchten nöthig. Dr. Murray hat dieſe merkwürdigen Thatſachen folgender Geſtalt zu erklären verſucht. Der Same beſteht hauptſächlich aus Mehlſubſtanz, die Sauerſtoff bedarf, um in Zucker umgewandelt zu werden. Nun ſcheinen aber die lebenden Pflanzen Sauerſtoff im Dunkeln zu abſorbiren. Unreife Früchte enthalten gewöhnlich eine Säure, d. h. ſie beſitzen einen Ueberſchuß an Sauerſtoff, und das Licht iſt wiederum der Entbindung des Sauerſtoffes aus den lebenden Pflanzen günſtig. (Loudon's Encycl. of Agric. 2d. edition).

---

*) Die Darſtellung des Zuckers aus Holz kann noch nicht mit Vortheil ausgeübt werden, weil das Holz mehr, als ſein eignes Gewicht concentrirte Schwefelſäure fordert, um aufgelößt zu werden. Die Stärke eignet ſich aber ganz vorzüglich zur künſtlichen Erzeugung des Zuckers und wird bereits an vielen Orten Deutſchlands hierzu verwendet. Das Verfahren, aus Stärke Zucker zu bereiten, iſt kürzlich folgendes: Man vermengt 100 Theile Stärke von Waizen, Kartoffeln, oder andern Mehlfrüchten mit 300 bis 400 Theilen Waſſer, welches zuvor mit 3 Theilen concentrirter Schwefelſäure vermiſcht worden, und kocht dieſe Miſchung in einem gut verzinnten Keſſel anfangs unter beſtändigem Umrühren etwa 8 Stunden lang, wobei das verdunſtete Waſſer durch Zugießen von neuen Antheilen Waſſers erſetzt werden muß. Man ſetzt hierauf zu der Flüſſigkeit, während dieſelbe noch ſiedet, erſt ſo viel gepulverte Kreide, oder reinen Kalk, als zur Entſäuerung derſelben erforderlich iſt, oder bis kein Aufſchäumen mehr erfolgt. und dann noch 1 oder 2 Theile fein gepulverte thieriſche Kohle, filtrirt dann das Ganze durch ein wollenes Tuch und verdunſtet die filtrirte Flüſſigkeit, am beſten in ganz flachen Keſſeln, bis beinahe zur Syrupsdicke. Man läßt dieſelbe in ſteinzeugenen Gefäßen erkalten und etwa 24 Stunden lang ruhig ſtehen, damit der noch aufgelößte Gyps niederfalle, gießt hierauf den Syrup klar ab und verdunſtet ihn über gelindem Feuer vollends bis zur ſtarken Syrupsdicke.

Dieſer Syrup hat eine weingelbe Farbe und einen ſehr angenehmen Geſchmack. Nach einigen Tagen gerinnt er zu einer feſten Maſſe und kann nachher in dieſem Zuſtande vollends ausgetrocknet werden. Der Zucker, welcher daraus hervorgeht, verhält ſich ganz wie Traubenzucker und beträgt der Menge nach etwas mehr, als das Gewicht der angewendeten Stärke. Wird er in 4, 6, oder 8 Theilen Waſſer aufgelößt, und die Auflöſung mit etwas Gährungsſtoff vermiſcht, ſo verwandelt er ſich, wie jeder andere Zucker, bei einer Temperatur von 10° bis 15° R. in Alkohol und Kohlenſäure und kann daher mit Vortheil zur Darſtellung künſtlicher Weine benutzt werden. (Zur Gährungs-Chemie, von Döbereiner 1822.)

Gedruckt bei Friedrich Häßler zu Weißenſee.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt=Aemter, Zeitungs=Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto=Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen=Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. XII. Weißenſee, (in Thüringen). Juni 1833. VI. Jahrg.

Beſchreibung und Cultur ſchönblühender Glashaus= und Stubenpflanzen.

Fuchsia gracilis, Lindl. F. decussata, Graham. Die ſchlanke Fuchſie.

(Beſchluß.)

Zur Ueberwinterung bedarf dieſe Pflanze eines Standes im Glashauſe oder in der Stube, bei einer Temperatur von † 3 bis 5° R., und, da im Winter der größte Theil der Blätter abfällt, eine geringe Befeuchtung. Vom Mai bis Anfangs Oct. ſtellt man ſie ins Freie, wo ſie, vorzüglich bei trockner Witterung, ein reichliches Begießen verlangt. Im April verſetzt man dieſe Pflanze, giebt ihr friſche Erde und, wenn es nöthig iſt, einen größern Topf. In einer dungreichen, lockern, ſandigen Damm= oder Miſtbeeterde gedeiht ſie ſehr wohl; eine ganz vorzügliche Vollkommenheit erreicht ſie aber dann, wenn man ſie vom Mai bis zum Sept. aus dem Topfe auf eine Rabatte in die vorgenannte Erdmiſchung ſetzt; hier treibt ſie mit einer Ueppigkeit und zu einer Höhe, und liefert den ganzen Sommer hindurch ſo zahlreiche Blüthen, wie man ſich bei der Kultur im Topfe kaum vorſtellen kann. Im September ſetzt man die im freien Lande ſtehenden Pflanzen mit dem Wurzelballen behutſam wieder in Töpfe, und ſtellt ſie bei mäßiger Befeuchtung an einen halbſchattigen Ort, bis kühle Nächte den Stand im Gewächshauſe nöthig machen.

Die Vermehrung dieſer Pflanze geſchieht ſehr ſchnell und leicht durch Stecklinge, die in kleine Töpfe gepflanzt in einem warmen Loh= oder Miſtbeete ſehr bald bewurzeln. Werden dieſe im Frühjahre bewurzelten Stecklinge ins freie Land in eine paſſende Erde gepflanzt, ſo erwachſen ſie ſchnell zu ſtarken Sträuchern, die gleich den alten Pflanzen im September wieder in Töpfe geſetzt und im Glashauſe überwintert werden.

Ein Blick auf den neueſten Zuſtand des Gartenweſens in den kaiſerl. königl. öſterreich. Staaten, mit beſonderer Rückſicht auf die Blumiſtik.

Eingeſandt von Hrn. **Jakob Klier** in **Wien**.

(Fortſetzung.)

Daß auf dieſe Weiſe der Geſammtreichthum unſerer Gärten ſich dergeſtalt vermehrte, daß endlich die zugereiſ'ten Handelsſpeculanten ſich weiter keine ſo bedeutenden Geſchäfte mehr verſprechen dürfen, iſt eine ſehr einleuchtende Folge aus dem Geſagten.

Man dürfte ſich nur die Mühe nehmen, die ſpeciellen Verzeichniſſe der k. k. Gärten von Schönbrunn, Lachſenburg und jener auf der Terraſſe, und im Stadtgraben, dann jener Ihrer k. k. Hoheiten der Herren Erzherzoge **Carl** und **Anton**, des fürſtlich **Eſterhazyſchen** Gartens zu Eiſenſtadt, des gräflich **Harrachiſchen** zu Bruck an der Leitha, des Baron **Hügelſchen** zu Hietzing, des fürſtlich **Meternichſchen**, fürſtlich **Lichtenſteinſchen**, fürſtlich **Razumoffkyſchen**, Freiherrn v. **Pronay**, des Herrn v. **Rupprecht**, und der Handelsgärtner **Roſenthal**, **Held**, **Ancelloti**, und vornehmlich des k. k. botaniſchen Univerſitätsgartens, in eines zuſammenzuſchmelzen, und es würde ſich eine Maſſe darſtellen, die unſere obige Angabe gar unwiderſprechlich beſtätigte.

Wenn man uns etwa den Mangel eines eigentlichen Blumenmarktes vorwerfen wollte, ſo muß ich hierauf antworten, daß ich zwar den Werth und die Vorzüge eines ſolchen weder verkenne, noch beſtreite, daß ich jedoch auch dießfalls in Wien für jenen Mangel einigen Erſatz in folgenden Anſtalten treffe. Unſere Handelsgärtner ſind größtentheils ſehr nahe an der Stadt etablirt, und dieſelben haben noch überdies meiſt ihre eigenen Buden, oder Verlagsgewölbe; an jedem ſehr beſuchten Platze oder Gaſſe befindet ſich außerdem eine Blumenhändlerin, und man trifft da öfters ſehr intereſſante und ſeltene Pflanzen; endlich mengen ſich auf den öffentlichen Marktplätzen den ganzen Sommer hindurch immerhin auch zahlreiche Blumenverkäufer unter die Obſthändler und Verkäufer der Gemüſe.

Was unſere Schau = Floren = Ausſtellungen und lebendigen Blumen = Tableaux betrifft, ſo glaube ich von den mir bekannten als vorzüglich ſehenswürdig anführen und aufzeichnen zu müſſen:

1) Die Hyacinthen= und Muſcari=Flor in Schönbrunn.
2) Die berühmte Tulpenflor des Hrn. **Adam** allhier;
3) Die Primel= und Aurikel=Flor im k. k. Augarten.
4) Die Nelkenflor des k. k. Obermalers Hrn. **Hirſchler**, nächſt der Nußdorfer=Linie.

5) Die Pelargonien=Floren ſind insbeſondere zahlreich: ich halte mich für verpflichtet, Folgende anzuführen, als: a) Jene Sr. kaiſ. Hoheit des Herrn Erzherzogs **Anton** zu Baden, b) die im k. k. Augarten,

c) jene im k. k. Park zu Lachſenburg; d) jene des Herrn Fürſten von Metternich am Rennwege; e) die Sammlung des Herrn Baron von Pronay; f) des Herrn Regierungs-Rathes Krebner, g) die des Luſt- und Ziergärtners Baumann; h) die des Fabrik-Inhabers Büchler; i) die zwar nur en miniature, aber ſehr gewählte des k. k. Hofrathes von Kernhofer; und endlich k) die des Einſenders dieſer Zeilen mit einem Vorrath von mehr als 7500 Exemplaren in tauſendfachen Verſchiedenheiten, womit er, wie in der Frauendorfer-Gartenzeitung unlängſt gemeldet worden, eine Topfroſenflor von mehr als anderthalbtauſend Exemplaren verbindet, die ſeine Allerhöchſten Gönner, und alle ſeine Beſchützer und Freunde im Wechſel mit der Blüthe von 8000 Tulpen und mehreren tauſend Ranunkeln bewillkommnen ſoll. (Fortſetzung folgt.)

Bemerkungen über die Kultur des Cyclamen persicum.

Will man von dieſer ſchönen Pflanze Freude erleben, ſo muß ſie im Winter einen ſonnigen Standort haben und in Haideerde gepflanzt ſein, die man beſonders vom April an mäßig feucht hält. Sind die fleiſchigen Wurzeln etwas dick, ſo blühen ſie leicht und bringen im Juni ihre ſchönen, rothen oder auch rein weißen, wohlriechenden Blumen hervor. Wenn dieſe am Verblühen ſind, ſo windet ſich bei Ausbildung der Samenkapſel der Stengel ganz ſpiralförmig ſo lange, bis die Samenkapſel auf dem Boden liegt. Iſt dieſes, dann nimmt man den Samen, ſäet ihn gleich in Töpfe mit Haideerde gefüllt, legt eine dünne Lage Moos über die Töpfe, damit die Samenkörner beim Entkeimen nicht wegſpringen und überwintert ſie im froſtfreien Zimmer. Im Frühlinge gegen April bis Mai werden die jungen Pflanzen verſetzt und werden bei ſorglicher Pflege recht gut gedeihen. Als Novität kultivirt man in Köln ein Cyclamen hederaefolium flore roseo pleno; es iſt dieſes aber keine neue Pflanze, ſondern nach Mill. und Smith. nichts anders als C. europaeum, welches auch wie dieſes im freien Felde mit weniger Laubbedeckung erhalten werden kann, jedoch fordert es Haideboden. Dieſes wenige wird hoffentlich dem Herrn Anfrager aus Torgau in Nro. 15 d. Z. v. J. 1832 ſeine Hoffnung auf künftige Freude beleben. Jetzt, Mitte Novembers ſteht ein C. europaeum im freien Felde bei mir im üppigſten Blüthenſchmucke.

Kirdorf. **Buſch.**

Die Cultur der Aurikeln.

(Nach des Herrn Regs.-Direktor Dr. Herquet Methode.) *)

Zur Ausſaat werden flache Töpfe und eine mittelmäßig gute Erde ohne Sand genommen. Die Erde auf der Oberfläche, ungefähr 1 Zoll hoch, läßt man durch einen Seiher laufen, um ſie wegen des feinen Samens und der zarten Wurzeln leicht durchdringbar zu machen. Im Winter, ungefähr im Januar, wenn

gefallener Schnee zu haben iſt, wird der Same auf die Oberfläche der Erde, ohne ihn unterzugraben, geſäet, mit Schnee bedeckt, und dieſe Bedeckung, wenn der darauf gebrachte Schnee geſchmolzen, noch mehrmals wiederholt, bis die Erde im Topfe gehörig durchdrungen iſt. Wird die Erde auf der Oberfläche allzutrocken, ſo wird die Bedeckung mit Schnee, wenn dieſer noch zu haben iſt, wiederholt, oder dieſelbe behutſam mit einer ganz feinen Brauſe begoſſen. Nach einiger Zeit geht der Same auf, und gegen Ende April's ſetzt man die Töpfe ins Freie, in den Schatten oder wenigſtens in den Halbſchatten. Im Nachſommer werden die zarten Pflänzchen in Käſten verſetzt und darin überwintert, im folgenden Frühjahre aber einzeln in kleine Töpfe oder in das freie Land verpflanzt. Im letztern Fall iſt der beſte Platz für dieſelben ein im Halbſchatten gelegenes Beet, wenn dieſes auch ſelbſt gegen Mittag gelegen, aber nur durch Bäume und Geſträuche von dieſer Seite her gedeckt iſt. An ſolchem Platze blühen die Aurikeln am ſchönſten und laſſen ſich am leichteſten überwintern.

Nachträgliche Bemerkungen über Rhododendron arboreum. Smith.

Dieſe Species des Rhododendron wurde zuerſt vom Capitain Hartwicke auf einer Reiſe nach Sireenagur im Jahr 1796 beobachtet, in dem Gebirgsſtrich, Sewalik-Kette genannt, welche die Ebenen Hindoſtans zwiſchen dem 75° und 35° öſtlicher Länge, von den Himmalaja-Gebirgen trennt. Sie wird gewöhnlich in hohen Gegenden in Eichenwäldern gefunden; der Boden iſt eine reiche ſchwarze Pflanzenerde über einem ſteinigen Lager. Sie blüht im März und April, der Same wird gegen Ende Mai oder Anfangs Juni reif, wenige Tage vor dem Eintritt der Regenzeit. Die Eingebornen gebrauchen das Holz, um die Schäfte der in Hindoſtan gewöhnlichen Musketen daraus zu machen. Im Lande ſelbſt heißt ſie Boorans.

Der Stamm iſt ſäulenförmig, 20 oder mehr Fuß hoch, 16 — 24 Zoll im Durchmeſſer. Die Rinde iſt geborſten und ſchält ſich in großen Maſſen ab, iſt ſo leicht wie Kork, und beſteht aus vielen Lagen von $\frac{1}{16}$ Zoll Dicke.

Die Pflanze läßt ſich leicht in jedem Gewächshauſe bei wenigen Graden Wärme kultiviren. In England kommt ſie auch im freien Lande fort, wird jedoch im Winter mit Stroh und dergl. eingebunden. In Devonshire und den ſüdlichen Grafſchaften hält ſie unbedeckt den Winter im Freien aus und gedeiht am beſten in Topferde oder ſehr leichtem, ſandigem Lehm.

Einiges über Acclimatiſirung und Behandlung der Haideerdepflanzen. (Fortſetzung.)

(Eingeſandt vom Hrn. Freiherrn von Pfeffenrath, Herzog. Sächſ. Kammerherrn zu Saalfeld.)

Die Blattbahn muß, wenn ſie zur Pflanzenvermehrung eingerichtet wird, mit 6 Zoll breiten Brettern eingefaßt werden, wovon 3 Zoll über und 3 Zoll in die Erde kommen; dieſe breterne Einfaſſung hat den Zweck, daß die Umgebung vor derſelben immer reinlich gehalten werden kann, daß ſich der äußere Boden nicht mit dem Haideboden vermiſcht, ſondern die Anlage immer ſcharf begränzt und eingefaßt iſt. Ich denke mir, es muß einen herrlichen Anblick gewähren, dieſe prächtigen Bäume und Sträuche in ſolch einem reich-erdhaltigen Standort ſich kraftvoll entwickeln zu ſehen. Man hat ſchon ähnliche Anlagen, wo dieſe Bäume in ihrem eigenthümlichen Boden ohne Töpfe wachſen, dieſe werden aber den Winter hindurch mit Häuſern und Strohdächern bedeckt, was freilich noch keine Acclimatiſirung zu nennen iſt. Die einer Acclimatiſirung am fähigſten Haideerdepflanzen ſind folgende:

---

*) Im Auszuge aus den Verhandlungen des Königl. Preuß. Gartenbau-Vereins.

I. Magnolia.
M. acuminata.
- maxima.
- auriculata.
- cordata.
- glauca.
- macrophylia.
- purpurea.
- Soulongeana.
- Thomsoniana,
- tripetala.
- Yulon.
- annonaefolia.

M. fuscata.
- grandifl. angustif.
- grandifl. cavaticulata.
- ferraginea.
- rotundifolia.
- glabra ovata.
- undulata.
- Kobus.
- pumla.
- grandifl. latifol.
- longifol.
- praecox.

M. pyramidata.
- Oxionensis.
- salicifolia.
- Ulon.
- Exmouth.
- stricata.
- Magardensis.
- grandifl. nana praecox.
- maxima.

(Fortſetzung folgt.)

Vertilgung ſchädlicher Inſecten.

Schon oftmals wurden mir theure und werthe Pflanzen (in Blumentöpfen) durch Würmchen zernichtet. Es waren ganz kleine weiße Maden in zahlloſer Menge, und dieſe Menge wurde um ſo größer, je fetter die Erde und je wärmer der Standort des Topfes war.

Dieſe Pflanzenfeinde zu vertilgen, machte ich mehrere Verſuche, die entweder ganz erfolglos waren, oder nebſt der Vertilgung der Maden auch den Tod der Pflanzen bewirkten. Endlich nahm ich gewöhnliches Kochſalz und ſtreute es auf die Erde eines Blumentopfs, der voll ſolcher kleinen Maden war. Das Salz zerfloß bald auf der vom Begießen feuchten Erde und mit demſelben verſchwanden auch die Maden. — Dieſes einfache und wohlfeile Mittel iſt nicht nur ganz unſchädlich, ſondern es befördert auch außerordentlich das Wachsthum und Gedeihen der Pflanzen. Darauf beſprengte ich mit Salzwaſſer meine Monatsroſenſtöcke, welche voll ſogenannter Blattläuſe waren, und wurden auch dieſe auf wiederholten Gebrauch davon befreit.

Günſtedt, im April 1833.

Fiſcher.

Aus der Revue horticole.

Neue oder wenig bekannte Pflanzen.

Amaryllis fulgida. Ker. Bot. Reg. Feuerfarbige Amaryllis. *) Eine ſehr ſchöne in Braſilien einheimiſche Amaryllis, die ſeit 1810 in England kultivirt, und 1831 nach Frankreich einzig nur in den Jardin des Plantes gebracht wurde, wo ſie im Februar und März 1832 zum erſten Male blühte. **)

Die Zwiebel iſt dick, rund und hält 3 bis 4 Zoll im Durchmeſſer; ſie treibt nur zwei an ihrem Grunde ſich umfaſſende Blätter ***); dieſe ſind zungenförmig, 12 bis 15 Zoll lang, 2 bis 3 Zoll breit, ſtumpf, an der Spitze flach, am Grunde etwas kielförmig und ſchön lebhaft grün. An der Seite der Blätter erhebt ſich der Schaft, der viel dicker als ein Daumen, 2 Fuß hoch, ein wenig zuſammengedrückt, mit einem grauen Staub ſehr ſtark bedeckt iſt, und an der Spitze eine zweiblättrige Blumenſcheide trägt, aus welcher 4 geſtielte, auseinanderneigende, 5 Zoll lange und breite zinnoberrothe Blumen hervorkommen. Der Blüthenſtiel iſt 3 Zoll lang; der Fruchtknoten iſt dick und hat 3 gerundete Lappen. Das Blumenrohr iſt auswärts grün, und dieſes Grün erſtreckt ſich bis zur Mitte jedes Blumenblatts. Das Innere des Blumenrohrs iſt weiß und etwas gelblich, und der Rand ſämmtlicher Blumenblätter iſt geadert oder mit gleichlaufenden Linien gezeichnet, die viel röther als das Uebrige ſind. Die Staubfäden und der Griffel ſind viel kürzer als die Blumenkrone, ſafrangelb und ſehr dick; die Staubbeutel ſind ebenfalls ſehr dick, aber ſehr kurz; die Theile der Narbe ſind lang und nach unten gerollt.

Dieſe ſchöne Pflanze blieb 14 Tage in Blüthe; die Fruchtknoten verdickten ſich und ſchienen Samen geben zu wollen. ****)

---

*) Am. miniata. Curt. Bot. Mag. Hippeastrum fulgidum var. miniatum. Herb.

**) Blüht nach Boſſe (Handbuch der Blumengärtnerei) im Frühling und Sommer, und iſt in Harlem, Hamburg u. a. O. das Stück für 2 Thaler zu bekommen.

***) Die Blätter ſind länglich-lanzettförmig, grün. Die Scheide bringt zwei feuerfarbige rachenförmige Blumen.

****) Man hält dieſe ſchöne Amaryllis im Treibhauſe oder in der warmen Stube, und begießt ſie im Winter ſehr wenig. Im Februar oder Anfangs März ſtellt man ſie warm, nahe ans Fenſter, und giebt ihr mehr Waſſer. Im Sommer kann man ſie auch unter einen Kaſten unter Glas ſtellen, woſelbſt ſie bei warmer Witterung reichlich Luft verlangt.

Um von dieſer Art alle 3 Monate Blüthen zu erhalten, (?) empfiehlt Herbert, ſie im Winter trocken und kühl zu halten, im Frühling warm zu ſtellen und zu begießen, worauf ſie bald blüht und neue Blätter treibt. Dann ſoll man ſie ins Glashaus ſtellen, bis zum Auguſt wenig Waſſer geben, alsdann wieder ins Treibhaus bringen und reichlicher begießen, wonach ſie zum zweitenmale blühen.

Gute Amaryllis-Erde wird aus 1 Theil fetter Raſenerde, 2 Theilen Laub- oder Walderde, 1 Theil alten, verwitterten ſandigen Lehm und 1 Theil groben Flußſand oder feinen Kies bereitet. Anmerkg. des Uebſ.

Syſtematiſche Namen der merkwürdigſten Pflanzen-Gattungen und Arten, ihr Genitiv ꝛc.

(Fortſetzung.)

Mitgetheilt von L. aus T.

Aloe. L. es. foem. Aloe.

ʼαλόη Plin. XXVII. 4. Die Abſtammung iſt noch ungewiß. Die mehreſten leiten es her von αλς, das Meer, weil dieſe Pflanze in der Nähe des Meeres zu wachſen pflegt. Die Leberaloe (A. hepatica) und Roßaloe (A. caballina) iſt ein aus A. vulgaris L., nach den neueren Entdeckungen aber aus A. perfoliata oder elongata Murr. oder linguifolia Thunb. gewonnener Saft. Die Erſtere hat den Namen von ihrer leberartigen Farbe, die Letztere, weil man ſie kranken Pferden einzugeben pflegt.

Aloexylon. Lour. neutr. Aloeholz.

Von ἀλόη und ξύλον, Holz. Vergleiche Agallochum.

Alopecurus. L. i. masc. Fuchsſchwanzgras.

ἀλωπέκουρος (Theophr. VII. 20; Plin. XXI. 17.) von ἀλώπηξ, der Fuchs, und οὐρᾶ, der Schwanz. Eine Grasart, deren Aehre mit einem Fuchsſchwanz Aehnlichkeit hat,

Alopecuros (Betonica). L. Gelbweiße Betonie.

Ihre längliche, zugeſpitzte Aehre hat ebenfalls Aehnlichkeit mit einem Fuchsſchwanz.

Alsine. L. es. foem. Vogelkraut, Hühnerbiß, Hühnerdorne. Penult. lang wie Neptunine Nerine.

Alsine (Diosc. IV. 87; Plin. XXII. 4.) von alsy, der Hain, eine Pflanze, die in den Hainen zu wachſen pflegt.

Die deutſchen Benennungen beziehen ſich auf A. media. L., weil dieſe ein gutes Futter für junge Vögel (Canarienvögel) und junge Hühner abgiebt. Auch gehört ſie zu den ſogenannten Uhrpflanzen, weil ſich ihre Blüthe erſt deß Morgens 9 Uhr öffnet und ſchon Nachmittags 3 Uhr ſchließt, daher wird ſie in einigen Gegenden Thüringens **Faule Magd** genannt. Ferner iſt ſie ein Wetterprophet; denn trifft man ſie während jener Zeit geſchloſſen an, ſo läßt ſich ſicher auf Regen ſchließen. (Fortſetzung folgt).

Varietäten.

Berlin. Am 23. Juni d. J. beging der Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den königl. preuß. Staaten im königlichen Akademie-Gebäude unter den Linden ſeine Stiftungsfeier. Das geſammte Lokal war mit Orangerien, ſo wie mit den ſchönſten Topf-Gewächſen, worunter ſehr viele exotiſche Pflanzen, durch die Herren Hofgärtner Braſch und Kunſtgärtner Touſſaint auf das Geſchmackvollſte geſchmückt, und im Veſtibul lagen unter der Akademie-Uhr die herrlichſten, für die jetzige Jahreszeit zum Theil ſehr ſeltenen Früchte, als Ananas, Melonen, Weintrauben, Pfirſichen, Pflaumen und die ausgezeichnetſten Erdbeeren aus. Die Wahl eines neuen Vorſtandes fiel auf den geheimen Ober-Finanz-Rath Herrn v. Zſchock.

Berlin. (Beſchluß der Notiz in Nr. 8 der Blumenzeitung.) Im königl. botaniſchen Garten blüheten in den erſten Monaten dieſes Jahres: Lobelia Cavanillesii Hort. monac. — Gastonia palmata Roxb. — Rhipsalis funalis Salm. — R. mesembrianthemoides Hav. — Ceanothus azureus Desf. — Hovea longifolia R. B. — Acacia dealbata Cunningh. — A. marginata R. B. — A. Oxycedrus Sieb. — A. pugioniformis Wendl. — A. linifolia W. — verniciflua Cun. — Boronia alata Smith. — B. pinnata Sm. — Correa pulchella R. B. — C. speciosa Bot. Rep. — Zieria Smithii Andr. — Pittosporum ferrugineum Ait. — Corydalis longiflora Pers. — Anemone Capensis L.

Wien, im Mai 1833. Die **Hyazinthen- und Tulpenflor** in der botaniſchen Abtheilung nächſt Hietzing im k. k. Hofgarten zu Schönbrunn verdient wegen ihrer ausgezeichneten Pracht einer rühmlichen Erwähnung und die Aufmerkſamkeit aller Blumenfreunde.

Paris. Vom 3ten bis 9ten Juni c. fand die öffentliche **Ausſtellung der Gartenbau-Produkte**, welche die Gartenbau-Geſellſchaft zu Paris jährlich veranſtaltet, im Orangeriehauſe der Tuilerien ſtatt.

Brüſſel. Die **Flora-Geſellſchaft** zu **Brüſſel** hatte vom 30ten März bis zum 2ten April 1833 die 22te öffentliche **Ausſtellung** veranſtaltet. Im Ausſtellungsſaal befanden ſich 916 Pflanzen, die von 248 Mitgliedern und Blumenfreunden eingeſendet worden waren.

Den Preis für die ſchönſte und zahlreichſte Sammlung erhielt Hr. F. Reynders, welcher 105 Pflanzen zur Ausſtellung gegeben hatte, unter welchen ſich mehrere bewundernswürdige befanden. Das Acceſſit wurde Herrn Verſchaffelt sen., Gärtner und Blumiſt zu Gent, ertheilt.

Den Preis für die ſeltenſte Pflanze, die erſt vor Kurzem in Europa eingeführt ſein ſoll, trug eine Berberis fascicularis aus der Sammlung des Hrn. F. Reynders davon. Das Acceſſit erhielt eine von Hrn. Parthon de Von zur Ausſtellung gebrachte Scottia trapeziformis.

Der Preis für die am ſchönſten blühende und am vollkommenſten kultivirte Pflanze wurde einer dem Hrn. F. Reynders gehörigen Templetonia retusa ertheilt, und das Acceſſit erhielt derſelbe für eine zur Ausſtellung gebrachte Correa pulchella.

Der Preis für die Pflanze, deren gegenwärtige Blüthe von der natürlichen Blüthezeit möglichſt entfernt ſein ſollte, wurde einer Rosa Banksia fl. albo, aus der Sammlung der Frau Comteſſe de Beaufort, zugeſprochen. Das Acceſſit erhielt eine andre, dem Hrn. F. Reynders gehörige Rosa Banksia.

Brüſſel, im Juni 1833. Im geographiſchen Garten hieſelbſt blüht in dieſem Augenblick ein Cactus speciosissimus mit 60 Blüthen.

Gent. Die königl. **Geſellſchaft für Ackerbau und Botanik** zu **Gent** hielt vom 6ten bis 10ten Februar 1833 ihre 48te öffentliche **Blumen-Ausſtellung**. Der Saal enthielt 1160 Pflanzen, von 237 Blumenfreunden zur Ausſtellung gebracht.

Die Pflanze, welche beſtimmt war, den 6ten Februar Vormittags um 9 Uhr in vollkommner Blüthe zu ſtehen, war Delphinium grandiflorum fl. pleno. Hr. Van de Woeſtyne-D'hane erhielt den Preis dafür.

Eine goldne Medaille war der Preis für die reichhaltigſte Sammlung von blühenden Pflanzen, die durch ihre Anzahl, Verſchiedenheit und ſchöne Cultur beſonders bemerkenswerth waren. Hr. Ch. A. Maes, der 103 Pflanzen zur Ausſtellung gebracht hatte, erhielt dieſen Preis. Das erſte Acceſſit wurde der Sammlung des Hrn. J. de Cock zu Melle und das zweite dem Hrn. Van de Woeſtyne-D'hane ertheilt.

Der Preis für die durch ihre Cultur unter allen gegenwärtigen Pflanzen bemerkenswertheſte, wurde einem Enkianthus reticulatus, aus der Sammlung des Hrn. A. Mechelynck zugeſprochen. Das erſte Acceſſit bewilligte man einer Epacris impressa, dem Hrn. A. Mechelynck gehörig, und das zweite einem Cypripedium venustum, von Hrn. Ch. A. Maes zur Ausſtellung gebracht.

(**Gartenkunſt der Chineſen.**) Fortſetzung. — In einem chineſiſchen Garten findet ſich auch gar kein Anblick, der Ueberraſchung erregen könnte; keine weit führenden, ſchön gewundenen Fußwege; keine kunſtreich täuſchenden, weiten Ausſichten; keine den Himmel abſpiegelnde Waſſerfläche, kein dichter Schatten zwiſchen Lauben. Nichts als eine kleine Welt von unbedeutenden Verwickelungen. Der zum Luſt- und Blumengarten beſtimmte Grund nimmt den Raum von zwei bis drei Acres ein, iſt aber gänzlich in unzählige, kleine, viereckige Beete abgetheilt, die mit niedrigen Ziegelmauern umgeben, abgetheilt und wieder untergetheilt ſind, auf deren breitem Saume porzellanene Gartentöpfe von allerlei Größe und Form mit Blumen und blühenden Sträuchen in Ordnung geſtellt ſind. Die innern ſowohl, als äußern Mauern des Gartens ſind mit Trillagen von phantaſtiſcher Zeichnung überdeckt, an welchen klimmende und kriechende Pflanzen ſich befinden. Außer der Schönheit und Seltenheit derſelben findet ſich nichts Anziehendes in dieſen Gartenanlagen. Ohne geniale Austheilung, ohne verſtändige Zeichnung iſt das Ganze ein Zuſammenfügen rauher, künſtlicher und natürlicher Felſen, aufſteigend aus Maſſen der zarteſten Blumen; phantaſtiſche Brücken ohne Waſſer; unanſehnliche Höhlen ohne Charakter und Schönheit! (Beſchl. folgt.)

Bollweiler, (Frankreich), im Juni 1833. Von der rühmlichſt bekannten Bollweiler Camelien-Sammlung, herausgegeben von den Herren Gebrüdern **Baumann**, iſt jetzt die dritte Lieferung mit 12 Abbildungen erſchienen. Die Beſitzer der erſten und zweiten Lieferung werden mit Vergnügen erſehen, daß die treu dargeſtellten Abbildungen der dritten Lieferung weit beſſer gelungen und beſonders die Camellien ſich ſchön ausnehmen; übrigens iſt letztere den zwei erſtern ziemlich gleich, und wie die Abbildungen iſt auch die Beſchreibung in den deutlichſten Charakteren dargeſtellt. Die vierte Lieferung iſt ihrer Vollendung nahe, und wird, wo nicht noch in dieſem Jahre, ſpäteſtens zu Anfang des Jahres 1834 erſcheinen. Sie ſind zu haben: zu Paris bei Mad. Huzard, zu Strasburg bei Mons. Levrault, Treuttel und Würtz, und bei den vornehmſten Buchhändlern in Frankreich.

(**Berichtigung.**) In Nr. 11 der Blumenzeitung pag. 84, Z. 13 v. o. bittet man gefälligſt zu leſen anſtatt: „ſehr gehörig" — „**nicht** gehörig" — und pag. 85, Z. 19 v. u. ſoll es heißen anſtatt: „das Befinden" — „das **Beſchneiden**".

Verzeichniß von 1833

über ganz gefüllte Georginen, Kartoffel-Sorten und perennirende Landpflanzen,

welche um beigeſetzte Preiſe zu haben ſind

bei Chriſtian Deegen zu Köſtritz bei Gera.

Die Zahlung geſchieht in preuß. Courant.

A. Georgina variabilis fl. plenissimo, dichtgefüllteſte Pracht-Georginen in allen neuen Formen und Färbungen, als:

		Fußhöhe	gr
1	alba crispa, kraußblättrige weiße	6	8
2	sulphureo-flavesc. grandifl., große ſchwefelgelbe, äußerlich nanquinfarbige T.	5	6
3	flavescens, lebhaft nanquinfarbige	6	6
4	aurea sordida micans, trübgoldgelb-ſchimmernde T.	5	12
5	vitellino-erubescens. röthlich-dottergelbe]	6	8
6	aurea, coccineo-veriegata, goldfarb. ſcharlach überzogen	4	12
7	carmineo-lutescens amabilis, liebliche, gelb-carminr. T.	5	16
8	aurorans triflora, dreiblumige aurorafarbige	4	8
9	atropunicea sordida frondosa, überlaubte trüb-dklblutrothe	5	6
10	violacea pall. humilis, niedrige halbviolette	4	6
11	lilacino-albida suave caerulesc., weißlich-lilaf. mit bläul. Schrin	5	8
12	rosea spectabilis, anſehnliche roſafarbige	6	8
13	lilacina hyalina, lillafarbige, blaulich-durchſcheinend	5	6
14	citrina pall. lucida, leuchtend hellzitrongelbe	6	8
15	coccin. holoseric. micans, ſchimm. ſcharlachf. m. Sammt	5	12
16	lilacino-caerulescens, hohe blaulillafarbige	7	8
17	violacea saturata, tief dunkelviolette	5	8
18	purpureo-violacea formosa, ſchöne dunkelviolett-purpurfarb.	5	8
19	Xerampelina, Herbſtrothe	5	6
20	amethystea pall. stellata, ſternförmige hellamethyſtblaue	5	12
21	coccinea praenitens, feurige ponçeaufarbige	5	12
22	coccinea, suave livido-canesc., ſcharlachfarbige, über der Hälfte des Blattes kreisrund in mattgelbgrau übergehend	5	24
23	albida, roseo-hyalina, weißliche, hellroſa durchſcheinend	3	8
24	lilacino-rosea, purp. flammea, vielblumige, lillafarbige, mit Purpur überflammt. T.	4	16
25	atrococcineo-purp. holosericea, frühblühende, dunkelſcharlach-purpurfarbige mit tiefem Sammt T.	4	12
26	lilacino-albida caeruleo-varieg.. gz. baßlillf. m. bl. Spz.	5	16
27	aurea, lateritia picta floribunda, blumenreiche goldfarbige, mit ziegelrothen Zeichnungen von Spitzen herein T.	4	36
28	aurantiaca-miniata major, große, orangemennigrothe T.	4	8
29	aurea, erubesc. striata sphaer., knopff. goldf. m. roth geſt.	5	8
30	lilac. incan., purpur. lin., purpurlin. a. graulillf. Gr. T.	5	20
31	carnea saturata, geſättigt hautfarbige	6	6
32	alba laciniata. ſchlitzblättrige weiße	5	6
33	chermesina vera, rein carmoiſinrothe T.	5	6
34	cinnamomea fistulosa, röhrige zimmetbraune	5	6
35	violacea pallida multiflora. vielblühende hellveilchenblaue	4	6
36	atrosanguinea, nigro-holoseric., dunkelblutrothe, mit ſchwarzblauem Sammt überzogen T.	4	8
37	lilacina int. purp. tenella, ſanfte lillafarbige, nach innen dunkelroth werdend T.	5	12
38	aurea-fulgescens, goldfarb. mit feuerrothen Anhauch	5	6
39	aurantiaca saturata canaliculat., rinnenblättr. dkelorangef.	7	8
40	albida, roseo-diluta lineata, weißliche, blaßroſa überwaſchen, mit glasartigen feinen Linien	5	36
41	badio-erubescens max., größte gelbbraunröthliche	6	6
42	caeruleo-holosericea altiss., höchſte Sammtblaue	9	6
43	pulcherrima tricolor, ſchöne dreifarbige	6	6
44	aurantiaca speciosa, große, prächtig orangefarbige	6	12
45	carmineo-haematitica maj., große, röthelcarminrothe	5	8
46	camelino-flavesc. suave roſ., gelbl. chamoiſ. m. roſa Schein	4	12
47	cupreo-fuscata, kupferrothbraune	5	6
48	carmineo-chermesina fulgida, lilaceo-holosericea, prächtig karmincarmoſinrothe, mit lilla Sammtſchein	5	48
49	coccin. splend., glänz. ſcharlachr. (Cact. spec. ähnl.) T.	5	8
50	cupreo-violacea int. viresc., violettkupferf. in grünlich. T.	5	8
51	carnea sord. chermesino-picta, trübhautfarbige, mit kupfrigen carmoſin überſtrichen T.	5	16
52	lilacea, purp. venosa glob., kugelrunde, lillafarbige, mit purpurfarbigen Adern T.	5	20
53	alba nymphaeformis, Seeroſengeſtalt. weiße	4	6
54	sulphurea nitens, leuchtend ſchwefelgelbe	5	6
55	alba paradoxa, ſonderbar gebaute, weiße	5	6
56	camelina, lilacino- varieg., chamoiſ. m. lilla a. d. Spitz.	5	12
57	coccinea formosa, prächtige ſcharlachrothe	5	12
58	carminea saturata, tief carminrothe	6	8
59	caerulea, purp. picta, lichtblaue, m. Purp. überzeichn. T.	5	16
60	albida-canescens, striata, weißlichgraue mit Streifen	6	16
61	rosea amoena, angenehme roſenfarbige, mit kleinen weißſtreifigen Blättchen T.	5	16
62	asterisimilis lilacina subt. arg., Aſterähnliche, lillafarbige, unten ſilberweiß T.	4	12
63	roseo-diluta-sanguinea et flava striata, nelkengeſtaltige, dreifarbige, blutroth und gelbſtreif. mit roſa verwaſchen. T,	5	72
64	atroviolacea, purp. venosa, dunkelveilchenblaue, mit dunkelpurpurfarbigen Adern T.	7	12
65	atrochermesina crispa, kraußblättrige carmoſinrothe T.	5	6
66	cinnamomeo-erubesc. grandifl., große röthl. zimmtf. T.	5	16
67	xerampelina fusc. pleniss., dichtgef. bräunl. Xerampelin.	5	8
68	sulphureo-canescens, graulich ſchwefelgelbe	5	8
69	isabellino-lutescens, gelbliche iſabellfarbige	6	8
70	rosea superba, große, prächtig roſafarbige	5	16
71	rubescens-luteo-striata max., größte, röthlich gelbſtreifige	7	12
72	chermesina canescens, große, carmoſinr. m. grau getrübt	5	12
73	camelino-canescens, rubro-varieg., grau-chamoiſfarbige, mit kreisrunden rothen Anhauch T.	5	16
74	atrosanguinea, purp. holosericea, große ſchwarzblutrothe mit purpurnen Sammt	6	8
75	carnea pallens caryophyll., nelkengeſtaltige, blaßhautfarb.	5	6
76	rosea suavis rosaeform.. roſenähnl. prächtig roſafarb. T.	4	24
77	aureo, rubro-picta grandifl., große goldfb. m. roth gez.	5	6
78	purpureo-caerulea plensima, dichtgef. dreiblum. purpurbl.	5	18
79	miniata pall. obsoleta., matt hellmennigrothe	5	6
80	lucida-canescens int. flavesc., graubleifarb. innen gelb	5	12
81	cuprea saturata grandifl., große dunkelkupferrothe	5	12
82	violacea purp. amoena, ſchöne violettpurpurfarbige	5	8
83	purpurea Reginae, königliche purpurfarbige	6	12
84	crocea saturata, tief ſafrangelbe	5	12
85	haematitica helianth, große, Sonnenroſ ähnl. röthelr. T.	5	16
86	atropunicea multifl., vielblum. ſchwärzlich blutigrothe T.	4	6
87	croceo-miniata caule-nigro, dklſtengel. ſafranmennigrothe	5	10
88	flavescens, carmineo-varieg., gelbl. m. carm. bunt ſchat.	5	16
89	ferrugineo-erubescens, papaveracea, ranunkelmohnähnliche, röthlich-roſtfarbige T.	5	20
90	rosea suave violacea subt. cerina, roſa, mit violett überzogen, unten wachsgelb T.	4	12
91	caerulea-rosea rosaeform., roſenähnliche, lillaroſafarbige	5	8
92	coccineo-fuscata corrusc., blendend bräunl. ſcharlachf. T.	5	10
93	sulphurea pall., blaßſchwefelgelbe T.	5	6
94	asterisimilis lacteo-lilacina, aſterähnliche weißl. lillafarbige	5	16

		Fußhöhe.	gr
95	fusco-cinerea int. lut., fahlrothgraue, innen gelb	6	10
96	amaranthacea altiss, hohe amaranthfarbige	7	8
97	roseo-caerulesc. multifl., vielbl. roſafarb., in blau ſpielend	5	8
98	carmineo-chermesina lucida, leuchtend karmincarmoſinr.	6	12
99	aurea suave coccinea multifl., vielbl. goldf mit Scharlach kaum bemerkbar überzogen	5	12
100	candida, rein weiße	5	6
101	coccinea spectab., anſehnliche ſcharlachrothe T.	4	12
102	tropaeolo-similis., Tropäolum gelbrothe	5	6
103	coccinea, atrobadio-holoser., große ſcharlachrothe, mit ſchwarzbraunem Sammt überzogen	5	12
104	aurea, fusco-varieg multifl., vielbl. goldf. m. graur. ſchat. T.	4	8
105	coccineo-sanguinea corrusc., blendend ſcharlachblutr. T.	5	10
106	cerino-fulvescens, wachsgelbbräunliche	5	8
107	coccinea saturata ranuncul., ranunkelähnl. dklſcharlachf.	5	8
108	haematitica sanguin.-grandifl. große dunkelröthelblutr. T.	5	12
109	sanguinea holosericea, ſammtige blutrothe	6	8
110	pallida rosea, albido-striata, verſchämte ſanftblaßroſenfarbige mit weißen Streifen T.	5	12
111	lateritia int. flavescens, ziegelrothe mit gelb, innen heraus verwaſchen T.	5	8
112	persicina saturata rubro-margin., tiefpfirſichblüthfarbige mit dunklern Einfaß	6	12
113	purpureo-amaranthacea, purpuramaranthfarbige	5	8
114	chermesina pall. lilacino- distincte venosa, blaßcarmoſinfarbige mit lilla ſcharfgeadert	4	12
115	carmin., alb. seminarg, weißl. mit carmin umſchloſſen	5	18
116	lilacea int. albo canesc., lillafarbige, innen weißgraue	6	6
117	flavo-fusca globularis. rundblum., gelblich-bräunliche	5	12
118	camelino-lutescens, gelblich-chamoifarbige	6	8
119	punicea pumila. niedrige blutigrothe T.	3	8
120	sanguin., fusco-holoseric., blutr. m. braun. Sammt T.	5	16
121	lateritio-flava multifl. vielblumige gelbziegelrothe T.	5	8
122	chermes. amaranth. semifist. diethenf. dklamrthcarmoſinf.	7	8
123	rosea tenella, zart hellroſenfarbige	7	8
124	atroviolacea perfecta, vollendeſte veilchenblaue	5	16
125	purpureo-carminea subt. viol., prächtige purpurcarminrothe, unten violett T.	4	16
126	phoenicea int. aurea, ſchimmernd feuerrothe	5	6
127	rosea, lilacina latemarg., roſaf. m. breit. lilla Einfaſſung	6	16
128	carminea crispa sphaerica, krauße, karminrothe mit grünem Knopfe	7	6
129	cereo-badio-rubra erecta, gelbbraunrothe T.	4	6
130	violac., chermes. latemarg, violette m. carmoſin eingef.	6	16
131	coccinea sordida, trübſcharlachrothe	6	8
132	atropunicea sordida trübblutigrothe	5	6
133	fulva grandiflora, große gelbbraune	5	6
134	atroamaranth. int. nigrescens max. größte dunkelamaranthfarbige, innen heraus ſchwarz T.	6	12
135	luteo-fusca tenella, zarte gelbbräunliche T.	5	10
136	nivea amoena, ſanft ſchneeweiße	7	8
137	citrina, croceo cincta, zitrongelbe m. ſafranf. Umkreiß	6	12
138	ochraceo-lutescens, florib., reichblühende gelbockerfarbige	4	10
139	luteo-miniata monstr., monſtr. gelbe m. mennigr. ſchatt.	7	6
140	atrocaerulea rosaeform., roſenähnliche ſchwarzblaue	5	6
141	atropurpureo-caerulea, dunkelpurpurblaue	5	8
142	cerina, rubro-varieg., bunte, wachsgelbe mit roth ſchatt.	5	12
143	aurea, miniata flammea speciosa, prachtvolle goldfarbige, mennigroth geflammt und fein geſäumt T.	5	24
144	carminea praenitens, köſtliche feurig-carminrothe T.	5	16
145	aurorans pellucida, ſchimmernd aurorafarbige	5	8
146	coccineo crocea praecox, frühblüh. ſafranſcharlachfarbige	6	8
147	atroviolacea multiflora, vielblumige dunkelviolette	5	6
148	flavo-miniata crispa- kraußblättrige gelbmennigrothe	5	6
149	aurea,rubro-varieg. florib, reichlichblühende hochgelbe m. lebhaften roth geflammt T.	5	24
150	lilaceo-caerulesc. subt. canesc., helllillablaue unt. grau	6	12
151	atroviolacea, canescens holosericea, dunkelveilchenblaue mit ſanftgrauem Sammt überzogen T.	5	8
152	rubro-fusca multiflora, vielblumige bräunlich-rothe	5	8
153	rosea, caeruleo-hyalina, ſanft roſaf., hellblau durchſch. T.	5	12
154	pall. viol. int. lact., niedr. blaßviol. inn. hera. weißl. T.	4	6
155	lateritio-fulgescens, gelblich-feuerfarbige	5	8
156	purpurea nitida subt. pall., leucht. purpurf. unt. heller	5	8
157	rubro-livida semifist., diethenf. rothe mit bleif. Spitzen	5	12
158	atroamaranth. chermesina triflora, dreiblumige, prächtige dunkelamaranth-carmoſinrothe T.	6	12
159	aurea-canescens, bleichgoldfarbige in grau gezogen	5	10
160	alba-caerulescens, ſanftweiße mit blaulichen Spitzen T.	5	24
161	ochracea, rubra sordida, ackergelbe mit trübr. verw. T.	4	8
162	aurea floribunda, überausreichlichblühende hochgelbe T.	4	12
163	rosea argentea, roſa mit Silberglanz	5	12
164	coccinea excellens, hervorglänzende ſcharlachrothe	7	10
165	rosea albicans, rosaeform., roſenähnl. blaßroſafarbige T.	4	18
166	violacea, lilacino-varieg., große violett-lillabunte	6	12
167	persicino-rubic. grandifl. große röthlich-hellpfirſichblüthf.	6	6
168	albo-lilic. marg., weißlichlillaf. m. dklrn. Adern u. Saum	6	10
169	lutea sordida erubescens, trübgelbe, röthlich angelaufen	6	8
170	lilacino-caerul. holoser., vielbl. lillablaue mit Sammt T.	5	8
171	purpurea, albo-varieg, weißliche mit Purpur überwaſch.	5	8
172	chermesina splendens min., kleinſte, leucht. carmoſinr.	5	10
173	sulphurea, cerina multifl., vielbl., ſchwefelg., roth ſch. T.	4	8
174	luteo-lateritia, ziegelrothe ins gelbe ziehend	5	8
175	lilacina albicans, weißliche mit lilla umſchloſſen T.	5	12
176	atropurp. caerulesc., dunkelpurpurf. innen blau ſchimm.	5	8
177	ochrac. satur. mult., vielblum. zarte dunkelockerfarb. T.	4	16
178	lutea, rubro-variegata, gelb und rothbunte	5	8
179	albida, rosea pallida semi-marg., kleine weißliche, mit blaßroſa an Seiten und Spitzen T.	5	1
180	violacea int. alba, violette, nach innen weißlich	5	
181	amaranth. holos. florib., reichbl. ſammt. dklamarthf. T.	4	
182	camelina flexuosa, chamoifarbige mit gebogenen Blättern	5	6
183	aurea saturata nitida, leuchtend tiefgoldfarbige	5	16
184	violacea pall. albo-striata, blaßviol. mit weißen Herzſtr.	5	6
185	cerina, cinnabarina, wachsgelbe, nach innen zinnoberroth	5	8
186	atrochermesina, fuscato-nigro-late marg., dunkelcarmoſinrothe mit ſchwarzbraunem breiten Einfaß	5	16
187	violaceo-rosacea, violettroſafarbige	5	8
188	badia int. aurea, kaſtanienbraune, innen hochgelbe	5	8
189	atrocarm. viol. spl. ſanftglänz. dunkelviolettcarminr. T.	4	16
190	atrosanguinea vera, rein-dunkelblutrothe	5	8
191	flavo-erubescens, bunte dunkelgelbe mit roth überzogen	5	12
192	atrococcineo-brunea, holosericea canescens, ſonnenroſenähnl., bräunl., ſcharlachrothe mit grauem Sammt T.	5	16
193	lilacino-canescens purpureo-flammea, ſchönbunte, graulillafarbige, mit Purpurflammen und Streifen	6	20
194	isabellina pallida grandiflora, große hellisabellfarbige	6	8
195	rufa subt. gilva sphaer., knopff. fahlr. trübgelb durchſch.	5	8
196	rubra sord. subt. gilva mult., vielbl. ſchmutzgr. unt. trübgelb	6	6
197	cinnabar. canesc. multifl., vielbl. zinnoberr. in grau zieh.	4	8
198	coccineo-sanguinea splendens subt. violacea, glänzend ſcharlachblutrothe, unten violett	6	18
199	nigro caerulea, holosericea rhomboid., eckiggebaute ſchwarzblaue mit Sammt	6	16
200	atroamaranthea, chermesina semifist., dietchenförmige, dunkelamaranth-carmoſinfarbige in halber Kugelform	7	18
201	aurantiaca-canescens maxima, größte und vollendeſte orangefarbige, mit grauem Schein. T.	5	24
202	amaranthea, carminea holosericea subt. argentea, ausgezeichnete amaranth-carminfarbige, mit kleinen weißſtreifigen Blättchen, unten ſilberweiß T.	5	36
203	atropurp. nigro-holos.; dunkelpurpurf. m. ſchw. Sammt	5	12
204	aurea, rubro-striata, goldf. m. roth geflammt u. geſtreift	4	12
205	aurea, rubra striata, goldf. m. roth geſtreift u. geflammt	5	8
206	caerulea-rosea pall., blaulich-hellroſafarbige T,	5	10
207	albida suave roseo-diluto amoena, ſanftweißliche, überzogen m. roſa, welches nach den Spitzen zu lichter wird T.	5	24
208	coccineo-phoenicea, hochſcharlachfeuerfarbige mit kleinen weißlichen Blättchen	7	16
209	lilaceo-caerulescens, zarte lillabläuliche	5	10
210	coccin. chermes. praecox, frühbl. ſcharl. carmoſinr. T.	5	12
211	chermesino-amaranthacea, karmoſin-amaranthfarbige	5	8
212	purpureo-sanguinea subt. violacea, vielblumige dunkelpurpur-blutrothe, unten violett	5	10
213	coccinea spec., große, prachtvolle, rein ſcharlachrothe T.	6	24
214	cocc.-sang. holos. undul., wellenbl. glänz. ſchrichbltr. T.	5	18
215	atrococcinea purpurascens, ſchwarz-ſcharlachfarbige mit Purpur durchdrungen	5	12
216	cerina, miniata late marg., wachsgelbe mit breiten mennigrothem Rande	4	6
217	coccineo-haematit., ſcharlachrothe mit röthelroth getrübt	5	8
218	atrocaerulescens altissima, höchſte ſchwarzblaue, mit kleinen weißſtreifigen Blättchen	7	10
219	croceo-miniata, tief ſafran-mennigrothe	5	8

		Fußhöhe.	gr
220	uscato-purpureo semifistulosa, dietchenförmige, bräunlichpurpurfarbige, halbkugelgeſtaltige T.	5	20
211	roseo-violacea triflora, dreibl. violett⸗roſenfarbige T.	6	12
222	citrina flavescens gigantea, rieſengroße, häufig blühende dunkelgelbe, innerlich zitrongelb T.	5	24
223	atrocerisea holosericea splendens, kirſch⸗ſchwarze mit glanzvollen Sammt T.	6	24
224	haematitica grandiflora, große röthelrothe	6	8
225	coccin. flavesc. florib., blumenreiche gelbl. ſcharlachf. T.	4	12
226	citrina grandiflora, große zitrongelbe	6	12
227	violacea, lacteo-venosa, violette mit milchweißen Adern	5	16
228	rubro-cana multiflora, vielblumige graurothe T.	5	12
229	cocc.-sang. int. aurea, ſcharlachblutrothe, innen goldfab.	7	8
230	sulphurea pall. lucida, leuchtend gz. blaßſchwefelgelbe	6	3
231	aurea satur. cinereo-varieg., dunkelgoldfarbige, äußerlich roſa⸗grau überzogen	5	6
232	fusca-sanguinea holosericea fulgens, bräunl. blutrothe mit glänzenden Sammt	6	12
233	aurea, carmineo-variegato, goldfarbige, von den Spitzen herein lebhaft karmin T.	5	12
234	cinnabarina splendens, glänzend zinnoberrothe	7	18
235	sulph. pall. rubic., blaßſchwefelgelbe röthl. kreisr. angeh.	5	8
236	alba vera, rein weiſe	7	8
237	purpurea splendens nigro-cincta int. nigerrima, durchglänz. purpur, breit⸗ſchwarz umfaßt, innen gz. ſchwarz T.	6	240
238	miniata sordida multifl., vielblumige trübrothe	5	8
239	flavesc., rubro-varieg., dunkelgelbe mit roth überw. T.	3	8
240	puniceo-chermesina, blutig⸗carmoſin	3	8
241	sulphurea albid. speciosa, prachtvolle, blaßſchwefelgelbe, nach den Spitzen in weiß übergehend T.	5	48
242	violaceo purpurea, violett⸗purpurfarbige T.	5	3
243	violac. mutab. veränderlich vioi., nach außen verſchieß. T.	3	16
244	citrina splendens, ſamtigglänzend⸗zitrongelbe	6	12
246	nigro-fusca, violacea perlucidans, Scabioſenähnliche, ſchwarzbraune in violett übergehend T.	4	12
246	purp.violac. anemonifl., anemonenähnl. violettpurpf. T.	4	16
247	luteo-carm. anemonifl., anemonenähnl. gelbcarminr. T.	4	16
248	atrococcinea tricuspidata anemoniflora, anemonenähnliche dunkelſcharlachrothe mit dreiſpitzigen Blättern T.	4	16
249	rosea spect. anemonifl., prächt. roſaſ. in Anemonenform	6	16
250	sanguinea anemonifl., anemonenähnliche blutrothe	4	16

Um den Freunden dieſer überaus ſchönen und prächtigen Gartenzierpflanze die Auswahl zu erleichtern und ſelbſt den Unbemittelteren die Erlangung ſchöner Sorten um einen äußerſt billigen Preiß zu bemöglichen, habe ich aus den hier oben angeführten, einzig nur Prachtſorten enthaltenen Sortiment, kleinere Parthieen mit niedrigen Preißen beſtimmt. Es werden daher:

12 Stück in eben ſo viel ſchönen, nach meiner Wahl ausgewählte unter den zwar ſchon bekannten, jedoch bewährteſten Sorten, mit den Preiß von 6—12 Gr. für 2 Thlr. 8 Gr.
12 Stück nach meiner Wahl ausgewählt, unter den Sorten von 8—18 Gr. für 3 Thlr. 12 Gr.
50 Stck. dergl. für 15 Thlr. 100 Stck. dergl f. 32 Thlr. abgegeben.

Bei der Auswahl wird ſtets darauf geſehen, daß unter 12 St. die Hauptfarben, unter 50 und 100 Sorten dieſelben mit allen ihren Abſtufungen und buntfarbigen Arten erwählt werden.

Eine Farbenſtufenleiter in ganz reinen Farben, von der lichteſten anhebend und bis zur dunkelſten übergehend, in 25 vorzüglichen Sorten für 9 Thlr.
25 vorzügliche Sorten, blos buntfarbige für 12 Thlr.

Zu größern Parthieen und Anlagen, biete ich mein ganzes in 600 gefüllten Sorten beſtehendes Sortiment an, und erlaſſe davon unter Angabe der Farben

500 Stück in 2–300 Sorten für 55 Thlr.
1000 ⸗ ⸗ 3–400 ⸗ ⸗ 100 ⸗
1000 ⸗ in Rommel ⸗ 60 ⸗

Ich habe vorgezogen, die oben aufgeführten Georginen, ſtreng nach ihren Farben, unter zu Grundlegung einer Farben⸗Anſicht und nach genauer Vergleichung der Blumen miteinander, zu benamen. Den Georginenfreunden hoffe ich es erleichtert zu haben, die ihnen fehlenden Farben beſſer herauszufinden; beſonders wenn ſie ſchon im Beſitze einiger Georginen mit Hauptfarben aus meinem Sortimente ſein ſollten. Sie können um ſo zuverſichtlicher darauf rechnen, keine Doubletten zu erhalten, als faſt mein ganzes Sortiment durch künſtliche Befruchtung und Kreuzung untereinander verwandter Farben, ſelbſtgewonnene, ſeltene Originalien enthält, welche jeglichen Kenner intereſſiren dürften; beſonders werden die in höhern Preiß geſtellten Georginen die Seltenheit der Formen und Färbung und zugleich den erreichten Höhepunkt der Cultur beurkunden. —

Ein großer Theil vorzüglicher Georginen eignet ſich auch zu einer vorzüglichen Flor in großen Blumentöpfen. Alle hierzu paſſende ſind mit T. bezeichnet. Und um die Georginen in Gruppen hintereinander ſichtbar aufſtellen zu können, habe ich auf einem freien Standorte die Fußhöhe derſelben vermeſſen u. ſolche bei jeder Sorte mit Zahlen angegeben.

Die Verſendung der Georginen⸗Knollen erfolgt gegen Ende März oder Anfangs April, nachdem die Witterung hierzu günſtig iſt. Die Knollen werden ſo vorbereitet verſendet, daß ſie beim Empfang ſofort an ihren Ort verpflanzt werden können.

B. Kartoffel⸗Sortiment

der gebräuchlichſten und neueſten Sorten.

1. Feine mehlige, engliſche ganz frühe Kartoffeln,
2. ⸗ ⸗ ⸗ Winter,
3. holländiſche blaublühende,
4. vorzüglich große mehlige Futter⸗
5. lange, ganz frühe,
6. engliſche Roſtbeef⸗
7. frühe, neue engliſche Forx⸗Early⸗
8. ſehr frühe engliſche Miſtbeet⸗
9. ⸗ ⸗ neu amerikaniſche,
10. lange eſchenblättrige Nieren⸗
11. immerwährende, *)
12. engliſche Spargel⸗
13. wilde,
14. lange ſchwarzblaue,
15. Zwittergeſtaltige,
16. neue mexikaniſche,
17. frühe, glatte, weiße,
18. ſchottländiſche,
19. beſte Speiſe⸗
20. Preiß von Hollands⸗
21. Zwiebel⸗
22. volltragende Gurken⸗
23. Preiß von Weſterwalds⸗
24. gelbe Patata⸗
25. frühe, hellrothe, volltragende Pfälzer⸗
26. große Vieh⸗
27. ächte Lerchen⸗, ganz vorzüglich zum Ganzkochen,
28. rothblau marmorirte,
29. reichlichtragende weiße,
30. peruaniſche,
31. Wachholder⸗
32. kleine Nuß⸗
33. blaue Horn⸗
34. Rocks⸗
35. frühe, volltragende, rothe,
36. Kaſtanien⸗
37. kleine, runde, blaue,
38. engliſche große,
39. lange, rothe Nieren⸗
40. ⸗ weiße ⸗
41. gelbe Zapfen⸗
42. Buisquit⸗
43. Zucker⸗
44. frühe gelbrothe,
45. rauchſchaalige, rothe, vortreffliche Speiſe⸗
46. lange, volltragende, ſpätgute,
47. Mandel⸗
48. unter u. über der Erde am Stengel wachſende Kart.

Von jeder Sorte werden 2—4 Stück abgegeben. Die Sorte einzeln koſtet 2 gr., das ganze Sortim. 2 rl. 12 gr.

*) Um dieſe Kartoffel das ganze Jahr hindurch friſch zu haben, wird im Frühjahre zeitig eine Auspflanzung, eine ſpätere um Johanni unternommen. Dieſe letztere bleibt den Winter über in der Erde und wird mit ihrem eigenen Laube oder Stroh gegen eindringenden Froſt geſchützt. Bevor die Keimkraft im Frühjahr erwacht, wird die Kartoffel der Erde entnommen, und im Keller im trocknen Sand verwahrt, wo ſie alsdann bis Johanni ſchmackhaft bleibt.

C. Einige der ſchönblühendſten perennirenden Landpflanzen.

	1 Exempl. gr.
Achillea alpina	3
— Ageratum	3
— asplenifolia	3
— ciliata	2
— distans	2
— grandiflora	2
— Impatiens	2
— mongolica	2
— magna	2
— millefol. fl. rosea	2
— paradoxa	3
— peregrina	2
— ptarmica fl. pl.	3
— setacea	2
— speciosa	3
— tanacetifolia	3
S. — tomentosa	5
S. Acanthus cardifolius	4
Aconitum album	3
— barbatum	3
— Cammarum	3
— leucanthemum	3
— Napellus	2
— — bicolor	3
— neomontanum	3
— nitidum	6
— sibiricum	3
— variegatum	3
— volubile	6
S. Adenophora denticulata	3
— comunis	3
— marsupiflora	3
Actaea racemosa	6
— spicata	3
Agrostemma coronaria	2
S. — — fl. pl.	8
— — fl. Jovis	3
Althaea narbonensis	2
— rosea fl. pl. in 30 div. Farben das Dutz. 18 Gr.	2
Allium globosum	4
— Moly	2
— narzissifolium	6
— odorum	3
— paniculatum	3
— purpureum	2
— roseum odoratum	4
— sphaerocephalum	4
S. Ammobium alatum	6
Anchusa capensis	4
— italica	2
— variegata	3
Anemone hepatica fl. rubro pl.	3
Anthericum Liliago	3
Antirrhinum majus	1
— 12 Stck. in div. Coul.	4
— maj. bic. prächt. 12 Stck. 12 Gr.	2
— dalmaticum	3
— jamajense	3
— mollis	1
— montevidense	2
Apocynum androsaemifolium	4
— venetum	4
Aquilegia alpina	3
— canadensis	4
— grandiflora	3
— praecox	3
— stellata	3
— striata	3

	1 Exempl. gr.
Aquilegia sibirica	3
— viscosa	3
— vulgaris	2
Arabis collina	2
Armeria latifolia	3
— plantaginia	3
Arnica doronicoides	3
— scorpioides	3
Asphodelus lutens	4
— tauricus	4
Asclepias pulchella	4
— sibirica	2
— Siegmannii	4
Aster alpinus altaicus	4
— altaicus	3
— amellus	3
— amygdalinus	3
— cordifolius	2
— elegans	3
— ericoides	3
— grandiflorus	6
— macrophyllus	2
— novae Belgii	3
— paniculatus	2
— punctatus	3
— salignis	2
— spectabilis	3
Astragalus alopecuroides	3
— galegiformis	3
— Laxmannii	2
Astrantia heterophylla	6
— major	3
Aubertia deltoidea	2
Bellis perennis, div. Coul.	1
Betonica grandiflora	3
— incana	3
— orientalis	3
— stricta	3
Boltonia glastifolia	3
Buphthalmum grandifl.	4
— cordifol.	3
— helianth.	3
Cacalia Saracenica	3
Caltha palustris	3
Campanula divergens	3
— farinosa	3
— gracilis	3
— grandiflora	4
— gummifera	3
— lilifolia	3
— marcantha	3
— Medium fl. pl.	2
— obliquaefolia	2
— persicifolia pl.	3
— — fl. pl. albo	4
— pulla	3
— pyramidalis	4
S. — — fl. albo	12
— sibirica	4
— speciosa	4
— suaveolens	4
Cassia marylandica	4
Catananche caerulea	3
Centaurea atropurpurea	2
— austriasa	2
— glastifolia	4
— macrophylla	4
— ochroleuca	2
— orientalis	3
— spathulacea	2
— strobilacea	3
S. Chelone barbata	4
S. — campanulata	4

	1 Exempl. gr.
Chelone glabra	6
— obliqua	4
— — fl. albo	6
Chrysanthemum roseum	6
Chrysocoma Lynosiris	3
S. Cineraria cordifolia	3
— corymbosa	3
— glabrata	3
— robusta	3
— sibirica	3
Clematis angustifolia	3
— campaniflora	3
— erecta	3
— integrifolia	3
— hispanica	3
— viticella	4
— — fl. pl.	8
S- Convallaria bracteata	8
— majalis	1
— multiflora	3
S. Coreopsis Atkinsoniena	6
— auriculata	3
— lanceolata	3
— tenuifolia	4
— tripteris	3
— undulata	3
Coronilla Emerus	3
— varia	3
Corydalis aurea	3
— capnoides	3
— fungosa	3
Cucubalus fimbriatus	3
S. Cynanchum fuscum	4
Cynoglossum bicolor	2
— pictum	2
— omphaloides	1
— virginicum	2
Cypripedium Calceolus	4
Delphinium amoenum	3
— grandiflorum	3
— dystiocarpum	4
— elegans fl. pl.	6
— hirsutum	3
— Stavisagria	6
Dianthus atrorubens	2
— Carthusian fl. pl.	2
— chinensis 1 Dtz. 4 Gr.	1
— deltoides	1
— glaucus	1
S. — japonicus	6
S. — odoratus fl. pl.	6
— plumarius	1
Dtz. 3 Gr.	1
— - max. fl. pl.	3
— pulchellus	2
— versicolor	2
— caryophyllus Sämlinge von ausgezeichneten Gartennelken 1 Dutzd. 6 Gr.	
Dictamnus Fraxinella	4
Digitalis alba	2
— Eriostachis	2
— fuscescens	2
— grandiflora	2
— lanata	2
— lutea	2
— purpurea	2
— Winterlii	3
Dodecatheon Meadia	4

	1 Exempl. gr.
Doronicum caucasicum	3
— Pardalianches	3
Dracocephalum arguense	4
— austral. viol.	3
— nutans	2
— Ruyschiana	4
— speciosum	8
— virgin. grandiflorum	6
— sibiricum	3
Echium Wierzbickii	4
— italicum	3
— pyrenaicum	2
Echinops paniculatus	3
— Ritro	3
Erigeron alpinum	3
— caucasicum	3
— grandiflorum	3
— purpureum	3
— Richardsonii	3
— Villarsii	3
Epilobium angustifolium	2
— - fl. albo	3
— hirsutum fol. var.	4
Eryngium amethystinum	3
— giganteum	3
S. Erysimum Barbarea fl. pl.	4
S. Erythronium denscanis	3
S. Eschholzia californica	8
Eupatorium album	3
— aromaticum	4
— purpureum	3
S. Francoa sonchifolia	4
S. Funkia japonica fl. albo	4
— — caerul.	3
Galium rectum	2
— verum	3
Geranium ibericum	2
— phaeum	2
— pratense striat.	2
— sylvaticum	2
— tuberosum	2
— umbellatum	2
Gentiana cruciata	4
S. Geum chilense	6
— coccineum	4
— macrophyllum	2
Gladiolus communis	2
— — fl. albo	4
Glycine Apios	3
Gratiola officinalis	3
Grindelia incisa	3
Gypsophila paniculata	2
Hedysarum canadense	4
S. — coronarium	3
S. — — fl. albo	4
Helianthus atrorubens	4
— laevis	3
— macrophyllus	3
— miusurii	6
S. — multiflorus	4
S. — — fl. pl.	4
— stramosus	3
Helenium autumnale	3
Helleborus hyemalis	4
— niger	3
— purpureus	8
Hemerocallis flava odor.	4
— fulva	2
Hesperis matron fl. albo pl. 12 Stück 12 Gr. 1 Stck.	2

	1 Exempl. gr.
Hesperis matron. fl. pl. viol. 12 Stück 18 Gr. 1 Stück	3
— tristis odorata	3
S. Hibiscus palustris	6
Hieracium aurantiacum	2
Hypericum canadense	3
— elegans	3
— pyramidale	4
— Gebleri	3
Inula helenium	2
— oculus Christi	2
— suaveolens	3
Iris germanica	3
— graminea	8
— pallida	4
— pumila	2
— sambucina	2
— sibirica fl. pl.	4
— spuria	2
Kitaibelia vitifolia	3
Lathyrus heterophyllus	4
— latifolius	4
Laserpitium radiatum	2
Lavaterum salvitellensis	4
Lilium bulbiferum	2
— candidum	2
— — fl. pl.	4
— Martagon	3
— pomponicum	6
— spectabile	10
— tigrinum	3
Linaria dalmatica	3
— purpurea	3
S. Linum flavum	6
— perenne	2
S. Lobelia cardinalis	4
S. — fulgens	4
S. — inflata	4
S. — splendens	4
— siphylitica	4
Lupinus mexicanus	4
— perennis	4
— poliphyllus	6
— tomentosus	4
— variegatus	4
Lychnis alpina	2
— calcedonica	2
— — fl. pl.	4
— — ferrugin.	3
— — mutabil.	4
— fulgens	3
— dioica fl. pl. albo	6
— — — — rubr.	4
— sibirica	3
— viscaria fl. pl.	2
Lysimachia Ephemerum	3
— quadrifolia	3
— verticillata	3
Lythrum lanatum	2
— virgatum	2
Malva moschata	2
— — fl. rubro	4
S. Matricaria Parth. fl. pl.	3
Melissa melissophyllum	6
Mimulus guttatus	3
— ringens	3
— rivularis	3
Monarda dydima	3
— longiflora	3
— mollis	3
— kalmiana	3
— nepalensis	3
Oenothera australis	3
— erosa	3
— Fraserii	3

	1 Exempl. gr.
Oenothera glauca	3
— spectabilis	3
— splendens	3
Ononis hircina	3
— natrix	3
Paeonia anomela	8
— arietina	12
— chinensis odor. fl. pl. carnea	24
— chinens. odor. fl. pl. chermes.	24
— decora elatior	12
— — Pallasii	12
— edulis candida	18
— humilis fl. pl.	6
— laciniata	6
— officinal. fl. rub. pl.	4
— — — atropurp. pl.	6
— — — carnea pl.	6
— paradoxa fimbriata	8
— peregrina compacta	8
— — Grewillii	12
— tartarica	12
— tenuifolia	8
Papaver caucasicum	3
— bracteatum	3
— croceum	2
— floribundum	4
— nudicaule	2
— orientale	3
Paptisia australis	3
— — fl. carn.	6
Patrinia scabiosaefolia	3
— sibirica	3
S. Penstemon atropurp.	6
— Digitalis	8
S. — campanulatum	4
— pubescens	4
Phlomis alpina	4
— aggraria	3
— tuberosa	3
S. Phlox amoena	8
— aristata	4
— carnea	12
— carolina	3
— decussata	6
— divaricata	3
S. — glaberrima	6
— longiflora	12
— maculata	4
— paniculata	3
— — fl. albo	3
— ovata	6
— reptans	4
— Sickmanni	12
— suaveolens	4
— subulata	4
— undulata	6
— Whelerii	12
Polemonium caeruleum	2
— gracile	3
— lacteum	3
— mexicanum	3
Primula Auricula, 12 Stück 6 Gr.	2
— elatior Anglica, endl, Sammtprimel 12 Stck. 12 Gr.	2
— acaulis fl. pl. lilacino	4
Pulmonaria maculata	4
— mollis	4

	1 Exempl. gr.
Pulmonaria virginica	8
Potentilla atrosanguinea	3
— formosa	4
— pedata	4
— recta	2
— rupestris	2
— splendens	4
Ranunculus aconitifol. fl. pl.	3
— acris fl. pl.	4
— millefoliatus	6
— platanif. fl. albo pl.	6
— repens fl. pl.	1
S. Rubus rosarosaefolius fl. pl.	6
Rudbeckia angustifolia	3
— fulgida	4
S. — hirta	3
— laciniata	2
— pinnata	4
— purpurea	6
— spesiosa	4
— triloba	4
Salvia argentea	3
— bractea	3
— Forsköhlaei	2
— grandiflora	3
Sambucus Ebulus	3
Saponaria officin. fl. pl.	3
Saxifraga hypnoides	3
— umbrosa	2
Scabiosa caucasica	4
— australis	2
— gigantea	4
Scutellaria alba	2
— minor	2

	1 Exempl. gr.
Scutellaria nigrescens	2
— vera	2
Sedum album	3
— Anacampseros	3
— lividum	3
— spurium	3
— Telephium	3
Sonchus Plumerii	4
Sempervivum arachnoideum	3
Senecio abrotanifolius	3
— delphinifolius	3
— macrophyllus	4
— sarcacenius	3
Silenè cuprea	6
— multiflora	4
Solidago canadensis	2
— läevigata	2
— petiolaris	2
— reflexa	2
Spiraea Aruncus	3
— filipendula	3
— — fl. pl.	4
— lobata	6
— palmata	6
— trifoliata	6
— ulmaria fl. pl.	2
Stachys lanata	2
Symphitum coccineum	4
— tartaricum	2
Tanacetum vulgare	2
— balsamita	2
— incanum	2
Thalictrum aquilegifol.	3
— concinnum	3
— glaucum	3
— lucidum	5

	1 Exempl. gr.
Thalictrum majus	3
— nigrescens	3
— speciosum	4
Teucrium hircanicum	2
Tradescantia virginica	3
— — fl. purp.	5
— — — albo	3
S. — ciliata	8
S. — subaspera	8
Trifolium Lupinaster	4
Trollius aconitifolius	4
— asiaticus	6
— europaeus	3
— tauricus	6
Valeriana officin odorat.	2
Veratrum nigrum	6
— album	7
Verbascum Blattaria	2
— phoeniceum	4
Veronica australis	3
— crenulata	3
— grandis	3
— grossa	3
— incana	3
— latifolia	2
— longifolia	2
— gentiana	2
— maritima	3
— spicata	3
— Waldsteiniana	3
Vinca minor fol. argenteo	2
— coerulea var. aurea	2
Viola odorata fl. pl. albo	4
— — — — caer.	2
— — — — rubro	3
— persicifolia	3

Die mit S. bezeichneten Perennirenden verlangen einigen Winterſchutz.

D. Einige Zierſträucher.

Amygdalus nana fl. pl. à gr.	8
Coroniila Emerus	4
Corchorus (Keria) Japonica	4
Robinia hispida	6
— pseueo-acacia hochſtämmig	4—6
Rosa dijon 1 Dtz. 1½ Rl. 1 Stück	4
— de Volmorin	12
Rosa muscosa fl. pl. à gr.	6
— centifolia pl. 60 Stck. 2 Rl.	
— sulphurea	6
— unica	16
Springa persica	3
Viburnus opulus fl. pl.	2

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt=Aemter, Zeitungs=Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Fur Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion ubernommen.

Der Porto=Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. XIII. Weißenſee, (in Thüringen). Juli 1833. VI. Jahrg.

Beſchreibung und Cultur einer ſchönblühenden Rabattenpflanze.

Liatris spicata. Aehrenblüthige Prachtſcharte. Knollenlevkoje.

Dieſe ſchöne Pflanze ſtammt aus Nordamerika, wo ſie am mehrſten in Virginien zu treffen iſt. — Aus der ausdauernden knolligen Wurzel erheben ſich mehrere aufrechte Stengel, die eine Höhe von 1½ bis 2 Fuß erreichen, mit linienförmigen, gleichbreiten unbehaarten Blättern, welche gerippt, punktirt und am Grunde gewimpert ſind. Die Blumen ſind ungeſtielt, haben eine ſchöne hellpurpurröthliche Farbe, und bilden eine lange, dichte Endähre mit 50 — 80, auch öfter mehrern Glocken, welche im Monat Auguſt erſcheinen und noch den ganzen Monat Sept. hindurch blühen. Die Blumenſtengel, welche nicht Samen tragen ſollen, müſſen gleich nach der Blüthe dicht über den Knollen abgeſchnitten werden, weil die Stengel hohl ſind, ſich deshalb das Waſſer darin verhalten und die Knolle dadurch in Fäulniß übergehen würde. — Dieſe Pflanze läßt ſich auch ſehr gut in Töpfen ziehen. — Zu dieſem Behufe nehme man die Pflanze mit dem vollen Ballen, aber nicht eher aus dem Lande, als wenn ſie eben aufblühen will, in einen nicht zu großen Topf, ſtelle ſie einige Tage in den Schatten, und halte ſie mäßig feucht. Dann kann man ſie ins Freie auf die Stellage, oder in ein Fenſter ſtellen. Nach der Blüthe werden die Blüthenſtengel abgeſchnitten, die Pflanze ſelbſt wird ziemlich trocken gehalten, und an einem froſtfreien Orte überwintert. — Dieſe Pflanze läßt ſich durch Zertheilung vermehren, aber vorzüglich wird ſie durch Samen vermehrt. Man ſäet den Samen im Herbſte oder Frühjahr in die freie Erde, und bedeckt ihn nur ganz dünn mit Erde. Beim Aufgehen zeigen ſich die Pflänzchen ganz wie Gras, mit einem langen nur ſchmalen Blättchen, weshalb man beim Jäten vorſichtig ſein muß. Sind die Knollen der jungen Pflanze nicht ganz ſo groß, wie von einer gewöhnlichen Felderbſe, ſo iſt es die beſte Zeit ſie zu verpflanzen; ſie werden dann nur ganz mäßig feucht gehalten, und zwar nur ſo lange, bis die Blätter abzuſterben anfangen, dann dürfen ſie gar nicht mehr begoſſen werden. Im erſten Jahre nach dem Verſetzen blühen ſie nicht, im zweiten Jahre aber die mehrſten mit einem Blüthenſtengel, aber im dritten Jahre vollkommen. Zu ihrem Gedeihen liebt dieſe Pflanze einen trocknen, leichten, aber nahrhaften mit 1/4 Flußſand vermiſchten Boden, eine etwas hohe, ſonnenreiche, aber geſchützte Lage, und im Sommer nur eine mäßige Feuchtigkeit.

Elingen, 1833. Fr. v. D.

Ein Blick auf den neueſten Zuſtand des Gartenweſens in den kaiſerl. königl. öſterreich. Staaten, mit beſonderer Rückſicht auf die Blumiſtik.

Eingeſandt von Hrn. Jakob Klier in Wien.

(Fortſetzung.)

6) Die Hortenſienflor des Handelsgärtners Graber und endlich

7) nebſt noch vielen Anderen am Schluſſe der den Blumen günſtigen Jahreszeit, wenn ſelbſt ſchon die ganz unübertreffliche Georgien= — (vormals Georginen= — noch früher Dahlien=) Flor des Freiherrn von Hügel vom Froſt zerſtört worden, noch die prachtvolle, und höchſt anmuthige Chryſanthemen=Flor in dem k. k. Gewächshäuſern im Stadtgraben, dann jene des k. k. Cenſors Rupprecht zu Gumpendorf, von dem nächſtens ein monographiſches Werk: „Ueber das Chrysanthemum indicum, deſſen Geſchichte, Beſtimmung und Pflege" erſcheint, und jene des Gärtner Frühauf.

Außerdem glaube ich noch erwähnen zu müſſen, daß ſich in den Gewächshäuſern Seiner Durchlaucht des Herrn Fürſten von Lichtenſtein in der Vorſtadt Roſſau nur von Camellien allein eine Sammlung von mehr als 4000 Exemplaren, worunter viele mehr als 8 Schuh hohe Bäumchen und ſtarke Sträucher ſich befinden, eine Augenweide darbietet, die wirklich fürſtlich verehrt zu werden verdiente. Und man mag hieraus auf den Vorzug der daſelbſt befindlichen übrigen vegetabiliſchen Reichthümer ſchließen. Zum Schluſſe erwähne ich hier noch die Roſen=Sammlung Seiner k. k. Hoheit des Herrn Erzherzogs Carl in Weilburg bei Baden, die über 1200 Arten, Halbarten, Racen und Varietäten zählt.

Dieß wäre alſo beiläufig der Beſtand der hortulanen Schätze in Wien, und ſeiner Umgebung. Aber auch die übrigen Erblande, dem Vorbilde ihres kaiſ. k. Herrſcherhauſes huldigend, verdienen ans Licht gezogen, und Hierorts gerühmt zu werden. So wenig auch meine Kenntniſſe zureichen, die provinziellen Fortſchritte in der Garten-Cultur zu würdigen, ſo mag doch Folgendes ſchon hinreichen, um auch im Auslande einen entſprechenden Begriff von der allgemeinen Erhebung des Gartenweſens in den k. k. Erbſtaaten zu erwecken:

Im lombardiſch-venezianiſchen Königreiche, wo die Cultur ſchon durch das Clima ganz beſonders begünſtigt wird, zeichnen ſich Mayland, Venedig, Verona und Trieſt durch ihre Gärten aus. (Beſchluß folgt).

Die Vermehrung der Dahlien durch Pfropfen in die Wurzelknollen [*].

Von Vetillart.

Die Vermehrung der Dahlien geſchieht am leichteſten durch Wurzelknollen und durch Stecklinge im Frühjahre; ein Verfahren, welches unter den Händen eines geſchickten Gärtners für unfehlbar zu betrachten iſt: allein mit Rückſicht auf die Reſultate bleibt man dabei doch immer beſchränkt, im günſtigſten Falle kann durch eines dieſer beiden Mittel eine Dahlie zehn bis zwölffach vermehret werden, was aber ſelten iſt. Das neue, ſogleich zu beſchreibende Verfahren der Vermehrung hat vor den bisherigen zwei beſondere Vortheile.

Der erſte beſteht darin, daß man ſich deſſelben bis zum Monat Auguſt bedienen kann; der zweite dagegen beruht auf der Benutzung der ſehr ſchwachen Seitentriebe, welche als Stecklinge nie anſchlagen würden.

Vor einigen Jahren habe ich eine Pfropfung der Dahlien mit weichem Triebe vorgenommen, das heißt, ich entfernte einen nahe an der Erde hervorgekommenen Trieb, und ſetzte an deſſen Stelle einen anderen, wovon ich der bereits bekannten Blüthe den Vorzug gab. Dieſe Operation gelang mir gewöhnlich ganz gut, weil aber mit jedem Winter der Stengel der Pflanze zu Grunde ging, ſo konnte ich auch keine Vermehrung dieſer Abart erreichen.

Im heurigen Jahre bekam ich einige Zwergdahlien, welche ich zur Zeit der Blüthe auswählte, und die mir eine ausgezeichnete Schönheit zu verſprechen ſchienen; die Pflanzen waren aber ſo ſchwach, daß ich weder Wurzelknollen noch Seitentriebe bekam; die meiſten gaben nur ſchwache Schößlinge.

Ich verpflanzte meine Dahlien im Monate April in Töpfe und unter Glasglocken; meinem Gebrauche gemäß kneipte ich ſie bei dem dritten oder vierten Knoten ab; bald darauf entwickelten ſich zwei bis vier Seitentriebe. Im Monat Juni wurden dieſe Dahlien in die freie Erde verſetzt, wobei die Seitentriebe 6 bis 8 Zoll Länge hatten. Zu dieſer Zeit war es, wo in mir die Idee entſtand, einige dieſer Triebe in ſelbſtſtändige Pflanzen umzuwandeln, indem ich ſie auf künſtlichem Wege mit Knollen verſah.

Ich nahm alſogleich einige zwanzig Triebe, an welche ich auf verſchiedene Art die von gemeinen Dahlien genommenen Knollen pfropfte. Ich will hier nicht alle verſchiedenen Pfropfmethoden beſchreiben, die ich unternahm, indem nur die beiden vorzüglicheren eine Aufmerkſamkeit verdienen. (Fortſetzung folgt.)

---

[*] Annales de la Société d'Horticulture de Paris. Tom. XII. Janvier 1833.

Ueber Nelken-Durchwinterung.

Nie habe ich einſtimmen dürfen in die vielen Klagen, welche von allen Seiten erhoben werden, daß es ſo mühſam ſei, Nelken zu durchwintern. Nur in's Freie damit, ſie der Mutter Natur überlaſſen; die ſtarken werden erhalten und die kranken geſunden! Außer der jungen Brut im freien Felde kultivirte ich mehr denn zwe hundert Stöcke in Töpfen. Meine größte Sorge war, daß ich frühe, gleich im Auguſt, das Geſchäft des Einſchneidens beſorgte, oder Stecklinge machte, welches letztere ich immer vorzog. Die Senker waren zu Ende Oktobers ſtark bewurzelt, ich ſetzte ſie dicht zuſammen auf ein Beet, das der Sonne nicht ausgeſetzt war, deſſen Boden ich mit etwas Sand vermiſcht hatte und bedeckte ſie täglich mit Laub. Die noch nicht angewurzelten Senker ließ ich am Mutterſtocke und brachte dieſen ganz in den Boden. Ende Aprils waren meine Senker ſtark, ohne alles Ungeziefer und ich verpflanzte ſie.

Kirdorf, am Niederrhein. Buſch.

Aus der Revue horticole.

Bemerkung über die Cultur der Parkinsonia aculeata und Poinciana pulcherrima.

(Von Poiteau).

Seit länger als 40 Jahren habe ich bemerkt, daß dieſe beiden Pflanzen in jedem Frühjahre im Pflanzengarten zu Paris ausgeſäet wurden, und niemals hat man eine Pflanze zwei Jahre lang erhalten. Auch in den Gärten von Cels, Noiſette, Bourſault und Soulange-Bodin u. a. m. werden ſie alljährlich ausgeſäet, und Niemand vermag eine zweijährige Pflanze aufzuweiſen. Ihre Samenkörner keimen leicht; die Parkinsonia erreicht im erſten Jahre eine Höhe von 15 bis 24 Zoll, und die Poinciana von 6 bis 8 Zoll, aber ſie ſterben immer im nächſten Winter, oder, nach dem Gärtnerausdruck, ſie gehen aus, weshalb man ſie alljährlich von neuem ſäen muß, ohne jemals ſtarke Stöcke davon zu erhalten.

Ich war nicht wenig erſtaunt, in den Gewächshäuſern von Brüſſel, Löwen, Antwerpen u. a. O. ſehr ſtarke, jährlich blühende Exemplare von dieſen Pflanzen anzutreffen, die ebenfalls aus amerikaniſchem Samen, wie man ihn zu Paris ſäet, entſtanden ſind. Nachdem ich dieſen Gärtnern erzählt, wie unſere Samenpflanzen der Parkinsonia und Poinciana zu Paris in jedem Winter zu Grunde gingen, ſo glaube ich, aus dem was ſie mir antworteten, als Grund davon angeben zu können, daß wir ſie den erſten Winter hindurch nicht in dem Zuſtande der vollkommenen Vegetation erhalten, wodurch ihr Holz verdirbt und die Pflanzen ausgehen.

Nach dieſer Vermuthung, die wohl gegründet iſt, würde es nöthig ſein, daß die jungen Parkinſonien und Poincianen im Herbſt in das Lohbeet eines niedrigen Warmhauſes geſetzt würden, wo den Winter hindurch eine ziemlich hohe Temperatur unterhalten wird, und man auf jede mögliche Weiſe der Stockung der Feuchtigkeit entgegenwirkt. Haben die jungen Pflanzen einmal den erſten Winter glücklich überſtanden, ſo erhält ihr Holz Feſtigkeit genug, um viel leichter die Feuchtigkeit des folgenden Winters zu ertragen, und ſie können dann bald wie die andern Warmhauspflanzen behandelt werden.

Auf ſolche Weiſe verfährt man mit dieſen Pflanzen in den Niederlanden, wo man eine weit größere Menge ſchöner und ſchwer zu kultivirender Pflanzen ſieht, als in Frankreich. Die Gewächshäuſer enthalten dort Exemplare von Parkinsonia und Poinciana pulcherrima von 15 bis 18 Fuß Höhe, welche zahlreich blühen. Die Blumen der letztern ſind groß, bei einer Varietät ponceauroth, bei einer andern gelb, in aufrechten, pyramidalen Trauben ſehr zierlich geordnet.

Neue oder wenig bekannte Zierpflanzen.

Acacia conspicua. Hortul. Akazie von St. Helena. Dieſe Akazie kam bald nach dem Tod Napoleons zu Helena im Handel vor, und es hieß, ſie ſei dort gefunden, oder auf das Grabmahl gepflanzt werden; es war um ſo leichter, dieſer Meinung Glauben zu verſchaffen, als dieſe Pflanze ganz das äußerliche Anſehn der Thränenweide (Salix babylonica) hat, und ebenſo zum Schmuck der Gräber gebraucht werden kann. Aber man erfuhr bald, daß auf der Inſel St. Helena keine Akazien ſich befinden, und daß es wahre Thränenweiden ſind, die das Grab des todten Helden umgeben. Man muß deshalb dieſe Meinung aufgeben. Uebrigens hat man es gar nicht nöthig, auf ſolche Weiſe das Intereſſe für dieſe Akazie zu erregen, da ſie ſo lieblich iſt, daß man ſie nur zu ſehen braucht, um ſich ihren Beſitz zu wünſchen. Ihre langen, gebogenen, mit einem ſeidenartigen Filze überzogenen Zweige, hängen geſchmackvoll im Bogen herab; die zahlreichen, faſt deltaförmigen, ſchiefen Blätter endigen ſich in einer borſtenartigen Spitze, ſind nur 7 bis 8 Linien lang, etwas behaart und ſcheinen eine Spirallinie um die Stengel zu beſchreiben. Im April und Mai kommt aus jedem Blattwinkel eine Traube goldgelber Blumen in kleinen Köpfchen ſtehend, und dieſe Bluthentrauben ſind auf einer beträchtlichen Länge der Zweigenden ſo zahlreich, daß davon höchſt zierliche goldgelbe Guirlanden entſtehen, die man lange Zeit erhalten kann. In dieſem Zuſtande iſt dieſe Akazie durch die Zierlichkeit und die geſchmackvolle Krümmung der Zweige wahrhaft bezaubend. Sie hat bei Hrn. Bourſault und Hrn. Cels geblüht. Man kultivirt ſie ganz wie die Neuholländer-Pflanzen. Da ihre Vermehrung ſehr ſchwierig iſt, ſo iſt ſie noch wenig im Handel verbreitet.

Ananas bracteata. P. W. Eine ſehr ſchöne, in Jamaika einheimiſche Zierpflanze, die 1785 in England eingeführt wurde und 1831 in Frankreich nur bei Hrn. Lemon zu finden war. Nach Swartz erreichen die Blätter eine Länge von 2 Fuß und eine Breite von 3 Zoll; ſie ſind dick, gerade, glatt und an den Rändern gezähnt. Aus ihrer Mitte erhebt ſich ein Schaft, der viel länger als die Blätter und mit ei-lanzettförmigen, zerſtreuten, häutigen, ſcharlachfarbigen Nebenblättern beſetzt iſt. Die Blüthen ſtehen nicht wie bei der gewöhnlichen Ananas in einer dichten Aehre, ſondern in einer zuſammengeſetzten, 1 Fuß langen Traube, deren zahlreiche Zweige zerſtreut, mehrfach getheilt, ausgebreitet und ſehr lang ſind. Die Zweige tragen die ſitzenden, unterſchiedenen und am Grunde mit kleinen Nebenblättern verſehenen Blüthen. Swartz ſagt nichts von der Farbe dieſer Nebenblätter; ſie ſind aber wahrſcheinlich roth wie die des Stengels.

Schon nach dieſem Blüthenſtande zu urtheilen, ſtehen die Fruchtknoten einzeln, und können zuſammen keine gemeinſchaftliche Frucht bilden, die ganze Traube kann nicht durch eine einzige Krone noch überragt werden. Alsdann können wir aber nicht begreifen, wie der Verfaſſer einer, in den Annalen der prakt. Ackerbau-Geſellſchaft, März 1833, pag. 97, befindlichen Beſchreibung hat ſagen können: daß an dem Schafte eine Endkrone ſich befinde und die Fruchtknoten ſich zu einer einzigen Frucht vereinigen.

Varietäten.

Berlin. Von der in voriger Numer dieſes Blattes erwähnten, am 23. Juni begangenen Stiftungsfeier des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den königl. preuß. Staaten bemerken wir nachträglich noch Folgendes.

In der Gallerie zur Linken, wo ſonſt die Meiſterwerke des ſchöpferiſchen Pinſels bewundert werden, ſah man im Hintergrunde, in einem weiten Kreiſe ſchlanker Metroſideren und Roſen, von Lorbeern und Palmen ſinnig beſchattet, die Büſte des hochverehrten Monarchen ſich erheben, und an der langen Seitenwand in ſchöner Beleuchtung, die Pflanzen aller Zonen in ihrem mannichfaltigen Blüthenſchmucke auf das Geſchmackvollſte geordnet; einen ähnlichen, reizenden Anblick gewährte in dem Saale zur Rechten, den Forſchungen der Wiſſenſchaften gewidmet, die reiche Pracht von Florens Schätzen, und das Auge weidete ſich im Ueberblick der weiten Hallen, an dem bewundernswerthen Feſtſchmucke, den nur ein bereitwilliges Zuſammenwirken vereinter Kräfte herzuſtellen vermochte. Manche neue, viele noch ſeltene Gewächſe gewährten dem Kenner hohen Genuß, allgemeine Bewunderung aber erregte eine herrliche Tillandsia farinosa vom Herrn Hofgärtner Braſch. Von den übrgen vielen bemerkenswerthen Gewächſen verdienen theils wegen ihrer Seltenheit, theils wegen der ausgezeichnet ſchönen Exemplare, genannt zu werden: Erythrina laurifolia, Lilium concolor, Digitalis obscura, Haemanthus puniceus, Penstemon laevigatum, Sinningia Helleri, Digitalis sceptrum, Ononis Natrix, Balsamina pumila, Cocos reflexa, Ixia crocata, Stachys nov. sp., Oxylobium nov. sp., Campanula muralis, Tradescantia ciliata, eine Menge ausgezeichneter Ericeen und hochſtämmiger neuholländiſcher Pflanzen ꝛc. aus dem königl. botaniſchen Garten: Andromeda speciosa und cossinaefolia, Calmia angustifolia, Azalea glauca, Lilium longiflorum, hochſtämmige Rosa microphylla, Noisettiana, multiflora und centifolia aus dem königl. Garten und der Landesbaumſchule zu Potsdam und von der Pfauen-Inſel; Echinocactus Ottonis, Erica baccans, urceolaris und ventricosa var. splendens, Coreopsis Amaryllis crocata, eine beträchtliche Anzahl Calceolarien und eine reiche Sammlung der ſeltenſten Pelargonien, vom Herrn Hofgärtner Braſch; Alstroemeria peregrina, Cactus speciosissimus von ſeltenem Umfange und überreicher Blüthenfülle, Georgina variabilis in den mannichfaltigſten Farben, Leptospermum und andere Myrtaceen in großen Exemplaren vom Kunſtgärtner Herrn Touſſaint; Arcopsis grandiflora, Burchelia capensis, Pimelia linifolia und decussata, Acacia undulaefolia, von Herrn Juſtizrath Meyer; Amaryllis viltata, Tropaeolum majus var. purpurea vom Kunſtgärtner Herrn Kuhfeld; Swainsonia coronillaefolia Aloe umbellata var. picta, Cotyledon diversifolia vom Fabrikanten Herrn Möwes; Penstemon diffusum, Lilium chinense, Dracaena ferrea und arborea, Aletris fragrans, Maranta Zebrina vom Kunſtgärtner Hrn. Matthieu; Camellia myrtifolia, Metrosideros speciosa und lanceolata in ausgezeichneten Exemplaren vom Kunſtgärtner Hrn. Teichmann; Calmia latifolia fl. albo, vom Kunſtgärtner Hrn. Kraatz; ein reicher Nelken- und Hyazinthenflor vom Hofgärtner Hrn. Nietner in Monbijou; die herrlichſten Exemplare von Nerium Oleander var. splendens in üppigſter Blüthenfülle, vom Kunſtgärtner Herrn Spät und die Maſſen von campanula media etc. von Kunſtgärtner Herrn Limprecht. Impoſant waren die rieſenhaften Exemplare von Citrus und Laurus aus dem Königlichen Garten von Mondijou und aus dem anmuthigen Garten Sr. Königl. Hoheit, des Prinzen Auguſt von Preußen zu Bellevue, und einen lieblichen Anblick gewährten die geſchmackvollen Blumenſtellagen des Kunſtgärtners Herrn Tauſſaint und die Käſtchen mit Rankengewächſen vom Kunſtgärtner Herrn Teichmann zum Schmucke der Fenſter. Endlich ſchilderte der Herr Geheime Medizinal-Rath und Profeſſor Link in einer geiſtreichen Rede die allgemeinen Zwecke des Vereins unter Darlegung der innern Verhältniſſe deſſelben und ſeiner ſpeziellen Wirkſamkeit in dem letztverfloſſenen Jahre, voll Dankgefühl für den hochverehrten Herrſcher und die weiſen Räthe, die ſeinen Thron umgeben, das am Schluſſe derſelben in folgenden Worten ſich ausſprach: „So unſer Beſtehen. — Ein König, wie kein Volk ihn hat; ein Friede, dauernd, wie ihn der preuß. Staat noch nie genoß; eine Entwickelung und Entfaltung des Innern und des Aeußern, wie noch nie die Zeit es ſah. — Willkommen, ſchönes Blüthenfeſt!"

Berlin. Im Königl. botan. Garten blühten am 9. Mai d. J. folgende ſeltene Pflanzen: Ismene nutans Herb., — Calceolaria robusta Nob., — Gesneria latifolia Link., — Mamillaria crucigera Mart., — M. criniformis Cand, — M. villifera Nob., — M. polythele Mart., — M. tenius Cand.

In dem Gewächshauſe des Herrn Juſtiz-Raths Meyer hat im vergangenen Frühjahre die ſchöne Azalea sinensis Bot. Cab. aus China geblüht; eine Art, die hier noch nicht geblüht hat, und noch ſelten zu ſein ſcheint.

Bei dem Herrn Fabrikanten Newes blühte in d. J. ein Rhododendron arboreum venustum, eine ſehr ſchöne Varietät, wahrſcheinlich aus Rhod. arbor. und ponticum erzeugt.

Wien, d. 12. Mai 1833. Am 8. 9. 10. und 11. Mai fand im Fürſtl. Schwarzenbergiſchen Gartenpalais am Rennwege hieſelbſt die 7. Blumenausſtellung ſtatt. Sie beſtand aus 1025 der ſchönſten, neueſten und ſeltenſten Pflanzen und errang durch ihre ſinnige, höchſt geſchmackvolle Anordnung allgemeinen Beifall.

Da der Zweck dieſer Blumen- und Pflanzen-Ausſtellung die höhere Garten-Kultur betrifft, ſo wurde in der Beurtheilung der um Preiſe concurrirenden Pflanzen, die Schönheit der Art wie des Exemplars hauptſächlich berückſichtiget, und daher am 8 Mai um die Mittagsſtunde von den hierzu beſtimmten Preis-Richtern: Freiherrn v. Jacquin, dem Hrn. Dr. Pohl, dem k. k. Hofgarten-Direktor Bredemayer und dem Hrn. Zahlbrückner, Sekretair Sr. kaiſerl. Hoheit des Erzherzogs Johann, nachfolgende Preiſe beſtimmt, und zwar den:

Erſten Preis der ſeltenſten und ſchönſten zu einem geſteigerten Grade der Entwickelung gediehenen Pflanze, deren Vaterland außer Europa, und deren Einführung in Europa noch neu iſt, erhielten die Pflanzen Chamaedoreae spec. Mas. und Foem. aus dem k. k. Hof-Pflanzengarten zu Schönbrunn, beſtehend aus der Berberis fascicularis. Hieran reihen ſich Banksia prostrata und Dryandra nivea aus demſelben k. k. Hof-Pflanzengarten geſendet.

Der zweite Preis, beſtehend in den Pflanzen Erica costata superba, hirta rubra, hispidula, marifolia, ventricosa und viridiflora, derjenigen außereuropäiſchen Zierpflanze, welche ſich vorzüglich durch ihren üppigen Kultur- und Blüthenſtand auszeichnet, beſtimmt, wurde der Loddigesia oxalidifolia, aus dem Garten des Herrn Grafen von Dietrichſtein, und Erica Hartnellii des Baron Carl v. Hügel zu Theil. (Fortſetzung folgt).

Zu Dropmore in England hat im Jahre 1832 ein Cereus speciosissimus prächtig geblüht; häufig waren 40 bis 50 Blumen zugleich entfaltet, und die ganze Zahl der Blumen, welche er im Laufe des Jahres hervorgebracht hat, beträgt mehr als 200.

Dem Pflanzengarten zu Paris ſind von der Regierung zum Unterhalt und zum Bau neuer Gewächshäuſer 2,400,000 Franken bewilligt worden.

Antwerpen. Am 24., 25. und 26. Februar d. J. fand die von der Gartenbau-Geſellſchaft zu Antwerpen, veranſtaltete öffentliche Blumen-Ausſtellung ſtatt, wozu von 150 Mitgliedern und Gartenfreunden 583 Pflanzen eingeſendet worden waren.

Der Preis für die am ſchönſten kultivirte blühende Pflanze wurde einer, dem Hrn. Jean Van Hal gehörigen Canna iridiflora ertheilt. Das erſte Acceſſit erhielt Hr. P. J. de Caters für eine Banksia marginata, und das zweite Hrn. Le Braſſeur-Vanden Bogaert für eine Azalea indica.

Den Preis für die reichhaltigſte Sammlung ſchöner und ſeltener Pflanzen, unberückſichtigt der Blüthe, geſtand man dem Hrn. P. J. Caters zu, und das Acceſſit der Sammlung des Hrn. J. de Knyff.

Der Preis für die blühende Pflanze, welche zur Hervorbringung der Blüthe die meiſte Sorgfalt erforderte, oder deren natürliche Blüthezeit ſehr entfernt von der gegenwärtigen Blüthe war, wurde einer Rosa unica provincialis ertheilt, die von Mad. Moretus-Van-Colen ausgeſtellt war. Das erſte Acceſſit erhielt ein Enkianthus quinqueflorus von Hrn. Van Hal, und das zweite eine Dryandra longiflora von Hrn. Parthon-Devon.

Den Preis für die ſeltenſte, oder die in der neueſten Zeit in Belgien eingeführte blühende Pflanze ertheilte man einem, von der Madam Moretus-Van-Colen ausgeſtellten Epidendrum cochleatum pallidum. Dieſelbe erhielt auch das erſte und zweite Acceſſit für eine Epacris nivalis und eine Camellia reticulata.

Den Preis für die ſchönſte Sammlung blühender Pflanzen von verſchiedenen Gattungen geſtand man der des Herrn Van Hal zu; das erſte Acceſſit wurde der Sammlung der Mad. Moretus-Van-Colen, und das zweite der des Herrn Parthon-Devon.

Lüttich. Die Gartenbau-Geſellſchaft zu Lüttich hatte am 10., 11. und 12. März 1833 die fünfte öffentliche Blumen-Ausſtellung veranſtaltet. Der Ausſtellungsſaal enthielt 289 Pflanzen, die von 66 Mitgliedern und Blumenfreunden eingeſchickt worden waren.

Den erſten Preis trug eine Camellia reticulata davon, die von dem Gärtner und Blumiſten Hrn. Mouton ausgeſtellt war.

Den zweiten Preis ertheilte man einer dem Hrn. Dozin gehörigen Brachysema latifolia. Dieſe Pflanze war wenigſtens 6 Fuß hoch.

Den dritten, für die reichhaltigſte Pflanzenſammlung beſtimmten Preis erhielt die des Herrn Freßart. Dieſe Sammlung enthielt, unter andern ſchönen Pflanzen, zwei Templetonia retusa von 5 Fuß Höhe, ganz mit rothen Blüthen bedeckt, und zwei Heliotropen, 5 bis 6 Fuß hoch, jede mit 60 bis 70 Blüthenbüſcheln.

Aloſt. Am 17., 18. und 19. Februar 1833 hatte die Flora-Geſellſchaft der Stadt Aloſt ihre neunte öffentliche Ausſtellung veranſtaltet, wobei 513 Pflanzen gegenwärtig, von 90 Mitgliedern und Blumenfreunden eingeſandt waren. Den Preis für die ſchönſte Kultur einer Pflanze erhielt Hr. Ch. Maes aus Gent für eine Epacris grandiflora, das erſte Acceſſit Hr. Mechelynck aus Gent für eine Epacris impressa, und das zweite derſelbe für ein Zygopetalum crinitum.

Der Preis für die durch ihre Anzahl, durch die Verſchiedenheit der Arten und durch die Kultur bemerkenswertheſte Sammlung wurde der des Hrn. de Grade, Blumengärtner zu Aloſt ertheilt; das erſte Acceſſit erhielt die Sammlung des Hrn. Ch. Maes aus Gent, und das zweite die der Frau Baronin Le Candele von Gyſeghem.

Der Preis für ein den 17. Februar blühend vorzuſtellendes Cypripedium album konnte, da keine ſolche Pflanze eingeſandt worden war, nicht ertheilt werden.

Hierbei ein Extrablatt.

Extra-Blatt zu Nro. 13. der Blumen-Zeitung.

Berlin. Bei Gelegenheit der erſten diesjährigen Frühlings-Verſammlung des Gartenbau-Vereins in ſeinem Lokale zu Neuſchönberg am 14. April fand die erſte Ausſtellung von 264 blühenden Pflanzen in dem königl. botaniſchen Garten ſtatt. Da der Raum des Verſammlungsſaales zur Aufnahme einer ſolchen Zahl blühender Gewächſe nicht geeignet iſt, ſo waren ſie in einem kürzlich vollendeten Gewächshauſe aufgeſtellt. Der Hauptflor beſtand, außer vielen andern botaniſchen Seltenheiten, in mehrern Exemplaren *Paeonia Moutan papaveracea* und *Banksiae*, neuholländiſche Akazien, Eriken, *Polygaleae*, *Diosmeae*, *Proteaceae*, als *Dryandra*, *Hackea*, *Grevillea concinna*, ferner einige ſehr ſchöne Kamellien, unter denen *Camellia reticulata* von Herrn Möwes ausgezeichnet war, dann *Elichrysum* und *Gnaphalium* mehrere Arten, indiſche Azaleen, namentlich *Azalea ledifolia, Smith*, *Mahonia (Berberis)* 4 Arten aus Californien. *Mimulus variegatus, Lehm.* und *quinquevulnerus nob.*; eine ſchöne Varietät des erſten, und von *M. guttatus* in dem hieſigen Garten entſtanden; mehrere Arten *Chorizema*, als: *C. Henchmannii*, *Daviesia*, *Hovea Celsii*, *Eutaxiae*, *Pomaderris*, *Scottia*, *trapeziformis*, *Boroniae*, *Indigofera speciosa*, ſämmtlich aus Neuholland. *Epidendron elongatum* und *cochleatum*, *Enkianthus quinqueflorus*, *Sinningia villosa* und *Gloxinia candida*, beide aus Braſilien. *Vaccinium ovatum*, *Globba saltatoria*. Endlich mehrere Frühlings- und Alpenpflanzen, als: *Primula carniolica, glutinosa, integrifolia, marginata, nivalis, suaveolens, viscosa, villosa, verticillata, helvetica, Clusiana, Anemone apeninna, Ranunculus gangaricus, Saxifraga Burseriana* u. a. m.

Bei der 119ten Verſammlung des Gartenbau-Vereins am 8ten Mai d. J., zu Neuſchönberg, wurden über 200 blühende Pflanzen für die geehrten Mitglieder und eingeführten Fremden zur bequemen Beſichtigung aufgeſtellt. Der Hauptſchmuck beſtand außer vielen zierlichen Frühlings- und Alpenpflanzen, als Primula, Orobus, Trillium, Saxifraga, Anemone u. ſ. w. aus 3 großen Exemplaren von Azalea indica alba, Az. ind. purp. und Az. ind. phoenicea, mehrere Acaciae, Eutaxiae, Calceolariae, aus Valparaiſo in Chili, ein prächtiges Exemrlar von Bilbergia iridifolia Bot. Reg., Theophrasta longifolia Jacq., Bossiaea ensata Sieb., B. rufa R. Br., Gastrolobium bilobum R. Br., Kennedia prostrata R. Br., ein neues wohlriechendes Caladium, eingeführt aus engl. Gärten als Dracontium nympheaefolium, der Magnolia fuscata im Geruch ähnlich, Calantha veratrifolia R. Br. aus Oſtindien, Bignonia cadensis, Senecio lilacinus, Ipomopsis elegans, Epidendron ciliatum, eine neue rothblühende Robinie aus Oſtindien, Genista elegans sp. nov., Trillium grandiflorum Sal., mehrere Aloe, Gastonia, Erica, Anthocercis viscosa, R. Br., A. albicans Cun., A. littorea La Bill., Polemonium pulchellum, nebſt mehrern andern in dieſer Jahreszeit in gutgehaltenen Gewächshäuſern gewöhnlich blühenden Pflanzen.

Preis-Aufgaben
des
Vereins
zur
Beförderung des Gartenbaues
in den Königl. Preuß. Staaten
für das Jahr 1833.

Publicirt: Berlin, am 11ten Jahresfeſte den 23. Juni 1833.

A.
Frühere noch laufende Preis-Aufgaben.
I. (vom Jahre 1831).

Auf die Erziehung einer neuen Varietät von Wein aus dem Samen, welcher mit oder ohne vorhergegangene künſtliche kreuzende Befruchtung erzielt iſt, wird ein Preis von 60 Stück Friedrichsd'or ausgeſetzt.

Die neue Varietät muß eine in jeder Beziehung vortreffliche Frucht liefern, welche in der October-Sizzung des Vereins im Jahre 1836 mit einem Theil der Rebe, woran ſie gewachſen, (nebſt Blatt) einzuſenden iſt. Es ſind dabei zugleich folgende, durch drei glaubwürdige ſachverſtändige Männer des Orts zu beſcheinigende Angaben erforderlich:

1) von welcher Weinſorte durch Selbſtbefruchtung, oder von welchen Weinſorten durch kreuzende Befruchtung, der Samen gewonnen ſei;
2) daß die gezogene Varietät im Jahre 1832 in's freie Land gepflanzt und ſeitdem darin unausgeſetzt verblieben ſei;
3) daß die überſandte Traube an beſagtem Weinſtock an einem ganz freien Spalier, ohne irgend eine künſtliche, die Reife befördernde Vorrichtung im Sommer 1835 gereift ſei.

Sollten mehrere Konkurrenten für die Preis-Aufgabe auftreten, ſo wird nach ſchiedsrichterlichem Ausſpruche ſachverſtändiger Weinkultivateurs der vorzüglichſten Frucht unter den konkurrirenden der Preis zuerkannt werden.

II. (vom Jahre 1832).

Für die am vollſtändigſten angeſtellte gegenſeitige Prüfung der Kanal- und der Waſſerheizung in gleichem Raum und in Bezug auf dieſelben Kultur-Gegenſtände, wobei ſowohl die Koſten der Anlage und des Betriebes bei beiden zu berückſichtigen, als auch die Wirkungen beider Heizmethoden auf die Erhaltung und das Gedeihen der Gewächſe genau zu erforſchen ſind, wird ein Preis von Sechzig Friedrichsd'or ausgeſetzt. Die Abhandlungen ſind im Januar 1838 einzuſenden.

III. (vom Jahre 1832).

„Durch welche Mittel kann man die Hyazinthenzwiebeln vor der, unter dem Namen „Ringelkrankheit oder weißer Rotz“ bekannten peſtartigen Krankheit ſchützen, oder wie ſind die, von dieſem Uebel ſchon ergriffenen Zwiebeln auf eine ſichere Art davon zu heilen?“

Die Beantwortungen ſind bis zum erſten Januar 1835 einzuſenden. Der dafür ausgeſetzte Preis im Betrage von zwanzig Friedrichsd'or kann erſt, nachdem das Mittel geprüft worden iſt, ertheilt werden.

B.

Neue Preis-Aufgaben.

IV.

„Welches iſt das beſte Verfahren, Pflanzen durch Stecklinge zu vermehren und welche die am meiſten dazu geeignete Zeit?“

Bei der Beantwortung dieſer Frage ſoll hauptſächlich nur auf die ſchwer zu vermehrenden Pflanzen, ſo wie auf diejenigen Rückſicht genommen werden, welche Knorren bilden (ſich verknorpeln), und dann nicht leicht Wurzeln ſchlagen.

Termin der Einſendung: Januar 1835.

Preis nach geſchehener Prüfung: Zwanzig Friedrichsd'or.

V.

Es wird eine hiſtoriſche Zuſammenſtellung aller vorgeſchlagenen und angeblich geprüften Mittel zur Vertilgung der den Gärten ſchädlichen Inſekten verlangt, nebſt genauer Angabe der Bücher, in welchen ſie empfohlen worden. Es ſoll eine Schrift ſein, die den Praktiker in den Stand ſetze, wahrhaft neue Vorſchläge von ſchon oft da geweſenen mit Sicherheit zu unterſcheiden und die Prüfung älterer zu wiederholen, weshalb als Haupt-Erforderniß: Vollſtändigkeit und Zweckmäßigkeit der Anordnung zu betrachten ſind, indem eine Beurtheilung der Mittel zwar angenehm, aber nicht durchaus erforderlich ſein wird.

Unter den bis zum Januar 1836 eingehenden Beantwortungen dieſer Aufgabe, erhält die beſte den Preis von dreißig Friedrichsd'or.

C.

Fortlaufende Prämie aus der von Seydlitzſchen Stiftung.

VI.

Derjenige Eleve der Gärtner-Lehranſtalt, welcher auf der dritten Lehrſtufe ſtehend, eine ihm geſtellte Aufgabe am genügendſten löſt, erhält, bei ſonſt untadelhafter Aufführung, eine Prämie von 50 Thalern aus der von Seydlitzſchen Stiftung, welche Summe ihm bei ſeinem Austritt aus dem Inſtitut übergeben wird, wie bereits im vorigen Jahre publicirt worden.

Alljährlich wird ein anderer Gegenſtand zur Preisbewerbung ausgeſtellt, und vom Vorſtande eine Kommiſſion zur Ertheilung des Preiſes ernannt werden. Der Name des Prämienempfängers wird am Jahresfeſte öffentlich genannt.

Die Abhandlungen über die Preis-Aufgaben ad II. bis V. werden an den Direktor oder an den General-Sekretair des Vereins eingeſendet. Auf den Titel derſelben wird ein Motto geſetzt und ein verſiegelter Zettel beigelegt, welcher äußerlich dieſes Motto und im Innern den Namen, Stand und Wohnort des Verfaſſers enthält.

Abhandlungen, die nach den beſtimmten Terminen eingehen, oder deren Verfaſſer ſich auf irgend eine Weiſe genannt haben, werden nicht zur Konkurrenz gelaſſen.

Wenn den eingehenden Abhandlungen der Preis auch nicht zuerkannt werden ſollte, wird doch angenommen, daß die Herren Verfaſſer nichts deſto weniger deren Benutzung für die Druckſchriften des Vereins bewilligen. Möchten die Herren Verfaſſer dies nicht zugeſtehen wollen, ſo werden ſie dies bei Einreichung ihrer Abhandlungen gefälligſt zu erkennen geben.

Einiges über Acclimatiſirung und Behandlung der Haideerde-Pflanzen.

(Beſchluß.)

Verzeichniß der Haideerdepflanzen, welche einer Acclimatiſirung am fähigſten ſind.

II. Rhododendron.

R. arboreum.
- — album nov.
- azaloides.
- fl. alb. odorata.
- catawbiense.
- caucasicum.
- caucasioides nov. sps.
- chamaecistus.
- dauricum.
- cassinefol.
- ferrugineum.
- glomeratum.
- hirsutum.
- — fol. variegat.
- hybridum.
- magnoliaefol.
- maximum.
- — flor. alb.
- — fol. variegat.
- — flor. carmosin.
- nereifol. nov.
- ponticum fl. pl.
- ponticum.
- — cassinefol.
- — latifol.
- — miniatum.
- — palicifol.
- — fol. variegat.
- pulverulentum.

Rhododendron.

R. punctatum.
- ponticum angustifol.
- — fl. pl.
- — algarbense.
- — crispum.
- — undulatum.
- — roseum.
- chisantum.
- rosmarinifol.
- macrophyllum.
- ponticum fol. aureo variegat.
- — albo marginatis.
- — rotundifol.
- — parviflor.
- doricum.
- chrysanthum.

Laurus Sassafras.
— benzoin.
Prun. Lauro-Cerasus.
Aucuba japonica.
Paeonia arborea.
— arb. papaveracea.
Cornus florida.
Cephalanthus occidentalis.
Chionanthus virginica.
Vaccinium arboreum.
Macturia aurantiaca.

Myrica arifera.
— Gale.
Calycanthus floridus.
— pompadura.
— praecox.
— ferox.
— nanus.
— oblongus.
Nyssa grandidentata.
— sylvatica.
— villosa.
Hallesia diptere.
— tetraptera.
Itea virginica.
Clethra alnifolia.
— acuminata.
— glauca.
— tomentosa.
Kalmia angustifol.
— glauca.
— latifolia.
— lucida.
— oleaefol.
— pumila.
— humilis.
— floribunda.
— serotina.
— nitida.
Comptonia asplenifolia.
Gordonia pubescens.
Guilandina divica.

Andromeda.

A. acuminata.
- angustifolia.
- arborea.
- asplenifol.
- axilaris.
- calyculata.
- — angustifol.
- cassinefol.
- formosissima.
- — laurina.
- — populifolia.
- — reticulata.
- americana.
- arborea.
- xilaris.
- — angustifolia.
calyculata.
- — *angustifolia.*
cassinefolia.
- *speciosa.*
- *Catesbaei.*
- *coriacea.*
- *lucida.*
- — *myrtifolia.*
- — *nitida.*
- *chyproides.*

Andromeda.

A. mariana.
- *paniculata.*
- *polyfolia.*
- — *angustifolia.*
- — *latifolia.*
- — *media.*
- — *rosmarinifolia.*
- *pulverulenta.*
- *rocemosa.*
- *serratifol.*
- *Walteri.*
- — *angustifol.*

Azalea.

A. calendulacea.
- *canescens.*
- *cumulata.*
- *indica.*
- *nudiflora.*
- — *aureo variegata.*
- — *aurantiaca maxima.*
- — *globosa alba.*
- — *grandifl.*
- — *humilis.*
- — *pulchella.*
- — *nutitans splendidissima.*
- — *spurea speciosa.*
- — *bicolor.*
- — *cromoisie flambogante.*
- — *Lioni.*
- — *mixta odorata.*
- — *praecox.*
- — *prolifera superba.*
- — *punicea insignis.*
- — *purpurea.*
- — *rubra.*
- — *rubra nana.*
- — *superba incarnata.*
- — *viola odorata.*
- *coccinea.*
- — *maxima.*
- — *cuprea.*
- — *splendens.*
- — *Bollwilleriana.*
- *glauca.*
- — *coronata.*
- — *hispida.*
- — *micans.*
- — *montana.*
- — *scabra.*
- — *tortuosa.*
- — *viltata.*

Azalea.

A. periclimenoides.
- *pontica.*
- — *bicolor.*
- — *Guillaume I.*
- — *humilis.*
- — *nec plus ultra.*
- — *quatricolor.*
- — *tricolor.*
- — *procumbens.*
- *viscosa vissa.*
- *serotina.*
- *sulphurea.*
- *alba duplex.*
- *jasminoides.*

Daphne Cneorum.
- *maximum.*
- *Laureola.*
- *odora.*
- *callina.*
- *pontica fl. rub.*
- *Tardonraira.*
Ledum palustre.
- *latifolium*
Prinos glaber.
- *verticillatus.*
Hydrangea arborescens.

Erica.

E. carnea.
- *herbaica.*
- *arborea.*
- *australis.*
- *mediterrania.*
- *scoporia.*
- *umbellata.*
- *viridis purpur.*
- *cineraria alba.*
- — *rubra.*
- *multiflor. alb.*
- — *rub.*
- *polyfol.*
- — *nana.*
- *tetralix alb.*
- — *rub.*
- *umbellata.*
- *vulgaris.*
- — *decumbens.*
- — *fl. pl.*
- — *spuria.*
- — *variegata.*
- — *alb.*
- — *rub.*
- *ciliaris.*
- *stricta.*
Empetrum nigrum.

Alle hier aufgeführten Pflanzen mit ihren mir bekannten Varietäten, die ſich zu Acclimatiſirungsverſuchen eignen, werden nach dem Verhältniß ihrer Höhe gepflanzt, ſo daß ſie ſtufenweiſe abfallen, und vorn die niedrigſten zu ſtehen kommen.

Zum Schluß bemerke ich noch, daß ich eine bedeutende Quantität mit ganz beſonderm Fleiß zubereiteter ächter Heideerde den Liebhabern in bedeutenden Quantitäten ablaſſen kann. Da mir daran gelegen iſt, die Acclimatiſirungsverſuche auf alle Weiſe zu fördern, ſo ſehe ich bei dieſem Verkauf mehr auf den Zweck als auf den Gewinn. In Kiſten und Säcken läßt ſich dieſe Erde am leichteſten transportiren, auch in großen Ballen. Nur muß ſie immer feucht gehalten werden.

Die Erde wird malter- und metzenweiſe verkauft: Die Metze zu 30 kr. Bei bedeutender Beſtellung mehrerer Malter oder Scheffel, koſtet die Metze nur 24 kr., mithin das Malter 6 fl. 24 kr. ohne Emballage und Porto. Briefe und Beſtellungen werden portofrei erbeten.

Saalfeld, 1833. von Pfaffenrath.

Sämereien von ſchönblühenden Blumenpflanzen

bei Herrn Chr. Deegen in Köſtritz.

Als neue, vorzüglich ſchönblühende oder ſonſt intereſſante Pflanzen, welche mein Blumen-Samen-Verzeichniß enthält, erlaube ich mir, Blumenfreunden folgende bemerkenswerthe herauszuheben:

a) ſchönblühende Sommerpflanzen: Ageratum Mexicanum, — Amaranthus glomeratus, — Argemone Barkleyana. — A. grandiflorus. — Calandrina speciosa. — Campanula Lorei fl. caerul. pall. — C. L. fl. atrocaerulea. — Celosia pyramidalis fl. sang. et lutea. — Chrysanthemum carnat. fl. lut. — Chr. speciosum (?) — Datura ceratocaule. — D. quercifolia. — D. Tatula gigantea. — Eccremocarpos scaber. — Erythraea pulchella. — Galardia bicolor. — Helianthus lenticularis. — H. petiolaris. — Ketmia vesicaria. — Leonurus occidentalis. — Loasa tricolor. — Malope malacoides. — M. trifida. — Nemophila phaceloides. — Nicotiana glauca. — N. Tabacum decurrens. — Nigella aristata. — N. coarcta. — Salpiglossis straminea. — Saponaria vacc. grandiflora. — Senecio elegans fl. pl. purpur. — Silene orchidea. — S. ornata. — S. trinervata. — Solanum formosum. — Tithonia tagetiflora fl. aurea. — Trachymene caerulea. — Zinnia coccinea, überaus prächtig. — Z. elegans fl. albo. — Z. eleg. fl. purpurea.

b) ſchönblühende perennirende Pflanzen: Amobium alatum. — Antirrhinum bicolor. — Astrantia heterophylla. — Beta Brasiliensis. — Campanula Sibirica. — C. speciosa. — Coreopsis Atkinsonia. - Delphinium Staphysagria. — Dianthus caucasicus. — D. glaucus. — Dracocephalum speciosum. — Eschholzia californica. — Francoa sonchifolia. — Geum chilense. — G. coccineum. — Lavatera Salvitellensis. — Linum flavum. — Lobelia inflata. — Lupinus polyphyllus. — Oenothera acaulis. — O. Fraseri. — O. splendens. — Papaver croceum. — Penstemon atropurpureus. — P. digitalis. — P. pulchellus. — Potentilla pedata. — P. formosa. — P. Simersiana. — Ranunculus millefoliatus. — Rudbeckia speciosa. — R. triloba. — Silene cuprea. — S. gracilis. — S. multiflora. — Stevia purpurea odorata. — St. serrata. — Veronica grossa. — Zygophyllum foetidum.

c) noch nicht allgemein bekannte Pflanzen: Achyropaphus skurioïdes. — Ascardia Indica. — Calceoria scabiosaefolia. — Centaurea aurea. — C. Salamantica fl. caerulea. — C. elongata. — Capsicum annuum fr. marmoreo. — Collomia grandiflora. — C. linearis. — Collinsia grandiflora. — Dianthus prolifer. — Dysodium divaricatum. — Mimulus floribundus. — M. moschatus. — Scabiosa rotula. — Spilanthus multiflorus. — Stachys Arabica. — Trifolium Goussonii. — Zea altissima etc.

Die Erziehung des Samens in Aechtheit und Vollkommenheit erfordert alle Umſicht und Aufmerkſamkeit eines Blumenfreundes, namentlich desjenigen Samens, welcher die, aus der Cultur hervorgegangenen Füllungen und verſchiedenen Färbungen ſtets ächt wieder prodiren ſoll. Alle in meinen Blumen-Samen-Verzeichniſſen aufgeführten Samen ſind in obiger Art erzogen, und kann ſie Blumenfreunden als keimfähig, ächt und vorzüglich empfehlen.

Camellien-Sammlung,

welche für 1833, nach der Wahl der Gebrüder Baumann zu Bollweiler, (nächſt Soultz im oberrhein. Departement) in Frankreich, zu veräußern iſt; als: 12 gefüllte Sorten mit Namen, zu 30 Franks; 25 Sorten zu 80 Fr.; 50 Sorten zu 200 Fr.; 100 Sorten zu 500 Fr.; 125 Sorten zu 750 Fr. und 150 Sorten zu 1050 Franks.

Die Liebhaber können ſich ſelbſt um die im großen Catalog angezeichneten Preiſe wählen.

Cam. axil. BC. Pollyspora axillar.
„ *euryoides*
„ *Hissi, BC. C. Reina, Bon. C. Nepalsis?*
„ *japonica alba (simplici)*
„ — *rubra (simplici)*
„ — *hybrida acutipetala*
„ — - Aglaé
„ — - *Aitoni (simp.)*
„ — - *alba plena*
„ — - Amelie de Baie
„ — - *amplissima (simp.)*
„ — - *atropurpurea*
„ — - - *nova*
„ — - *atroviolacea*
„ — - *aneubifolia*
„ — - *Bedfortia, Whitina*
„ — - *Berleziana*
„ — - Blow
„ — - *Bruxelliensis*
„ — - Calvert nova
„ — - *carnea*, Middlemist
„ — - *Carolus*
„ — - *cerasina (simpl.)*
„ — - Charles Auguste
„ — - *coccinea*
„ — - Colla
„ — - *colorata*
„ — - Colouret
„ — - *Comptoniana*
„ — - *concata*
„ — - *conchiflora*
„ — - - *nova*
„ — - *conspicua*
„ — - *coronata rub. pl.*
„ — - - *rosea*
„ — - crassifolia
„ — - *crassinervis*
„ — - *Derbiana*
„ — - *Egertonia*
„ — - *electa*
„ — - *elegans (seml du.)*
„ — - *elegantissima*
„ — - *eximia*
„ — - *expansa*
„ — - *fascicularis*
„ — - *fimbriata alba pl.*
„ — - *Fionia*
„ — - *flaccida (simplici)*
„ — - *flavescens*
„ — - *foliis marginatis*
„ — - *formosa*
„ — - *fulgens, rubicaulis?*
„ — - *grandiflora ros. (s.)*

Cam.jap.hybr. Griffinii
„ „ „ *Hallesia*
„ „ „ Henriette[belle]
„ „ „ *Herbertii*
„ „ „ *humilis*
„ „ „ *ignescens*
„ „ „ Impératrice du Brés.
„ „ „ *incarnata*
„ „ „ Japonaise (la pet.)
„ „ „ *Johnsonii*
„ „ „ Lady Ad. Campbell's
„ „ „ *Lambertii*
„ „ „ *Lankmannii*
„ „ „ *Lippoldii*
„ „ „ *longifolia (smp.)*
„ „ „ *variegata*
„ „ „ *macrophylla*
„ „ „ *marmorata*
„ „ „ Mester's double red
„ „ „ New imported
„ „ „ Pink
„ „ „ *papaveracia*
„ „ „ *paradoxa*
„ „ „ *Parmentierii grand.*
„ „ „ *parviflora*
„ „ „ *pourple*
„ „ „ *punctat. pl.* invin.
„ „ „ *simplici*
„ „ „ *Regina gallicar.* Eclipse, Pressi
„ „ „ Roi des P.-bas, *Rex ba.*
„ „ „ *rosacea*
„ „ „ *rosaflora*
„ „ „ *rosea flavescens*
„ „ „ *rosea plena*
„ „ „ *Rosa mundi*
„ „ „ *rotundifolia (s.)*
„ „ „ *rubra plena*
„ „ „ *max.*
„ „ „ *salicifolia*
„ „ „ *sanguinea*
„ „ „ *Simsii*
„ „ „ Single white Streped
„ „ „ *splendens*
„ „ „ *spolofera*
„ „ „ *supina*
„ „ „ *Thersiana*
„ „ „ *Traversii mutab.*

(Fortſ. folgt.)

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Fur Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion ubernommen.

Der Porto-Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. XIV. Weißenſee, (in Thüringen). Juli 1833. VI. Jahrg.

Beſchreibung und Cultur einiger ausgezeichneten neuern Zierpflanzen.

(Mitgetheilt vom Herzogl. Hofgärtner Herrn J. W. Boſſe in Oldenburg.)

1) Penstemon ovatus Dougl. Eiförmiger Fünffaden. ♃. Eine ſehr ſchöne, 1 1/2 Fuß hohe Landzierpflanze (aus Californien), welche im Juni und Juli ſich mit zahlreichen, in aufrechten Endriſpen ſtehenden Blüthen ſchmückt. Die Wurzelblätter geſtielt, eirund, gezähnt, glatt; die Stengelblätter ſtiellos, länglich, halbſtengelumfaſſend, gezähnt, glatt. Die Blumen ſehr ſchön blau, mit Violet gemiſcht, auswendig gleich dem Stengel weichhaarig; die Oberlippe der Corolle 3ſpaltig, gleich der 2ſpaltigen Unterlippe roth geadert, am Grunde gebartet. — Man kann dieſe Art in einen Topf in lockere, fette Erde pflanzen, und bei mäßiger Feuchtigkeit an froſtfreien, luftigen Orten durchwintern; ſie kommt aber an ſonnigen, beſchützten und nicht zu feuchten Standorten gut im Freien fort, wenn man ſie nur bei ſtrenger Kälte etwas bedeckt. Sie wächſt in jedem guten, lockern Boden, und wird ſowohl durch den Samen, als wie durch Theilung und ebenfalls durch Stecklinge (im Juli — Auguſt in ein Melonenbeet geſteckt) vermehrt. Der Same wird in den Topf geſäet (wie von den meiſten Arten dieſer ſchönen Gattung), ſchattig, mäßig feucht, und im Glashauſe oder kühlen Miſtbeete ziemlich luftig gehalten. — Ein Exemplar dieſer Art koſtet im botan. Garten zu Hamburg 2 Mark, bei mir 16 ggr.

2) Podolepis angustifolia Hort. Berol.? ⊙. Eine ſehr zierliche Pflanze, welche zu den Radiaten und zur 2. Ordn. der 19. Linn. Claſſe gehört. Die allgemeine Blüthendecke beſteht aus zierlich übereinander gelegten, rauſchenden, faſt durchſichtigen, geſtielten Schuppen, die ſich am Blumenſtiel hinab verlieren, und bei dieſer Art ſtumpf-dreikantig, weißlich und glänzend ſind. Vor dem Aufblühen iſt die Blüthendecke verkehrt-eiförmig. Der Fruchtboden iſt nackt, und die Samenkrone beſteht aus Haaren. — Dieſe Art wird an 2 — 3 Fuß hoch, und iſt überall unbehaart. Der Stengel aufrecht, etwas äſtig. Die Blätter unten am Stengel und über der Wurzel 8 — 10 Zoll lang, 8 — 16 Linien breit, linien-lanzettförmig, langgeſpitzt, glänzend, faſt 3rippig, ganzrandig, die Stengelblätter ſtiellos, am Grunde herzförmig-ſtengelumfaſſend, die oberſten ſehr klein, lanzettförmig. Die hübſchen, geſtrahlten, 1 Zoll 3 Linien breiten Blumen ſtehen aufrecht und einzeln am Ende des Stengels und der Aeſtchen; die Strahlenblümchen ſind linienförmig, weißlich fleiſchfarbig, an der Spitze ausgerandet, dicht und zahlreich beiſammen ſtehend, die Scheibenblümchen röhrig, 5ſpaltig, blaß fleiſchfarbig. Sie kommt wahrſcheinlich aus Neuholland, und blühet in unſern Gärten im Juli bis October. — Der feine, ſchwärzliche Same wird im Anfang April in den Topf in lockere Laub- oder Miſtbeeterde (auch in ein laues Miſtbeet) geſäet, kaum mit etwas leichter Erde bedeckt, mäßig mittelſt der Brauſe feucht gehalten, und in ein lauwarmes Miſtbeet geſenkt, welches bei Sonnenſchein beſchattet und nach Maßgabe der Witterung oft gelüftet wird. Die jungen Pflanzen verſetzt man in angemeſſene Töpfe in oberwähnte Erde, und ſtellt ſie zur Beförderung des ſchnellern Anwuchſes wieder etwas vorn in ein Miſtbeet. Ehe der Blüthenſtengel treibt, werden ſie zum zweitenmale mit ſorgfältiger Schonung des Wurzelballens verſetzt, und zwar ein Theil in 6 — 7zöllige Töpfe, und ein Theil entweder auf eine warme, ſonnige Rabatte, oder auf ein Laub- oder abgetriebenes Miſtbeet, welches bei kalter und naſſer Witterung (welche die Samenerndte von zarten Sommergewächſen leider oft vereitelt) durch Fenſter oft geſchützt werden kann. Viele Näſſe iſt ihr Verderben, Sonne hingegen liebt ſie, wie faſt alle Syngeneſiſten, ſehr. Die Töpfe ſtellt man ſpäter, wenn die Pflanzen blühen wollen, in das offene Glashaus oder an andere, ſonnige und zugleich luftige und beſchützte Orte.

Der Same (wenn er reift) kann von mir mitgetheilt werden; auch wird derſelbe bei Herrn Fr. Ad. Haage jun. in Erfurt u. a. O. zu haben ſein.

(Fortſetzung folgt).

Ein Blick auf den neueſten Zuſtand des Gartenweſens in den kaiſerl. königl. öſterreich. Staaten, mit beſonderer Rückſicht auf die Blumiſtik.

Eingeſandt von Hrn. Jakob Klier in Wien.

(Fortſetzung.)

Im Königreiche Böhmen ſind die Gärten der (p. t.) Herrn Fürſten Metternich, Colloredo, dann Sr. Excellenz des Miniſters Herrn Grafen Kolowrat-Liebſteinski, des Herrn Grafen von Czernin, Salm ꝛc. obenan zu erwähnen.

In Mähren muß ich vor allen übrigen die Gärten in Feldſperg und Eisgrub, dem Fürſten Lichtenſtein gehörig, mit einem 80 Wiener Klafter langen Orangeriehauſe, und jene Sr. Excellenz des Oberſten Hofkanzlers, Grafen von Mittrofski, Magnis, Chorinski, und Freihern von London anführen.

In Gallizien erſchallen die herrlichen Namen Lubomirski, Potocki, Morska, Pawlikofski ꝛc. als jene der eifrigſten Beförderer der Gartenkunſt.

Auch das glückliche Ungarn zeigt ſeit etwa 20 Jahren eine ihm vorzüglich empfehlenswerthe Neigung das Gartenweſen zu verbeſſern; dies zeigt vorzüglich ſein Kepograph Profeſſor Kunitſch; aber wir ziehen es vor, hier die Namen der erhabenen Beförderer der ungariſchen Horticultur, eines Fürſten Eſterhazy, der Fürſtin Graſſalkowitz, der Gräfin Zichi Ferrari, der Grafen Keglevitc, Bathyani, Niclas Forgacd, Bereny, eines Freiherrn von Orczy, und Serpes nebſt jenen der Edlen Zichi und Szinderi für jeden Antheilnehmer an dieſen Fortſchritten der Cultur mit wahrhafter Hochachtung aufzuzeichnen.

(Beſchluß folgt.)

Die Vermehrung der Dahlien durch Pfropfen in die Wurzelknollen. (Fortſetzung).

Von Vetillard.

Die erſte beſteht darin, daß man das Ende eines Knollens in den Zweig der zu vermehrenden Sorte einfüget, das heißt, daß man einen Knollen in den Zweig pfropfet. Dieſe Operation iſt ziemlich ſchwer auszuführen, und erfordert große Vorſicht, um das Mark nicht zu berühren, was, wie ich noch jedesmal erfuhr, ſtets den Tod der Pflanze verurſachte.

Das zweite viel leichtere Mittel iſt auch faſt unfehlbar, und beſteht darin, daß man den Zweig in den Knollen pfropfet; es iſt auch dasjenige, welches ich empfehlen möchte, und wovon ich hier einige Proben mittheilen werde.

Dieſes Pfropfen des Triebes in die Wurzel ſcheint mir auch für viele andere Pflanzen empfehlenswerth, bei welchen die Vermehrung ſchwierig iſt.

Es iſt weſentlich, daß man acht oder zehn Tage vor dem Propfen die zwei oder vier letzten Blätter von unten abſchneidet, und daß man jenen Zweig abkneipt, von welchem man beim dritten oder vierten Knoten eine Pfropfung machen will; dieſe Operation macht den Zweig kräftiger, welcher ſich beſſer ausbildet, und in wenigen Tagen mehr, als ſonſt geſchehen würde, an Stärke gewinnt; bald darauf ſchwellen die beiden an der Spitze ſtehenden Knospen auf, und fangen an, Blätter zu entfalten. Dieß iſt nun der Zeitpunkt, wo man den Zweig abnehmen, und das Pfropfen vornehmen muß.

Beſchreibung der Operation. Man nehme einen der geſündeſten und kräftigſten Knollen aus der Erde, ſchneide die Krone ſo weit davon ab, daß nicht der geringſte Trieb an derſelben entſtehen kann, entferne, der Länge nach ein Stück ohngefähr ſo groß als der einzupfropfende Zweig beträgt. Nun nehme man den Zweig, ſchneide ganz leicht mit einem ſcharfen Meſſer die Epidermis auf zwei Seiten und in einer ſolchen Länge, als der in den Knollen gemachte Einſchnitt verlangt, hinweg, ſchiebe ihn darein, und laſſe das untere Ende des Zweiges über dem Knollen hervorſtehen. Hierauf wird das Ganze mit dem Bindfaden zuſammengebunden, und die auf ſolche Art gepfropfte Dahlie entweder in einen Topf unter eine beſchattete Glasglocke gelegt, wodurch das Anſchlagen beſonders geſichert wird, oder man bringt ſie in die freie Erde, und verhindert zugleich die unmittelbare Einwirkung der Sonne, damit der junge Zweig nicht verwelke; wenn ſie ferners ſtark begoſſen worden iſt, ſo kann man in kurzer Zeit kaum mehr erkennen, daß Zweig und Knollen einſtens getrennte Theile waren. (Fortſetzung folgt).

Verſuche mit der Sommerlevkoje (Cheiranthus annuus), um gefülltblühende zu erhalten.

Mitgetheilt von Herrn G. A. Bluhm in Schweidnitz.

Die Sommerlevkoje gehört für Blumenliebhaber unſtreitig zu den lieblichſten und herrlichſten Gewächſen, und erweckte daher bei dem Einſender auch den Trieb, über die Behandlung dieſes Gewächſes Verſuche anzuſtellen, um die Monſtroſität des Gefülltwerdens der Blume zu bewirken. Ich beſtimmte daher zu dem anfänglichen 1ſten Verſuche mehrere in ſehr gutem Gartenlande ſtehende Pflanzen, benahm denſelben, ſobald ich die einfache Blüthe zu erkennen vermochte, durchaus alle Nebenzweige und Seitenſproſſen, und beſchränkte den Blüthenſtand auf zwei, drei bis vier Blüthenknospen ꝛc.

Die im folgenden Jahre aus dieſem Samen gezogenen Pflanzen lieferten aber nur größtentheils einfache Blumen.

2) Um mich von dem Erfolge der Caſtrationsmethode zu überzeugen, unternahm ich, (nachdem alle zu dieſer Operation beſtimmten Pflanzen in den vorbemeldeten Zuſtand verſetzt worden und in Töpfe gepflanzt waren), mit allen botaniſchen Werkzeugen ausgerüſtet, die Entmannung dieſes Tetradynamiſten, mit aller erforderlichen Vorſicht, Genauigkeit und Behutſamkeit, und zwar in dem Zeitpunkte, wo ſich die gefärbte Spitze der Blumenblätter, aus dem Kelche hervordrängend zeigte, wobei ich gleichzeitig, beſonders einige Pflanzen mit weißen Blüthen, des Stigma, mit dem Pollen eines ſehr dunkelbraunen Goldlacks (Cheiranthus Cheiri), mehrere Tage damit fortfahrend, beſtäubte und bedeckte. Die innere Kraft und Geſundheit der Pflanzen dokumentirte nach meinem Dafürhalten die üppige Vegetation durch fortwährendes Hervorbrechen von Seitenzweigen, nur blieben die Samenſchoten von auffallender Kürze, jedoch gedrungen und von ſtrotzendem ſucculentem Anſehn. Die Samenerndte fiel daher nur kärglich aus, indeß erhielt ich doch von jeglicher Pflanze einige Samen, und im folgenden Jahre Pflanzen. Zu meinem Bedauern erkrankten und ſtarben mir aber ſämmtliche weiße Levkojen, woran vielleicht zu viele Näſſe ſchuld war. Die übrigen ins Land gepflanzten Levkojen blühten, blieben ihrer alten urſprünglichen Farbe wenigſtens unmerklich getreu, und lieferten, außer ſehr wenigen, größtentheils — einfache Blumen. Hierdurch belehrt, daß auf ſolchem Wege der vorgeſetzte

Zweck nicht erreicht werde, und daß eine vollkommne Befruchtung ſtatt finden müſſe, machte ich im vorigen Sommer 1832 einen dritten Verſuch. (Fortſetzung folgt.)

Tauſchanerbieten.

Der Redaktion der Blumenzeitung ſende ich hier ergebenſt eine zweite Abſchrift meiner Pelargonien-Sammlung, wozu mich das Tauſchanerbieten in Nr. 25. S. 19. des vorigen Jahrganges zuerſt veranlaßt hatte.

Ich habe dort die Tauſchbedingungen (gegen engliſche und wiener Pelargonien) auseinandergeſetzt, und ich füge nur noch bei, daß ich Pelargonien im März und April, dann im September und Oktober verſenden kann, daß ich Nelken dagegen aber nur im Herbſt mir ausbitte, und daß es billig wird gefunden werden, wenn ich gegen ausgeſuchte Pelargonien auch mir Nelken ꝛc. ausſuche. Mit Nelken, Topfroſen, Cactus geht der Tauſch Stück gegen Stück; bei andern ſchönen Pflanzen kann auch beſondere Uebereinkunft getroffen werden. Es darf übrigens kaum bemerkt werden, daß nicht alle hier verzeichneten Pelargonien bereits in Vermehrung vorhanden ſind; aber für die Vermehrung wird nach Thunlichkeit und Möglichkeit geſorgt werden. München, 4. Juli 1833.

v. Gemünden, k. wirkl. Collegien-Rath ꝛc.
Ludwigs-Vorſtadt, Singſtraße Nr. 7.

Pelargonium.

aemulum
acetosum
Alexander d. G.
Alexander Kaiser
alnifolium
amplissim. rub.
— album
amaryllidis
amoenum
Anna Pawlowna
amphibolon
angulosum
angustum
apiifolium
aquilinum
ardens
ardescens
argenteum
arboreum
aromaticum
Auguste Pss.
aurant. undul.
azalea ros.
— insigne
alienatum
anemonaefol.
— fol. var.
annomalum
australe
acutilobum
acupictum
atrorubens
affine
— cupreum
affluens
Adonis
atrofuscum
Alexandrowna
agonizans
ampleatum
amioum
Adelheid
aetinogramma
Apollo
Atlas
Anna Maria
Alenii
— violae
Abdallah
auricampestre
amoenissimum
altimi
amanticum
Arundel Lady
agathosmum
Abron
Antonianum
astrantiaefol.
Admiral
— Htigt
atrostriatum
autumnale
acaule
auroreum
Alstroemeria
aretinum
Arbutnot Miss
amauron
aceroides
abbreviatum
Anna Boley
Ammersleyan.
Adonis roi
angletere roi d'.
ardens coiuin(?)
agnatum
aimable
amabile
— majus
atropurpur.
augustissimum
Ataxerxes
Aberdun Lord
Ajax
Alenii maj.
amabile grdfl.
argutum
andrewsianum
Anna
Ali Pascha
Alexandra Pss.
Adeline
Bourmann
Buelow
BernanerAgnes
Belladonna
bailea
baileanum
— castum
— immacul.
— kloiberi
balsam. atrop.
banisteri
banks
— majus
Barrington
Beaumontine
Beaufortianum
bethelina
betulinum
bicolor
blattarium
Bourdin Lady
Brougton —
Belton —
Browns Elisab.
bressianum
brigtianum
bellum
bellissimum
bristolian. prpr.
Babilon roi de
Baumann
Bauhini
butera frz.
basilisc
basilicum
bivulnerum
broelii
backerianum
boscaveria
brougtonia
Buchstalleri
bembrieuse
Beauté suprême
Baiern Koenigin von
blandum
bishopae
bathesba
boitarbii
bavariae fortuna
Bern l'honneur de
Bolivar
Bourelle la.

(Fortſetzung folgt).

Viŏla tricŏlor. L.

Eine franzöſiſche Anekdote aus der Blumenwelt zur Zeit der Gewaltherrſchaft Napoleons.

Dreifaltigkeitsblümchen, *) auch Tag- und Nachtblume, Stiefmütterchen, *) Sinnviole oder Gedenkblümchen, vertritt bei den Franzoſen und Engländern die Stelle unſers Vergißmeinnicht und iſt bei ihnen das Blümchen der Liebe und ſteten Erinnerung. In letzterer Beziehung führt es auch in Frankreich den Namen Pensée und gab im Jahr 1815 zu einem tragikomiſchen Ereigniß die Veranlaſſung. Der Lehrer in einer kleinen Provinzialſtadt hatte nämlich ſeinen Schülern als Thema zu einer ſchriftlichen Ausarbeitung die Beſchreibung des Dreifaltigkeitsblümchens aufgegeben und ihnen als Motto nachſtehende Verſe aus dem lateiniſchen Gedicht des Pater Rapin: die Gärtner, recitirt:

Flosque jovis, folii tricoloris, et ipsi par violae.

Der Maire des Städtchens erhielt davon Kunde, und glaubte in dieſem Anſinnen des Lehrers an die Schüler die Abſicht zu finden, letztere zur Empörung zu reizen, und ließ jenen, in Folge des Aufruhrgeſetzes, verhaften. Der Maire commendirte nämlich die angeführten Verſe alſo: Flos jovis, Blume des Jupiter, d. h. Blume Napoleon's; folii tricoloris deutet unſtreitig auf die dreifarbige Kokarde hin; et ipsi par violae iſt eine offenbare Anſpielung auf le père la violette, wie damals Buonaparte genannt ward, weil ſeine Verehrer zum Abzeichen ein Veilchen am Buſen oder im Knopfloch trugen. So erſtaunt und betrübt auch anfänglich das arme Schulmeiſterlein über ſeine Verhaftung geweſen war, ſo konnte es ſich doch nicht enthalten, die Auslegung des Maire über jene Stelle zu belächeln, die uns ſelbſt komiſcher dünkt, als der Beweis, den einſt der bekannte Silberſchlag in Berlin von der Dreieinigkeit Gottes an einem Dreifuß führte, der nämlich nicht Dreifuß heißen könne, wenn er zwei oder wohl gar nur einen Fuß habe. (Vergl. Selam oder die Sprache der Blumen S. 173.)

T. im Mai 1833. C. A. L.

---

*) von ihrer dreifarbigen Eigenſchaft.

*) Dieſem Worte will man folgende Bedeutung untergelegt haben:

Bekanntlich iſt der Kelch dieſer Blume fünfblättrig, und die Blättchen ſind zwar gleich, aber von verſchiedener Lage, ſo daß zwei davon das obere, abwärts gerichtete, breitere und ſtumpfere Kronblatt, zwei auf beiden Seiten und eines die beiden untern Kronenblätter unterſtützen.

Die ganze Blume ſoll das Bild einer Mutter mit zwei leiblichen und zwei Stiefkinder darſtellen, welche zuſammen auf fünf Stühlen ſitzen. Die Kronblätter nämlich deuten auf die Glieder der Familie, die Kelchblättchen hingegen auf die Stühle hin.

Giebt man nun der Blumenkrone eine ſolche Richtung, daß das obere abwärts gerichtete Kronblatt in die Höhe zu ſtehen kommt, ſo erſcheint in dem Letztern die Mutter auf zwei Stühlen oben ſitzend und unter ihr zunächſt gewahrt man deren beide leibliche Kinder, jedes auf einem Stuhle, unter dieſen aber wieder die beiden Stiefkinder, zuſammen nur auf einem Stuhle ſitzend — eine figürliche Beziehung auf die Härte und Abneigung, womit die liebloſen Stiefmutter ihren Stiefkindern zu begegnen pflegen.

Systematiſche Namen der merkwürdigſten Pflanzen-Gattungen und Arten, ihr Genitiv ꝛc.

Mitgetheilt von L. aus T.

(Fortſetzung).

Alternanthera. Forsk.

Von alternus, wechſelweiſe ſtehend, und anthera, Staubbeutel. Den Namen hat dieſe in Arabien und Egypten wachſende Pflanzengattung daher erhalten, weil ihre Blume mit drei fruchtbaren und mit eben ſo viel völlig unfruchtbaren Fäden abwechſelt.

Althaea. L. ae. foem. Eibiſch, Ibiſch, Heilwurz.

ἀλθαια (Diosc. III. 163 Plin. XX. 21.) von ἄλθος oder ἀλθαίνειν, heilen, wegen ihrer heilenden Kraft. Die Griechen nannten ſie ἰβίσκος und daraus ſind die beiden erſten deutſchen Benennungen entſtanden.

Aly̆pum (Globularia) L. i. neutr. dreizähnige Kugelblume, der fürchterliche Strauch.

Alypion (Plin. XXVIII. 4.) Von ἀ priv. und λύπη, Traurigkeit, Schmerz, alſo ſchmerzlos. Das Kraut iſt bitter und ſehr ſcharf, es purgirt heftig von oben und unten (daher der zweite deutſche Name) und hebt auf dieſe Weiſe vorhandene Schmerzen. (Fortſetzung folgt.)

Varietäten.

Gotha. Der thüringer Gartenbauverein in Gotha feierte am 10. Juli das dritte Jahr ſeines Beſtehens, im herzogl. Orangeriegebäude. Der eine Rotunde bildende mittlere Theil deſſelben war, in ähnlicher Weiſe wie im vorigen Jahr, durch hohe immergrüne Bäume von den beiden Seitenſälen abgeſchloſſen worden und enthielt eine gewählte, gegen 1200 Töpfe betragende Zuſammenſtellung ſchön blühender oder immergrüner Gewächſe, welche theils die herzoglichen Gärten zu Gotha und Reinhardtsbrunn, theils Kunſtgärtner und Blumenfreunde in der Stadt und Gegend für dieſen Zweck eingeliefert hatten.

Aus dieſer großen Anzahl verdienen beſonders erwähnt zu werden: ausgezeichnet ſchöne Exemplare von Topfroſen, der Rosa indica (Thea) Noisettiana, multiflora, semperflorens, Prachtexemplare der Nemophilla phacelioides, Campanula Medium fl. pleno, Salpiglossis ꝛc., aus dem Garten Ihrer Hoheit der verwitweten Frau Herzogin von Gotha und Altenburg; — eine zahlreiche Folge der jetzt noch blühenden, über 180 Sorten betragenden Pelargonienſammlung des herzoglichen Hofgartens zu Gotha, ſchöne Topfroſen, den Arten Thea Noisettiana, moschata angehörend, prächtige Celosien, Gloxinien, Schizanthus, Hortensien, Verbena Melindris, Cactus, (Cactus grandiflorus hatte am Vorabend des Feſtes geblüht;) Canna, Pothos, Caladium, Cycas revoluta, Aloe maculata, Nerium der verſchiedenen Spielarten, durch Blumen und Früchte ausgezeichnete Melaleuca und Metrosideros; dieß Alles aus dem hieſigen unter der Leitung des Hofgärtners Müller ſtehenden Hofgarten; — Ampherepis intermedia, Asclepias nivea, carnosa, Amobium alatum, Impatiens Balsamina (in Zwergform) Begonien, Calceolaria bicolor, integrifolia, hybrida, Campanula Medium fl. pleno aller Farben, in dichteſter Füllung, Clarkia pulchella alba, Celosien, Gloxinien, Hedysarum Vespertilionis, Hortensien in Roth und Blau mit ausgezeichnet großen Blumen, Maurandia drei Arten ſehr reich blühend, Passiflora gracilis, Pentapodes phoenicea, Plumbago verſchiedene Arten, Thunbergia alata und viele andere ſchön blühende Hauspflanzen und Sommergewächſe vom Hofgärtner Eulefeldt aus Reinhardtsbrunn; Kunſt- und Handelsgärtner Haage jun. in Erfurt hatte unter Andern zugeſandt: Dracaena terminalis fol roseis, Hibiscus rosa sinensis fl. aurantiaco plen., Hamelia patens, Polygala mixta, Melaleuca linarifolia, zwölf der neueſten Sorten Calceolarien, acht Arten Erica, unter den ſich die ſchön blühenden ventricosa stellata, viridiflora, Juliana, hyacinthoides befanden, Pelargonium Allenii majus; vom Kunſt- und Handelsgärtner Barth in Gotha fand ſich ein ſchönes Sortiment großblumiger, dicht gefüllter Balſaminen in achtzehn Sorten, mehrere der neueſten Calceolarien, Pelargonium corruscans, Megalaion, Prinz regent, Hericatianum ꝛc. Außer dieſen zahlreichen Beiträgen hatten noch viele Mitglieder einzelne Exemplare ſchön blühender und ſeltener Topfpflanzen und ein Sortiment der jetzt blühenden Stauden- und Sommergewächſe geliefert, von denen noch genannt zu werden verdienen: prachtvolle Nerium, reich blühende Citrus Aurantium, Zinnia elegans fl coccineo et albo, mehrere ſeltene Pelargonien, Lychnis coronata, Sedum tabulare mit ſeiner merkwürdigen Blüthe, Hoya carnosa; ein Sortiment ſchöner Sommerlevkojen in Töpfen, vom Kunſtgärtner Kayſer eingeſandt, fand großen Beifall und wurde, da es verkäuflich war, ſchnell geräumt. Die oben erwähnten Staudengewächſe und Sommerpflanzen in abgeſchnittenen Exemplaren befanden ſich auf zwei runden Blumentiſchen in Vaſen geſchmackvoll geordnet und waren mit einem Kranze von Georginen umlegt; ein Tiſch, zunächſt des Eingangs, enthielt eine Zuſammenſtellung der ſchönſten, jetzt reifen Kirſchenſorten, mehrere Melonen und Aepfel, welche ſich durch Güte und Haltbarkeit auszeichnen, während auf einem andern die gelungenen aus Papiermaché verfertigten Nachbildungen von Obſtfrüchten aufgeſtellt waren, die unter Aufſicht und Mitwirkung

des thüringer Gartenbauvereins von Küchenmeiſter Dittrich in Gotha unter dem Titel: deutſches Obſtkabinet herausgegeben werden und von denen ſich hier die dritte bis ſechſte Lieferung vorfanden. (Beſchluß folgt.)

Hamburg. Der rühmlichſt bekannte Naturforſcher Herr Ecklon hat jetzt vom Vorgebirge der guten Hoffnung, wo ſich derſelbe mit Herrn Zeiher theils in den verſchiedenen Theilen der Cap-Colonien, theils im Kaffernlande und andern angranzenden Ländern 5 Jahre aufgehalten, außer einer Menge Mineralien und Petrefakten, auch eine Menge Samen von vielen ſeltenen ſüd-afrikaniſchen Gewächſen, eine Pflanzen-Sammlung von circa 6000 Spezies und eine bedeutende Anzahl Zwiebeln von den ſchönern Arten der Liliaceen im guten Zuſtande mit hierher zurückgebracht, wo dieſelben nun im hieſigen botaniſchen Garten aufgeſtellt und geordnet werden ſollen.

Bollweiler. (Fortſetzung.) Verzeichniß der Camellien, welche in den Gärten der Herren Gebrüder Baumann daſelbſt kultivirt werden:

C. foliis marginatis.
- mutabilis!!!
- Herberti.
- Griffinii.
- Parmentierii.
- Sericea.
- Lehmannii.
- delecta.

C. Lindley.
- Helvola.
- insignis fl. rubro.
- eximia.
- Carolina. V.
- acutipetala.
- Eurioides.
- blanda.

C. parviflora.
- excelsa.
- virginica.
- Cliveana.
- Watsoniana.
- Lady Admiral Cambells.
- Rivesii.

(Fortſetzung folgt).

Neben Hrn. Prof. A. Alſchingers „Flora Jadrensis" (490 Gattungen und 1222 Arten phenerogamer und 10 Gattungen und 16 Arten farrenartiger Pflanzen aus der Umgegend von Zara enthaltend) verdient auch Hrn. Prof. Petters „botaniſcher Wegweiſer in der Gegend von Spalato in Dalmatien," in welchem 1037 Arten nach alphabetiſcher Ordnung mit Angabe ihrer Fundorte, Blüthezeit, Ausdauer ꝛc. angeführt ſind, einer ruhmlichen Erwähnung.

(**Cochenille auf Cacten**). Herr Dr. Pappe aus Hamburg, der im Jahr 1831 Verſuche mit der Cochenille auf dem Cap der guten Hoffnung machte, hat dabei die Bemerkung gemacht, daß die Cochenille, welche auf Cactus opuntia eingeführt wurde, dieſe Cactus-Species verließ, um ſich auf dem daſelbſt durch das ganze Land allgemein verbreiteten Cactus ficus indic. niederzulaſſen, den es in kurzer Zeit mit ſeinem Geſpinſte überzog.

Für Gärtner und Gartenfreunde.

So eben iſt erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Naturgeſchichte
der ſchädlichen und nützlichen
Inſekten
und
die bewährteſten Mittel zur Vertilgung der erſteren.
Von P. Fr. Bouché,
Kunſtgärtner in Berlin und Mitglied der Geſellſchaft
naturforſchender Freunde daſelbſt ꝛc.
(Sauber geheftet Preis 20 Sgr.)

Die vorgenannte Schrift wird ohne Zweifel allen Gartenbeſitzern und Gärtnern eine ſehr willkommne Erſcheinung ſein, indem der rühmlichſt bekannte Herr Verfaſſer ſeine vieljährigen bewährten Beobachtungen und Erfahrungen darin mittheilt. Die wenigen ſchon vorhandenen Schriften über die Garten-Inſekten ſind theils zu unvollſtändig, theils wimmeln ſie von Irrthümern, Aberglauben und Vorurtheilen aller Art, ſo daß man nur hin und wieder etwas Anwendbares darin aufgeführt findet. Um ſo mehr glauben wir, daß durch die Herausgabe der gegenwärtigen Schrift, einem weſentlichen Bedürfniſſe abgeholfen wird; der mäßige Preis macht ſie einem Jeden zugänglich.

Nikolaiſche Buchhandlung in Berlin.

Hierbei eine Beilage: Pflanzen-Verzeichniß von Hrn. Carl Appelius in Erfurt.

Erſtes Pflanzen-Verzeichniß

von

Carl Appelius,

Kunſt- und Handelsgärtner in Erfurt.

Die Preiſe ſind in Preuß. Courant geſtellt, den Thaler zu 24 Groſchen gerechnet.

Kalthaus-Pflanzen.

	Thlr.	gr.
Acacia armata	—	10
— decipiens	—	16
— floribunda	—	16
— latifolia	—	8
— longifolia	—	12
— lophanta	—	8
— — speciosa	—	12
— stricta	—	8
— verticilliata	—	8
Agapanthus umbellatus	—	6
Agrostemma coronaria fl. pl.	—	6
Aletris capensis	—	10
— uvaria	—	10
Aloe spiralis	—	6
— variegata	—	8
Alstromeria pelegrina	—	8
Andromeda buxifolia	3	—
— polifolia	—	4
Anthemis artemisiaefolia in 15 verſchiedenen Farben, à Stück	—	3
Asclepias fruticosa	—	6
Azalea indica fl. alba	—	16
— pontica, ſtark	—	12
Banksia ericaefolia	1	—
Bignonia grandiflora	1	—
Calandrinia speciosa	—	8
Calceolaria atropurpurea	1	6
— Alexandriana	—	18
— angustifolia	—	8
— arachnoidea	—	8
— — fl. albo	2	—
— bicolor	—	10
— coerulescens	1	—
— connata (floribunda)	—	6
— corymbosa	—	6
— crenatiflora suberecta für jetzt in Saamen, die Priſe	—	16
— cuprea	1	—
— epsomensis	1	12
— excelsa	—	10
— — cinnamomea	2	—
— — marmorata	1	18
— — Taylori	2	—
— Gilani	—	16
— Herbertiana	2	—
— Hopaeana	—	20
— — varietas	1	—
— integrifolia (rugosa)	—	6
— Leonidas	1	12
— lutescens rosea	1	18
— mellifera	—	20
— Mülleri	1	—
— notha	2	—
— nova semi	1	8
— oleifera	1	—
— pendula	1	20
— plataginea	—	8
— Pressi	—	16

	Thlr.	gr.
Calceolaria Pressi aurantia	—	20
— — purpurea	1	—
— punctata	1	—
— — nova	1	12
— purpurea	3	—
— sanguinea	1	12
— striatiflora	1	—
— thyrsiflora	—	10
— tricolor	—	18
— — picta	1	6
— turbinata	2	—
— Victory	2	—
— Youngi	1	—
Calistachis lanceolata	—	12
Calothamnus quadrifidus	—	8
— villosus	—	12
Cassia ligustrina	—	12
Ceanothus coeruleus	—	12
Cineraria amelloides	—	4
— cruenta	—	6
— maritima	—	4
Cheiranthus cheiri fl. pl. foliis variegatis	—	8
Cistus creticus	—	4
— formosus	—	8
— ladaniferus	—	8
Colutea frutescens	—	6
Convolvolus cneorum	—	6
Coronilla valentina	—	6
Correa alba	—	6
— pulchella	—	20
— speciosa	1	—
Crassula coccinea	—	6
— columnaris	—	10
— versicolor	—	8
Crotolaria purpurea	—	20
Cupressus expansa	—	6
— pyramidalis, ſtark	—	12
Cyrissa myrthifolia	—	8
Daphne Delphinium	—	16
— odorata	—	6
Digitalis Sceptrum	1	—
Echium candicans	—	4
— fastuosum	—	8
Ecremocarpus scaber	—	12
Elychrisum argenteum	—	10
— proliferum	—	18
— retortum	—	6
— spectabile	2	—
Epacris grandiflora	1	—
Erica aggregata	—	16
— Bonplantia	2	—
— bruniades	1	12
— baccans	—	8
— cerinthoides	1	12
— cubica minor	—	18
— Daboecia	—	6
— herbacea	—	6

	Thlr.	gr.
Erica hybrida	—	18
— linnea superba	2	12
— mediterania	—	12
— blanda	—	12
— transparens	1	—
— tubiflora purpurea	1	6
Erythrina christa galli	1	—
Erodium incarnatum	—	6
Eutaxia myrthifolia	—	8
Francoa appendiculata	1	—
— sonchifolia	—	8
Fuchsia arborea	—	10
— coccinea	—	6
— gracilis	—	12
— — multiflora	—	18
— mycrophylla	—	12
— tenella (decussata)	—	10
— thymifolia	—	6
— virgata	—	14
Gaillardia aristata	—	16
Gazania rigens	—	4
— uniflora	—	8
Gnaphalium orientale	—	4
Gnidia simplex	—	8
Halleria lucida	—	8
Heliotropium peruvianum	—	4
— grandifl.	—	6
Jasminum grandiflorum	—	8
— trifoliatum	—	6
— triumphans	—	8
Ipomopsis elegans	—	12
Kennedia bimaculata	—	12
— coccinea (prostrata)	—	16
— comptoniana	1	6
— macrophylla	—	16
— purpurea	1	—
— rubicunda	—	8
Lassiopetalum purpureum	—	12
— solanaceum	—	10
Laurus nobilis	—	4
— glaucus	1	—
Lechnaultia formosa	—	8
— oblata	—	8
Leptospermum acuminatum	—	12
— lucidum	—	12
— pubescens	—	8
— scoparium	—	12
— Thea	—	16
Lobelia cardinalis	—	10
— fulgens	—	6
— inflata	—	6
— siphilitica	—	6
Lophospermum mexicanum	2	—
— scandens	—	16
Lotus Jacobaeus	—	4
Magnolia grandiflora praecox	3	—
— pumila	1	—
Maurandia anthirrhiniflora	—	4

	Thlr.	gr.
Maurandia Barcleyana	—	8
— bicolor	1	—
— semperflorens	—	4
Melaleuca decussata	—	8
— diosmaefolia	—	8
— hypericifolia	—	8
— ovatifolia	—	12
— pulchella	—	12
— viminalis	—	8
Melia Azaderach	—	8
Metrosideros angulosa	—	8
— citrina	—	8
— fulgens	—	12
— lanceolata	—	8
— linearis	—	8
— lophanta	—	8
— ragulosa	—	10
— saligna	—	8
— semperflorens	—	10
— speciosa	—	12
Mimulus anticolor	—	6
— glutinosus	—	8
— luteus	—	3
— moschatus	—	4
— nudicaulis	—	12
— quinquevulnerus, ganz neu und ausgezeichnet ſchön	—	12
— rivularis	—	6
— variegatus	—	8
Myrthus communis	—	4
— — fol. var.	—	6

	Thlr.	gr.
Myrthus latifolia	—	4
— — fol. var.	—	8
Muraltia mixta	—	12
Myrica quercifolia	—	12
Nolana atriplicifolia	—	4
Oenothera speciosa	—	6
— taraxasicifolia	—	8
Passerina filiformis	—	16
— imbricata	—	16
— nudiflora	—	16
Passiflora coerulea	—	6
— racemosa	—	8
Penstemon atropurpureum	—	6
— digitalis	—	6
— pulchellum	—	6
Phyllica ericoides	—	8
Primula chinensis	—	3
— — fl. albo	—	6
Prostranthera violacea	—	16
Protea squarrosa	—	18
Psoralea acuminata	—	16
— coerulea	—	12
Punica granatum fl. pl. v. 16 gr. bis	5	—
Pyrus japonicus	—	8
Rhododendron arboreum	2	12
— ponticum, ſtark	—	16
Roellia ciliaris	—	16
Royena glabra	—	12
Salpiglossus atropurpurea	—	4
— Barcleyana	—	6
— — albiflora	—	6

	Thlr.	gr.
Salpiglossus Barcleyana lilacina	—	6
— — speciosa	—	10
— integrifolia	1	—
— intermedia	—	4
— — variegata	—	6
— picta	—	4
— straminea	—	2
Außer integrifolia ſind ſie ſämmtlich zweijährig.		
Salvia coccinea	—	4
Senecio eleg. fl. pl. atropurp.	—	4
— venustum	—	6
Sophora mycrophylla	—	12
— tetraptera	—	16
Sperolobium vimineum	—	10
Templetonia glauca	—	16
— retusa	—	16
Trachelium coeruleum	—	4
Tropaeolum majus fl. pl.	—	4
— — fl. atropurp. superbum	—	12
Veltheima aletris	—	10
— uvaria	—	10
Verbena aubletia	—	6
— melindres	—	6
— pulchella	—	6
— triphylla	—	6
— venosa	—	18
Viburnum Tinus	—	4
— lucidum	—	12
Yucca gloriosa, blühbar	4	—

Warmhaus-Pflanzen.

Amarillis Belladonna	—	12
— crispa	—	4
— crocata	—	16
— flexuosa	—	18
— Johnsoni	1	6
— purpurea	—	12
— recurvata	—	16
— rutila	—	8
— vittata	—	16
Asclepias carnosa	—	6
— currasavica	—	6
Bletia Tankervillae	—	18
— tuberosa	—	12
Blumenbachia insignis	—	8
Cactus Cereus albispinis	—	6
— — cylindricus	—	6
— — Deppii	—	12
— — elegans	—	6
— — flagelliformis	—	4
— — grandiflorus	—	6
— — hexagonus	—	6
— — histrix	—	12
— — lanuginosus	—	12
— — monstrosus	—	8
— — multangularis	—	12
— — myosurus	—	6
— — niger	—	12
— — Royeni	—	12
— — Scopa v. 16 gr. bis	2	—
— — serpentinus	—	6
— — speciosus	—	6
— — strigosus	—	12
— Echinocactus multiplex	—	8
— — Ottonis	1	—
— — Sellovianus	3	—
— Epiphyllum alatum	—	6

Cactus Epiphyllum truncatum	—	6
— — — multiflora	—	12
— Mammillaria caespitosa	—	8
— — coronaria	—	12
— — prolifera	—	6
— — pseudo mammillaris	—	8
— — simplex	—	6
— — stellata	—	4
— Opuntia ficus indica	—	6
— — fragilis	—	6
— — crassa	—	10
— — leucantha	—	6
— — mycradasis	—	8
— — monacantha	—	6
— — polyacantha	—	6
— — rubescens	—	8
— Rhipsalis calamiformis	—	6
— — salicarnoides	—	6
Euphorbia Caput Medusae	—	6
— cereus	—	8
Didimocarpus Rhexii	—	4
Gardenia florida fl. pl.	—	8
Gloxinia caulescens	—	8
— formosa	—	4
— — fl. albo	—	8
— maculata	—	4
— Schottii	—	12
Haemanthus albi flos	—	12
— puniceus	—	6
Harrachia speciosa	—	12
Hibiscus rosa sinensis	—	8
— — — fl. pl.	—	10
Jasminum sambac fl. pl.	—	16

Indigofera australis	—	6
Lantana Sellovii	—	8
Mimosa pudica	—	6
Nerium Oleander album novum	—	12
— — — simplex	—	6
— — aurantiacum	—	16
— — cardinalis	—	12
— — indicum	—	12
— — pomponicum	—	12
— — radicans	—	12
— — rubro pleno	—	6
— — — simplex	—	4
— — splendens	—	8
Passiflora cermesina	—	10
— racemosa	—	8
Plumbago capensis	—	6
Rochea falcata	—	8
— perfoliata	—	12
Roellia coccinea	—	10
— formosa	—	8
Salvia involucrata	—	8
— mexicana	—	8
— splendens	—	6
Sempervivum tabulare	—	6
Stapelia glauca	—	8
— grandiflora	—	8
— tupa	—	12
— variegata	—	4
Strelitzia Reginae	3	—
Thunbergia alata	—	8
— capensis	—	18
Vinca alba intus lutea	—	6
— — — rubra	—	6
— rosea	—	6
Volkameria japonica	—	6

Indem ich mein erſtes Pflanzen-Verzeichniß hiermit zu überreichen die Ehre habe, bemerke, daß Briefe und Gelder franco erbeten werden, und Aufträge ohne den Betrag unberückſichtiget bleiben. Emballage und Kiſten werden beſonders berechnet.

Erfurt, im Juli 1833.

Carl Appelius.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto-Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen- Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. XV. Weißenſee, (in Thüringen). Auguſt 1833. VI. Jahrg.

Neue, ſchöne Roſen.

In dem Garten des Hrn. Kaufmann Wilhelm Keller zu Duisburg am Rhein blühten Ende Juni d. Jahres zwei ausgezeichnete Sempervirens-Roſen, Adelaide von Orleans und Felicite Perpetue, als kräftige, acht Fuß hohe Stöcke im freien Lande. Sie waren jetzt nach dreijähriger Pflanzung freiſtehend gezogen, mit einer ſolchen Menge ſchön geformter, ganz gefüllter Blumen überdeckt, daß ſie bei den zahlreichen Zuſchauern die höchſte Bewunderung erregten.

Adelaide von Orleans. Lange, gebogene Zweige. Krumme, dicke Stacheln. Keine Borſten. Die Blattſtiele mit geſtielten Drüſen, unten mit krummen Stacheln beſetzt. Schmale, kurze Afterblätter mit langen, linienförmigen, pfriemförmigen, am Rande gefranzten oder kammförmigen drüſigen Spitzen. Dicke, ſtark abſtehende, eiförmige, lang geſpitzte, glatte Blättchen. Das Gezähnte iſt einfach, ſpitzig, wenig tief. Der Blumenſtiel rauh, drüſig, gewöhnlich einfach und in doldenförmigen Büſcheln vereinigt. Nebenblättchen lanzettförmig, lang geſpitzt, mit Drüſen gefranzt. Fruchtknoten ſchmal, länglich kreiſelförmig, haarig unter der Knoſpe, gewöhnlich glatt nach dem vollkommenen Aufbrechen. Drüſige, kurze, pfriemförmige Kelchabtheilungen, drei haben zuſammen fünf Anſätze. Rothe kugelige Knoſpe. Blume mittelgroß (20 — 30 Linien im Diameter), gefüllt (60 — 80 Blumenblätter), fleiſchfarbig, bisweilen zart hellroſa, zuletzt ins Weiße übergehend. Hohle Blumenblätter, die innern ſchmal, ſpatelförmig. Griffel hervorragend, fadenförmig, freiſtehend.

Felicite Perpetue. Blume mittelgroß oder klein, hellfleiſchfarbig, ſtark gefüllt, ſehr ſchöne Ranunkelform, in Bouquets von 10 — 25 Knoſpen an jedem Zweig. Die übrigen Theile des Strauchs ſind dem vorhergehenden ſehr ähnlich.

Beide Roſenſtöcke blühen nur einmal im Jahr und etwas ſpäter, als die gewöhnlichen Landroſen. Wegen ihres kräftigen Wuchſes und der Menge ihrer langen Zweige eignen ſich dieſe beiden Sorten beſonders zur Bekleidung von Mauern und Lauben. Obſchon ſie, bevor ſie eine gewiſſe Höhe erreicht haben, nicht leicht blühen, ſo läßt ſich dieſes durch Hilfe der Kunſt auch früher bewirken. Beide Sorten ſind in künftigem Herbſte in wurzelächten Exemplaren jede zu 15 ſgr von Duisburg zu beziehen.

Eine der ſchönſten neuen Noiſetteroſen, die Roſe Lamarque, welche jetzt hier ſowohl in Töpfen als im freien Lande in prachtvoller Blüthe ſteht, bedarf noch einer beſondern Erwähnung. Die Blume iſt ſehr groß, ſtark gefüllt, weiß mit blaßgelbem Mittelpunkt und angenehmem Theegeruch. Gewiß eine der prachtvollſten Roſen, welche in neuerer Zeit durch die künſtliche Beſtaubung hervorgebracht ſind.

Beſchreibung und Cultur einiger ausgezeichneten neuern Zierpflanzen.

(Mitgetheilt vom Herzogl. Hofgärtner Herrn J. W. Boſſe in Oldenburg.

(Fortſetzung.)

3) Alstroemeria acutifolia. Hort. Bérol. Spitzblättrige Alſtrömerie, aus Chili. ♃. Der Stengel dieſer ſchönen Art windet ſich 5 — 6 Fuß hoch empor, er iſt glatt, unterhalb bräunlichpurpurroth mit Grün gemiſcht. Die lanzettförmigen, lang zugeſpitzten, feinſpitzigen Blätter ſind 4 — 5 Zoll lang, 9 — 10 Linien breit, am Grunde in einen gedrehten, am Rande gekräuſelten Blattſtiel verſchmälert, oben glatt, grün, unten 7rippig, und auf den Rippen zottenhaarig. Die prächtigen Blumen bilden 4 — 8blumige Enddolden, welche unten mit lanzettförmigen, langgeſpitzten, ſchwarzvioletten Hüllblättchen verſehen ſind. Die Blumenſtiele 14 Linien lang, violett, weichhaarig. Die Corolle 14 Linien lang, mit etwas zuſammengeneigten, ſtumpfen Kronblättern, wovon die 3 äußern feuer- und ſcharlachroth, die 3 innern anfangs gelbgrünlichroth, dann goldgelb oder pomeranzenfarbig, und an der Spitze gelblichgrün und feuerfarbig ſind. Die Kapſeln ſind oben glatt abgeſtumpft, faſt dreieckig, und enthalten ſcharlachrothe, glänzende, beerenförmige Samen, die erſt gegen den Winter oder Frühling reifen. Die Blumen erſcheinen im Auguſt, und währen eine geraume Zeit hindurch. — Die knollige Wurzel wird nach dem Abtrocknen des Stengels und der Blätter den Winter hindurch bis zum März faſt ganz trocken gehalten, bleibt aber während dieſer Zeit ruhig im Topfe an einem trocknem Orte des Glashauſes oder Zimmers ſtehen. Im März nimmt man die Knollen heraus, ſäubert ſie von beſchädigten oder abgeſtorbenen Wurzeln, theilt ſie, ſo weit dieſes ohne Verletzung der dicken Knollen geſchehen kann, und pflänzt ſie in ver-

hältnißmäßige (5 — 7zöllige) Töpfe, auf deren Boden man 3/4 Zoll feine Torfbrocken oder Scherben legt, und ſie dann mit einer Miſchung von gleichen Theilen fetter Miſtbeet-, Laub- oder Holz-, und Moorerde, (in welcher die Alſtrömerien gut gedeihen,) mit 1/5 Flußſand gemengt, füllt. Man begießt die gepflanzten Knollen mäßig, ſtellt ſie in ein warmes Miſtbeet zum Antreiben, und wenn die Stengel etwa einen Fuß hoch ſind, in ein niedriges Glashaus, oder in das Zimmer vor ein ſonniges Fenſter. Die herangewachſene Pflanze liebt ziemlich viel Feuchtigkeit, und gelangt am beſten zur Blüthe, wenn ſie nahe unter den obern Fenſtern ſteht, woſelbſt es ihr nicht an Luft und Licht fehlt. Der Same wird ſogleich nach der Reife geſäet, und mit dem Topfe warm geſtellt, er liegt oft lange, ehe er keimt. Pflanzen ſind in Berlin, Hamburg (für 6 Mark im botan. Garten daſelbſt) und bei mir (für 1 Thlr. 16 ggr.) zu haben. (Fortſetzung folgt.)

Ein Blick auf den neueſten Zuſtand des Gartenweſens in den kaiſerl. königl. öſterreich. Staaten, mit beſonderer Rückſicht auf die Blumiſtik.

(Beſchluß.)

In einem analogen Verhältniſſe ſind auch die übrigen Provinzen des öſterreichiſchen Kaiſerthums in dieſem Fache unter dem Einfluß erlauchter Vorſteher und National-Häupter geſchäftig, und im Wetteifer mit den andern begriffen. Ich muß es nur beklagen, daß meine hortulane Statiſtik zu ſehr beſchränkt iſt, um auch ihre Verdienſte mit analogen Zeugniſſen zu erwähnen.

Auch die Pomologie hat ihre Beförderer an dem durch ſeine literariſchen Arbeiten rühmlich bekannten Herrn Apotheker **Liegel** in Brauau, an dem Hrn. k. k. Hofgärtner **Antoin**, an Hrn. **Kraft** zu Währing nächſt Wien, an dem Ordensherrn **Kurz**, an Hrn. **Wölfel** zu Güns, u. ſ. w.

Ich bin übrigens weit entfernt, meinen Patriotismus bis zur Prahlerei ſteigern zu wollen. Ich gebe mit aller Bereitwilligkeit zu, daß es uns an ſo mancher wünſchenswerthen vegetabiliſchen Schönheit mangle, die vielleicht ſogar in manchen Gärten Deutſchlands zu finden wäre. Ich wollte mit all dem Geſagten nur unſeren Aufſchwung in dem Gebiete der Hortulanie beurkunden, und durch die angeführten Beiſpiele zu demſelben noch ferner ermuntern. Ich geſtehe in eben dieſem Sinne mit Bedauern, daß es uns an einer Anſtalt mangelt, die ſogar in einem unſerer Nachbarſtaaten mit vielem Gedeihen betrieben wird, ich meine jene ſyſtematiſch-ſcientifiſche Pflanzſchule zur Bildung brauchbarer Gärtner. Doch ich hoffe, daß unſere für die ächte wiſſenſchaftliche Ausbildung ſo väterlich wohlwollend beſorgte Regierung auch dieſen Mangel bald ergänzen, und mit ihrer längſt anerkannten Vorliebe für alles Schöne, Edle und Gute, ein Inſtitut begründen werde, welches ſo ſehr geeignet ſein dürfte, das Glück ihrer Unterthanen, und das Vergnügen aller edlen Menſchenfreunde auf lange Zeit zu begründen.

Wien, 1833. **Jakob Klier.**

Tauſch-Anerbieten.

(Fortſetzung.)

Pelargonium:

Buls fin sedling
Browni
Brabant Duc de
Bentingkianum
Babo
Blücher
Boursault
Bergk van de
Beauté de Vere
Bergernianum
Belladonna grdfl.
Brabant Duch.
Brendel Lady
Berry Duch. de
Baiern König von
Boile
Blandine
Campe
caledonia
Caroline v. Baiern
capense
cartilagineum
— pulchellum
— praeclarum
— melancholie
— lilacinum
— speciosiss.
— cruentum
— ros.
— multiradiat.
Chamorrhodon
Chandler grdfl.
Chandlerianum
Charlotte Pss.
Cliffort Lady
Clinton Lady
cochleat. ros.
Colvilli
— pavon.
Cardinalis
Commandeur en chef
concolor maj.
— minus
coronatum
cruentum
— superbum
— lilacinum
Coulon
cucullat. hybr.
— maxim.
Chirideum
castum
Circassienne belle
conforme
calycinum
corruscans
Cambridge Duc.
charasophyll.
castaliaefol.
chamoldolian.
cotyledonis
corymbosum
Cupido
crassifol.
Callodon
coelestinum
Carolianum
Carolinaeum
chrysanthem. fol.
calocephalum
candidum
coarctatum
cephalorum
circumscriptum
compactum
candidissimum
Caroline Queen
crenulatum
Claudius Caesar
Davidianum
Diadema
ducomerianum
Dürer Albrecht
decipiens
dumonlianum
daucifolium
davaijanum
Dawson
Dawsoniae
Dawsonianum
defians
delectabile
Derby Lady
Dawerley
dubium
difforme
daomasticum
dilutum
decorum
desideratum
diaphanum
decoloratum
didymum
dobreanum
dilucidum
Darnley supb.
Duschl
daveanum
dependens
disganon
Dwernicki
Donna da gloria
deltoides
dummosum
diadematum
daseanum
dondiaefol.
dormatophyllum
Eriocaulon
echinatum
— formos.
euriophyllum
elegans
elegantissim.
Èlenore
Elites Lady
elichridium
Emelie Pss.
eximium
Essex
Eugen Prz.
erodium incarnat.
eminens
Etna mount
eriophotum
Empereur
eclipse
Elisabeth
exornat.
elat. nov.
Ernestine
Euprosopon
erubescens
expans.
England King of
Empyron
Emma
Excellens
electorale
elegans latifol.
epilophyllum
Ferdinandeam
Fleur des dames
fastuos.
Felderi
Faironia (ferraria)
flammeum
florid.
— maj.
foliaceum maj.
formosum
formosiss.
fragrans
fratern.
fulgid.
forcardian.
Fani fawk
Flora
floriss.
Fox Miss
flavum (daucifolium)
Franklin
Franzise imperat.
floccos.
flammula
Friederike
filosum
fenestrat.
flammos.
flexuos.
fürstian.

(Fortſetzung folgt).

Verſuche mit der Sommerlevkoje (Cheiranthus annuus), um gefülltblühende zu erhalten.

Mitgetheilt von Herrn G. A. Bluhm in Schweidnitz.

(Fortſetzung.)

Der dritte Verſuch betrifft den Ringſchnitt oder das Ringeln der Pflanze. Unter den im Gartenlande gepflanzten Levkojen wählte ich die kräftigſten von mehreren Farben aus, und beobachtete an denſelben die in dem erſten Verſuche angegebene Vorbereitung. — Um nun das Durchſchneiden der Epidermis mit Behutſamkeit und Leichtigkeit zu vollziehen, iſt die Beſchreibung eines hiezu gebrauchten unbedeutenden Inſtruments erforderlich. Man nimmt ein etwa 5 — 6 Linien breites und 4 Zoll langes oder auch etwas längeres, nicht zu leicht ſich biegendes Stück Meſſingblech, bohrt ganz am Ende deſſelben ein Loch, und erweitert daſſelbe mittelſt einer runden Feile, bis der Durchmeſſer deſſelben etwa 3 Linien beträgt. Hierauf ſchneidet man mit einer ſtarken Scheere das Blech an dem Punkte durch, der das Loch in zwei Halbkreiſe theilt. Der an dem Blechſtreife ſich nun befindende halbkreisförmige Ausſchnitt, (der den Stengel der Levkoje zur Hälfte zu umſchließen fähig ſein wird,) wird mit einer feinen Feile zum Einſchneiden ſcharf und tauglich gemacht, und das Blech etwa in zwei Linien Entfernung von dem halbkreisförmigen Ausſchnitte rechtwinklich umgeben.

Dies Inſtrument, oder vielmehr den ꝛc. Ausſchnitt legte ich nun an den Stengel zwiſchen den Blättern der Levkojen-Pflanze, und mittelſt eines mäßigen Druckes führte ich den Schnitt kreisförmig um denſelben. Dieſe Ringſchnitte hatte ich nach Gutdünken, zum Theil vom unterſten Blatte bis zur halben Höhe der Pflanze, und zwar 3 bis 4 derſelben gemacht. Bei einigen Pflanzen habe ich auch dieſen Ringſchnitt in der Nähe des Blüthenſtandes verſucht, nur mußte ich ſehr behutſam damit umgehen, und die Pflanze ſogleich an ein Stöckchen binden, weil der Wind dort den Stengel gewöhnlich zerbricht. — Der nun im Verlauf der Zeit auf dieſe Weiſe hinlänglich gewonnene Same keimte in dieſem Frühjahre ſehr gut. Zur gehörigen Zeit wurden 80 dieſer Zöglinge in ein Gartenbeet verpflanzt, und jetzt ſehe ich mit Verwunderung, daß unter dieſer angezeigten Zahl zweiundſechszig gefüllte Levkojen in ihrer Pracht blühen. —

(Beſchluß folgt.)

Varietäten.

Berlin. Bei der diesjährigen in dieſen Blättern ſchon mehrfach erwähnten Pflanzen-Ausſtellung den 23. Juni ſah man in der Mitte des Veſtibuli eine hohe Pyramide mit den ſchönſten und herrlichſten Blumen teraſſenartig bis zur Spitze beſetzt, aus deſſen Mitte ſich ein imponirendes Exemplar einer Kokospalme mit ſeinen Rieſenblättern wie ein Coloß über die andern Pflanzen erhob. Der Fuß der Pyramide war mit Reſeda-Töpfen eingefaßt, auf der Pyramide ſelbſt aber prangten Roſen, Balſaminen, Glockenblumen, Azaleen, Kalmien, Levcojen, Iberis umbellata mit den ſchönſten Abänderungen in roth, Gloxinia speciosa, Schizanthus pinnatus, ſehr ſchöne Hahnenkämme (Celosia christata), von welchen die ausgezeichneteſten von den Herren Kunſt- und Handelsgärtnern David Bouché und Limprecht eingeſendet waren, welcher letztere in ſeinem Garten an 1500 Töpfe mit dieſer Pflanze zum Verkauf vorräthig gehabt hat. Vor allen ausgezeichnet war aber die herrliche Flor von Pelargonien in mehrern hundert Töpfen von Herrn Braſch aus dem Garten von Bellevue. Jeder Beſchauer ſtand bewundernd bei dieſer ſchönen Pflanzengruppe, welche die Pyramide an der Lichtſeite von unten bis oben füllte. Die vorzüglichſten derſelben waren: Pel. Antonian., Anna Boulen, Belladonna, Belzoni, Bertoloni, Canaris, Capodistrias, Daphne, decorum, de Bourghae, Duc of Sussex, Duchesse de Wellington, Duch. St Albans, germanicum, Hogarth, Humboldtii, Humei, imperiale, Klierianum, Lady Mansfeld, Lord Byron, Megaleion, Miaulis, Mülleri, Navarina, Nimrod, nubilum, olympicum, (das herrlichſte von allen,) quinquevulnerum, Romulus, Russelianum, spectabile, elegans, tinctum, translucens, tricolor, triumph de Flora, Wielandi, Xanthum u. v. a.

Auch ſah man herrliche Calceolarien in vielen ausgezeichneten Exemplaren, als: C. robusta, thyrsiflora, fulva, polyantha, Mülleri, cuprea, angustifol., arachnoidea. tricol., bicolor, Thoungii, Alexandria, u. a., ſämmtlich aus dem botan. Garten.

Die ausgezeichnete Hyacinthenflor, welche in dieſer Jahreszeit gewiß zu den Seltenheiten gehört, war von dem Hrn. Hofgärtner Nietner in Monbijou eingeſandt, und von demſelben auf Eis gezogen worden. Die Zwiebeln waren im Herbſt in Töpfe gepflanzt, die Töpfe in einen Kaſten geſetzt, dieſe Kaſten luftdicht verſchloſſen und auf Eis geſtellt worden. Hier hatten ſie bis jetzt ruhig geſtanden, in welcher Zeit ſie ſich ausbildeten und Blüthenknoſpen bekamen, die dem Aufbrechen nahe waren. Sie blieben in dieſer Zeit ganz farbenlos, bekamen aber, da ſie wegen der herrannahenden Blumen-Ausſtellung herausgenommen wurden, in einigen (6 bis 14) Stunden ihre grüne Farbe und in einer Zeit von 36 Stunden hatten ſie ihre Blüthen entwickelt. Endlich verdient noch ein ſchöner Cactus speciosissimus mit 13 Blumen und mehrern Knoſpen erwähnt zu werden.

Berlin. Im Monat Juni blühte im königl. botan. Garten das ſo ſchöne und prächtige Crinum amabile Don. (superbum Roxb.) aus Oſtindien, unſtreitig eine der ſchönſten Arten, mit großen, roſenrothen, wohlriechenden Blumen, die zu vierzig in der einzigen Dolde ſtehen. Es wurde im Jahr 1810 in England eingeführt.

Gotha. Bericht des thüringer Gartenbau-Vereins. (Beſchluß.) Wenn auch dieſe Pflanzenausſtellung, bei deren geſchmackvoller Anordnung, außer den beiden Hofgärtnern Müller und Eulefeldt, dieſelben Mitglieder des Vereins thätig waren, welche ſchon in den vorigen Jahren dafür gewirkt hatten, durch keine jener koſtbaren botaniſchen Seltenheiten ſich auszeichnete, die in Berlin oder Wien die letzten Blumenausſtellungen zierten, wo bedeutendere Mittel der Gartenliebhaberei gewidmet ſind, ſo beurkundet dieſelbe doch, wie Garten- und Blumenpflege auch bei uns den örtlichen Verhältniſſen gemäß fortſchreiten, und der mit den Erzeugniſſen beider geſchmückte Saal mußte in dieſer Hinſicht ſowohl den Kenner befriedigen, als dem beſchauenden Blumenfreund einen gefälligen Anblick darbieten.

Der zeitherige Director des thüringer Gartenbauvereins, Graf von Saliſch, Oberhofmarſchall a. D., eröffnete die öffentliche Sitzung, an welcher 59 Mitglieder und ein zahlreiches Publikum Theil nahmen, durch eine Schilderung der Wirkſamkeit des Vereins im verfloſſenen Jahr. Sein Vortrag zeigte, wie der im Jahre 1830, nach Auflöſung des Gartenvereins in Dietendorf, von einer kleinen Anzahl Freunde des Gartenbaues zu Gotha gegründete Verein mit jedem Jahre mehr Theilnehmer gefunden habe und jetzt aus 22 Ehrenmitgliedern und 165 wirklichen Mitgliedern beſtehe, von denen jedes jährlich einen Thaler beiſteuere. Da dem Verein keine andern Mittel zu Gebote ſtänden, als die durch dieſe Einzahlung ſich bildenden, ſo verdiene das vermöge derſelben Geleiſtete alle Anerkennung. Die Wirkſamkeit der Geſellſchaft habe ſich hauptſächlich auf dreierlei Weiſe dargethan: erſtens ſei fortgefahren worden, durch mündliche und ſchriftliche Belehrung den Mitgliedern nützlich zu werden;

die zahlreich beſuchten Monatsverſammlungen, der alles Neue und Wiſſenswerthe im Fache des Gartenbaues darbietende Leſezirkel, ſo wie die Unterhaltung des Verkehrs mit andern der Beförderung des Gartenbaues gewidmeten Vereinen waren die Mittel zur Erreichung dieſes erſten Zweckes, wobei die erfreuliche Berückſichtigung, welche die Anfragen, ſo wie die Bitten um Edelreiſer, Sämereien und Pflanzen von Seiten des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den königl. preuß. Staaten ſtets gefunden haben, nicht ohne dankbare Erwähnung bleiben dürfe; — zweitens ſei die neu begründete Baumſchule in der doppelten Rückſicht fortgeführt worden, durch dieſelbe den Obſtbau zu verbeſſern und auf die Verſchönerung des Landes hinzuwirken; — und drittens habe ſich endlich der Verſuch, gute, als keimfähig geprüfte Sämereien zu erziehen und durch Vermittelung der Handlung J. C. Grimm in Gotha zu verbreiten, eines Erfolgs zu erfreuen gehabt, der bei ausgebreiteter Theilnahme von weſentlichem Nutzen für den Gartenbau Deutſchlands werden könne.

Nach einem Vortrag des Pfarrer Stetefeld in Holzhauſen, worin derſelbe ſchilderte, wie viel die Pflanzenkunde zur Erheiterung und Veredlung des Menſchen beitragen könne, und an welchen derſelbe den Wunſch knüpfte, die wiſſenſchaftliche Betrachtung des Pflanzenreichs möge immer mehr Freude finden — ſchloß der Direktor die Sitzung, indem er die vom Caſſirer geführte Jahresrechnung zur Einſicht den Mitgliedern vorlegte.

Gleichwie in den vorigen Jahren, ſo vereinigte ſich auch dieſesmal eine große Anzahl der Mitglieder und theilnehmenden Freunde zu einem Mittagsmahle im Gaſthof zur Stadt Coburg, bei welchem dem durchlauchtigſten Schutzherrn des Vereins, Ihrer Hoheit der verwittweten Frau Herzogin als außerordentlichem Ehrenmitgliede, das die heutigen Tafelfreunden durch ein Geſchenk zu erhöhen wußte, und andern hohen Gönnern manches frohe Lebehoch erſchallte.

Die Blumenausſtellung, welche ſich des Beſuchs Sr. Durchlaucht des regierenden Herzogs und der Durchlauchtigſten Prinzen, ſo wie Ihrer Hoheit der Frau Herzogin Caroline Amalie zu erfreuen hatte, blieb am Nachmittage und auch noch am folgenden Tage dem ſchauluſtigen Publikum geöffnet.

Wien, den 12. Mai 1833. (Fortſetzung). Der dritte Preis, enthaltend Frankoa appendiculata, Dianthus Balbisii, Nuttallia pedata, der ſeltenſten und gefälligſten europäiſchen Pflanze, mit beſonderer Rückſicht auf inländiſchen Urſprung aus der öſtreichiſchen Monarchie in ihrem ganzen Umfange beſtimmt, wurde der Ramondia pyrenaica vom Baron von Hügel zuerkannt.

Den vierten Preis, beſtehend aus: Fraxinus floribunda, Ribes aureum serotinum und sanguineum, der ſchönſten üppigſt blühenden europäiſchen Zierpflanze, welche im Freien ausdauert, beſtimmt, erlangte Trollius europaeus var. belgicus von Herrn Held überſendet.

Den fünften Preis, a) beſtehend aus den Pelargonien: diadematum coccineum, regium und rubro-fuscum der ſchönſten Pflanze aus der Familie der Geraniaceae, inländiſchen Urſprunges, mit Rückſicht auf Seltenheit, erhielt: ein Pelargonium (Sämling), geſendet von Hrn. Joh. Grohmann.

Der fünfte Preis, b) beſtehend aus den Pelargonien: agnatum, Antonianum speciosum und Mathildinae für die ſchönſte Pflanze aus der Familie der Geraniaceae, ausländiſchen Urſprunges mit Rückſicht auf Seltenheit, beſtimmt, wurde dem Pelargonium schizopetalum aus dem Garten S. kaiſerl. Hoheit des Erzherzogs Anton zuerkannt.

Den ſechſten Preis, beſtehend aus Rhododendron arboreum Smithii der beſtkultivirten blühenden Pflanze aus der Familie der Rhodoraceae als: Rhododendron und Azalea, oder Kalmia, beſtimmt, erlangte Rhododendron arboreum, aus dem Garten S. kaiſerl. Hoheit des Herrn Erzherzogs Anton.

Acceſſit: Rhododendron catawbiense des Handelsgärtners Held; Azalea nudiflora mixta triumphans und Kalmia glauca, beide von Herrn Baron von Hügel. (Fortſetzung folgt).

Ueber die diesjährige Roſenflor bei Hrn. Keller. (Auszug aus einem Schreiben von Duisburg am Rhein). Die außergewöhnlich trockne und warme Witterung des Monats Mai hatte auf die diesjährige, 14 Tage früher wie ſonſt erſchienene Roſenflor einen beſonders wohlthätigen Einfluß, den man nicht erwartete. Noch nie ſah man die ſehr ſtark gefüllten Roſen, die ſich oft nur ſehr ſchwer und unvollkommen öffnen, ſo prachtvoll aufblühen, als in dieſem Jahre; beſonders vollkommen erſchienen die große, neue, weiße, roſenroth bordirte und die längſt bekannte große, gefüllte, gelbe. Ausgezeichnet vor allen Roſen des freien Landes zeigten ſich die vielen neuen bengaliſchen Hybriden vom reinſten Weiß bis zum ſchwärzeſten Purpur in allen Farbenmiſchungen und den ſchönſten gefüllten Formen. Dieſe erſt in den letzten Jahren entſtandenen ſchönen Varietäten haben, im Vergleich mit den Provinzroſen (rosa gallica), noch den beſondern Vorzug, daß ihre Farbe und Füllung ſtets dieſelbe bleibt, und nicht ſo ſehr von der Witterung abhängig iſt. Ganz ſonderbar und nichts weniger wie ſchön geſtalteten ſich in dieſem Jahre mehrere, ſonſt als ſchöne und gefüllt blühend bekannte Provinzroſen, einige faſt ganz dunkle, ſtarkgefüllte blühten hellpurpur oder dunkelroſa, halbgefüllt, und waren in Form und Farbe nicht zu erkennen. Man wandte auf dieſe und eine Menge anderer, ſogar auf die Centifolia cristata, deren noch nicht aufgebrochene Knospe bewundernswerth iſt, die künſtliche Beſtaubung an, und noch nie ſah man die Roſen eine ſolche Menge Früchte tragen als jetzt. Zu den ſonderbarſten Spielen der Natur gehört wohl die neue Moosroſe mit mooſigen Blättern, Zweigen und Knospen, deren hochſtämmige kräftige Exemplare von Jedem bewundert wurden. Aus einem ſtarkbemoosten Zweige dieſer ſonderbaren Roſe bildete ſich kürzlich ein neues Naturſpiel; es erſchien ein kleiner Zweig ohne Moos, mit Blättern und Blumen ganz der gemeinen Centifolie gleich.

Bollweiler. (Beſchluß.) Verzeichniß der Camellien, welche in den Gärten der Herren Gebrüder Baumann daſelbſt kultivirt werden:

Camellia
colla
conchifl. nova
elegantissima
electa
comptoniana
reticulata
Augusta nova
ignescens
Berleziana
Hovea
ardens superb.
Reevesi
waratah var.
Weimaria
Agloe
nov. du calvert
Fionia

Camellia
gloria belgica
conspicua
Scarlet waratah
Almets superb.
gloriosa
punctat. simpl.
spolofera
amplissim. spl.
waratah vera
alba lutescente
marmorata
single White Striped
Augusta (Deroi)
salicifolia
vennsta
formosa

Camellia
Lambertii
Sinica
Blakburniana
Chitonia
palmerii rubr.
— alba
nepalensis
Picoti-waratah
Grays nova
Amerschia
plumaria
Broksii
Abisters Picoti
ardens
Kermesiana war.
anemoneflora
wart-carnea

Camellia
Knigtii warat.
splendida
Pomponia spl.
warat.-carn. ros.
limbata
celsiana
Swetii
coronata rosea
— rubra
Pink-waratah
Theresiana
dahliaeflora
Impehaie de Bresil
waratah purpurascens
atropurp. nov.

In dem Garten der Lady Stavelton in Gray's Court, Henley on Thames ſteht eine Paeonia Moutan, die vor ungefähr 14 Jahren aus einem kleinen Topfe in die freie Erde verpflanzt war, und nach einer im Mai 1832 vorgenommenen Meſſung 5½ Fuß Höhe und 27 Fuß Umfang hatte, und 230 Blüthen trug, deren jede 6 Zoll Durchmeſſer hatte.

(Hohes Alter eines Cactus.) Im Pflanzengarten zu Paris wurde im Jahre 1700 ein Cactus peruvianus als eine Pflanze von 4 Zoll Höhe und 2 Zoll Durchmeſſer gepflanzt; im Jahre 1717 war dieſer Cactus, trotz einer abſichtlichen Verſtümmelung an ſeinem Gipfel ſchon 23 Fuß hoch, und macht noch gegenwärtig, 40 Fuß hoch, eine Merkwürdigkeit des Gartens aus.

Hierbei eine Beilage: Nr. 12 der gemeinnützigen Mittheilungen über Weinbau ꝛc.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto-Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. XVI. Weißenſee, (in Thüringen). Auguſt 1833. VI. Jahrg.

Beſchreibung und Cultur einiger ausgezeichneten neuern Zierpflanzen.

(Mitgetheilt vom Herzogl. Hofgärtner Herrn J. W. Boſſe in Oldenburg.)

(Fortſetzung.)

4) Thunbergia grandiflora. Roxb. Großblumige Thunbergie, aus Bengalen. ♄. Eine ſehr ſchöne Species, welche ihre großen, prächtigen Blumen im Mai und Juni hervorbringt. Der Stengel rund, windend, etwas ſcharf. Die Blätter entgegengeſetzt, herzförmig, nach der Baſis zu mehr oder minder eckig, ſchärflich-feinhaarig, langgeſpitzt, 2 — 3 Zoll lang, theils ganzrandig, theils etwas ausgeſchweift gezähnt. Die Blumenſtiele einzeln, winkelſtändig, aufrecht, vielblumig. Der innere Kelch fehlt. Die Corolle am Rande 3 Zoll breit, mit hellblauen, verkehrt-eirunden, ſtumpfen Einſchnitten, wovon der untere am Grunde dunkler blau iſt. Die Antheren gebartet, geſpornt. — Sie wird im März oder April umgepflanzt, in Lauberde, die mit etwas Sand gemiſcht iſt in einen warmen Lohkaſten, und wenn ſie ſtark iſt, oder blühet, ins Warmhaus geſtellt, woſelbſt man ſie auch bei mäßiger Befeuchtung durchwintert. Während der warmen Jahreszeit lieben die Thunbergien viele Luft und reinlich Waſſer, auch bei heißer Sonne Schatten; einige Arten kann man im Juli und Auguſt ins Glashaus ſtellen, und Thunbergia alata und fragrans auch im Juni auf eine warme Rabatte ins Freie pflanzen. Dieſe Art wird leicht durch Stecklinge vermehrt. — Sie iſt bei mir für 1 Thlr. 8 gGr. zu haben. (Fortſetzung folgt).

Bemerkung über das Düngen der Topfgewächſe mit Knochenmehl.

(Mitgetheilt vom Herrn Candid. Böttner in Heiligenſtadt.)

Das ſo viel beſprochene und allgemein empfohlene „Düngen mit Knochenmehl" mag am rechten Orte und zur rechten Zeit wohl empfehlungswerth ſein, jedoch nicht unbedingt bei Topfgewächſen, wovon mich die Erfahrung überzeugt hat.

Da in dieſen Blättern nur Hr. Hofgärtner Mootz in Weimar (ſ. Blumenztg. Jahrg. V. Nr. XVI) eine kurze Bemerkung hierüber gegeben hat, der ich vollkommen beiſtimme, ſo erlaube ich mir aus meiner Erfahrung Folgendes mitzutheilen.

Im März miſchte ich der Erde, welche ich zum Umſetzen der Topfgewächſe brauchen wollte, 1/8 friſches Knochenmehl bei, und gab dieſe Miſchung den Pflanzen, welchen ich ſie für zuträglich hielt und die ich dem Verſuche unterwerfen wollte. Nach drei Tagen entſtand auf der Oberfläche der Erde Schimmel. Sogleich lockerte ich dieſe behutſam auf und wiederholte dies alle drei Tage. Hierdurch bewirkte ich wenigſtens, daß der Schimmel auf der Oberfläche vertrocknete und die Erde etwas Waſſer annahm. Bei den Töpfen aber, die ich abſichtlich nicht auflockerte, war der Schimmel nach 9 Tagen einen Zoll hoch, die Erde trocknete ſehr langſam aus und nahm faſt gar kein Waſſer auf. Mehre ausgeſchüttete Töpfe zeigten, daß auch das Innere ganz weiß, vom Schimmel durchdrungen war, ſie verbreiteten einen ſtarken Modergeruch, und die Erde hielt ſehr feſt zuſammen. Einen Theil dieſer Pflanzen erhielt ich nur durch die größte Sorgfalt und fleißiges Lüften; an mehrern faulten aber die Wurzeln und ſie ſtarben. Auch beſondern Einfluß auf die Vegetation habe ich bis jetzt noch nicht bemerkt. Alle dieſe Erſcheinungen waren ſehr natürlich und fielen mir nicht auf, denn die in den Knochen enthaltene Gallerte, ſowie die fettigen Theile, müſſen Schimmel und Moder, beſonders im eingeſchloſſenen, feuchten Raume, erzeugen, die lockern Erdtheile binden und das Eindringen — ſowohl der Luft, als auch des Waſſers — verhindern. Auf die Vegetation konnte es auch keinen Einfluß üben, da das Knochenmehl im Topfe ruhig liegt, nicht zerſetzt wird und ſich die Nahrungstheilchen wegen ihrer Flüſſigkeit durch das bloſe Gießen der Erde nicht beimiſchen können. Es ziehen alſo nur diejenigen Wurzeln einige Nahrung, welche die Knochen-Stückchen unmittelbar berühren. Deswegen hat der ſo erfahrne Hr. Hofgärtner Mootz vollkommen recht, wenn er das Knochenmehl in friſchem Zuſtande bei Topfpflanzen nicht empfiehlt, aber ſagt: „daß es ſehr gute Wirkung habe, wenn es der Topferde beigemiſcht, welche erſt nach drei oder vier Jahren beim Umſetzen der Topfpflanzen gebraucht wird." Jeder Erdhaufen wird doch jährlich einige Male umgeworfen; hierdurch, ſowie durch die Luft und das Faulen, löſ't ſich die Gallerte von dem Knochen, ſie zerfallen und der Nahrungsſtoff durchdringt die Erde.

So hat auch Hr. Hofgärtner Mootz vollkommen recht, wenn er ſagt: „das friſche Knochenmehl, bei Cacten angewendet, diene dazu, das Waſſer abzuleiten.“ Das Knochenmehl hält vermöge ſeiner Fettigkeit das Eindringen des Waſſers zurück, dieſes zieht ſich dann größtentheils zwiſchen dem Topfe und der Erde durch, berührt blos die Wurzeln, welche am Topfe anliegen und giebt ihnen einige Feuchtigkeit. Zu empfehlen möchte es aber dennoch nicht unbedingt ſein, weil es das ſchnelle Austrocknen des untern Topfraumes verhindert und ſomit Moder und Fäulniß der Wurzeln hervorbringt. Auch möchte das Knochenmehl, wenn es durch Fäulniß aufgelöſ't iſt, den Cacten zu viel Nahrungsſtoff, dabei aber keine lockere Erde, verleihen, was wir doch vorzüglich berückſichtigen müſſen. Denn ſowie bei allen Gewächſen, ſo auch bei den Cacten müſſen wir uns ſo viel als möglich dem natürlichen Stande und der natürlichen Erde ihrer Heimath zu nähern ſuchen. Nun wiſſen wir aber, daß die Cacten in ihrer Heimath eine lockere, nicht allzu fette Erde haben und größtentheils auf Bergen oder Felſen wachſen, wo ſich die Feuchtigkeit nicht allzu lange hält. (Wir brauchen nur unſere Pflanzen der Art, welche auf Bergen und Felſen wachſen, als Beiſpiel zu nehmen. Auf der Oberfläche bildet ſich eine leichte, lockere und wegen der verfaulten Vegetabilien ziemlich fruchtbare Erde, worin dieſe Pflanzen wurzeln, nicht aber in die feſtere und unfruchtbare Unterlage eindringen. Wenn nun ein naſſer Sommer eintritt, ſo grünen und blühen die Pflanzen an den Bergen ſchön; wenn im Gegentheile der Sommer trocken iſt, ſo ſtehen auch ſie ſchlecht. Jenes kömmt nun nicht von der fortwährenden Näſſe, in welcher ſie ſtehen, (denn dann könnten wir ſie ja in ein naſſes Thal verpflanzen, wo ſie aber faulen würden), ſondern von der hinlänglichen Feuchtigkeit, die ſie erhalten. Die Erde an den Bergen nimmt nicht mehr Feuchtigkeit an, als ſie einſaugen kann, die übrige läuft ab, und die lockere Oberfläche trocknet ſchnell wieder aus). So bei uns, ſo in der Heimath der Cacten. Ferner müſſen wir den Wurzelbau der Cacten berückſichtigen. Dieſe haben faſt alle an den Wurzeln feine, wollenartige Härchen, womit ſie ſich gleichſam an die Erde ankleben. Iſt nun die Erde feſt, ſo hält ſie nicht allein zu viele Feuchtigkeit, wodurch dieſe feinen Würzelchen faulen, ſondern ſie werden auch zuſammengedrückt und können ſich nicht gehörig ausbreiten. Endlich haben wir noch die Beſtandtheile der Steinarten ins Auge zu faſſen. Hier finden wir, daß viele reine Kalkfelſen ſind, oder doch Kalktheile enthalten. Hieraus ergiebt ſich für uns das Geſetz, daß wir den Cacten eine lockere, nicht zu magere, aber auch nicht zu fette, mit den nöthigen Kalk- und Sandtheilen vermiſchte Erde und nicht zu viel, auch nicht zu wenig Feuchtigkeit geben. Durch dieſes Geſetz beſtimmt, gebe ich meinen Cacten eine Erde, beſtehend aus einem Theile fetter, alter, gut verrodeter Miſtbeet-, einem Theile Lauberde, einem Theile klaren Flußſande und 1/2 Theile zerſtoßenen Spar- oder Gypskalk von einer verwitterten, alten Mauer, und gieße Winter und

Sommer regelmäßig, wenn die Erde gehörig ausgetrocknet iſt. In dieſer Erde befinden ſich meine Cacten ſehr gut, wachſen kräftig und gewähren durch ihr friſches Grün einen erfreulichen Anblick. In dieſer ſehr ſchnell austrocknenden Erde iſt mir noch nie ein Exemplar verfault, was wohl der Fall war bei ſolchen, die ich in Töpfen erhielt, welche mit einer feſten, fetten, mit feinem Sande vermiſchten Erde angefüllt waren, und die ich nicht in meine Erdmiſchung verſetzte. Dieſelbe Erdmiſchung wird auch ſeit einigen Jahren in einem botaniſchen Garten angewendet, wo die Cacten ſehr ſchön ſtehen, die früher kränklich ausſahen. Bei einem andern Blumenfreunde fand ich die Cacten ebenfalls ſehr ſchön, weil das Waſſer, womit ſie begoſſen werden, Kalktheile enthält. In zu magerer Erde und bei zu kärglichem Gießen ſtehen die Cacten, ſo wie alle Gewächſe, ſtets kümmerlich und geben ſchlechte Blumen.

Dieſe Behandlungsweiſe ſcheint jedoch Cactus op. ficus indica nicht zu verlangen, denn ich fand ein großes kräftiges Exemplar in einem großen, mit ſchwerer, fetter Garten-Erde angefülltem Topfe, welches 30 bis 40 Blüthen hatte, und ein anderes im freien Lande, in ſchwerem Boden, welches ebenfalls viele Blüthen trug.

Cultur der Georginen

bei J. Booth und Söhne, Beſitzer der Flottbecker Baumſchulen bei Altona.

Eine vollkommene Flor zu erzielen, d. h. von jeder einzelnen Sorte, möge ſie eine Blume des erſten oder zweiten Ranges ſein, den möglichſt größten Blumenertrag, welche dieſe Sorte ihrer Art nach hervorzubringen im Stande iſt, zu gewinnen, bediene man ſich folgendes Verfahrens. —

Der Boden darf nicht erſt zur Zeit des Pflanzens der Knollen oder kurz vorher durch Dünger zubereitet werden, weil alle ſtarken Reizmittel dieſer Art, nachtheilig wirkend, einen außerordentlichen Wachsthum der Georginen verurſachen, die Ausbildung einer Maſſe von Blättern und Zweigen befördern, und dadurch wenige, und dies in der Regel verſpätete Blumen zwiſchen den Blättern hervorbringen.

Da aber nicht jedes Terrain, wo eine Georginen-Anlage wünſchenswerth erſcheint, den geeigneten Boden darbietet, und die gänzliche Umwandlung des Bodens eines ſolchen Flächenraums mit vieler Mühe und Koſtenaufwand verknüpft ſein würde, ſo kann man ſich die Arbeit dadurch ſehr erleichtern, daß man Löcher 1½ Fuß tief, 1¼ Fuß breit, und 4½ Fuß nach allen Seiten von einander entfernt macht, dieſe mit einer Miſchung von 2 Drittheil guter Gartenerde und 1 Drittheil reinem Flußſand anfüllt, und darin die Knollen ſo tief pflanzt, daß ſie ungefähr 1 Zoll mit Erde bedeckt werden. Die beſte Zeit zum Pflanzen der Knollen iſt die letzte Hälfte des April oder Anfangs Mai. Durch das frühere Pflanzen der Knollen glaubt Mancher ſich eine zeitige Flor zu verſchaffen; dem iſt aber nicht ſo; meiſt wird eine Verſpätung derſelben die Folge ſein, indem die ſo zeitig gelegten Knollen den ganzen Einfluß des kalten und feuchten Erdreichs empfinden, dadurch wie erſtarrt werden, und in der Regel einige Wochen ins Stocken gerathen oder auch erkranken. In den Flottbecker Gärten bewährt ſich das Geſagte vollkommen.

Nachdem die angewurzelten Knollen anfangen Triebe zu machen, müſſen alle dieſe bis auf einen, und zwar den kräftigſten Trieb, abgebrochen werden, und muß man damit fortfahren, ſo lange ſolche Auswüchſe aus der Knolle ſich wiederholen. Dieſer eine Trieb, an einen Blumenſtab gebunden, bildet ſich zum Stamm, und macht allein die ganze Pflanze aus, die alsdann eine regelmäßige gefällige Form bekömmt, und die Blumen in großer Menge und Vollkommenheit entwickelt. Eine auf dieſe Weiſe gezogene Pflanze bringt wenigſtens einen zur Hälfte größeren Blumenertrag, als dieſelbe Sorte, der man alle Triebe aus der Knolle gelaſſen hat. Blumen, die im Verblühen oder Verwelken begriffen ſind, müſſen abgeſchnitten werden. Endlich ſei Jedem der Rath ertheilt, ſich die Mühe eines Verſuchs zu erſparen, Georginen dort mit Erfolg kultiviren zu wollen, wo ſie beſchattet werden, oder im Schatten großer Bäume ſtehen müſſen. Eine vollkommene Flor bedingt zum Voraus einen Standort, wo die Pflanzen den ganzen Tag die Strahlen der Sonne genießen können. So nachtheilig auch eine, den heftigen Stürmen ausgeſetzte Lage iſt, ſo begünſtigt doch ein freier Luftzug, vorausgeſetzt, daß in einiger Entfernung hinreichender Schutz vorhanden iſt, Windſtöße abzuwehren, das gute Gedeihen der Georginen. Die Feuchtigkeit und die dumpfe Luft, die im Spätſommer und im Herbſte, durch die Nebel dieſer Jahreszeit auf die blattreichen Georginen Stauden täglich wirken, können nur durch freien Luftzug abgetrocknet werden.

Verſuche mit der Sommerlevkoje (Cheiranthus annuus), um gefülltblühende zu erhalten.

(Beſchluß.)

Dies Ergebniß meiner Bemühung habe ich den verehrlichen Blumenliebhabern hiermit freundlichſt mitzutheilen nicht unterlaſſen wollen. Zwar hätte ich erſt nach mehrjährig angeſtellten Verſuchen, die Bewährtheit dieſer Methode prüfend, zu deren Mittheilung mich entſchließen ſollen; allein das bedeutend prädominirende Zahlenverhältniß der erhaltenen gefüllten Levkoien läßt mich faſt mit völliger Zuverſicht erwarten, daß dieſer Umſtand nicht einem bloſen Zufalle zugeſchrieben werden dürfte.

Ohne Zweifel werden hierdurch mehrere Blumenfreunde veranlaßt werden, mit dieſer Methode ebenfalls Verſuche anzuſtellen, und es würde mich außerordentlich freuen, wenn glückliche Reſultate meine Erfahrung beſtätigten.

Nachträglich käme es nur noch darauf an, auszumitteln, ob:

1) ein einmaliger Ringſchnitt zur Erlangung des beabſichtigten Zweckes ſchon hinreichend ſei?
2) ob derſelbe in der Wurzelnähe oder in der Mitte der Pflanze geſchehen müſſe? und
3) wie viel Samenſchoten man der Pflanze überlaſſen müſſe?

Auch würden Verſuche mit andern Species dieſes Pflanzengeſchlechts, als: Cheiranthus Cheiri, — tricuspidatus, — fenestralis, — odoratissimus, — Chius, — mutabilis etc. der Sache noch ein größeres Intereſſe geben. Wenn ſich dieſe Levkojen-Metamorphoſe durch das angeführte Verfahren beſtätigen ſollte, ſo ſcheint die Erklärung dieſes Phänomens eine ſchwierige Aufgabe zu ſein. Ob nun die Epidermis der Baſt- oder anderer Gefäße mit den Zeugungs-Organen in genauer Verbindung ſtehen, ſo daß bei deren Verletzung dieſe Verwandlung der Genitalien in Blumenblättern oder die Kaſtration ſchon unſichtbar bewirken? muß dem Urtheile der Phyſiologen überlaſſen bleiben.

Schweidnitz, im Juli 1833. **G. A. Bluhm.**

Tauſch-Anerbieten des Herrn Collegien-Raths v. Gemünden zu München.

(Fortſetzung in Nr. 14.)

Pelargonium:

Canedy
Calabres Duc de
carbonatum
Czerninianum
conivens
Constant Benj.
Coburgia pulcher.
calographicum
coriaceum
calophyllum
Columbus
Compson
coilophyllum
cucurbitaceum
Chlopeki
cuneiflor.
Cambermer Lord
Coburgianum
carnescens
Ceres
crassifol. maj.
colorat. max.
candoleanum
Cyrillis
conclausum
Comptonia
— striatum

Caroline Auguste
Coburg. obscurat.
Corymbe
comptum
la Fayette
Foy General
Fürstembergianum
fusciflorum
Friedrich d. Gr.
fuscatum
franzisceum
flaccidum
filipendulifol.
Friedericum
Fornborougk Lord
grinanum
gloria (theldest)
Georgina
la Grandeur
Gruberianum
Gardneria
gemellum
George royal
gibbosum
glaciale
glaucum

glaucophyllum
gloriosum
— grandifl.
Gloucester Duc
le Grand
grandiflor.
grandeur superb.
graveolens
gangrenosum
— lobatum
— lineatum
generalissimus
Geislerianum
gloria mundi
gruinale
Grand George
Gellert
geralicinum
Gower Lord
Gustav Adolf
grandidentat. grandiflor.
George King
gruinale platipetalum
graciflorum
grandis
de l'Hére
Hastings Marq.
Hume Lady

homophyllum
— ros.
— lilacin.
Hellenium
— min.
— nov.
Hermannaefol.
Hemsiva
Hogart
hortensiflora
hortensioides
Hussai Marie
hussayanum
humile
— fol. var.
heraldicum
Honneur de Ceerne
— de Bern
— d'Ahremberg
Henriette sa belle
hirtum
Hamersliae
holosericeum
hesperideum
Herder
hymenopterum
Hans Sachs
Hillarion.

(Fortſetzung folgt).

Syſtematiſche Namen der merkwürdigſten Pflanzen-Gattungen und Arten, ihr Genitiv ꝛc.

Mitgetheilt von L. aus T.

(Fortſetzung).

Alyssum. L. i neutr. **Alyſſenkraut.**

ἄλυσσον (Diosc. III. 105; Plin. XXIV. 11.) vom ἀ priv. und λύσσα, Tollwurm der Hunde unter der Zunge. Sie ſoll ſonſt wider den Biß toller Hunde gebraucht worden ſein.

Amanita. Haller. **Wulſtpilz.**

Er wächſt vorzüglich auf dem Berge Amanus, zwiſchen Cilizien und Syrien; daher nannten ihn die Griechen ἀμανίτης.

Amarantus (nicht Amaranthus) L. i masc. **Amarant, Fuchsſchwanz, Blume der Liebhaber, Floramor, (abusive Flormor).**

ἀμάραντος (Plin. 21. 8.) vom ἀ priv. und μαραίνω, ich verwelke, alſo eine unverwelkliche Blume. Irriger Weiſe haben Einige dies Wort von Amor, die Liebe, und ἄνθος, die Blume, abgeleitet, und daher die Pflanze auch flos amoris genannt, wonach ſich die hierauf Beziehung habenden deutſchen Namen erklären laſſen. Von der Form der herabhängenden Blumentrauben iſt die Benennung Fuchsſchwanz hergenommen. Am. tricolor. L., der dreifarbige Amarant, heißt Tauſendſchön und auch Pfauenfeder, weil die lanzettförmigen, zugeſpitzten, dunkelgrünen Blätter in ihrer Mitte auf der Oberfläche einen grünlich-blauen, gelben und rothen Fleck haben, der dem ſchönen regenbogenfarbigen Auge auf der Schwanzfeder des Pfauen gleicht; ſowie denn auch die aufrechten rothen Blumenähren, welche den Stengel umfaſſen, in Verbindung mit den ſchönen Blättern, dem Ganzen ein prachtvolles Anſehen gewähren. (Fortſetzung folgt).

Varietäten.

Im königl. botaniſchen Garten zu Berlin blühten im vergangnen Frühjahre folgende 3 Prachtpflanzen in ausgezeichnet großen Exemplaren: Paeonia Moutan var. rosea mit einigen 60 Blumen, eine herrliche Magnolia obovata aus China, dicht mit großen, ſchönen, rothweißen Blumen beſetzt, und Sterculia Balanghas L. aus Oſtindien, mit äußerſt zahlreichen Blüthentrauben.

Aus der Fülle blühender Pflanzen, welche die warme Witterung des Monat Mai im königl. botan. Garten ſchnell zur Blüthe gebracht hatte, verdienen folgende genannt zu werden: Aloe acuminata Haw. — A. plicatilis Mill. — Gasteria brevifol. Haw. — G. obtusifol. Salm. — G. subnigricans Haw. — G. lingua Willd. — G. subverrucosa Salm. — Crinum asiatic. L. — Nematostigma peniculatum Dietr. — (Renealmia panicul. R. Br.) — Pimelia incana R. Br. — Conobaea alata Lehm. — Trientalis americana Pursh. — Syringa Josicaea Jacq. — Selago Ohlendorfii Lehm. — Sinningia velutina Lindl. — Pentstemon procera Don. — P. glandulosa Don. — P. ovata Don. — Sprengelia incarnat. Smith. — Melocactus pyramidalis Lk. et O. — Echinocact. Sellowii Lk. et O. — E. acuatus Lk. et O. — E. corynodes Nob. — Cereus denudatus Lk. et O. — C. Ackermanni Haw. — Melaleuca rotundifol. R. Br. — M. diosmaefol. Andr. — M. lanceolata Nob. — Platylobium lanceolat. R. Br. — Crotolaria elegans — Polygala obcordata Hort. angl. — P. attennata Lodd. — P. speciosa Hort. angl. — P. cordifol. Thunb. — P. latifol. Ker. — P. umbellata Thunb. — Pennea mucronat. L. — Hibbertia saligna R. Br. — H. linearis R. Br. — Anemone Hudsonia Rich.

Wien, den 12. Mai 1833. (Fortſetzung.) Die diesjährige ſiebente Pflanzen-Ausſtellung beſteht aus 1025 Pflanzen, die ſämmtlich nach den in dem hierüber erſchienenen gedruckten Verzeichniſſe enthaltenen Namen erſichtlich gemacht werden, und wurden geſendet aus dem k. k. Hofpflanzengarten zu Schönbrunn, aus den Gärten ihrer kaiſerl. Hoheiten der Erzherzoge Carl und Anton, der HH. Fürſten von Metternich und Schwarzenberg, der Freiherren Carl v. Hügel, von Arnſtein und v. Pronay, der Grafen Cſaky und Dietrichſtein, der HH. Angelotti, Graber, Frühauf, Held, Klier, Mayer, Fritz, Grohmann und Kolb, Wirthſchaftsbeſitzer von Neudorf.

Aus dem gräfl. Dietrichſteiniſchen Garten am Rennwege ſendete der Gärtner, Hr. J. Jeſcheck, welcher vorzüglich wegen Erzeugung neuer und ſchöner Georginen, Roſen und Pelargonien aus Samen ehrenvoll bekannt iſt, von welchen die erwähnten, nebſt noch andern Gattungen gut kultivirten, in Vermehrung befindlichen Pflanzen um die beſtehenden Catalogs-Preiſe abgegeben werden, nachbenannte Pflanzen zur gegenwärtigen Blumen-Ausſtellung: Paeonia arborea, arborea semiplena (ein Sämling von arborea), Azalea liliflora (indica alba), Rosa Banksiae lutea, Campylia splendens (ein Sämling von 1829, zum erſten Male in der Blüthe), Campylia carinata, Loddigesia oxalidifolia, Cussonia tyrsiflora, Calceolaria Hebertiana, Edwardsia grandiflora; Acacia elliptica, Fabricia laevigata.

Vom Hrn. Franz Kolb ſind aufgeſtellt: Lechenaultia formosa, Phlox pilosa, Fuchsia microphylla, Erica laevis, Rosa Caroline Imperiale, Grandvillei, semperflorens centifol., Thea lilacina, Pelargonium Antonii, Caliston, clarissimum, Davidianum, hetrotrichum roseum, Labrusa, maculatum, decoratum, Marie, Mildeanum, Münnichianum, sessile, Waldstättenianum.

Aus dem Garten des Handelsgärtners Herrn Joſeph Held wurden nachfolgende Pflanzen geſendet: Pommaderris tomentosa, Melaleuca hypericifolia alba, Eugenia australis, Pittosporum ferrugineum, Casuarina stricta, Jasminum revolutum, Melaleuca foliosa, Ficus elastica.

(Fortſetzung folgt.)

Bollweiler. (Fortſetzung des im Extrabl. zu Nro. 13 befindlichen Verzeichniſſes.) Camellien-Sammlung, welche für 1833 nach der Wahl der Gebrüder Baumann zu Bollweiler zu veräußern iſt.

Cam. jap. hybr. plenissima
— jap. hbr. variegat. pl.
— — — vennsta
— — — Walluerii (rosa chin.)
— — — Watzoniana
— — — Wilbrohamia
— — — Wiltonia
— — — Youngii, Young's red
— — Pomponia
— — — alba variabilis
— — — Charlemagne

C. jap. Pompon. De Candollii gallica alba
— — — French white
— — — Kew-blush
— — — pearle
— — — Palmerii alba
— — — — rosea
— — — — rubra
— — — paeoniflora
— — — — rosea
— — — Parmentierii nive
— — — semi pl. (Fortſ. f.)

Die Fortpflanzung und Vermehrung der einjährigen Gewächſe durch Stecklinge iſt eine eben ſo alte, als allgemein verbreitete und bekannte Thatſache. Man bedient ſich dieſer Vermehrungs-Methode bei unzähligen baum-, ſtrauch-, und krautartigen Pflanzen mit dem beſten Erfolge, und doch kam man erſt in neuerer Zeit auf die Idee oder vielmehr auf die glückliche Ausführung der Idee, auch einjährige Pflanzen auf dieſe Weiſe zu ziehen und zu vervielfältigen. Ein Hr. G. J. T. erklärt, in einem der neueſten Hefte des Horticultural-Register, daß es ihm gelungen ſei, viele der beſten einjährigen Gewächſe durch Stecklinge fortzupflanzen, und macht dabei auf die Vortheile aufmerkſam, welche für die Blumengärtnerei aus dieſer Methode erwachſen dürften. Die Hauptvortheile ſind, daß man im Herbſte Stecklinge machen kann, welche weit leichter und ſicherer zu überwintern ſind, als junge Samenpflanzen, und daß die Bluthezeit der Gewächſe dadurch auf eine für den Gärtner äußerſt wichtige und ſchätzenswerthe Weiſe verändert wird. Um nur ein Paar Beiſpiele anzuführen, ſo machte Hr. T. im September mehre Stecklinge von Balſaminen und der ſchönen Coreopsis tinctoria, welche er in einem Ananas-Beete, in welchem die Temperatur den Winter über nur auf 5 — 8° R. erhalten wurde, überwinterte, und erhielt auf dieſe Weiſe bereits Anfangs Mai die ſchönſten Balſaminen und üppige Stöcke von Coreopsis, deren Blüthen, die uns ſonſt nur im Herbſte erfreuen, die Größe eines Thalers hatten. Herr T. vermuthet überdies aus einigen Erfahrungen, die er machte, daß die durch Stecklinge fortgepflanzten einjährigen Gewächſe weit weniger gegen Kälte empfindlich ſind, als die durch Samen erzogenen. Seltene einjährige Pflanzen, welche in den Gärten oft ſehr ſpät zur Blüthe kommen und daher ſelten Samen zur Reife bringen, verlieren ſich leider ſehr oft ganz aus unſern Gärten. In ſolchen Fällen dürfte die Fortpflanzung durch Stecklinge gewiß die beſten, für botaniſche Gärten beſonders ſehr ſchätzenswerthe Reſultate gewähren.

(Repertory of Patent-Inventions).

(Hierbei das Titelblatt zur Blumenzeitung 1833.)

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt=Aemter, Zeitungs=Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto=Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen=Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. XVII. Weißenſee, (in Thüringen). Auguſt 1833. VI. Jahrg.

Beſchreibung und Cultur einiger ausgezeichneten neuern Zierpflanzen.

(Mitgetheilt vom Herzogl. Hofgärtner Herrn J. W. Boſſe in Oldenburg.)

(Fortſetzung.)

5) Nemophila phacelioides. Bart. Eine hübſche annuelle, an 2 Fuß hohe Pflanze aus Nordamerika, zur 1. Ordn. der 5. Linn. Claſſe und zur Familie der Hydrophylleen gehörig. Die Gattung unterſcheidet ſich durch einen 10theiligen Kelch, deſſen Einſchnitte abwechſelnd zurückgeſchlagen ſind, eine glockenförmige Corolle, 10 grubige Nectarien, kürzere Staubgefäße als die Corolle, einen 2ſpaltigen Griffel und eine 4ſamige Capſel. — Die Merkmale obgenannter Species ſind folgende: Der Stengel aufrecht, äſtig, hellgrün, glatt, faſt halbſtielrund. Die Blätter ſehr zart flaumhaarig, unten glatt, gefiedert, nach der Spitze zu tief halbgefiedert, 9 — 12 Zoll lang; die Blättchen gelappt=gezähnt, ſtumpf, mit ſtachelſpitzigen, ſehr zart gewimperten Läppchen. Die Blumenſtiele ſtehen den Blättern gegenüber, einzeln, einblumig. Die Corolle ausgebreitet, 1 Zoll 3 Linien breit, ſchön, hellblau, im Grunde weiß, mit 5lappigem Rande; die Lappen ſtumpf verkehrt=eirund=kreisförmig. Der Kelch gewimpert. — Der Same wird im März in den Topf in gute, lockere Erde geſäet, warm geſtellt, feucht und ſchattig gehalten; auch kann man ihn in's Miſtbeet ſäen. Die jungen Pflanzen verſetzt man theils in Töpfe, hält ſie anfangs im Miſtbeete unter Glas, bis ſie angewachſen ſind, und ſtellt ſie dann in's Glashaus, Zimmer, oder an ſonnige, gegen heftige Regengüſſe geſchützte Orte in's Freie; theils verpflanzt man ſie im Mai an angemeſſene Plätze in's Land. — Der Same iſt in allen guten Handelsgärten zu haben.

6) Silene compacta. Hornem. Dichtblühende Silene, aus Tranſylvanien, vom Caucaſus. ♃. Dieſe Art iſt wegen der dichten, ſehr ſchönen reichblumigen, rothen Endrispen eine ſehr empfehlenswerthe Land=Zierpflanze. Der Stengel wird 2 Fuß und darüber hoch, iſt äſtig, und gleich wie die ganze Pflanze, glatt. Die Blätter graugrün, eirund=länglich, mit der Baſis ſtengelumfaſſend, ſtiellos, die obern eirund, alle ganzrandig, zugeſpitzt, die größten etwa 3 1/2 Zoll lang und 2 Zoll breit. Die Blumen roth, ſehr dicht und zahlreich in Endrispen geordnet; die Kronblätter ganzrandig, am Grunde mit 2theiligen Schuppen verſehen, deren Theile pfriemenförmig ſind. Die Deckblätter ausgebreitet, die Blumenſtiele überragend. Der Kelch keulenförmig gefärbt, grünlich=blaß=purpurroth. — Sie blühet im Juni und Juli, liebt einen warmen, ſonnigen Standort, fetten, lockern, mehr trocknen, als naſſen Boden, und dauert bei gewöhnlicher Winterkälte gut aus; bei ſtrenger Kälte aber bedarf ſie einer leichten, trocken zu haltenden Bedeckung. Man erzieht ſie am beſten aus dem Samen, der im März oder April auf ein lockeres, beſchattetes Beet geſäet wird. — Sie iſt bei mir, in Hamburg u. a. O. zu haben, und koſtet 4 — 6 ggr., die Portion Samen 1 1/2 — 2 ggr. (Fortſ. folgt).

Nachtrag über den in Nro. XV. der Blumenzeitung befindlichen Aufſatz: „Neue, ſchöne Roſen" in dem Garten des Hrn. Kaufmann Wilhelm Keller zu Duisburg.

1) Adelaide von Orleans. Dieſer ſchöne Roſenſtrauch von außerordentlich kräftigem Wachsthum wird in wenigen Jahren zehn und mehrere Fuß hoch, bedeckt ſich, ſobald er das gehörige Alter erreicht hat, von unten bis oben mit den ſchönſten Bouquets, die an den Spitzen der mehrſten Zweige mit 10 bis 20 Blumen nach und nach hervortreten, und einen prächtigen Effekt machen. Obſchon dieſer Strauch, ſo wie der folgende, einen geſchützten Standort liebt, ſo hat er doch hier auch ganz freiſtehend die drei letzten Winter ohne die geringſte Bedeckung oder Niederbiegung ausgehalten. — 2) Felicite Perpetue. ꝛc.

Beide Roſenſorten, die zu den Hybriden der Rosa sempervirens gehören, blühen erſt, wenn die andern Landroſen aufhören, und fanden bei der Pracht, wie ſie ſich hier in 6 — 8 Fuß hohen Exemplaren zeigten, allgemeine Bewunderung. Wurzelächte Ableger davon ſind zu 15 Sgr. pro Stück von Duisburg zu erhalten. Andere ſchöne Varietäten der Rosa sempervirens, als: alba plena, rosea plena, Leopoldine von Orleans, Melanie von Montjoie, die italieniſche, Prinzessin Marie, Prinzessin Louise, Armide und sempervirens spectabilis, welche größtentheils ſchon in kleineren Exemplaren blühen, können zu beſtimmten Preiſen eben daher bezogen werden.

Cereus hybridus.

Eine der ſchönſten und neueſten Zierpflanzen, blühte in dem vergangenen Frühjahre im königl. botan. Garten zu Berlin, wohin ſie aus Norwich gekommen war, und ſtammt aus Samen, erhalten durch Vermiſchung des Pollen von Cereus speciosissimus, Desf. und Cereus phyllantoides, Cand. oder Cactus speciosus, Bonpl. (welche Pflanze ſo oft fälſchlich für Cactus alatus ausgegeben wird).

Der Wuchs dieſer Prachtpflanze kommt ganz mit dem von Cereus phyllantoides überein, und ſteht demſelben am nächſten, nur hier und da zeigen ſich Spuren und Uebergänge von Cereus speciosissimus mit den drei- und viereckigen Zweigen. Am untern Theile der Pflanze ſind die Aeſte alle drei- bis viereckig, dann verliert ſich das Eckige allmählich und geht in das Zuſammengedrückte des Cereus phyllantoides über, doch ſcheinen die Zweige etwas ſtärker und kräftiger, ja faſt auch breiter zu ſein als bei dieſem. Auch haben die Kerben am Rande der Zweige mehr die Aehnlichkeit der Zähne von den Kanten des C. speciosissim. und auch der weiße Filz iſt dem von dieſem ähnlicher. Die Blumen erſcheinen in großer Menge eben ſo wie bei C. phyllantoides, aus den Kerbzähnen, ſind denen vom C. speciosissim. ſehr ähnlich, faſt ebenſo groß, prächtig ziegelroth, doch etwas matt und nicht mit dem glänzend violettem Schiller überhaucht, wie dieſe. Die Cultur iſt ganz dieſelbe wie bei dem C speciosissim. und phyllantoides; er liebt einen guten Standort am Fenſter und nicht zu große trockne Wärme Die Blumen erſcheinen im April und Mai, und ſchon die ſchönen rothen Knospen, die ſehr lange zu ihrer Entwickelung bedürfen, ehe ſich die großen rothen Blumen öffnen, geben der Pflanze ein herrliches Anſehen. Sie iſt im Handel noch nicht ganz gewöhnlich. (Im Auszug aus der Berl. Allgem. Gartenztg.)

Blumiſtiſche Mittheilungen.

Ueber Nelken-Durchwinterung.

Nie habe ich einſtimmen können in die vielen Klagen, welche von allen Seiten erhoben werden, daß es ſo mühſam ſei, Nelken zu durchwintern. Nur in's Freie damit, ſie der Mutter Natur überlaſſen; die ſtarken werden erhalten und die kranken geſunden! Außer der jungen Brut im freien Felde kultivirte ich mehr denn zweihundert Stöcke in Töpfen. Meine größte Sorge war, daß ich früh, gleich im Auguſt, das Geſchäft des Einſchneidens beſorgte, oder Stecklinge machte, welches letztere ich immer vorzog. Die Senker waren Ende Oktobers ſtark bewurzelt, ich ſetzte ſie dicht zuſammen auf ein Beet, das der Sonne nicht ausgeſetzt war, deſſen Boden ich mit etwas Sand vermiſcht hatte und bedeckte ſie dünn mit Laub. Die noch nicht angewurzelten Senker ließ ich am Mutterſtocke und brachte dieſen ganz in den Boden. Ende Aprils waren meine Senker ſtark, ohne alles Ungeziefer, und ich verpflanzte ſie.

Kirdorf. **Buſch.**

Tauſch-Anerbieten des Herrn Collegien-Raths v. Gemünden zu München.

(Fortſetzung in Nr. 14.)

Pelargonium:

Hongrie reine d'
Haiden adrius
Hahn Pfarrer
Hoareanum
Hebe
Harriet
Hermannianum
Hermine
Humei
ignescens
— couin.
— splend.
incomparabile
— superbum
inquinans
— grandiflor.
— tomentos. ros.
infundibuliforme
involucratum
— ros.
Iphigenia
inexprimable
integrifolium
illecebrum
inciso dentat.
illustrium
involucratum fuscatum
insigne
ichorosum
incarnat. nov.
inquin. purp.
inscriptum
impurum
Istria Capo d'
irisianum
imperiale
invincibile
idion
Juliana
Julius
juvenile
Julia pulchra
Josephine K.
Juan don
jucundum
Jonkinson
Jacquinianum
Josephinum
Jeschukianum
Knappianum
Klurianum
Kent Duch. of
Kent's pourple
Koburg Prz.
Kraftianum
Keinhoferianum
— latum
Kolowrathion
Krebnerianum
King of Engl.
Klara
Katarina
Kolowrathian.
Lauderdale Lord
Lambtonia
lateripes
— fol. var.
latilobum
Lée Lord
Leopold d. alte
— d. neue
Leopoldianum
Leopoldine
lineatum
lobatum
longipetalum
Lousadanium
Leonuroides
Ludovicianum
Luitpold Prz.
Learne l'hon. de
litigiosum
— nov.
laevigatum
Ludwig König
lassiophyllum
luissant
Lesal
Louise Pss.
lepidum
— striatum
Lessing
Lina
lucidum
Lotte
lotum striat.
Lavater
Leuchtenberg Hzg.
Led Seedling
laxiflorum
laetum
Lamarque Grl.
latifolium
liliaeflorum
Ludwig d. B.
Malfait
Melancion
Machrorhizon
magnificum
— rubr.
majestum
majestuosum
maculat. aur.
— argent.
— superb.
marginat. aur.
— argent.
Marianne Rosen
Morgan Lady
macranton
— ros.
— purp.
— supb.
— gibbosul.
— specios.
— novum
— led Seedling
— repens
— insigne
markianum
maternum
melalophium
melicium supb.
melissin. Klaib.
— grandiflor.
Metternich
— ros.
Mina Grl.
molle
monstrosum
Murrayanum
Mina (Wilhelmine)
mirabile
magnificens
Maidenblush
Maland Miss.
Montblanc
medusulum
Mungo Park
Maria Pss.
Maria Isabella
Morning Staar.
morcanum
maculat. Kleini
— Stöttneri
mucronatum.

(Fortſetzung folgt).

Die Vermehrung der Dahlien durch Pfropfen in die Wurzelknollen. (Beſchluß.)

Von Betillard.

Der mit Saft angefüllte Knollen vereinigt ſich bald mit dem Propfreiſe und ernährt es, während das untere Ende des letzteren einen Wulſt bildet, und neue Wurzeln und Knollen hervorbringt.

Wenn das untere Ende des Zweiges ganz in dem Knollen ſteckt, ſo geſchieht auch deſſen Vereinigung vollſtändig, das Pfropfreis lebt auf Koſten des Knollens, von dem es umgeben iſt, treibt und blüht, ohne Wurzeln der nämlichen Abart hervorzubringen; indeſſen iſt nichts deſto weniger die Sorte dennoch erhalten.

Ein, nach dem zweiten Abkneipen einer Zwergdahlie hervorgekommener Trieb, der ſchon eine Blüthenknoſpe trug, wurde ſelbſt am zweiten Auge abgekneipt; acht Tage darauf waren ſchon die übrigen Zweige in der Blüthe, dieſer hingegen fing an, in den Blattwinkeln einen Trieb zu entwickeln; ich pfropfte nun dieſen zarten, noch ganz weichen Zweig in einen, früher auf der Erde liegen gebliebenen Knollen, legte ihn in einen Topf, und verſah ihn reichlich mit Waſſer; ich ſtellte ihn unter den Schatten von Pomeranzenbäumen in's Freie, und nach Verlauf von einem Monate hatte mein Pfröpfling Knoſpen angeſetzt. Ich entfernte die Knoſpen, und ließ den gepfropften Knollen bis zum 2. November im Topfe ſtehen. Da ich um dieſe Zeit fand, daß die Knollen noch zu zart und nicht gehörig ausgebildet waren, um den Winter aushalten zu können, ſo ließ ich ſie im Topfe, und brachte ſie mit zwanzig andern, beinahe zu gleicher Zeit gepfropften Dahlien in die Orangerie, wo ſie noch in ſchöner Blüthe ſich zeigen, während die alten Stöcke im Freien zu Grunde gehen, und ſchon ſeit einem Monate nicht mehr blühen.

Ich halte mich für überzeugt, daß dieſe Vermehrungsart uns den Genuß der herrlichen Blüthe der Dahlien um einen Monat verlängern wird. Eben ſo bin ich überzeugt, daß von tauſend Stecklingen, welche mit einem ſolchen Zweige gemacht worden waren, nicht ein einziger angeſchlagen haben würde.

Im heurigen Jahre ſind mir mehr als ſechzig Pfropfungen nach dieſer Methode gelungen, die alle vollkommen geblüht haben. Ich bemerkte dabei, daß alle diejenigen, bei welchen die Zweige bis auf das Mark eingeſchnitten waren, nach wenigen Tagen zu Grunde gingen, indem die Fäulniß bald an dem untern Theile ſich einſtellte, obgleich das obere Ende noch ganz grün geweſen iſt. Es iſt daher weſentlich, den Zweig nur von der Rinde zu entblößen, oder nur einen geringen Theil der Epidermis zu entfernen; und zwar blos darum, daß der Saft des Pfropfreiſes mit jenem des Knollens in unmittelbare Berührung kommen könne.

Wir alle wiſſen, daß die großen Dahlienſtöcke, wenn ſie mit allen ihren Knollen verſetzt werden, niemals ſo viele Blüthen von großem Umfange, und eben ſo wenig volle Blüthen geben, als zeitig gemachte Stecklinge, oder die von dem nämlichen Stocke getrennt gelegten Knollen.

Die natürliche Schlußfolge dieſer beiden Thatſachen beſteht nun darin, daß die alten Knollen der Dahlien keine ſolche Kraft und Entwickelungsfähigkeit, als junge Knollen, oder die erſten Triebe des Jahres beſitzen, um die in den Gefäßen enthaltenen Säfte zu verarbeiten, daß ſie große und beſonders ſchöne Blüthen hervorbringen.

Aus dieſer Urſache iſt es räthlich, bei dem Einlegen alter Dahlienſtöcke einen großen Theil der alten Knollen ganz zu vertilgen, um die Entſtehung neuer Sorten und deren kräftige Vegetation zu begünſtigen.

Syſtematiſche Namen der merkwürdigſten Pflanzen-Gattungen und Arten, ihr Genitiv ꝛc.

Mitgetheilt von L. aus T.

(Fortſetzung).

Amarantus. L. i. masc. **Amarant, Fuchsſchwanz** ꝛc.

(Beſchluß.)

Man vergleiche auch Abrotŏnum, Adianthum, Agerătum, Athanasia, Erigĕron und Senecĭo, — Namen, die ſich auf die Unverwelklichkeit und Dauer ihrer Blumen ebenfalls beziehen.

Hierbei können wir die ſogenannten **Immortellen** nicht mit Stillſchweigen übergehen. Dies ſind nicht etwa die beim Claudian (158) vorkommenden immortales herbae, unter welchen man ſolche Gewächſe verſteht, durch deren Genuß Glaucus unter die Unſterblichen verſetzt wurde (Ovid. metam. VIII. 947.), ſondern diejenigen, deren ausdauernde papier- oder ſtrohartige Kelchſchuppen rauſchend und zum Theil mit metalliſchem Glanze begabt ſind, ſo daß ſie im trockenen Zuſtande ihre prächtige glänzende Farbe behalten und ſich auf dieſe Weiſe ſelbſt verunſterblichen. Daher werden ſie auch **Immerſchöne, Papierblumen, Strohblumen** (Plantae colorem servantes s. retinentes), genannt. Unter die vorzüglichſten derſelben gehören:

Amarantus caudatus L.; cruentus L.; hypochondriacus L.; melancholicus L.; tricolor L.
Catananche caespitosa Desf.; coerulea L.; lutea L.
Celosia argentea L.; coccinea L.; cristata L. margaritacea L.
Centaurea alba L.; atropurpurea Wldst.; calocephala Wlld.; glastifol. L.; macrocephala. Com. de Mussin pusk; cruenta L.; pulcherrima Wlld., splendens L.
Gnaphalium arenarium L., eximium L.; foetidum L; ignescens L.; margaritaceum L.; maritimum L.; orientale L.; sanguineum L.
Gomphrena globosa L.
Johannia microphylla Tratt.
Xeranthemum annuum L.; orientale Wlld.

Dieſe merkwürdigen Eigenſchaften gaben dem verewigten Prof. Batſch zu Jena (Anleit. zur Pflanzen-Kenntniß. Thl. II. S. 370) Veranlaſſung zur Begründung einer beſondern natürlichen Familie der Strohblumen, denen er die Gattungen Gomphrena, Celosia, Amarantus, Plantago beizählte. Die Gattungen Centaurea und Xeranthemum hingegen zog er zu den Diſtelblumen, ſo wie Gnaphalium zu den Scheibenblumen. Auch hat Sadebeck zu Reichenbach in Schleſien dieſen Gewächſen ſeine beſondere Aufmerkſamkeit gewidmet und mancherlei ſehr intereſſante Bemerkungen und Entdeckungen gemacht, die unfehlbar jeden Liebhaber der immerſchönen Blumen ꝛc. belehrend und liebevoll anſprechen werden. Die Zahl der unverwelklichen Pflanzentheile, welche er ſeit 1806 bis zum Ende des Jahres 1814 beobachtet und in Hinſicht auf ihre Dauer geprüft hat, beläuft ſich ſchon über 500, und dieſe ſind von ihm zu vielfacher Benutzung, nämlich zu Sträußern, Kränzen, Blumenkörbchen und Vaſen-Inſchriften ꝛc. verwendet worden, welche wegen der Zuſammenſtellung und Anordnung des Ganzen allgemeinen Beifall erhalten haben. Siehe Dietrich's Nachtrag zu Brockhauſen's botan. Wörterb. S. 21. (Fortſetzung folgt).

Varietäten.

Berlin. Am 6ten Juni blühten im königl. botaniſchen Garten folgende ſeltene und ſchönblühende Pflanzen: Brodiaea congesta R. Br. — Cattleya Forbesii Lindl. — Hoya Pottsii Hort. angl. — Pachypodium tuberosum Bot. reg. — Bignonia viridiſſ. Lodig. — Tecoma digitata Kunth. — Gesnera spicat Humb. — Epacris obtusifol. R. Br. — Echinocact. hypocentrus Lehm. — Combretum purpur. Vahl. — Lebretonia coccinea Schrank.

In der Mitte des Monat Juni blühten daſelbſt folgende bemerkenswerthe Pflanzen: Sowerbaea juncea Smith — Funkia undulat. Nob. — Dyckia remotiſſ. nov. sp. — Iris nepalensis Wallich — Phyllanthus Conami Swartz — Cerbera fruticos Roxb. — Ceropegia aphyll. Haw. — Asclepias quadrifol. Pursh — Nierembergia angustifol. Kunth. — Sideroxylon melanophleum L. — Plectronia corymbos. L. — Erythrina laurifol. Jacq. — Acacia pugioniformis Wendl. — Oxalis ros. Jacq. — Malpighia urens L. — Prokia laevi nov. sp.

In großen Maſſen in Gruppen und Strauchparthien blühten: Azal. viscos., var. odorat., variegat., pubescens, Caprifol. pubescens Hooker, Philadelphus gracilis Loddig.

Ph. hirsutus Nuttal., Amorphoe microphylla Pursh, herbacea Walt., canescens Nuttal., Lewisii Loddig., fragrans Sweet, etc.

Berlin. In der 122. Verſammlung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den königl. preuß. Staaten am 4. Auguſt c. wurden vorgetragen und berathen: Bemerkungen des Herrn Profeſſor Treviranus in Bonn über die Zerſtörung verſchiedener Ziergewächſe, namentlich aus der Familie der Potentillen, durch einen kleinen Rüſſelkäfer, Rhynchites minutus Herbat.; eine Abhandlung des Blumiſten Hrn. Schneevoigt in Harlem über den weißen Rotz und die Ringelkrankheit der Hyazinthenzwiebeln; Angaben des Lehrers Herrn Görner zu Straupitz bei Lübben über eine von ihm bewährt gefundene Methode, um von der gelben, gefüllten Roſe alljährlich viele und ſchöne Blumen zu erhalten; Mittheilungen des Fräulein Friederike Ziegler in Münſter über ihr Verfahren bei Auflegung von Blumen zur Erhaltung ihrer natürlichen Farben; Bemerkungen des thüringer Gartenbau-Vereins in Gotha über die Anwendung des Bleidrahtes zum Anheften von Pflanzen-Etiketts; aus dem königl. botaniſchen Garten waren aufgeſtellt: ein ſchönblühendes Exemplar von Billbergia zebrina Lindl. und eine reiche Sammlung abgeſchnittener Georginen-Blüthen der ſeltenſten, zum Theil hier noch ganz neuer Sorten aus England und Schottland, deren Farbenpracht allgemein bewundert wurde.

Wien, den 12 Mai 1833. (Fortſetzung.) Um dieſer ſiebenten Pflanzen-Ausſtellung eine noch größere Ausdehnung und Theilnahme der Preisbewerber zu geben, deren Anzahl nie zu groß ſein kann, und um jede Art von Pflanzenpflege zu berückſichtigen, haben zwei Beförderer der Horticultur ihre Bedachtnahme, abgeſehen von dem botaniſchen Pflanzenwerthe, und hauptſächlich nur den angenehmen Eindruck auf das gebildete erfahrene Auge berückſichtigend, auch auf die Anzucht ſchöner und vorzüglicher Blumen übertragen, und folgende Geldpreiſe, außer jenen von den leitenden Mitgliedern dieſer Pflanzen-Ausſtellung feſtgeſetzten ſieben Pflanzen- oder den entſprechenden, ſchon vorhinein berechneten Geldpreiſen beſtimmt, und zwar den erſten Preis von 6 Dukaten in Gold für die ſchönſte blühende Glashaus- oder überhaupt im Blumentopfe gezogene Roſe beſtimmt, erhielt die Rosa Noisette Yellow, von dem Herrn Handelsgärtner Held geſendet.

Der zweite Preis von 6 Dukaten in Gold für die ſchönſte, nicht gemeine, einjährige Pflanze, oder in Ermangelung einer ſolchen, der beſtcultivirten blühenden Pflanze aus der Claſſe der beliebten Gartenblume beſtimmt, wurde der Hydrangea hortensis vom Handelsgärtner Herrn Graber geſendet, zu Theil.

Auf die für einen dieſer Geldpreiſe concurrirenden Pflanzen hatten die Bedingniſſe des erſten und zweiten Preiſes gleichfalls ihre Anwendung, und dieſe beiden Pflanzengattungen waren von der Concurrenz um die früher aufgeführten Pflanzen-, oder in deren Geldverwerthung ſchon vorhinein berechneten Preiſe nicht ausgeſchloſſen; es wäre denn, daß ſie der Eigenthümer ausdrücklich für die eine oder andere Preis-Categorie beſtimmt hätte. Ein und daſſelbe Pflanzen-Exemplar konnte jedoch nur einen Preis erhalten.

Um jede Art Bemühung im feineren Gartenweſen zu ermuntern, und gleichwie einer Seits die Möglichkeit zur Geltendmachung erworbener Fähigkeiten im Fache der Blumen- und Pflanzen-Cultur zu ſteigern, auch anderer Seits die Mannigfaltigkeit und Verſchönerung der Ausſtellung zu erhöhen, ſind für die intereſſanteſte und ſchönſte Zuſammenſtellung abgeſchnittener Blumen in Bouquets zwei Preiſe feſtgeſetzt worden, einer derſelben für die gelungenſte wiſſenſchaftliche Anordnung eines Bouquets, welches durch ſinnige Zuſammenſtellung und den darin begründeten Gehalt das botaniſche Kennerauge in Anſpruch nimmt, — der andere für die geſchmackvollſte, edelſte Zuſammenfaſſung vorzüglicher oder doch wohlgefälliger Blumen in einen maleriſchen Strauß, worin ein feiner Kunſtſinn erkennbar ſein ſollte. Zum erſten **Preis ſind die Pflanzen: Phlox Coldreyana, — P. excelsa,**

P. gracilis, — p. intermedia, — P. Listoniana, — P. Nutallii durch den Verein beſtimmt worden, und er wurde in Ermanglung von Bouquets nach wiſſenſchaftlicher Anordnung nicht vertheilt.

Bollweiler. (Fortſetzung). Camellien-Sammlung, welche für 1833 nach der Wahl der Gebrüder Baumann zu Bollweiler zu veräußern iſt.

Cam. jap. Pomponia sericea
— jap. Pomp. venosa
— — — virginica
— — — Weimaria
— — Warratah alba
— — — alba lutescens
— — — Almet's superb.
— — — AlnutiiAlm.sup.
— — — altheaeflora
— — — Amerthia
— — — anemonefl. alba
— — — — rosea
— — — — rubra
— — — ardens
— — — — superba
— — — argentea
— — — atrorubens
— — — Blakburniana
— — — blanda
— — — Broksii

C. jap. Warratah Bukliana
— — — carnea
— — — carolina
— — — Celsiana
— — — Chandlerii
— — — Clintonia
— — — — nova
— — — compacta
— — — corallina
— — — dahliaflora
— — — decora
— — — Derdii, (Augusta)
— — — delecta
— — — dianthiflora
— — — Dorsettii
— — — Elphinstonia
— — — excelsa
— — — flammea
— — — florida. (Fortſ. f.)

(Neue Pflanzen). H. Schott und St. Endlicher liefern in ihrem neueſten zu Wien erſchienenen Werke: „Meletemata botanica“ ſehr intereſſante Bemerkungen über folgende noch unbekannte Pflanzen. Das Lophophytum mirabile, aus der Familie der Balanophoreen, eine äußerſt ſeltene Pflanze aus den ſchattigen Wäldern der Gegend von Rio-Janeiro in Braſilien, wo ſie Schott im Jahre 1820 nur ein einziges Mal geſehen hatte. — Das Scybalium fungiforme, ebenfalls aus der Familie der Balanophoreen, ein Paraſyt aus den Urwäldern der Gebirge von Sierra d'Eſtrella in Braſilien, von Schott im Jahre 1820 geſammelt. — Die Mayaca, zur Familie der Commelinaceen gehörig, welche ſchon Aublet kannte, fand Schott in den Sumpfgegenden von Rio-Janeiro in Braſilien. — Die Ungeria floribunda, aus der Familie der Sterculiaceen, von der Inſel Norfolk in der Südſee, von Ferdinand Bauer auf ſeiner neuholländiſchen Reiſe geſammelt. — Das ſchöne Methorium canum, zur Familie der Sterkuliaceen gehörig, aus der Bucht Carpentaria im nördlichen Theile von Neuholland, ebenfalls von der Ausbeute Ferdinand Bauers. — Schott theilt die Claſſe der Rhizantheen, zu welcher Lophophytum und Scybalium gehören, in drei Familien, (Balanophoreen, Cytineen und Raffleſiaceen) und dreizehn Gattungen. Die Claſſe der Aroideen theilt derſelbe in vier Familien (Cyclantheen, Poit, Pandaneen, Rob. Brown, Araceen, Schott, und Acoroideen, Schott) und 42 Gattungen. — Die Familie der Sterculiaceen theilt derſelbe in zwei Zünfte (Heliktereen und Sterculieen) und 41 Gattungen.

(Anwendung gebrannter Mauerziegeln in Gärten.) Herr Dr. W. Fiſcher zu Korneuburg macht jetzt auf ein Verfahren aufmerkſam, nach dem er mit großem Vortheil für Wachsthum und Fruchtbarkeit mehrerer Pflanzen, zwiſchen denſelben die Erdoberfläche mit ſchwarzen Platten aus feſt gebranntem Töpferthon (1 Fuß lang und breit und 2 Zoll dick) dicht bedeckt. Dieſes Verfahren, welches in mehreren Bezirken Spaniens längſt in Gebrauch iſt, ſoll nicht nur die Vertilgung des Unkrautes, das Begießen, das Anhäufeln der Erde unnöthig machen, ſondern auch bewirken, daß die Nahrungsſtoffe der Pflanzen nicht verwittern und daß Blumen oder andere Pflanzen dadurch beſſer als gewöhnlich kultivirt werden. Näheres hierüber wird die nächſte Numer der gemeinnützigen Mittheilungen über Wein-, Obſt- und Gemüſebau ꝛc. mittheilen.

(Hierbei zwei Beilagen.)

à Stück	ggl.
Iris susiana	6
— tenuifolia	2
— versicolor	3
Lactuca perennis	2
Lavendula multifida	3
Lathyrus latifolius	4
Lilium candidum	2
— croceum	3
— bulbiferum	3
— martagon fl. albo	6
— — — pl.	6
Linaria linifolia	2
— vulgaris Pellori	3
Linum perenne	2
Lychnis chalcedonica	2
— — flore albo	3
— — fl carneo	3
— — fl. pleno	6
— dioica fl. albo —	8
— — alba	2
— — rubra plena	3
— viscaria	2
— — — pleno	2
— — fl. roseo	4
— fulgens	4
— calcedonia ferruginea	4
Lysimachia punctata	2
— thyrsiflora	2
— vulgaris	2
Lythrum acuminatum	2
Matricaria Parthenium fl. pl.	2
Melittis grandiflora	3
— Melissophyllum	4
Mimulus guttatus	4
Mentha aquatica fol. variegata	2
Monarda didyma	3
— fistulosa	2
— mollis	2
— rugosa	2
— violacea	3
Oenothera spectabilis	4
Orobus lathyroides	2
— niger	2
Paeonia albiflora	8
— corallifera	8
— humilis	6
— tenuifolia	6
— officinalis rubra pl.	3
— — carnea pl.	4
Papaver italic.	4
— nudicaule	4
— orientale	3
Phlox acuminata	4
— decussata	3
— carolina	4
— divaricata	3
— glaberrima	2
— maculata	4
— ovata	3
— paniculata	3
— — fl. albo	3
— — fl. roseo	4
— setacea	6
— suaveolens	3
— subulata	4
— reptans	3
— undulata	4
Polemonium coeruleum	2
— fl. albo	2
Polygonum Bistorta	2
Podalyria australis	4
Potentilla atrosanguinea	4
— canescens.	2
— nepalensis	4
— diffusa	3
— hirta	3
— obscura	3
— purpurea	4
— recta	3
Primula cortusoides	4
Pachysandra procumbens	6
Ranunculus acris fl. pl.	2
Rheum compactum	4
— rhaponticum	3
— undulatum	3
Rudbeckia fulgida	4
— hirta	4
— laciniata	3
— purpurea	6
Rumex hastata	1
Salvia affinis	2
— Sclarea	2
Sambucus Ebulus	3
Saponaria officinalis	2
— — fl. pl.	2
Saxifraga crassifolia	2
— longiflora	2
Saxifraga umbrosa	2
— punctata	2
Scabiosa mollis	2
Scrophularia aquatica	2
Scutellaria lateriflora	2

à Stück	ggl.
Senecio saracenica	3
Silphium perfoliatum	2
Solidago bicolor	4
— canadensis	2
— arguta	2
— lanceolata	2
— alnifolia	2
— virga aurea	2
— reflexa	2
— mexicana	2
— serotina	4
Spirea aruncus	2
— filipendula	2
— — fl. pl.	4
— lobata	4
— trifoliata	4
— ulmaria	2
Stachis lanata	4
— alpina	2
Statice armeria 4 Stück	1
— grandiflora	1
— Limonium	8
Stellaria nemorosa	2
Thalictrum cinereum	3
— medium	2
— purpureum	3
— speciosum	3
Trollius aconitifolius	6
— europaeus	4
Tussilago suaveolens	3
— alba	2
Valeriana rubra	3
— Phu	2
Verbascum Thapsus	3
Veronica argata	3
— canescens	3
— longifolia	3
— multicaulis	3
— pinnata	2
Vinca minor fl. pl.	2
Viola odorata fl. pl. coeruleo	1
— — — — albo	3
— — — — roseo	3
— — semperflorens	1
Waldsteinia geoides	4

b. Sträucher.

Amygdalus communis amara	4
Aristolochia Sipho	8
Berberis vulgaris	2
Cercis occidentalis	4
Clematis Vitalba	3
Corchorus japonicus	4
Citisus Laburnum	4
— elongatus	6
Evonymus europaeus	3
Genista canariensis	4
Hypericum Androsaemum	4
Ligustrum vulgare	2
Lonicera tartarica	2
Philadelphus coronarius	2
Robinia hispida	6
Rhus thyphinum	2
— Cotinus	4
Rubus fruticosus fl. pl.	4
— odoratus	2
Ribis alpinum	2
Spirea acteifolia	4
— crenata	4
— opulifolia	2
— salicifolia	2
— ulmifolia	2
Staphylea pinnata	3
Syringa persica	3
— chinensis	4
— grandiflora	3
— laciniata	6
— vulgaris	2
— — fl. albo	2
Salix babylonica	4
Viburnum Lantana	3
— Opulus	2
— — roseum fl. pl.	3
Vitis vulpina	4

c. Land-Roſen in gefüllten Sorten.

Rosa alba plena	3
— belgica humifusa	6
— — minor	4
— belle aimable	6
— burgundica	3
— Blumenkranzroſe	3
— carnea humilis	6
— carnea media	4
— caryophylla	8
— capitata	6
— cuprea	4
— elegans	6
Rosa centifolia	2
— — maxima	4
— — Hollandica	8

à Stück	
Rosa centifolia saturata	
— cinamomea	
— de Dijon	
— de Perlo	
— de Vilmorin	
— de Meaux	
— damascena anglica	
— coccinea	
— eglanderia	
— francisca rubella	
— galantho	
— fulgens	
— gallica	
— — regalis	
— — versicolor	
— gloria mundi	
— holoseria	
— — maxima	
— — fulgens	
— — ranunculoides	
— inermis	
— lactea	
— lusitanica	
— lugdunensis (minima)	
— malum punicum	
— mignon	
— moschata	
— millifolia	
— — coccinea	
— — carnea	
— — marmor. violacea	
— — incarnata	
— — pallida	
— — rubra	
— — purpurea (marmorea)	
— muscosa rubra pl.	
— — alba plena, occulirt	
— omnium calendarum	
— — fl. albo	
— pomponica maxima	
— pulchra fastuosa	
— provincialis major	
— purpurea	
— regalis minor	
— — incarnata	
— superba praecox	
— pimpinellifolia alba pl.	
— — carnea pl.	
— — bicolor pl.	
— sessiliflora	
— sempervirens	
— stricta	
— turbinata	
— umbellata	

d. Einfache Roſen.

Rosa lucida	
— lutea	
— bicolor	
— muscosa, occulirt	
— pendulina	3
— pimpinellefolia alba	2
— scotica	2

e. Topf- oder immerbl. Roſen.

Rosa semperflorens alba	8
— — anemonaeflora	6
— — atropurpurea	8
— — banksiana	6
— — bischonia	4
— — carolinian. pallida	4
— — centifolia	6
— — — minor	6
— — Diademe de flora	8
— — Eremit	12
— — floribunda	6
— — formosa	8
— — pumila	6
— — liniferblanc	6
— — marylandica	8
— — monstrosa	6
— — moschata varieg.	4
— — marmorea	8
— — Noisette coccinea	12
— — noisettiana	8
— — parviflora	6
— — petitenuoisin	6
— — pallida	4
— — purpurea	4
— — — minor	6
— — sinensis nova	8
— — speciosa	8
— — Thea rubra	8
— — — odor. carnea	12
— sempervirens Banksia	8
— — — bracteata	8
— — multifl. japon.	6
— — — — fl. purp	8
— — — — odorata	8
— — Roxburghi	6

Roſen (Centifolien), das Dutzend 12 gl

Sortiments-Preiſe von Gewächſen.

	ggl.
Ein Sortiment Roſen für's freie Land, ſehr ſchöne gefüllte in 30 Sorten 5 Thlr.	—
Ein — — Prachtblumen — 20 — 5 —	—
Ein — — dergl. — 12 — 2 —	16
Ein — Rosa semperfl. et sempervirens — 20 — 5 —	—
Ein — nur semperfl., ſchönſte — 12 — 3 —	—
Ein — Staudengewächſe, auf Rabatten, ſchöne in 20 Sorten 2 Thlr.	—
Ein — — ſchönſte — 12 — 1 —	6
Ein — dgl. auf größere Plätze — 20 — 1 —	8
Ein — ſchönſte — — — 12 — 1 —	—
Ein — Sträucher, ſehr ſch. — 30 — 4 —	8
Ein — — ſchönſte — 20 — 3 —	8
Ein — Pelargonien, engl. großblumige in 12 Sorten 3 Thlr.	—
Ein — Chryſanthemum — 16 — 2 —	8
Ein — neueſte und ſchönſte — 8 — 1 —	12

Gotha, im December 1832.

Chrysanthemum indicum.

	ggl.
Chrysanthemum ind. fl albo fistulosa	4
— — — — speciosa	6
— — — aureo grandifl.	4
— — — bicolor	4
— — — carneo fistulosa	6
— — — fuscata superba	6
— — — lillacina anemonaeflora	6
— — — niveo major	6
— — — purpureo	4
— — — — grandiflora	4
— — — roseo	4
— — — sulphureo fistul.	4
— — — luteo speciosa	6
— — — flavescens	6
— — — ranuncula fuscata	6
— — — variegata	4

Ein Sortiment ſchönblühender Topfgewächſe, welche zum Zimmerflor geeignet ſind, 12 Sorten 3 Thlr.

J. A. Büchner in Gotha.

Pflanzen-Catalog

für das Jahr 1833

der Gebrüder

Traugott und Jacob Seidel,

auswärtiger Mitglieder der Londoner Gartenbau-Gesellschaft.

Dresden,

äussere Rampische Gasse No. 130.

Zu Vermeidung aller Irrungen bitten wir, unsere Vornamen mit auf unsere Adresse zu schreiben.

Embellage wird besonders bezahlt.

Ausser den Geldbriefen, welche nicht brauchen frankirt zu werden, bitten wir um portofreie Einsendung aller Briefe, und deutliche Beifügung der Adressen, unter welchen wir zu antworten haben.

Da in diesem Cataloge die Preise schon möglichst erniedrigt sind, wie man durch Vergleichung bald wahrnehmen wird, so ist kein weiteres Rabbat davon möglich.

	Sächs. Conv. Thlr.	Gr.
Acacia		
dealbata	2	—
decurrens	2	—
— pulverulenta	2	—
— speciosa	2	—
floribunda	1	—
Julibrissin	1	—
linearis	—	16
paradoxa	1	—
pinifolia	2	—
saligna	1	—
verticillata	1	—
vestita	1	—
Adansónia		
digitata w.	3	—
Agapanthus		
minor, fol. albo-striat.	—	16
Allamanda		
cathartica w.	1	—
Alstroemeria		
Ligtù	—	12
Pelegrina	—	12
psittacina w.	1	—
Amaryllis		
alata	1	—
ambigua	2	—
aurea	1	—
Belladonna		
— major blühbar	1	—
— minor blühbar	1	—
blanda	2	—
Brasiliensis (reginae)	—	16
coccinea	2	—
curvi-latifolia	2	—
Johnsoniana	5	—
miniata	2	—
pulverulenta	5	—
radiata	1	—
reginae (Brasiliens)	—	16
reticulata	2	—
uniflora	1	—
vittata	1	—
Andromeda		
cassinefol. (specios.)	—	16
Catesbaei	—	12
oleifolia	—	12
paniculata	—	12
polifolia	—	12
pulverulenta	—	16
rosmarinifolia	—	12
serrata	—	12
Arbutus		
Chinensis	4	—
crispa	1	—
Unedo	1	—
Ardisia w.		
crenulata	—	12
littoralis	1	—
paniculata	10	—
punctata	1	—
pyramidalis	1	—
Arthropodium		
fimbriatum w.	—	16
Artocarpus		
integrifolia w.	8	—
Arum		
argyrostigmum w.	—	16
discolor w.	—	16
pictum w.	—	16
Astrapaea		
Walichii w.	2	—
Azalea		
albescens	1	—
amabilis	1	—
Archeduc Anton	2	—
aurantiaca	1	—
— flammea	1	—
calendulacea	1	—
carnea	1	—
coccinea	1	—
— major	1	—
concolor	2	—
crocata	1	—
cuprea	1	—
elegans	1	—
flammea	1	—
floribunda	—	16
formosa	1	—

	Thlr.	Gr.
Azalea		
glauca	—	16
globosa	—	16
gloriosa	2	—
grandiflora maculata	2	—
gratiosa	2	—
hybrida	1	—
Indica	1	—
— alba	1	—
— hybrida	1	—
— Phoenicea	1	—
— purpurea plena	1	—
— Smithiana	2	—
— Vendesiana	2	—
insignis	1	—
mirabilis	1	—
multiflora	—	16
mutabilis	1	—
odorata	—	16
odoratissima	1	—
picta	1	—
pontica	1	—
— rubra	1	—
pulchella	1	—
rosea	1	—
splendens	1	—
striata nobilis	2	—
tricolor	2	—
triumphans	2	—
venusta	1	—
vestita	1	—
viscosa plena	—	16
Banksia		
dentata	2	—
grandis	20	—
ilicifolia	1	—
marginata	2	—
oblongata	2	—
paludosa	2	—
pinnata	1	—
prostrata	1	—
Barkleya		
species nova w.	1	—
Bauera		
humilis	—	12
rubioides	—	12
Beaumontia		
grandiflora w.	2	—
Berberis		
aristata	2	—
Bignonia		
capensis	1	—
Bombax		
Ceiba w.	2	—
Bonapartea		
juncea w.	2	—
Mexicana w.	3	—
Boronia		
denticulata	1	—
Brachysema		
latifolium	2	—
Bromelia		
pyramidalis w.	—	16
Brunia		
nodiflora	1	—
Bryonia		
species nova w.	1	—
Burchelia		
capensis	1	—
Cactus w.		
Cereus		
— Deppii	1	—
— gracilis	—	16
— hybridus	1	—
— lanuginosus	1	—
— myosurus	1	—
— Napoleonis	—	16
— Pitajaya	1	—
— Royeni	1	—
— serpentinus	1	—
— squamosus	1	—
— strigosus	—	16
— tetragonus	—	16
— triangul. fol. var.	—	16
— tunicatus	1	—
Echinocactus		
— multiplex	1	—
— scopa	1	—

	Thlr.	Gr.
Cactus		
Epiphyllum		
— Ackermanni	2	—
— ciliare	1	—
— crispatum	1	—
— Phyllanthoides	—	16
— Phyllanthus	—	16
— truncatum	—	8
Mammillaria		
— coronata	1	—
— densa	—	16
Opuntia		
— Dillenii	—	16
— ferox	—	16
— fragilis	—	16
— glomerata	—	16
— horizontalis	—	16
— imbricata	1	—
— Microdasys	—	16
— rubescens	1	—
Rhipsalis		
— mesembrianthoides	—	8
— salicornia	—	8
Calceolaria		
angustifolia	1	—
Arachnoidea	2	—
corymbosa	2	—
Callistema		
ruscifolia	1	—
Calophyllum		
Calaba w.	1	—
Calothamnus		
aspera	1	—
quadrifida	—	16
villosa	1	—
Calycanthus		
floridus	1	—
laevigatus	1	—
nanus	1	—
Calytriplex		
ericaefolia	1	—
Calytrix		
conglobata	1	—
Camellia		
acutopetala	2	—
Aitonia	2	—
alba plena	1	—
— simplex	1	—
albicans	2	—
Allnuts superbe	1	—
althaeaflora	3	—
anemoneflora	1	—
— alba	3	—
— rosea	3	—
— striata	3	—
— variegata	2	—
ardens superba	6	—
argentea	3	—
Aspasia	6	—
atropurpurea	1	—
atrorubens	1	—
axillaris	2	—
belle Henriette	4	—
— Rosalie	4	—
Buff	1	—
Buckliana	6	—
carnationblush	2	—
carnea	1	—
cerasina	3	—
Chandler.	3	—
Charlemont	6	—
coccinea	2	—
compacta	3	—
conchaeflora	1	—
corallina	3	—
coronata	1	—
crassinervis	2	—
dahlia-flora	1	—
decanthola	6	—
derbiana	5	—
dianthiflora	2	—
Dorsetii	4	—
double nouveau	2	—
eclipse	5	—
egertonia	3	—
elegans	3	—
Elphinstonia	5	—
eurioides	2	—

	Thlr.	Gr.
Camellia		
excelsa	3	—
fascicularis	3	—
fimbriata	1	—
floriana	3	—
flammula	3	—
flavescens	1	—
florida	2	—
fulgens	4	—
gigantea	6	—
gloria mundi	4	—
gloriosa	6	—
gussonia	4	—
grandiflora simplex	1	—
grays invincible	6	—
Griffinii	3	—
halesia	3	—
heptangularis	3	—
hexangularis	3	—
humilis	3	—
imperialis	6	—
insignis	8	—
— rubra	2	—
involuta	1	—
Kew blush	1	—
Kissii	2	—
Knightii	2	—
Lady Admiral Campbel	1	—
— Humes blush	1	—
Lankmannii	3	—
Limbriata	3	—
longifolia grandiflora	1	—
— simplex	1	—
lucida	3	—
macrophylla	2	—
magnoliflora	3	—
margarita	2	—
Mexicana	6	—
Middlemists	1	—
monstrosa	3	—
myrtifolia	1	—
Naortensis	3	—
new imported	2	—
oleifera	1	—
— latifolia	1	—
ornata	3	—
oxoniensis	5	—
paeoniflora alba	1	—
— rosea	1	—
pallida	1	—
Palmeri	4	—
papaveracea	3	—
paradoxa	2	—
pensillata	3	—
Permentierii grandiflora	3	—
Pink	1	—
platipetala	6	—
pomponica alba	1	—
— incarnata	1	—
praegnans	6	—
Prince Charles Auguste	6	—
— d Orange	2	—
princeps	2	—
pulchella	3	—
punctata	6	—
purple waratah	2	—
Rawesiana	3	—
Reine des Pays bas	2	—
Reevesii	5	—
Rex Georgius	6	—
Roi des Pays bas	3	—
Rollinsoniana	3	—
rosaeflora	2	—
rosa mundi	4	—
rosa Sinensis	3	—
Rossii	6	—
rotundifolia	2	—
ruberrima	2	—
rubra plena	1	—
— simplex	1	—
rubricaulis	1	—
sanguinea	2	—
Sasanqua alba plena	6	—
— alba simplex	1	—
— rosea plena	1	—
Simsii	2	—
spathulata	3	—
splendens	2	—
spolulifera	6	—
staminea	2	—

Anzeige.

Den mir ertheilten vielſeitigen Aufträgen mit einem Male begegnend, zeige ich hiermit an, daß ich die bereits bei mir beſtellten Quantitäten Weinfechſer zur Anpflanzung von Weinbergen, in vorzüglichſter Qualität und zu den äußerſt billigſten Preiſen eingekauft habe, und den geehrten Beſtellern nach früherer Uebereinkunft zu den nachſtehenden Preiſen bis zum 1ſten November d. J. zuſenden werde.

Ich habe mit mehreren Weinbergbeſitzern in den vorzüglichſten Lagen des Rheingaues Uebereinkunft abgeſchloſſen, nach welcher ich im Stande bin, noch in dieſem Herbſt gegen 40 bis 50 Tauſend Weinfechſer an Liebhaber verſenden zu können, und zwar in folgenden zwei Sorten, welche einzig und allein hier zur Gewinnung der weißen Rheinweine gebaut werden:

1)	100 Stück frühe Rießlinge, 2jährige Fechſer, gut bewurzelt und geſchnitten zu	1 Thlr. 12 Gr.
	1000 Stück dergleichen	10 Thlr. — Gr.
2)	100 Stück Kleinberger frühe	1 Thlr. 18 Gr.
	1000 Stück	11 Thlr. — Gr.

Auch werde ich Beſtellungen auf gute Tafeltrauben möglichſt prompt und billig expediren. Was die Fracht betrifft, ſo verſichere ich, die beſtellten Weinfechſer nach allen Gegenden Deutſchlands auf die ſicherſte, billigſte und möglich ſchnellſte Weiſe zu expediren. Der Centner, circa 1000 Stück, koſtet von hier bis Gotha 5 fl.

Obige beiden Sorten eignen ſich, ihrer feſten Dauer, ihrer frühen Reife und ihres Wuchſes wegen, vorzugsweiſe für rauhe Gegenden. Dieſelben werden in allen Bergen des Rheingaues zur Gewinnung faſt aller Sorten weißer Rheinweine faſt einzig und allein gebaut. Die zweijährigen Fechſer werden im hieſigen Weingarten ebenfalls den dreijährigen zum Weinbau vorgezogen, weshalb ich auch blos zweijährige abgeben kann. Sämmtliche Fechſer ſind von den Winzern ſo geſchnitten, wie es zur Anpflanzung nöthig iſt. Zugleich bin ich erbötig, Liebhabern auf Verlangen über den Weinbau im Rheingau alle nöthige und wünſchenswerthe Auskunft mit Vergnügen zu ertheilen.

Beſtellungen bitte ich möglichſt bald an mich oder bei Herrn Friedrich *Häßler* in *Weißenſee* franco einzugeben und den nöthigen Betrag ſogleich beizufügen oder mir auf ein Haus in Frankfurt oder Mainz Anweiſung zu geben.

Zugleich empfehle ich Blumenliebhabern mein neues Roſen-Verzeichniß, welches die vorzüglichſten und neueſten Roſen — *in lauter ſtarken und wurzelächten Exemplaren* — enthält.

Wiesbaden, den 13. Auguſt 1833.

Petſch,

Obergärtner im Düringer'ſchen Garten.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto-Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. XVIII. Weißenſee, (in Thüringen). September 1833. VI. Jahrg.

Fortlaufendes Pränumeranten-Verzeichniß. (Fortſetzung.)

Herr Jakob Klier zu Wien.
Herr Dr. Netto, Inſpektor der Penſions-Anſtalt in den Frank'ſchen Stiftungen zu Halle.
Herr Kaufm. Ferdinand Tſchapeck zu Prag.
Herr Graf von der Goltz zu Wendiſch-Tarsnitz bei Boganitz.
Frau Sophie Neuendorf zu Neukirchen im Königreich Sachſen.
Königl. Poſtamt zu Hamburg.
— — — Neiſſe.
Königl. Poſtamt zu Dinslaken.
— — — Gleiwitz.
— — — Wetzlar.
— — — Deſſau.

Beſchreibung und Cultur einiger ausgezeichneten neuern Zierpflanzen.

(Mitgetheilt vom Herzogl. Hofgärtner Herrn J. W. Boſſe in Oldenburg.)

(Fortſetzung.)

7) **Lathyrus californicus.** Hort. Hamb. **Californiſche Platterbſe.** ♃. Eine neue, perennirende Land-Zierpflanze aus Californien. Die ganze Pflanze iſt glatt, 3 Fuß und etwas darüber hoch. Die Wurzel wuchert und macht weite Ausläufer. Der Stengel kletternd, 3eckig und undeutlich 4eckig, faſt geflügelt. Die Afterblätter ſchief pfeilförmig, an der Baſis mehr oder minder gezähnt, ſpitz. Die Gabelranken haben 9 eirunde, ſehr kurzſtielige, ſpitzliche, abwechſelnd ſtehende, 1 1/2 Zoll lange, 8 — 10 Linien breite, ganzrandige Blätter. Die Blumenſtiele kürzer als die Blätter (beblätterten Ranken), einzeln winkelſtändig, 7- — 9blumig. Die Blumen ſchön, blau und violett, an 9 Linien lang, am äußern Grunde purpurroth, das Fähnchen zierlich mit dunkeln, feinen Adern durchzogen. Die Hülſe an 2 Zoll lang, 4 — 5 Linien breit, anfangs fein flaumhaarig, nachher glatt, wenig gekrümmt. Der Saame braun, rund. — Sie blühet im Juni — Auguſt, und wird wie Silene compacta behandelt. Sie iſt zu haben in Hamburg, bei mir und an a. O. für 12 — 16 gr.

7) **Helianthemum vulgare venustum** Anglor. ♄. Eine ſehr ſchöne Varietät des gemeinen Sonnenröschens, mit blut- oder dunkelrothen, 1 Zoll breiten Blumen in lockern Endtrauben. Die Blätter linien-lanzettförmig, am Rande zurückgerollt, oben dunkelgrün, unten mit ſehr feinem graulich grünem Filze bekleidet. Wird 1 1/2 Fuß hoch und blühet im Frühling und Sommer. Die Vermehrung kann durch Ableger und Stecklinge geſchehen. Pflanzt man die Sommerröschen-Arten im Juni in's freie Land, an eine ſonnige Stelle, ſo blühen ſie noch weit ſchöner und reichlicher. Iſt bei mir u. a. O. zu haben. Preis 10 bis 12 gr.

(Fortſetzung folgt.)

Ueber Calceolarien.

(Mitgetheilt von Herrn F. A. Haage jun. in Erfurt).

Wenn Blumenfreunde ein Pflanzengeſchlecht mitunter kaum dem Namen nach kennen oder daſſelbe nur in einigen Abänderungen und in einerlei Farbe zu ſehen gewohnt ſind, ſie nun aber plötzlich einige 60 Sorten in den verſchiedenartigſten Farben und contraſtirendſten Blätterformen vor ſich ſehen, ſo muß dies wohl bei ihnen Erſtaunen erregen und ſehr angenehm überraſchen.

Dies iſt jetzt der Fall mit den lieblichen Calceolarien oder Pantoffelblumen, welche Kenner und Nichtkenner während des Sommers in meinem Garten täglich zu bewundern Gelegenheit haben: auf einem 70 Fuß langen Beet prangen ſeit Monat Mai, nach Größe und Farbe abwechſelnd arrangirt, 400 Exemplare derſelben, die Mehrzahl davon, 2 Fuß breite und 3 Fuß hohe Stöcke, ſind über und über mit Blüthen bedeckt und wenige davon dürften unter 300 derſelben haben, während die andern mit 1000 davon gleichſam überſäet ſind. Ueber die Anlage dieſes Beetes werde ich ſpäterhin noch Einiges ſagen.

Ich bemerke zuvörderſt, wie wenig dies Geſchlecht früher bekannt war, denn in Dietrichs Lexikon II. Bd. von 1802 finden ſich zwar 9 Spezies verzeichnet, wobei 6 einjährige, indeß mögen dieſe wohl nur in den größten botaniſchen Gärten kultivirt worden ſein: im Handel kam nur die jährige C. pinnata vor. Endlich im Jahre 1824 erhielt die große Pflanzenſammlung auf Belvedere bei Weimar aus London die erſte ſtrauchartige Calceolaria integrifolia, jetzt rugosa, welche damals großes Aufſehen erregte, jedoch auch wirklich ein wahrer Schmuck unter den Neuholländer Pflanzen war, ſie koſtete damals 6 ℛ𝓈. Später erſchien nun die Calc. scabiosaefolia, dann salicifolia, plantaginifolia, corymbosa und andere, alle aber nur mit gelben Blumen; es war daher eine deſto willkommenere Erſcheinung, als die Calc. arachnoidea ankam, die der Herr Lieut. Wäber in Dresden aus den Niederlanden im Jahre 1829 (?) mitbrachte und welche ſich bald darauf in den deutſchen Gärten ſehr verbreitete. Dieſe, mit ſchönen dunkellilla gefärbten Blumen, machte unter den bereits vorhandenen gelben Blumen eine prachtvolle Abwechſelung, und ſie wird ſich gewiß recht lange als große Zierde erhalten; ſie wurde aber dennoch durch die noch prächtigere C. tricolor übertroffen, die im Frühjahre 1832 aus Lüttich zu uns kam. Im vorigen Herbſt endlich wurden 40 ganz neue Sorten angezeigt, die ich mir ſofort und zwar für ziemlich hohe Preiſe (10 bis 25 Frks.) kommen ließ. Dieſe nun und mehrere, die ich von der C. tricolor und arachnoidea durch gegenſeitige künſtliche Befruchtung gewann, ſind es, welche jetzt in üppigſter Fülle mit ihrem buntfarbigen Blüthenſchmuck auf beſagtem Beete prangen.

Daß mehr als $\frac{2}{3}$ nur Formen oder Baſtarde ſind, iſt nicht zu bezweifeln, daß aber dieſe Formen durch Kreuzung ſo leicht entſtehen und die Befruchtung überhaupt ſo gut auſchlägt, hatte ich nicht geahnet; durch einige Ausſaaten habe ich aber die Gewißheit erlangt, daß in einigen Jahren wohl eben ſo viele Arten Calceolarien beſtehen werden, als jetzt Pelargonien vorhanden ſind, und dürfte dieſe Modeblume die Pelargonien in vieler Hinſicht noch weit übertreffen, wenn man mit der Kultur derſelben recht vertraut iſt, denn nicht allein, daß ſie in äſthetiſcher Hinſicht allen Anforderungen entſpricht, ſo iſt es auch beſonders die Dauer ihrer Blüthezeit, was jeden Blumenfreund anſpornen muß, dieſe ſchöne Pflanze zu kultiviren; im freien Lande nämlich blühet ſie vom Mai bis October ununterbrochen und täglich ſchöner fort, in Töpfen nach jedesmaligem Verſetzen 4 bis 6 mal des Jahres, und wie wenig Pflanzen gewähren dieſen Genuß?

Die zweckmäßigſte Behandlung werde ich hier im Allgemeinen andeuten, beſtimmte Vorſchriften laſſen ſich indeß, ſo leicht ſich dieſe Pflanze auch ziehen läßt, für Erde, Waſſer und Standort nicht geben, ſondern jeder Blumenliebhaber muß ſich nach der ihm zu Gebote ſtehenden Lage, Erde u. ſ. f. richten, und durch Verſuche das Zweckdienlichſte ermitteln. (Fortſetzung folgt).

Ueber die Anzucht der Georginen in kleineren Gärten.

(Mitgetheilt von W. Steiger aus S.)

Die Blumenzeitung, welche ſeit Jahren für Ausbreitung und Beförderung der Blumen-Cultur in einem weiten Kreiſe thätig geweſen, und ſich bis auf dieſen Augenblick die Liebe und das Wohlwollen aller Blumenfreunde zu erhalten wußte, hat ſehr oft Beiträge zur Cultur der Georginen, dieſes köſtlichen Gartenſchmucks, geliefert, und, da die Erziehung derſelben im Ganzen mit ſo wenigen Schwierigkeiten verbunden zu ſein ſcheint, auch ſogar Monographien dieſes ſchönen Zierſtrauchs in ſeinen unzähligen Varietäten erſchienen ſind, ſo dürften die Acten über dieſen Gegenſtand wohl geſchloſſen ſcheinen.

Da jedoch viele dieſer Anweiſungen manchem Gartenfreunde nicht in die Hände kommen möchte, auch mit Unrecht meiſtentheils die Georginen nur für größere Anlagen und Gärten geeignet, dargeſtellt wird, ſo glaube ich, dürfte eine kurze Bezeichnung einer Methode, Georginen für kleinere Hausgärten leicht und früh zu ziehen, wohl nicht überflüſſig ſein. Der größte Theil der Blumenliebhaber iſt ja außerdem in ſeinen Mitteln und in ſeinem Raume beſchränkt, und gerade dieſer ſucht in der Blumenzeitung Auskunft, die ihm bei jenen Beſchränkungen zu Hülfe kommen könnte. Für Kunſtgärtner, welche größern Anſtalten vorſtehen, iſt die Blumenzeitung nicht beſtimmt, obgleich Viele dieſes ſo achtbaren Standes dieſelbe mit Vergnügen leſen, auch mehrere Ausgezeichnete derſelben Mitarbeiter an dieſem verdienſtvollen Unternehmen ſind; wie denn jeder Blumenfreund die Namen eines B. in O., eines M. in W. und andere mit dankbarer Anerkennung nennt. So erfolgt denn hier in flüchtigen Umriſſen die Beſchreibung des Verfahrens, wie ich für einen kleinen Hausgarten die Georginen behandle.

Wenn im Herbſt durch die erſten Nachtfröſte die Stengel der Georginen getödtet worden ſind, bleiben ſie, da ſelten der Froſt ſogleich tiefer eindringt, noch einige Zeit in der Erde. Sie ſogleich heraus zu nehmen iſt unrecht, da oft der größte Theil der Wurzeln noch nicht völlig reif geworden, durch das Abſterben der Stengel aber bald dahin gebracht wird.

An einem, wo möglich, ſonnigen Tage *) werden dieſe nun mit Vorſicht und Behutſamkeit ausgegraben, und ſogleich ganz rein abgewaſchen. Dies geſchieht am zweckmäßigſten, indem man die Wurzeln in einem Gefäß mit Waſſer durch Hin- und Herſchütteln abſpült, und von Zeit zu Zeit die noch dazwiſchen befindliche Erde mit einem ſtumpfen Hölzchen losmacht. Viele Gartenfreunde entledigen die Wurzeln nicht von der Erde. Theils wird aber dadurch das Gewicht dieſer oft ſehr großen Stöcke vermehrt, theils hält ſich auch, trotz der ſorgfältigſten Abtrocknung, noch Feuchtigkeit in dieſer Erde, welche dann in der Winterung noch Schimmel und Fäulniß erzeugt. (Fortſetzung folgt.)

Ueber die Erziehung der Eriken, Rhododendren, Melaleuken, Metroſideren, Leptoſpermum u. ſ. w. aus Samen.

(Mitgetheilt von P. aus W.)

Mühſam und zeitraubend iſt die Vermehrung dieſer ſo ſchönen Pflanzengattungen. Selten wird der Blumenfreund durch einen glücklichen Erfolg ſeiner Bemühungen belohnt; hat er es ja durch unſägliche Mühe und Sorgfalt endlich ſo weit gebracht, daß der ausgeſtreute Samen ſeine Keime zu entwickeln beginnt, ſo werden doch leider noch oft genug durch ein langſames Hinwelken und Verderben der zarten Pflänzchen ſeine Hoffnungen vernichtet. Mißvergnügt mit dem Reſultat ſeiner Bemühungen unterläßt man ſehr oft neue Verſuche mit der Ausſaat, und daher kommt es, daß dieſe exotiſchen Zierpflanzen noch nicht allgemeiner verbreitet ſind. Auch mir mißglückten anfangs mehrere Ausſaaten, bis ich endlich, nach und nach durch erneute Verſuche aufmerkſam gemacht, meine Bemühungen mit dem beſten Erfolge gekrönt ſah. Durch die Ausſaat des Samens

---

*) Im Jahr 1829 war ich genöthigt, die Georginenwurzeln unter ſchuhhohem Schnee herauszugraben, und es iſt mir nicht eine einzige verloren gegangen. W. St.

gewinnt man mancherlei Vortheile; bei guter Behandlung erzieht man eben ſo ſchnell, als durch jede andere Vermehrungsmethode, junge Pflanzen, die an Dauer und kräftigem Wuchſe die durch Ableger, Stecklinge ꝛc. gemachten weit übertreffen; durch Samen gewinnt man weit mehr junge Pflanzen, und hat dabei das Vergnügen, neue, an Bau und Blüthe von den Mutterpflanzen verſchiedene Varietäten zu gewinnen. Zur Vermehrung durch Veredlung der Azaleen und Rhododendren ſind endlich Samenpflanzen unentbehrlich. Ich werde mich bemühen, meine ſeit Jahren gemachten Erfahrungen über die Cultur der erwähnten Pflanzen hier ſo treu und ausführlich als möglich in folgenden Abſchnitten mitzutheilen:

§. 1. Einrichtung der zweckmäßigſten Winterhäuſer oder Conſervatorien für Eriken ꝛc.

§. 2. Ueber die erforderliche Erde, die Herbeiſchaffung des Samens und die Ausſaat ſebſt.

§. 3. Die tauglichſten Geſchirre zur Aufnahme des Samens, Standort und Behandlung der beſäeten Geſchirre bis zum Verpflanzen.

§. 4. Verpflanzen derſelben, der dazu nöthigen Geſchirre und Behandlung der verpflanzten Sämlinge bis zum Monat Oktober.

§. 5. Aufſtellung derſelben im Conſervatorium und Behandlung derſelben während der Wintermonate.

§. 6. Temperatur und Heizung des Hauſes.

§. 7. Aufſtellung der Pflanzen im Freien nach verfloſſenem Winter.

§. 8. Verſetzen und Behandlung während des Sommers bis zum Einzug in das Haus.

§. 9. Ueber Veredlung der Camellien und Behandlung der veredelten Pflanzen.

§. 10. Vorzügliche Fabrikation der Etiquetten.

§. 11. Ueber Verpflanzung neuholländiſcher Pflanzen in Gruppen, im freien Lande.

§. 12. Ueberwinterung im Freien.

§. 13. Vermehrung der Haiden, Azaleen ꝛc. durch Stecklinge und Ableger. (Fortſetzung folgt).

Neue Pelargonien bei Hrn. Lemon in Paris. *)

Im vergangnen Jahre hatte Hr. Lemon, dieſer ausgezeichnete Pelargonien-Erzieher, ein Samenbeet von mehr als 1500 Pelargonien-Sämlingen, aus Samen der vorzüglichſten Sorten. Alle waren kräftig herangewachſen; da aber dieſe Pflanzen, wenn ſie beſondern Werth haben ſollen, auch ſchon durch die Blätter ſich auszeichnen müſſen, ſo hat Hr. Lemon bereits ein Tauſend dieſer Neugebornen wieder ausgeſchoſſen. Fünf bis ſechs Hundert Stöcke davon werden demnach im nächſten Frühjahre ihre Blumen zeigen.

Zu den ſchönſten und neueſten Pelargonien zählt Hr. Lemon in ſeinem neueſten Pflanzen-Verzeichniſſe folgende:

P. adulterinum violaceum, mit dichten Dolden von großen ſchönvioletten Blumen.

P. amabile hispidum, eine ſtarke, ſehr reichlich blühende Pflanze, roſenrothe Blumen mit großen, ſehr lebhaft feuerfarbigen Flecken.

P. amabile superbum, ſchöne Dolden von ſehr großen roſa-carminfarbigen Blumen mit braunen ſammetartigen Flecken.

P. augustissimum corallinum, Dolden von ſehr breiten (3 Zoll) Blumen, mordorée-purpurfarbige Blumenblätter, mit weißen Flächen und blutrothen Flecken.

P. augustissim. superb. Die Blumen eben ſo breit wie die vorhergehenden, die obern Blumenblätter carmoiſin-purpurfarbig, die untern halb lila, halb roſa-carminroth, breite ſammetbraune Flecke, feuerrothe Streifen. (Fortſ. flgt.)

---

*) Aus den Annales des Jardiniers Amateurs. Janvier 1833. Paris chez Renard.

Neue oder wenig bekannte Zierpflanzen.*)

Acacia grandiflora Willd. Großblüthige Akazie. Dieſer in Indien einheimiſche Strauch iſt eine der ſchönſten Zierden des Warmhauſes, und verdient für den Handel beſonders empfohlen zu werden. Man hat bei dieſer Pflanze den Vortheil, daß man ſie jedes Jahr bis einige Zoll über der Erde abſchneiden kann, und daß die neuen Stengel bis zum Monat Auguſt wieder eine Höhe von 4 bis 5 Fuß erreicht haben und bis in den Oktober blühen. Die Blätter ſind doppelt-gefiedert, mit ſehr zahlreichen, länglichen, ganz kleinen und ſehr zierlichen Blättchen. Der gemeinſchaftliche Blattſtiel iſt 6 bis 7 Zoll lang und rauh. Die Fiederblättchen, an der Zahl 20 bis 30, haben jedes mehr als 100 Blättchen, weshalb ein vollkommnes Blatt 8 bis 9 Zoll lang und 4 bis 5 Zoll breit iſt. Die Blüthe iſt endſtändig, in einer langen ſtraußfarbigen Traube, deren zahlreiche Blüthen ſich allmählig von unten nach oben lange Zeit hindurch öffnen. Der Kelch iſt klein, grün, unbedeutend; aber die Schönheit der Blüthen beſteht in den zahlreichen, 3 Zoll langen, dunkelviolett-purpurfarbigen Staubfäden, welche zierliche Büſchchen bilden.

Bisher hatte dieſe Pflanze im Jardin des Plantes zu Paris noch keinen Samen angeſetzt, doch jetzt (den 28. Sept. 1832) bemerkt man eine kleine Frucht, welche zu reifen ſcheint. Die Cultur iſt die der andern Warmhauspflanzen.

Phlox rosea Hortul. Roſenfarbige Flammenblume. Eine ſehr ſchöne Varietät, die Hr. Souchet, Gärtner in Schloß Fontainebleau vor 3 Jahren aus Samen gezogen hat. Die Stengel ſind dick, rauh, 3 bis 4 Fuß hoch; die Blätter ſind gegenſtändig, groß, etwas rauh. Der Stengel endigt ſich in einer breiten Rispe ſchön roſenfarbener Blumen, die ſich rückſichtlich der Farbe von allen Flammenblumen ſehr unterſcheiden. Die Blüthe dauert vom Ende April bis zu Ende September.

---

*) Aus der Revue horticole.

Syſtematiſche Namen der merkwürdigſten Pflanzen-Gattungen und Arten, ihr Genitiv ꝛc.

Mitgetheilt von L. aus T. (Fortſetzung).

Amarella (Gentiana) L. Der bittere Enzian.

Amarus, bitter, von der Bitterkeit ihres Krautes.

Amaryllis. L. (Hort. Cliff. 135.) idis. f. Amarylle, Narziſſen-Lilie.

Amaryllis (von ἀμαρύσσω, ich glänze, ſchimmere) war bekanntlich der Name eines ländlichen Mädchens, welches von Virgil (Ecl. I. 37. — O Amarylli, amica rustica, formosa!) für ſehr ſchön gehalten wurde. Daher wählte Linné dieſen Gattungsnamen.

Amaryllis Atamasco. L. Die virginiſche Narziſſen-Lilie.

Den Namen Atamasco hat ſie erhalten, weil ſie von den Indianern ſo genannt werden ſoll.

Am. guttata. L. Tropfen-Amaryllis.

Von gutta, der Tropfen, denn der Rand ihrer Blätter iſt mit Härchen wie mit Wimpern beſetzt, die Blätter ſind gefleckt, die Blume iſt purpurroth. Späterhin hat ſie Linné Haemanthus ciliaris genannt. (Fortſetzung folgt).

Varietäten.

Berlin. Am 8. Juli blühten im Königl. botaniſchen Garten folgende ſchönblühende Pflanzen: Pothos digitata Jacq., Caladium odoratum, Roxb. Arum macrorhizum L., Tradescantia Karwinskii Mart., T. cirrhifera Roxb., Phalangium nepalense Lindl., Conanthera Echèandia Pers., Ophiopogon spicatus Ker., Funkia cordata Siebold., F. lancifol. Spreng., Moraea Herberti Lindl., Patersonia glabrata Rob. Br., P. glauca R. B., Maranta setosa Dietr. sp. pl. 1. p. 23., M. Jacquini Roem. et Sch., Lomatia longifol. R. B., Stenocarpus salignus R. B., Petrophila pulchella R. B., Protea Scolymus Thunb., Anagallis Webbiana Hort. Angl., Chironia elongata Eckl., Cerbera Ahóvai L., C.

Odallam Hamilt. (C. Manghas Bot. Mag.), C. Thevetia L., Echites chinensis Hort. Angl., Linaria triornithophora Willd., Isoplexis Sceptrum Lindl. (Digitalis Sceptrum L.).

(Beſchluß folgt).

Caſſel, den 23. Auguſt 1833. In der gewählten, aus mehrern hundert Sorten beſtehenden Dahlien- oder Georginenſammlung des Kaufmann und Samenhändler Stephan Münch in Caſſel blühen gegenwärtig eine Anzahl der neueſten engliſchen Zwerg-Georginen in Exemplaren von 2 — 4 Fuß Größe. Dieſe Sorten ſind vom ſchönſten Farbenſpiel, und zeichnen ſich durch ihren außerordentlichen Blüthenreichthum beſonders aus. Prachtvoller ſind jedoch jedenfalls die neueſten mittelhohen Sorten, worunter wahrhaft bewundernswürdige ſich befinden. — Unter den anemonen- und kugelblüthigen Sorten ſind: Dark Crimson und new red Crimson die ſchönſten und beachtungswertheſten. Erſtere hat eine Größe von 4 Fuß; die purpurfarbigen Blumen ſind höchſt regelmäßig eng geduttet, und unveränderlich kugelrund geſtaltet, und krönen auf langem Stiel in großer Zahl den Stock. New red Crimson, 5 Fuß groß, der vorigen an Farbe faſt ganz gleich, imponirt mehr durch ihre etwas größeren Blumen, iſt jedoch nicht ſo regelmäßig geduttet und vollkommen kugelrund als obige Dark Crimson.

In den Samenbeeten findet ſich unter andern Prachtvarietäten als neue Erſcheinung eine ſchwefelgelbe anemonenblüthige Georgine.

Paris. Am 3ten bis 9ten Juni 1833 fand die dritte öffentliche Ausſtellung der Produkte des Gartenbaues in der Orangerie der Tuilerien ſtatt, und am letzten Tage derſelben war eine allgemeine feierliche Verſammlung der Mitglieder; es wurden mehrere Vorträge gehalten und die Preiſe entſchieden.

Obgleich die Zahl der Theilhaber, welche Gegenſtände zur Ausſtellung gebracht hatten, wie der ausgeſtellten Pflanzen ſelbſt, nicht ſo beträchtlich als im vergangnen Jahre war, ſo war ſie doch eine herrliche Augenweide, und die unzählbare Menge der Beſchauer, die 4 Tage lang hinzuſtrömte, beweiſet das Intereſſe, welches man dafür hatte.

Die allgemeine Verſammlung fand Sonntags, den 9ten Juni, Nachmittags um 2 Uhr in der Abtheilung der Orangerie der Tuilerien ſtatt, die zu dieſem Zwecke auf das Prächtigſte ausgeſtattet war. Anſtatt der Inſtrumentalmuſik ließ Herr Wilhem nach ſeiner Methode mehrere Geſangſtücke von 100 Kindern, Knaben und Mädchen aufführen, welche ungemeinen Beifall erhielten. Ein 4 Jahr altes Kind ſang dabei eine kleine Soloparthie eben ſo ſicher, als takt- und geſchmackvoll. Der Präſident der Geſellſchaft Vicomté Héricart de Thury, eröffnete die Sitzung mit einem Vortrage über Gärtnerei; alsdann gab der Generalſekretär der Geſellſchaft M. le Chevalier Soulange Bodin Bericht über die Arbeiten der Geſellſchaft im verfloſſenen Jahre.

Die ſechs Ermunterungs-Medaillen wurden ertheilt:

1) an Hrn. Pepin, Chef der botan. Lehrſchule im Jardin des Plantes nach dem Vortrage des Hrn. de Sainte-Columbe.
2) an Hrn. Gircourt, Gärtner des Hrn. Morel de Vindé nach dem Bericht des Hrn. Vicomte Debonnaire de Gif. (Fortſ. folgt.)

Wien. Zum zweiten Preiſe haben mehrere Damen fünf Species-Dukaten ausgeſetzt und er würde dem von Sr. kaiſerl. Hoheit dem Erzherzoge Anton, unter der Deviſe: „Von einem Verehrer der ſchönen Blumen," ſehr anziehenden und die edelſten Blumen enthaltenden Bouquete zuerkannt, welchen Preis jedoch Höchſtdieſelben huldreichſt dem an Schönheit zunächſt erkannten, von Herrn Carl Zahn in Hietzing überbrachten Bouquete abzutreten geruhten.

Blumenbouquete werden ferner geſendet: Von Herrn Carl Pichler aus dem k. k. Hof-Pflanzengarten zu Schönbrunn, mit der Deviſe: „Plinius" — Von Herrn Czerwenka aus demſelben k. k. Hofgarten, beſtehend aus Monocolyledonen. — Von Herrn Joſeph Warnia, Gartengehülfen des Kunſtgärtners Held. Ein Tableaux von lebenden Aurikeln, ein Kranz, in deſſen Mitte den Schriftzug C enthaltend, mit der Deviſe: „Ehret die Frauen, ꝛc. geſendet von Herrn

Ferdinand Wurzinger aus Yocs, iſt ebenfalls aufgeſtellt. In Allem langten daher fünf Blumenbouquete ein. Um die Bouquetpreiſe konnten nur Gartenbeſitzer und Gärtner concurriren; ſo wie dem Ueberbringer eines Bouquets bei Uebergabe an das dazu beauftragte Individuum, als Entſchädigung für die abgeſchnittenen Blumen, bis fünf Gulden Conv. Münze verabfolgt wurden, es ſei denn, daß der Eigenthümer auf dieſe Vergütung verzichtete. Nach erfolgter Preiszuerkennung wurde der Name des Ueberſenders erſichtlich gemacht.

(Fortſetzung folgt.)

Schönbrunn bei Wien, den 16. Juli 1833. In den Gewächshäuſern des k. k. Hofgartens hierſelbſt blühten folgende Gewächſe:

Angelonia salicariaefolia. (Humboldt.) Aus Neuſpanien. Scrofularinae. Didynamia, Angiospermia. — Arthrostemma versicolor. (Decandolle.) Aus Mexico. Melastomaceae. Octandria, Monogynia. — Bunchosia argentea. (Decandolle.) Aus Caracas. Malpighiaceae. Decandria, Monogynia. — Crinum americanum. (Linné.) Aus Südamerika. Amaryllideae. Hexandria, Monogynia. — Erica capitata. (Linne) Vom Vorg. d. g. Hoff. Ericeae. Octandria, Monogynia. — E. comosa, alba. (Hortorum.) V. Vorg. d. g. H. E. O. M. — E. jasminiflora. (Andrews.) - V. V. d. g. H. E. O. M. — E. rubens (Thunberg.) V. N. d. g. H. E. O. M. — Melaleuca thymifolia. (Smith.) Aus Neuholland. Myrtaceae. Polyadelphia, Icosandria. — (Beſchl. flgt.)

München. (Fortſetzung.) Tauſch-Anerbieten des Hrn. Collegienraths v. Gemünden daſelbſt.

Pelargonium:

Abundans
Albert
Alfred
altum
altissimum
assurgens
ampelophyllum
augustissim. coerul.
august. odorat.
— purpur.
Barrington nov.
Bethelianum
Bristolianum
Calanthum
chondrophyll.
chrysoplenum
Crasmon
cavrianum
Candolleanum
Christian
confluens
discolor
disgenon
dulcissimum
euprosopon
exochum
epiphanon
flore abundante
Frauenhofer
geniculatum.

(Fortſetzung f.)

Bollweiler. (Fortſetzung.) Camellien-Sammlung, welche für 1833 nach der Wahl der Gebrüder Baumann zu Bollweiler zu veräußern iſt.

Cam. jap. Warratah gigantea
C. j. W. glor. Belgica
- - - - mundi
- - - gloriosa
- - - Goussonia
- - - grandissima
- - - Graya
- - - - nova
C. j. W. helvola
- - - heptangularis
- - - heterophylla
- - - (C. acutipetala?)
- - - hexangularis
- - - Hovea
- - - imbricata
- - - insignis alba
- - - - coccinea
C. j. W. insign. rubra involuta
- - - (C. myrtifol.?)
- - - Kentii
- - - kermesina
- - - Knight's nova
- - - Knightii
- - - Lehmannii.

(Fortſetzung folgt).

(Auszug aus einem Schreiben aus Havanna. *) — Welche Vegetation in dieſem himmliſchen Clima, in dieſem ewigen Sommer; Pflanzen, die in unſern Treibhäuſern ſorgfältig gepflegt, kaum eine Spanne hoch werden, gedeihen hier in der freien Natur zu einer Höhe und Kraft, die uns unglaublich erſcheint. Wir haben keinen Maßſtab für die erſtaunliche Größe der Stauden, Sträucher und Bäume des Tropenlandes. Mandeln, Citronen, Feigen und eine Menge der edelſten Früchte, wie Ananas, Melonen, wachſen wild, und die goldnen, aromatiſchen Orangen, Lemonen liegen unberührt in dem hohen, üppigen Graſe. Auf den Cedern, Palmen, Pananen, Cokusbäumen wiegen ſich Vögel, deren prächtiger Farbenſchmelz das Auge blendet und die herrlichſten Blumen verbreiten einen Balſamduft von einer Stärke, Fülle und Lieblichkeit, die uns von der Natur ſo karg bedachten Nordländer in ein Paradies verſetzt.

Die Rosa du Roi, welche ſowohl in Paris als in Wien große Epoche macht, läßt ſich ungemein leicht treiben; ſie mißglückt, auch in der ſchlechteſten Behandlung, niemals, und man kann ſie zu allen Jahreszeiten blühend haben.

---

*) Dem Herrn Einſender einſtweilen meinen verbindlichſten Dank und die Verſicherung, daß, ſobald es der Raum des allg. Unterhaltungsbl. geſtattet, die mir gütigſt mitgetheilten Briefe aus Neu-York ꝛc abgedruckt werden ſollen. Der Red.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt=Aemter, Zeitungs=Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto=Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. XIX. Weißenſee, (in Thüringen). September 1833. VI. Jahrg.

Ueber Calceolarien.

(Mitgetheilt von Herrn F. A. Haage jun. in Erfurt.)

(Fortſetzung.)

Die Calceolarien gedeihen in gewöhnlicher Heideerde am beſten, und dieſe braucht nicht ſo vorzüglich zu ſein, als andere neuholländiſche Pflanzen ſie verlangen, gewöhnliche Holzerde aus hohlen Weidenbäumen, leichte Raſenerde, Erde von verfaultem Unkraut, Torf oder Braunkohle, überhaupt jede leichte Erde ſagt ihnen in Töpfen zu; hat man mehrere ſolcher Erden, kann man ſie auch mit Vortheil zuſammen miſchen; ſollte aber für den Augenblick des Einſetzens nur gewöhnliche Gartenerde vorhanden ſein, ſo ſiebe man ſolche recht fein aus, miſche etwas Sand bei und fülle die Töpfe, worin die Pflanzen eingeſetzt werden ſollen, bis zur Hälfte mit gehacktem Moos an, und pflanze ſie dann mit dieſer Erde ein, worin ſie dann ebenfalls kräftig wachſen werden. Sie lieben ferner einen mehr ſchattigen als ſonnigen Stand und viel Feuchtigkeit, kann man dieſen nicht gut geben, ſo muß man ſie im hohen Sommer von 9 Uhr Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags vor den brennenden Sonnenſtrahlen durch irgend eine Bedeckung ſchützen, was übrigens auch vor anhaltendem Regen geſchehen muß.

Im freien Lande, worin die Calceolarien beſonders ſchön und kräftig wachſen, gedeihen ſie auch in einer ſonnigen Lage, beſonders wenn man bei anhaltend trocknem Wetter die Oberfläche der Erde mit etwas Moos belegt, ſchweres Gartenland muß durch Beimiſchung von Haide=, Torf= oder Holzerde mild gemacht werden und, da die Wurzeln tief eingehen, wenigſtens 1½ Fuß ausgeſtochen, durchgeſiebt, mit genannten Erdarten vermiſcht oder von kleinen Holzabfällen, Rinden oder Moos eine Unterlage erhalten und bei trockenem Wetter begoſſen werden; das Auspflanzen geſchieht nach der Hälfte des Mai's, im mildern Klima auch früher.

Das Einſetzen braucht nicht vor der Mitte des Septembers zu geſchehen, indem die vielen fleiſchigen Wurzeln ſtets etwas Erde behalten, und überhaupt ſehr leicht anwachſen; nur wenn ſolche während des Sommers zu ſehr gewuchert, muß man einen Theil der Zweige ganz entfernen, ſo wie bis zum völligen Anwurzeln ſchattig ſtellen, und täglich einigemal beſpritzen, ſie blühen dann noch eine Zeitlang im Winterquartier. Vom November an bis Mitte Februar muß man ſie möglichſt trocken halten, ſo lange die Temperatur nicht unter 0 ſteht, oft friſche Luft geben, und ſie überhaupt mehr kalt als warm halten.

Die Vermehrung durch Stecklinge iſt leichter, als bei allen übrigen neuholländiſchen Pflanzen; die kraut- oder ſtaudenartigen machen an allen Trieben junge Wurzeln und ſelbſt die ſtrauchartigen bilden größtentheils Luftwurzeln, beſonders dann, wenn man ſie in der zweiten Hälfte des Februars und ſpäter öfters beſpritzt, was ohne Nachtheil geſchehen kann. Die Zweige ſtopft man in kleine Töpfe oder auch in ein lauwarmes Miſtbeet in die ſchon angegebenen Erden, befeuchtet und beſchattet ſie vierzehn Tage bis drei Wochen, wo alsdann der größte Theil ſchon bewurzelt ſein wird, nur im hohen Sommer und überhaupt bei trockener Witterung wachſen die Stecklinge faſt gar nicht, hingegen nach der Mitte Auguſts gedeihen ſie wieder und wachſen in ſechs Wochen bis zur blühbaren Pflanze heran.

Schwieriger iſt aber die Erziehung durch Samen, indem derſelbe von den mehrſten Sorten ſo klein iſt, daß die Form des Körnchens nicht mit bloßen Augen zu unterſcheiden iſt, es darf daher dieſer Same gar nicht mit Erde bedeckt, ſondern blos aufgeſäet werden. Ich verfahre hierbei auf folgende Weiſe: Mittelgroße, mehr flache Töpfe werden bis zur Hälfte mit kleingeſchlagenen Scherben oder gehacktem Moos und dann mit feingeſiebter Haide=, oder Holz= oder Lauberde bis zum Rand des Topfes angefüllt, feſtgedrückt und geebnet, hierauf der Samen gleichmäßig ausgeſäet und überall aufgedrückt, mit einer Glasſcheibe bedeckt, in einen Unterſatznapf geſtellt, der bis zum Erſcheinen der Pflanzen mit Waſſer gefüllt bleibt; die Töpfe oder Näpfe werden alsdann in ein ganz kaltes Miſtbeet, oder in ein ungeheiztes nach Morgen gelegenes Zimmer hinter die Fenſter geſtellt, ſpäter auch auf eine ſchattige Stelle in den freien Garten gebracht. Sobald ſich nun das Herzblatt zeigt, hebt man die noch ſehr kleinen Pflanzen mit fein geſpitzten Hölzchen aus und verpflanzt mehrere in kleine Töpfe beiſammen, die ebenfalls von unten eine Zeitlang befeuchtet werden; bildet ſich auf der Oberfläche der Samentöpfe Moos, worin die Samen ſowohl als auch die kleinen Pflänzchen leicht erſticken, ſo ſtreuet man fein gewaſchenen Sand darauf. Nach jedesmaligem Verpflanzen muß die Oberfläche des

Samentopfes wieder feſtgedrückt werden, indem die Pflänzchen ſelten auf einmal erſcheinen, oft kommen ſogar nach der 2ten und 3ten Auspflanzung mehr zum Vorſchein als das erſtemal vorhanden waren.

Haben die Pflanzen nun das fünfte bis ſechſte Blatt erreicht, ſo werden ſie auf ein dazu vorgerichtetes Beet gebracht, wo ſie dann überaus ſchnell und kräftig wachſen werden; iſt die Ausſaat Anfangs April und noch früher geſchehen, ſo kann man Ende Juni und ſo fort der Flor entgegen ſehen. Welche Entſchädigung für die gehabte Mühe und welchen Genuß hat dann der Blumiſt zu erwarten! Dies iſt nicht zu beſchreiben, nicht wie bei den Nelken im zweiten, und wie bei den Pelargonien und Aurikeln im dritten und vierten Jahre, ſondern ſchon in wenigen Monaten wird er überaus reichlich belohnt.

Von ungefähr dreißig der allervorzüglichſten Calceolarien, die ich mit vieler Sorgfalt befruchtete, werde ich Samen ernten und die Sorten ſpäter hier verzeichnen, für jetzt laſſe ich das Verzeichniß der ſämmtlichen Sorten nebſt einer kurzen Beſchreibung folgen, und füge auch die feſten, ſehr billigen Preiſe bei, wonach ſie ſofort bei mir zu beziehen ſind. (Fortſ. folgt.)

Ueber die Anzucht der Georginen in kleineren Gärten.

(Mitgetheilt von W. Steiger aus S.) (Fortſetzung.)

Die abgewaſchenen Wurzeln werden ſorgfältig an der Luft abgetrocknet, ins Haus gebracht, in einem froſtfreien Zimmer auf den Fußboden in Reihen neben einander geſtellt, und zwei Fuß hoch mit ganz zu Staub gewordener und trockener Blumenerde überſchüttet. (Die Durchwinterung in Kellern oder Gewölben iſt durchaus nicht anzurathen, da in ihnen, auch wenn ſie noch ſo trocken ſind, die Wurzeln leicht vom Schimmel ergriffen werden, die alten Stengel auch ſehr leicht den Brand bekommen.) Hier bleiben ſie unberührt und ungefährdet bis zum Ende des Februar liegen, und ſelbſt da, als im kalten Winter 1830 der Froſt am 21. Februar in meine Blumenſtube eindrang, hatten ſie nichts gelitten.

Jetzt zertheile ich die Knollen in ſo viel Stücken als nur möglich. Es verſteht ſich freilich von ſelbſt, daß an jeder Wurzel ein Theil des alten Stammanſatzes bleiben muß, unter dem ſich die neuen Triebe entwickeln. Große, mit vielen Wurzeln behangene Stöcke zu pflanzen, iſt nicht rathſam, da dieſe unförmliche, breite Büſche bilden, und ſelten ſo ſchön werden, als die von einzelnen Wurzeln.

Jede derſelben pflanze ich in einen Topf in gute lockere Erde, in deren Wahl und Miſchung man übrigens nicht ängſtlich zu ſein braucht. Die Töpfe müſſen höher als weit ſein, da die Wurzeln oft ſehr lang ſind und es vortheilhaft iſt, wenn der Kopf der Georgine wenigſtens einen halben Zoll in die Erde kommt. Doch habe ich ſehr lange und nicht zu ſtarke Wurzeln oftmals ganz krumm gebogen, und ſie ſind gut fortgewachſen. Gewöhnlich bediene ich mich der bekannten hohen und engen Töpfe, in welchen Hyazinthen getrieben werden, mit welchen auch zugleich große Raum-Erſparung gemacht wird.

Da man in einem kleinen Garten nicht leicht mehr als 50 — 60 Stück Georginen anpflanzen wird, ſo kann dieſe Anzahl wohl in einem ſonnigen Zimmer oder in einem nicht zu warmen Kaſten untergebracht werden. Sobald ſie zu treiben anfangen, was in 8 bis 14 Tagen, auch wohl früher, geſchieht, indem ſich bei gelinden Wintern die Augen ſehr zeitig entwickeln, muß man das Luftgeben ja nicht verabſäumen, da die Stärke des Stengels, und das Gedeihen der Blumen zu reicher Fülle, hauptſächlich von dieſem Umſtande abhängt. Sobald warme, ſonnige Tage kommen, werden die Töpfe in die freie Luft gebracht, und ſtehen gewöhnlich von Mitte April an bei mir in einem gegen Südoſt gerichteten und bedeckten Bienenhauſe. Kleine Reife ſchaden an einem ſolchen Orte nicht leicht, wenn auch zuweilen die Blätter ihre dunkelgrüne lebhafte Farbe verlieren ſollten. Nur müſſen ſie ſtarkem Luftzuge nicht ausgeſetzt ſein.

Der hervorgetriebene Stengel wird an einem Stabe befeſtigt, alle andern Sproſſen aber von jetzt an entfernt, und man gewinnt durch dieſe Maaßregel mehr baum- als ſtrauchartig hervorſchießende Pflanzen. Sobald im Mai die Fröſte vorüber ſind, werden ſie mit vollem Ballen in's Land an die ihnen beſtimmten Stellen geſetzt, wozu ich Rondele zu 16 — 20 Stück, oder erhöhte Rabatten zu zwei Reihen wähle. Man vergeſſe dabei nicht, die niedrigen Sorten vor den höheren zu reihen, damit jene von dieſen nicht verdeckt und verdrückt werden. Daß der Boden ein gut durchgearbeiteter, wenn auch nicht ſtark gedüngter Gartengrund ſein müſſe, brauche ich nicht weiter zu berühren. Zu ſtarke Düngung iſt nicht rathſam, da dieſe nur viel Kraut aber wenig Blumen giebt. Auf Beeten, die das Jahr vorher Kohl, Sellerie, u. ſ. w. trugen, gedeihen die Georginen vortrefflich. Oft habe ich das Land mit halbverfaultem Laube aus dem Sommerkaſten durchgraben laſſen, und mich gleichen Erfolgs erfreut.

(Beſchluß folgt.)

Ueber die Erziehung der Eriken, Rhododendren, Melaleuken, Metroſideren, Leptoſpermum u. ſ. w. aus Samen.

Mitgetheilt von P. aus W. (Fortſetzung.)

§. 1. Conſtruktion der zweckmäßigſten Winterhäuſer oder Conſervatorien für Eriken, Rhododendren, Melaleuken, Azaleen ꝛc.

Ein zweckmäßig gebautes Winterhaus iſt zur Unterhaltung exotiſcher Zierpflanzen unumgänglich nöthig. Vorzügliche Aufmerkſamkeit hat der Blumenfreund dem Baue eines Glashauſes zur Ueberwinterung obiger Pflanzen zu widmen. Der innere Raum eines ſolchen Hauſes muß ſo viel als nur möglich erhellt werden können, eine trockene Lage haben, und mit Oeffnungen zum Lüften nach allen Seiten hin verſehen ſein. Für eine bedeutende Sammlung Neuholländer-Pflanzen muß das Haus wenigſtens eine Länge von 50 Fuß, Tiefe oder Breite von 16 Fuß und Höhe von 14 — 16 Fuß, 12 — 14 Fuß über und zwei Fuß unter der Oberfläche des Erdbodens haben. Die Fenſter von 10 — 12 Fuß Höhe und 4 Fuß Breite liegen ſchief, ſo daß der untere Schenkel des am obern Fenſterrahmen angeſetzten rechten Winkels 18 Zoll mißt. Beſſer iſt es, die vordere Fenſterſeite des Hauſes durch je zwei über einander liegende Fenſter von 6 Fuß Höhe zu bauen, weil Fenſter von 12 Fuß Höhe zwar mehr Licht geben, aber auch ſchwerer zu behandeln und koſtſpieliger ſind. Will man indeſſen doch die Fenſter aus dem Ganzen 12 Fuß hoch machen laſſen, ſo müſſen dieſelben in der Mitte noch durch einen ſtarken eiſernen Querſtab verbunden ſein. Man ſehe ja darauf, daß das Glas von dem Glaſer möglichſt tief, wenigſtens 1 Zoll, in die Stäbe zu liegen komme, und gut eingekittet und verſtiftet werde. Liegt das Glas nicht tief genug im Kitt, ſo hat derſelbe auch weniger Halt, wird leichter abfallen und ſo verurſachen, daß immerwährende Glasreparaturen nöthig ſind. Der Kitt, mit welchem das Glas eingekittet wird, darf nicht von Firniß, ſondern blos von reinem Leinöl und Kreide fabrizirt werden und muß ſo ſteif als möglich geſchlagen werden. Der von Firniß, Silberglätte und Kreide bereitete Kitt trocknet zwar ſchneller, bekommt aber durch die Sonnenhitze Sprünge und fällt alsdann ab.

(Fortſetzung folgt).

Neue Pelargonien bei Hrn. Lemon in Paris.

(Fortſetzung.)

P. Aitonianum, große Blumen mit dem dunkelſten Violett.

P. balsameum, die Blumen 30 Linien breit, goldlackroth, mit dunkelkaſtanienfarbenem Flecke auf weißen Flächen; die Blätter von einem ſehr angenehmen Geruch.

P. Bancksianum grandiflorum, ſehr zahlreiche, regelmäßige, 3 Zoll breite Blumen, die obern Blätter taubenkehlenartig (gorge de pigeon), feuerfarbene Flächen, ſchwarz und karminroth geſtricht.

P. blandum majus, die Blumen 30 Linien breit, die obern Blumenblätter roſafleiſchfarbig, dunkbraune Flecken auf ſanftem Lila, die untern Blumenblätter einfarbig rein weiß.

P. Carolineum, die Blumen 3 Zoll breit, roſafleiſchfarbig, purpurfeurig gefleckt, weiß geſchillert.

P. Clotildeae, große roſafleiſchfarbige Blumen mit weißen Flächen, braunpurpurfarbigen Strahlen, lebhaft ponceauroth gefleckt.

P. Desfontainianum maximum, die Blumen ſehr groß, atlasartig, zahlreich, einfarbig auf klatſchroſenrothem Grunde, purpurkaſtanienbraun ſammetartig gefleckt.

P. diversum, große Blumen, die obern Blumenblätter roſacarminroth, purpurfarbig gefleckt und ſammetartig, weiß und violett geſtricht, die 3 untern Blumenblätter mit weißem Grunde und zarten lilafarbigen Rändern.

P. excelsum, mittelgroße Blumen mit ſcharlachfarbigem Grunde und ſchwarzen ſammetartigen Flecken, rautenförmig blau ſchattirt.

P. flore variegat., große Blumen, rein weiß, roth und lila, nach Art der ſchönſten Nelken-Flamanten geſtreift.

P. igneum, mittelgroße Blumen, 25 Linien und weniger breit, atlasartig, einfarbig mennigorange, roſafarbig ſchattirt, ſchwarz geſtricht, kaſtanienbraune Flecken auf carminfeuerfarbenem Grunde ſchillernd bis an die Spitze der Blumenblätter.

P. illiciolens, mittelgroße, 20 bis 25 Linien breite Blumen, die obern Blumenblätter atlasartig und carminroth, auf blauem Schiller ſammetartig braun gefleckt, die untern Blumenblätter roſafleiſchfarben, purpurfarbig geadert, die Blätter mit einem eigenthümlichen Anisgeruche.

P. Poiteanum, die Pflanze hat ein ganz ausgezeichnetes Aeußere, ſehr ſtarke Dolden von großen Blumen auf

ſteifen Stielen, die einfarbigen Blumenkronen ſind prächtig purpurfarbig, die Nägel lilablau und die Striche kaſtanienbraun.

P. splendidum maxim. nov., viel ſchöner und zierlicher als das alte, und dieſes hinſichtlich der Farbe, Schattirung, Geſtalt und des Wuchſes bedeutend übertreffend.

P. tigrinum, mittelgroße Blumen, mit lebhaftem lilafarbigem Grunde, weiß und ſchwarz gefleckt. (Fortſ. f.)

Aus der Revue horticole.

Neue oder wenig bekannte Zierpflanzen.

Tropaeolum majus nov. var. Mordoréefarbige Kapuzinerkreſſe. Bisher kannte man nur die gelbe Kapuzinerkreſſe, aber Hr. Vibert zu St. Denis und Hr. Sageret zu Paris haben aus einem Samenbeete vom Samen der gewöhnlichen Kapuzinerkreſſe eine mit mordoréefarbigen Blumen erhalten, die eben ſo ſchön als ſeltſam iſt. Wenn ſich dieſe eigenthümliche Farbe durch Samen fortpflanzen läßt, ſo werden ſich Liebhaber genug finden. Indeſſen iſt hierauf nicht zu bauen, und die Vorſicht erfordert, daß man im Herbſte Stecklinge mache, dieſe im Warmhauſe durchwintere und im nächſten Frühjahre ins freie Land ſetze. Wenn man reifen Samen davon erhält, ſo ſchlage ich vor, einen Theil davon mit dem Samen der gelben Kapuzinerkreſſe vermiſcht auszuſäen, und abzuwarten, ob der davon gezogene Samen neue Farbenmiſchungen giebt, den andern Theil aber von der gelben Kapuzinerkreſſe entfernt zu ſäen, um eine vermiſchte Befruchtung zu vermeiden und der Entartung der Farbe möglichſt vorzubeugen.

Syſtematiſche Namen der merkwürdigſten Pflanzen-Gattungen und Arten, ihr Genitiv ꝛc.

Mitgetheilt von L. aus T. (Fortſetzung).

Am. formosissima L., die ſchönſte Amarylle, iſt unſtreitig eine der prächtigſten Lilien, die ſowohl durch die Geſtalt, als durch das ſammetartige Weſen und die carminrothe Farbe ihrer Blume, die bei Sonnenſchein ganz vergoldet ausſiehet, große Aufmerkſamkeit erreget. Sie ſtammt aus dem ſüdlichen Amerika (und nicht, was man früher behauptete, aus Oſtindien), woher ſie zuerſt der Arzt Simon von Tovar in Sevilla im Jahre 1593 von einem aus Süd-Amerika kommenden Schiffer erhielt; auch haben ſie mehrere ältere Reiſende und namentlich noch Thiery de Menonville daſelbſt wildwachſend gefunden. Simon von Tovar ſchickte im folgenden Jahre einige Zwiebeln derſelben an Paludanus und den Grafen von Arenberg und eine Beſchreibung der Blume an Cluſius; Letzterer erhielt in der Folge auch eine getrocknete Blume von Paludanus und vom Grafen von Arenberg ein genaues Gemälde derſelben, und machte ſie darauf im Jahr 1601 zuerſt bekannt. Im Jahre 1608 lieferte der Gärtner Robin eine beſſere und größere Abbildung, die nachher von mehrern wiederholt wurde. Man nannte ſie anfänglich Narciſſen-Lilie (Lilio-Narcissus), weil ſie der Blume nach der Lilie, der Wurzel nach hingegen einer Narziſſe gleicht. (Fortſetzung folgt.)

Varietäten.

Berlin. (Beſchluß.) Am 8. Juli blühten im königl. botaniſchen Garten folgende ſchönblühende Pflanzen: Gesnera rupestris, Mart. — Mimulus roseus, Hort. angl. — Rhodochiton volubile, Zuc. — ? Russelia scoparia, Nob. — Mamillaria pycnacantha, Mart. — M. lanifera, Haw. — Pereskia grandifol., Haw. — Sempervivum tabulaeforme, Haw. — S. urbicum, Hornem. — S. glaucum, Ten. — Calandrinia discolor, Schrad. — C. spectabilis, Nob. — Myrtus tomentosa, Ait. — Melalenca uncinata, R. B. — M. linariaefol., R. B. — Swainsonia galegifol. ros., R. B. — S. g. albiflora, R. B. — Smithia repens nov. sp. — Virgilia capensis, Lam. — Bauhinia parviflora, Vahl — Linum chilense, Nob. — Schizopetalon Walkeri, Bot. Mag. — Magnolia fuscata, Andr. — M. anonaefol., Salisb. und viele andere ſchöne Pflanzen.

Wildeck, den 8ten September 1833. In dem hieſigen fürſtlichen Garten blühte dieſen Sommer ein gelbgefüllter Centifolien-Roſenſtock mit mehr als 1000 vollkommen ausgebildeten Roſen, eine große Menge Knoſpen wurden bei der Zählung nicht beachtet.

Ganz beſonders merkwürdig iſt aber eben jetzt eine Ananasfrucht von der gerippten Sorte, welche drei Pfund wiegt und auf welcher zehn Kronen ſitzen; außer dieſer ſind mehre ſtarke Früchte noch mit zwei und drei Kronen verſehen. K.

Paris. (Beſchluß.) Die ſechs Ermunterungsmedaillen wurden noch ertheilt:

3) an Hrn. Cajeux, Pflanzenhändler zu Boulogne sur Mer, nach dem von Hrn. Fion vorgeleſenem Bericht des Hrn. Hericart de Thury.
4) an Hrn. Alfroy jun., Pflanzenhändler zu Lieusaint, nach dem Bericht des Hrn. Bailly de Merlieux.
5) an Hrn. Lemaire, Gärtner der Frau Gräfin de Boignes, nach dem Bericht des Hrn. Abbé Berlèse.
6) an den Chef der Gartenanlagen zu Amiens, nach dem Bericht des Hrn. Hericart de Thury.

Darauf ſprach der Hr. Abbé Berlèse über den Verluſt, den die Geſellſchaft im letztvergangenen Auguſt durch den Tod des Hrn. Cels erlitten.

Endlich wurde durch Hrn. Poiteau das Reſultat der zur Prüfung der ausgeſtellten Gegenſtände beſtimmten Jury bekannt gemacht:

Den erſten Preis für die ſchöne Kultur einer Pflanze, erhielt Hr. Jacques, königl. Gärtner zu Neuilly, den zweiten erhielt der Blumengärtner Hr. Chauvière, den dritten der Blumengärtner Hr. Durand.

Den Preis für die größte Sammlung ſchöner, neuer und ſeltener blühender Pflanzen erhielt der Blumengärtner Hr. Loth.

Der für Kunſtprodukte, die Gärtnerei betreffend, beſtimmte Preis wurde dem Schreiner Georgé ertheilt, welcher 2 prächtige Vogelbauer, mehrere ländliche Hausgeräthſchaften, Modelle von Stühlen, Bänken, Brücken, wie ſie die Landſchaftsgärtnerei bedarf, mit ſehr vielem Geſchmack und gut gearbeitet, zur Ausſtellung gebracht hatte. Die Herren Arnheiter und Petit hatten einen großen Vorrath von Gartenbau- und Ackerbau-Werkzeugen ausgeſtellt. Einige Künſtler haben gemalte Blumen, andere, Blumen und Früchte ſehr vollkommen in Wachs modellirt, zur Ausſtellung gegeben. Endlich hatte auch die Buchhandlung der Rev. horticole einige der ſchönſten und beſten blumiſtiſchen Werke mit Abbildungen, von Mad. Huzard, Hrn. Audot und Hrn. Lachevardière eingeſendet.

Um 4½ Uhr hob der Hr. Präſident, nachdem er Allen, die etwas zur Ausſtellung geliefert, Dank geſagt hatte, die Verſammlung auf.

Wien. (Fortſetzung.) Von dem Kunſt- und Handelsgärtner Joſeph Held wurde zur Blumenausſtellung geſendet: Crataegus glabra, Cassine Mourocenia, Paeonia papaveracea, Azalea pontica sinensis, Salpiglossis integrifolia, Grevillea punicea, Rhododendron catawbiense, Trollius belgicus, Galardia bicolor, Coriaria sarmentosa, Citrus Aurantium fol. varieg., Hibbertia grossulariaefolia, Gentiana acaulis, Rosa semperflorens Montfordiana, Daviesia latifolia, Rosa Noisette Yellow, Dryandra nervosa, Brownea grandiceps, Rosa Thea Chouin, Isle de Bourbon, semperflorens Nini, Thea Catherine, Bourbon flavescens, Cels blanc, Maria Louise Imperial, Paruy, Noisette Yellow, provincialis de honteuse, Eutaxia pungens.

Herr Handelsgärtner Angelotti ſendete: Chamerops humilis, Astrapaea Wallichii, Cycas revoluta, Caladium pinnatifidum, Phoenix dactylifera, Rosa Thea flavescens, Maria Louise, venusta, nigrita, Dietrichsteinia, odora, mutabilis, George de Four, Admiral d'Rigni, la superbe, la Campii, Darius, Belladona indica, Thea hyméne, triumphans.

Der Handelsgärtner Mayer, ausgezeichnet bekannt durch ſeine vielen aus Samen gezogenen ſchönen Pelargonien, von welchen manche, ausländiſche, die Original-Pelargonien-Pflanze nicht nur an Schönheit erreicht, ſondern ſie auch ſogar übertrifft. Möge deſſen unermüdetes Streben durch eine ergiebige Abnahme ihren verdienten Lohn finden; er ſendete: Pelargonium exornatum maj., Augustissimum, affine supreum, Hügellinum, excellens, fastuosum, Dumontianum, purp., Carolinea Augustae, concessum, Canonicus, Primatum, succulentum, insigne, Humei, austriacum, splendidum verum, Belladonna grandiflora, Lemonianum, flagrans, sarcanthum, Calistum, Lord Combermeer, Sämlinge.

Herr Handelsgärtner Frühauf ſendete: Schizanthus retusus, Rosa semperflorens Schoenbrunnensis, Acacia affinis, Eucalyptus Globulus, piperita.

Herr Handelsgärtner Graber ſendete 6 Stück Hydrangea hortensis mit 100 Blumen. (Fortſetzung folgt.)

Schönbrunn bei Wien, d. 16. Juli 1833. (Beſchluß.) In den Gewächshäuſern des k. k. Hofgartens hierſelbſt blühten noch folgende Gewächſe: Passiflora alba. (Hortorum.) Vaterl. unbekannt. Passifloreae. Monadelphia, Pentandria. — Relhania pungens. (Heritier.) Vom Vorg. d. g. Hoff. Compositae. Syngenesia, Superflua. — Sabal minor. (Persoon.) Aus Carolina. Palmae. Hexandria, Trigynia. — Semionotis floribunda. (Schott.) Aus Braſilien. Leguminosae. Diadelphia, Decandria. — Tabernaemontana coronaria. (Willdenow.) Aus Oſtindien. Apocyneae. Pentandria, Monogynia. — Xanthosoma sagittaefolium. (Schott.) Aus Weſtindien. Aroideae, Monoecia, Androgynia. — Alstroemeria salsilloides. (Martius.) Aus Braſilien. Asphodeleae. Hexandria, Monogynia. — Brunfelsia undulata. (Swarz.) Aus Weſtindien. Solanaceae. Didynamia, Angiospermia. — Cordyline cannaefolia. (R. Brown.) Aus Neuholland. Asphodeleae. Hexandria, monogynia. — Elaeodendron australe. (Ventenat.) Aus Neuholland. Celastrinae. Pentandria, monogynia. — Erica praegnans. (Andrews.) Vom Vorgeb. d. g. Hoffn. Ericeae. Octandria, monogynia. — E. spuria. (Andrews.) Vom Vorg. d. g. Hoffn. Eric. etc. — E. ventricosa, purpurea. (Hortorum.) etc. — Isoplexis canariensis. (Lindley.) Von den canariſchen Inſeln. Scrofularinae. Didynamia, Angiospermia. — Isopl. sceptrum. (Lindley.) etc. — Leptospermum flavescens. (Smith.) Aus Neuholland. Myrtaceae. Icosandria, monogynia. — Lomatia longifolia. (R. Brown.) Aus Neuholland. Proteaceae. Tetrandria, monogynia. — Ludia sessiliflora. (Lamark.) Von der Mauritius-Inſel. Bixineae. Polyandria, monogynia. — Melastoma cymosum. (Wendland.) Von Sierra-Leone. Melastomaceae. Decandria, monogynia. — Olea exasperata. (Jacquin.) Vom Vorgeb. d. g. Hoffn. Oleinae. Diandria, monogynia. — Xerotes longifolia, (R. Brown.) Aus Neuholland. Junceae. Dioecia, Hexandria.

Bibliographiſche Notiz über Blumiſtik.

Buch der Geheimniſſe für Gartenliebhaber.
Aus Werken unſerer Vorfahren mitgetheilt von E. v. Pott.
Leipzig 1833. Brüggemann'ſche Verlags-Exped.

Ein Büchelchen voller Albernheiten u. Unſinn. Von den 85 mitgetheilten Kunſtſtückchen hat der Verf. wahrſcheinlich nicht eins verſucht, ſonſt würde er die aus alten Garten-Scharteken entlehnten Albernheiten nicht als baare Münze auftiſchen wollen. Als Probe Folgendes: No. 31. Fünferlei Roſen auf einen(m) Stock zu haben. „Thue ihm alſo, um die Zeit, wenn die Körnlein heraus wachſen, und knöpfen ſollen, ſo bohre mit einer Ahle unter ſich in den Stamm, unter dem Knöpflein bis an den Kern, und ſenke geſottene Peterſilgen mit einer Feder zum Loch hinein: In einen andern Stamm thue grüne Farbe: in den dritten gelbe, und in den vierten ſchwarze Dinten, und in den fünften blaue Farbe, und verſtreich dieſelbe Löchlein."

Das beſte und ſicherſte Mittel iſt das letzte, No. 85. Vom Bienenſtich. „Wer von einer Bienen geheckt worden, thut am beſten, er entweiche aus dem Garten, denn die andern werden ihm gleicher Weiſe zuſtürmen, als ob ſie ihn vor andern erkenneten."

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto-Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. XX. Weißenſee, (in Thüringen). September 1833. VI. Jahrg.

Ueber Calceolarien.

(Mitgetheilt von Herrn F. A. Haage jun. in Erfurt.)

(Fortſetzung.)

Beſchreibung:

C. arachnoidea, ſtrauchartig, Blätter zungenförmig, wollig, Blumen dunkellila, etwas gekerbt. 8 gr.

C arachnoidea alba, ganz wie vorſtehende, nur daß die Blumen weiß gefärbt ſind. 1 Rß 16 gr.

C. arachnoidea purpurea, wie die erſtere, Blumen purpurroth glänzend, im Aufolühen faſt ſchwarzroth, aus Samen der C. arachnoidea und tricolor gewonnen. 2 Rß.

C. atropurpurea, ſtrauchartig, Blätter lanzettförmig, geſägt, hellgrün, Blumen dunkelpurpur, faſt rund. 20 gr.

C. atrosanguinea, ſtrauchartig, Blätter lanzettförmig, geſägt, fein behaart, am Blüthenſtengel umfaſſend, Blumen groß, dunkelblutroth, gekerbt. 20 gr.

C. aurantiaca rubra, ſtrauchartig, Blätter blaßgrün, ausgerandet, Blumen dunkelorange in braun verlaufen. 14 gr.

C. bicolor, ſtrauchartig, Blätter geſtielt, gegenüberſtehend, häufig im Quirl von 3 Blättern, eiförmig, doppelt gezähnt, wenig behaart, Blumen weiß und gelb, das Schiffchen zu beiden Seiten geöffnet. 10 gr.

C. cericea, ſtrauchartig, Blätter lanzettförmig, unregelmäßig geſägt, hellgrün, Blumen kirſchroth und lila, rund und gekerbt. 14 gr.

C. Buteracea, ſtrauchartig, Blätter ei-lanzettförmig, runzlich, graugrün, etwas behaart, Blumen beim Oeffnen röthlich, in völliger Blüthe chamois. 16 gr.

C. coccinea, ſtrauchartig, Blätter lanzettförmig, ausgerändert, graugrün, die Farbe der Blume iſt zwar nicht ſcharlachroth zu nennen, doch iſt die rothgelbe Farbe ſehr hoch und leuchtend. 1 Rß.

C. coerulescens, ſtrauchartig, Blätter lanzettförmig, geſägt, hellgrün, Blumen: die Oberlippe derſelben klein und bläulich, Unterlippe zimmetbraun, Rückſeite lila. 16 gr.

C. corymbosa, krautartig, Blätter ei-lanzettförmig, doppelt geſägt, die jungen Blätter graugrün mit weißlichen Haaren, Blumen hochgelb mit herabhängender Unterlippe, inwendig mit braungeſtrichener Zeichnung. 6 gr.

C. corymbosa formosa, krautartig, Blätter länglich, unregelmäßig gezähnt, etwas wollig, Stengel dunkellila, Blumen größer wie corymbosa, nur lebhaft orange. 12 gr.

C. crenatiflora suberecta gleicht faſt der corymbosa und iſt wahrſcheinlich auch aus ſolcher entſtanden, die Blumen ſind größer, noch lebhafter in Farbe, die Unterlippe ſehr breit und zu beiden Seiten gezeichnet, blüht noch reichlicher als corymbosa. 1 Rß.

C. cuprea, ſtrauchartig, Blätter ſitzend, lanzettförmig ausgerändert, Blumen kupferfarbig, lebhaft, etwas gefurcht. 1 Rß.

C. epsomensis, krautartig, Blätter kurzgeſtielt, eilanzettförmig, unregelmäßig geſägt, langbehaart, Blumen ſehr groß, beim Aufblühen dunkelſammetbraun, Oberlippe ſehr kurz und violett, beim Verblühen roſtbraun. 20 gr.

C. excelsa, ſtrauchartig, Blätter lanzettförmig, ſtumpf geſägt, runzlich, unterhalb filzig, Blumen okkergelb. 12 gr.

C. excelsa cinnamomea, ſtrauchartig, Blätter länglich unregelmäßig geſägt, Blumen etwas größer wie bei der vorigen, ſtark gefurcht, wodurch am Rande der Unterlippe Kerben entſtehen, beim Aufblühen hellzimmtbraun, ins Violette ſpielend, beim Verblühen goldgelb mit mattem Braun ſchattirt. 20 gr.

C. excelsa Taylori ſtrauchartig, Blätter länglich geſägt, weichbehaart, Blumen ſammetartig von lebhafter blutrother Farbe. 1 Rß.

C. fusca, ſtrauchartig, Blätter elyptiſch ausgerändert, runzlich, und unten filzig, oberhalb mit einzelnen Haaren beſetzt, Blumen ſind runzlich, flachgefurcht, Oberlippe blaßbraun, Unterlippe roſtbraun. 20 gr.

C. herbertiana, ſtrauchartig, Blätter gegenüberſitzend, eilanzettförmig, weichbehaart, hat noch nicht geblüht. 16 gr.

C. hopeana, krautartig, Blätter herzförmig geſägt und kurzborſtig, Blumen länglich, dunkelſtrohgelb in der Oeffnung mit rothen Streifen. 16 gr.

C. latifolia, ſtrauchartig, Blätter eiförmig, doppeltgekerbt und runzlich, unterhalb mit kurzen Haaren beſetzt, die eine klebrige Feuchtigkeit ausſchwitzen, Blumen ganz hochgelb. 16 gr.

C. Leonidas, ſtrauchartig, Blätter elyptiſch, unregelmäßig gekerbt, filzig, Blumen ſehr groß, im Aufblühen violett in Braun übergehend, im Abblühen aber zimmtbraun und am Rande mit gelb untermiſcht, prachtvoll. 1 Rß 8 gr.

C. lutescens rosea, ſtrauchartig, Blätter lanzettförmig ausgerändert, etwas runzlich, Blumen von gelblicher Farbe mit roſenroth untermiſcht. 1 Rß.

C. marmorata, ſtrauchartig, Blätter länglich, ausgerändert, runzlich, unten ſtark behaart, Blumen gelb mit blaßviolett marmorirt und eiförmig. 16 gr.

C. mellifera, ſtrauchartig, Blätter lanzettförmig, geſägt, Blumen blaßbraun ins Violette ſpielend. 14 gr.

C. Millerii. ſtrauchartig, Blätter lanzettförmig, filzig, ganzrandig, Blumen faſt nierenförmig von lebhaft braunrother Farbe. 16 gr.

C. mutabilis, krautartig, Blätter eilanzettförmig, gekerbt, Anfangs von dunkelbrauner Farbe, die bei längerem Blühen in eine faſt graue Farbe übergeht. 1 Rß.

C. nouveau semi, ſtrauchartig, Blätter lanzettförmig, gekerbt und weichhaarig, die Oberlippe der Blumen violett, die untere zimmetbraun. 12 gr.

C. oleifera, ſtrauchartig, Blätter lanzettförmig, geſägt, weichbehaart, Blumen von gelblicher mit braun und lila untermiſchter Farbe. 16 gr.

C. plantaginea, krautartig, Blätter rautenförmig, glatt, grobzähnig, Blumen dottergelb, auf der Rückſeite mit kirſchrothen Punkten und in der Oeffnung mit einem ſchwarzbraunen Kranze beſetzt. 8 gr.

C. Pressii, ſtrauchartig, Blätter klein, lanzettförmig, fein geſägt, weichbehaart, Blumen von ſchwefelgelber Farbe. 10 gr.

C. Pressii diffusa, ſtrauchartig, Blätter eilanzettförmig, unregelmäßig geſägt, filzig, Blumen von blaßgelber Farbe. 12 gr.

C. Pressii aurantiaca, Stengel, Blatt wie bei Pressii, Farbe der Blumen von gelblicher Orangenfarbe. 16 gr.

C. Pressii purpurea, wie Pressii, nur die Farbe der Blumen ſchwarzbraun. 14 gr.

(Beſchluß folgt).

Ueber die Anzucht der Georginen in kleineren Gärten.

(Mitgetheilt von W. Steiger aus S.) (Fortſetzung.)

Bei der Pflanzung werden die nöhigen ſtarken, und zum wenigſten 6 — 8 Schuh hohen Stangen zur Befeſtigung der Stengel gleich mit eingeſetzt, weil man ſpäterhin die Lage der Wurzeln nicht mehr ſo genau kennt, und ſie leicht bedeutend beſchädigen könnte.

Das fortwährende lockere Anbinden mit Baſt darf nicht verſäumt werden.

Jede meiner Georginen erhält bei trockner Witterung alle Tage einen vollen Eimer an der Sonne erwärmtes Brunnenwaſſer. Nur ſtarke Regengüſſe, oder anhaltend feuchtes Wetter machen dies Begießen überflüſſig. Bei ſchwächerm Regen gelangt ſelten von der ausgebreiteten Krone etwas an die Wurzeln.

Unter einer ſolchen Behandlung blühten am 19. Juni dieſes Jahres: die herrliche Jaune d'orée, miniata speciosa, Lillacina, und mehrere andere, ausgezeichnet ſchön, und ſtehen jetzt (in der letzten Hälfte des Juli) mit Blumen bedeckt.

Möchte dieſer Aufſatz noch dazu beitragen, Blumenfreunde zu bewegen, auch ihre kleinen Hausgärten mit dieſer vortrefflichen Pflanze zu zieren! Ihre Wartung iſt bei Weitem nicht mit den Schwierigkeiten verbunden, die eine Nelken- oder Aurikelſammlung mit ſich bringt, und der Genuß derſelben dauert oft bis in den ſpäten Herbſt, wenn nicht frühe Nachtfröſte, die ja ſo aller Gartenkunſt ein Ziel ſetzen, die Stengel zu Grunde richten. Ein Roudel mit Georginen beſetzt, ſchütze ich übrigens gegen leichte Fröſte durch Umſetzen mit Strohdecken, und übergelegten Papierfenſtern, welche auf eingeſteckte Stäbe paſſen. Man kann dadurch den Genuß dieſer ſchönen Blumen oft auf vier Wochen verlängern, da nach einem Nachtfroſte im Herbſte zuweilen mehrere Wochen lang warme und ſchöne Witterung folgt.

Sollte irgend ein Blumenfreund über die hier berührten Gegenſtände nicht völlig befriedigt ſein, ſo werde ich auf geſchehene Aufforderung, ſehr gern noch ſchriftlich weitere Auskunft ertheilen. (Beſchluß folgt.)

Ueber die Erziehung der Eriken, Rhododendren, Melaleuken, Metroſideren, Leptoſpermum u. ſ. w. aus Samen.

Mitgetheilt von P. aus W.

§. 1. Conſtruktion der zweckmäßigſten Winterhäuſer oder Conſervatorien für Eriken, Rhododendren, Melaleuken, Azaleen ꝛc.

(Fortſetzung.)

Der über den Fenſtern noch bleibende Raum von 4 Fuß wird ausgemauert und gut vertüncht. Das Dach des Hauſes muß auf der Vorderſeite über den Fenſtern 20 Zoll Vorſprung beſitzen, ſo daß durch dieſen die Fenſter gegen den ſtarken Platzregen geſchützt ſind. Zur Lüftung des Hauſes müſſen die Fenſter mit Bändern an der Längen-Seite an die Säulen befeſtigt ſein. An der Mitte der Seite, welche gelüftet wird, ſind Haken von ſtarkem Eiſen befeſtigt, welche beim Luftgeben eingehängt werden. Die Haken ſind an dem Lufteiſen, welches 1 Fuß lang ſein muß, 2 Zoll weit auseinander befeſtigt. Jedes Lufteiſen enthält demnach 6 Haken. Will man die Fenſter nun 2 Zoll lüften, ſo wird das Lufteiſen in den erſten Haken gehängt, will man 8 Zoll lüften in den vierten ꝛc. Die Lufteiſen müſſen ferner ſo an die Fenſter befeſtigt ſein, daß man ſie beim Schließen derſelben zurücklegen kann. Der Eingang in das Haus wird wo möglich an einem der Gibel angebracht. Die Tiefe des Hauſes, von der Oberfläche der Erde an gerechnet, darf nur 2 Fuß betragen; ein Haus, welches tiefer in die Erde geht, iſt zu feucht und der Geſundheit der Pflanzen nachtheilig. Von großem Nutzen ſind Zugkanäle, deren 3 auf der Hinter- und 3 auf der Vorderſeite des Hauſes befindlich ſind, dieſe meſſen 6 □ Zoll und beabſichtigen, die im Hauſe befindliche feuchte Luft durch die zu den untern Oeffnungen der Canäle hineinſtrömende reine atmoſphäriſche Luft zu verdrängen. Es verſteht ſich, daß dieſe Zugkanäle während ſtrenger Kälte, wo das Haus geheizt wird, verſchloſſen werden. An der Decke des Hauſes befinden ſich gleichfalls zwei Oeffnungen von 2 □ Fuß durch welche die Luft ausſtrömt.

Was nun den Heizungs-Apparat anbelangt, ſo halte ich für nöthig, den im Bau der Gewächshäuſer noch Unkundigen hier noch einige Winke zu geben. Die

Feuerung, welche ſich wo möglich jedesmal auf dem weſtlichen Gibel des Hauſes befinden ſollte, muß für das Haus von der angegebenen Größe 4 Fuß Länge, 1 1/2 Fuß Breite (im Lichten) und 1 Fuß Höhe haben. Die Feuerthüre hält 1 □Fuß. Der Roſt iſt 18 Zoll lang und 1 Fuß breit. Wird mit Holz gefeuert, ſo muß der Roſt ſo eng als möglich ſein, bei Torffeuerung oder Braunkohlen können die Stäbe 1/2 Zoll weit auseinander liegen. Unter dem Roſt befindet ſich der Aſchenkanal. Der Rauchkanal muß von dem Ende der Feuerung an bis an 3 Fuß lang verjüngt zulaufen und da nur 10 □Zoll enthalten. Der Kanal muß vom Ende der Feuerung an rund um an den Wänden des Hauſes hinlaufen und in den neben der Feuerung befindlichen Rauchfang ausſtrömen. Zur Beförderung des Zuges iſt es nöthig, daß der Rauchkanal vom Ende der Feuerung an bis an ſeine Ausſtrömung in den Schornſtein 3 Fuß ſteigt. Die Feuerung wird von Backſteinen, der Kanal von Ziegelplatten erbaut. (Fortſetzung folgt.)

Neue Pelargonien bei Hrn. Lemon in Paris.

(Fortſetzung.)

P. adulterinum roseum, die Blätter von roſenartigem Geruche, die obern Blumenblätter atlasartig und lebhaft roſenfarbig, purpurcarminroth und ſammetartig, ſtark gefleckt, mit blauen Streifen.

P. adulterinum carmoisinum, eine runde, prächtiggeformte Blumenkrone, die obern Blumenblätter carmoiſin-feuerfarbig, braun gefleckt und ſchön ſammetartig, die untern Blumenblätter purpurfarbig-blau.

P. cuspidatum, die Blumenkrone hat 2 Zoll im Durchmeſſer, die obern Blumenblätter purpurviolett, braun gefleckt und fein ſammetartig, die untern lebhaft roſa- und feuerfarben.

P. Glaucopis, eine ſehr reichlichblühende Pflanze, ausgezeichnet durch immerwährendes Blühen, die Blumenkrone korallenroth, blau gefleckt, mit grünlichen Schattirungen.

P. Imperator. (P. maximum), die Blumenkrone hat einen Durchmeſſer von 30 Linien, iſt lackroth gefärbt, ſammetartig braunglänzend oder mordoréefarbig gefleckt, blau geſtricht.

P. Imperator. (P. perfectum), ſehr zahlreiche und große ſcharlachrothe Blumen, ſammetartig braun gefleckt.

(Beſchluß folgt).

Aus der Revue horticole.

Neue Roſen.

Bei Hrn. Siſley-Vandael (rue de Vaugirard No. 31) zu Paris, welcher erſt ſeit einigen Jahren eine Handelsgärtnerei gebildet hat, die ſich nur auf die ſchönſten Roſen und Nelken beſchränkt, ſahen wir im vergangenen Monat Juni drei ſehr werthvolle Roſenſorten in vollkommner Blüthe, die wir noch in keinem andern Garten geſehen haben, nämlich:

1) R. Noisettiana Deprez. R. N. flava. Unter dem erſten Namen hat ſie Hr. Pirolle im Auguſt- und September-Heft 1831 der Annalen der ökonomiſch-praktiſchen Geſellſchaft beſchrieben, unter letzterem iſt ſie zeither in der blumiſtiſchen Welt bekannt. Man verdankt dieſe Roſe Herrn Deprez zu Yèble bei Guignes. Sie ſcheint aus einem Samenkorn der R. bengal Bourbon, befruchtet durch eine Noiſette-Roſe, entſtanden zu ſeyn; Herr Deprez hat zwar hierüber keine Auskunft gegeben, allein das Aeußere und der Wuchs dieſes Roſenſtocks kommt mit der R. Bourbon überein, während die Blüthe der einer Noiſette-Roſe gleicht und im Ganzen ſtellt er ſich als eine Hybride dar,

Dieſer Roſenſtock iſt ein ſtarkwüchſiger Strauch, der ſich gut aufrecht erhält, und deſſen Dornen violett und zerſtreut ſind; die Blätter ſind groß, ſtark ausgeſchweift, lederartig, ſehr ſchön glänzend grün, mit 5 eiförmigen zugeſpitzten Blättchen, deren Ränder ſtumpf und zahlreich gezähnt ſind. Der gemeinſchaftliche Blattſtiel iſt unten mit Stacheln verſehen, und der untere Theil der Mittelrippe des Endblättchens ſelbſt iſt oft auch mit einigen Stacheln am Grunde beſetzt, wenn die Blätter ſehr groß ſind. Die endſtändigen Blüthen, 3 bis 5 auf jedem Zweige, ſtehen auf ſehr langen und ſehr beugſamen Blüthenſtielen, ſo daß ſie ſich gegenſeitig nicht im Wege ſtehen. Die Blüthenſtiele ſind purpurfarbig, ein wenig behaart, gleich den Fruchtknoten und Kelchen, welche grün ſind. Die Fruchtknoten ſind eiförmig-länglich und die Kelchtheile wenig oder nicht geflügelt.

Die Blume iſt gefüllt, 30 bis 36 Linien breit; die äußern Blumenblätter breit, ausgehöhlt und wie die Centifolien-Roſe eine Unterſchale bildend, die innern Blumenblätter zuſammengerollt, und dieſe, wie jene, nankingfarbig oder wie der Bauch einer Hirſchkuh gefärbt, und am obern Theile roſafarbig getuſcht. Der Duft dieſer Roſe iſt ſehr angenehm und mehrere Perſonen vergleichen ihn mit dem einer reifen Ananas.

Man kann dieſe hübſche Roſe mit keiner andern verwechſeln, und ſie wird auch in der auserleſenſten Roſenſammlung einen ehrenvollen Platz behaupten. (Beſchluß folgt.)

Syſtematiſche Namen der merkwürdigſten Pflanzen-Gattungen und Arten, ihr Genitiv ꝛc.

Mitgetheilt von L. aus T. (Fortſetzung).

Am. formosiss. L., die ſchönſte Amarylle.

(Beſchluß.) Den jetzigen Gattungsnamen erhielt ſie von Linné 1737, der auch im Jahre 1742 eine vollſtändige Beſchreibung und eine ſehr gute Zeichnung von A. formosissima gegeben hat.

Den Namen Jacobaea gab ihr ein Arzt in Madrid, weil Geſtalt und Farbe ihrer Blumenblätter mit dem rothen gekreuzten Schwerte auf den Kleidern der Jacobsritter in Spanien Aehnlichkeit haben. Noch jetzt wird ſie von den Kohlgärtnern Iris suedica genannt.

Am. reginae L. Königl. Amaryllis.

Den Namen Regina erhielt ſie vom Dr. Douglaß, der ſie 1728 auf einem Folioblatt erſcheinen ließ, weil ſie am erſten März, als am Geburtstage der Königin von Großbritanien, in voller Blüthe und Schönheit ſtand.

Am. sarniensis. L. Am. von Guernſey; Japaniſche Am.

Sie ſtammt aus Japan, wo ſie auch Kämpfer und in neuern Zeiten Thunberg wildwachſend gefunden haben. Sie hat in Europa zuerſt in dem Garten des Johann Morin zu Paris im Jahr 1634 geblühet, und Jacob Cornutus lieferte im folgenden Jahre die erſte Beſchreibung davon unter dem Namen Narcissus japonicus flore rutilo. — Im Jahr 1665 beſchrieb ſie der Engländer Johann Rea und nannte ſie zuerſt Guernsey lilly; die Veranlaſſung zu dieſem Namen war folgende: Ein aus Japan zurückkehrendes, mit den Zwiebeln dieſer Blume beladenes Schiff ſcheiterte, wie Moriſon erzählt, an der Inſel Guernſey, und die vielen Zwiebeln, die dabei an das Ufer geworfen worden, haben ſich in dem lockern ſandigen Boden anfänglich von ſelbſt angebaut und ſo vermehrt, daß in der Folge daſelbſt ein Baron von Hatta ihre Cultur und Vermehrung betrieb und noch jetzt die Engländer viele Zwiebeln daher erhalten. Der Name: japaniſche Amaryllis — iſt alſo älter. (Fortſ. folgt.)

Varietäten.

Berlin. Auswahl blühender Pflanzen im königl. botan. Garten daſelbſt, den 15. Auguſt. Alstroemeria acutifolia, Link et Otto — A. ovata, Cavan. — Vallota purpurea, Herbert

(Amaryllis purpurea, Aiton) — Billbergia zebrina, Lindl. (Bromelia zebrina, Bot. Mag.) Dieſe Pflanze war auf der diesjährigen Blumen- und Pflanzenausſtellung unter der Benennung Tillandsia farinosa von dem Hrn. Hofgärtner Braſch eingeſendet worden. — Phyllanthus glaucescens, Humb. — Aristolochia brasiliensis, Mart. (Ar. ringens, Link) — Olea undulata, Jacq. — Notelaea ligustrina, Ventenat — Clerodendron calamitosum, L. — Gratiola aurea, Pursh. — Salpiglossis picta, Sweet. — S. atropurpurea, Graham. — S. straminea, Hooker. — S. sinuata, Ruiz et Pav. — S. parviflora, Don, und viele andere Varietäten. — Buddlea diversifolia, Ruiz et Pav. — Solanum obliquum, Bot. Mag. — Escalonia floribunda, Humb. — E. rubra, Persoon. — Lobélia speciosa, Hort. angl. — L. salicifolia, Sweet (Lob. Tupa, Ait.?) — Morinda citrifol., L. — Symphoria microphylla, Sprengel. — Cineraria vestita, Haw. Philos. Journal. — Cereus repandus, Haw. — C. subrepandus, Haw. C. Haworthi, Spreng. (C. nobilis, Haw.) — Baeckia virgata, Ker. — B. frutoscens, L. — B. camphorata, Smith. — Virgilia capensis, Lam. — Acacia longissima, Wendl. — A. Cyclopis, Makay. — Aglaia odoratissima, Blume.

Hamburg. Die Herren James Booth und Söhne, Eigenthümer der Flottbecker Pflanzenſchulen bei Hamburg, gaben der Redaction der Blumenzeitung unterm 15. September 1833 folgende intereſſante blumiſtiſche Notiz: „Der Anblick unſerer Gärten iſt gegenwärtig durch eine vielleicht früher nie geſehene Georginen-Pracht faſt bezaubernd, es finden ſich täglich mehrere Hundert hieſiger und fremder Blumenliebhaber ein, um ſich daran zu ergötzen und Kenner aus Frankreich, England, Holland und allen Theilen Deutſchlands erklären frei, etwas Aehnliches nie vorher geſehen zu haben; 100 Sorten der Zwerg-Georginen, zum Theil auf ganz fettem Boden, erreichen die Höhe von 1, 2 bis 4 Fuß und ſind nicht ſelten gleichzeitig mit 100 bis 150 offenen Blumen zu ſehen — es ſind 64 Sorten der ſogenannten anemonenblüthigen Georginen jetzt in der Blüthe und über 300 mittelhohe Sorten. Es ſind dieſen Sommer 2½ Morgen Landes mit Georginen des erſten Ranges bedeckt.“

Paris. In der Sitzung der Pariſer Akademie der Wiſſenſchaften vom 24. Juni ſtattete unter andern Hr. Juſſieu Bericht über den botaniſchen Theil der naturhiſtoriſchen Reiſe des Herrn Gay in Chili ab, woraus erhellt, daß dieſer junge Reiſende das königl. naturhiſtoriſche Muſeum zu Paris nur in botaniſcher Hinſicht allein ſchon mit 900 Pflanzenſpecies bereichert hat, wovon ungefähr die Hälfte neu d. h. im Syſteme noch gar nicht vorkommt und unbekannt iſt! Der Einſender hat ſogar diejenigen von den überſandten Gewächſen, welche wegen des Glanzes ihrer Farben oder wegen ihrer außerordentlichen Zartheit keine Wahrſcheinlichkeit darboten, daß ſie, obgleich auf's Beſte konſervirt und verpackt, in einem ſolchen Zuſtande in Europa anlangen dürften, um ihre Schönheit und die Gattung, wozu ſie gehören mögen, erkennen zu laſſen, ſelbſt abgezeichnet und illuminirt. Auch eine beträchtliche Anzahl von Samenarten hat dieſer vielverheißende junge Reiſende eingeſandt, und diejenigen davon, welche in den Verſuchshäuſern und Beeten des Pflanzengartens ausgeſäet wurden, ſind aufgegangen. Herr Juſſieu ſchloß mit dem Antrage, daß die Regierung dem Hrn. Gay, welcher die Landſchaften Chilis und den öſtlichen Abhang der Anden von Neuem zu bereiſen gedenke, einen geſchickten europäiſchen Gärtner beigeſellen möge, welcher demſelben bei ſeinen Einſammlungen und Culturverſuchen an die Hand gehen könnte.

Wien. (Fortſetzung.) Von Herrn Jacob Klier, ausgezeichnet verdient um die Erzeugung neuer Spielarten der Geraniaceen ſo wie um deren Cultur, welches die von demſelben gegebenen Pelargonien-Ausſtellungen zur Genüge beurkundeten und deren baldige Ausſtellung auch im gegenwärtigen Jahre der Pelargonien-Freund in froher Erwartung entgegen ſieht, wurde geſendet: Rosa Thea, Azalea calendulacea max., discolor, Rhododendron punctatum, Pelargonium lobat. frutesc., Pelargonium Augustiss.

Von Herrn Grohmann wurde ein Pelargonien-Sämling geſendet, der auch den für die inländiſchen Pelargonien beſtimmten Preis erhielt.

Aus dem Garten des Herrn Baron v. Arnſtein wurden aufgeſtellt: Acacia undulata, Rosa atroviolacea, Camellia japon. dianthifl., Pelargonium Augustiss., Smithi maculat., Allénii violac., elegantissimum, Barklayianum, Adonis, Primatum, Rosa Thea lilacina.

Herr Graf v. Cſaky ſendet aus ſeinem Garten: Rosa semperflora mutabilis, Canarina campanulata, Epacris grandiflora, Carapa guianensis. (Fortſetzung folgt.)

München. (Fortſetzung.) Tauſch-Anerbieten des Hrn. Collegienraths v. Gemünden daſelbſt.

Pelargonium:

Gallipetalum
grandidentat. Stöttn.
— immaculat.
Harriet
Hellas
inscriptum
Don Juan
Krossaton
Lindegart
Lothi

miaulis
Mariae
Markofskianum
mirabile Sw.
— Walln.
melissin. maculat.
Mufti
palmeopetal.
Pascha v. Janina
permixtum

potulentum
praestans
punctatum
purpur. specios.
Rhodopetalum
Raphans
resplendens
reticulare
Rosette
Rossullianum
Rouge brillante

Serae
speciosissim.
scutat. supb.
spectabile Sw.
Tantalus
Theodorich
trivulnerum
undulapetal.
virgulatum
Wallnerianum.
(Fortſetzung folgt.)

Bollweiler. (Fortſetzung.) Camellien-Sammlung, welche für 1833 nach der Wahl der Gebrüder Baumann zu Bollweiler zu veräußern iſt.

Cam. japon. Warratah limbata
C. jap. Warr. Lindbriata
— — — C. Limbria
— — — Lindleyii
— — — lucida
— — — Master's picotti
— — — moustrosa
— — — myrtifolia
— — — Nannettensis
— — — ornata
— — — oxoniensis

C. jap. Warr. pensillata
— — — Picotti
— — — Pink
— — — plumaria
— — — pregnans
— — — princeps
— — — pulchella
— — — pulcherrima
— — — purpurasc. nov.
— — — purpurea nova.
(Beſchluß folgt.)

In England hat ſich die Liebhabrei jetzt auf Sammlung ausgezeichneter Varietäten von Federnelken gelegt; man findet dort von dieſer ſonſt nur zu Einfaſſungen benutzten Blume ſchon Sammlungen von 200 der ſchönſten Varietäten.

Bibliographiſche Notiz über Blumiſtik.

☞ Der deutſche Blumiſt als zuverläſſiger Rathgeber über die Anlegung der Miſt- und Treibbeete, ſowie von der Zubereitung der Erde, in den Blumentöpfen, als in den Beeten. Nebſt einer auf Theorie und Erfahrung gegründeten Anweiſung über die Behandlung des Bodens, Erziehung und Pflege der vorzüglichſten Blumen, welche ſowohl in offenen Gärten, als in den Treibehäuſern erzogen werden können. Kitzingen 1833. Bei Gundelach.

Unter obigem anlockendem Titel erſcheint hier daſſelbe alte, für die jetzige Blumengärtnerei gar nicht taugliche Buch, welches in Nro. 11 des 4ten Jahrganges der Blumenzeitung als Miller's praktiſche Beobachtungen über die Behandlung, Erziehung und Pflege der Blumen u. ſ. w., und in Nro. 24 des 2ten Jahrganges der Blumenzeitung als der Blumenfreund angezeigt wurde. Nach dem, was bereits daſelbſt über die Nichtsnutzigkeit dieſes Buchs geſagt worden iſt, brauchen wir wohl angehende Freunde der Flora, denen es gewidmet worden iſt, nicht weiter vor dem Ankaufe deſſelben zu warnen.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto-Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gG 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. XXI. Weißenſee, (in Thüringen). October 1833. VI. Jahrg.

Ueber Calceolarien.

(Mitgetheilt von Herrn F. A. Haage jun. in Erfurt.)

(Fortſetzung.)

Beſchreibung:

C. punctata aurea, krautartig, Blätter eilanzettförmig, ſtumpfgeſägt, oben mit einzelnen Haaren beſetzt, unten aber faſt filzig. Blumen: die Grundfarbe iſt goldgelb, doch iſt die Oberfläche bräunlich, worauf ſich wieder Flecke von der Grundfarbe zeigen, in der Oeffnung befindet ſich unter der Oberlippe ein glänzend kaffeebrauner Kranz. 16 gr.

C. punctata nova, Stengel, Blatt wie vorſtehend, Blumen: die Farbe der obern Seite der Unterlippe ein ſchönes lebhaftes Braun mit goldgelben Punkten, die Oberlippe gelb mit einem ſchwarzbraunen Kranz in der Oeffnung. 16 gr.

C. punctata fusca, ſtrauchartig, Blätter ausgerändert runzlich, unten filzig, oben mit einzelnen Haaren beſetzt, Blumen rundlich, flach gefurcht, Oberlippe gelb, Unterlippe ſchwarzbraun glänzend. 1 Rß 16 gr.

C. punicea, ſtrauchartig, Blätter lanzettförmig, gekerbt und weich behaart, Blumen dunkelcarminroth, faſt rund. 16 gr.

C. racemosa, krautartig, Blätter kurzborſtig und herzförmig, Blumen zahlreich und blaßgelb. 4 gr.

C. purpurea, krautartig, Blätter eiförmig, doppelt gezähnt, weich behaart, hat noch nicht geblühet. 2 Rß.

C. rugosa, ſtrauchartig, Blätter eiförmig, gezähnt, runzlich, Blumen ſtehen in einer ſehr gedrängten Traube und ſind ſchwefelgelb. 6 gr.

C. rugosa var. urticaefolia, ſtrauchartig, Blätter eiförmig, runzlich, ſpitzig geſägt, Blumen größer wie bei der vorigen und von weit hochgelberer Farbe. 8 gr.

C. salicifolia, ſtrauchartig, Blätter linienlanzettförmig und ſtumpfgeſägt, Blumen ſind etwas größer, aber von gleicher Farbe wie rugosa. 8 gr.

C. sanguinea, ſtrauchartig, Blätter länglich ausgerändert, unten faſt filzig, oben fein behaart, Blumen von faſt blutrother Farbe. 12 gr.

C. scabiosaefolia, krautartig, Blätter fünflappig, verbunden und mit einzelnen Haaren beſetzt, Blumen blaßgelb. 4 gr.

(Beſchluß folgt).

Ueber die Anzucht der Georginen in kleineren Gärten.

(Mitgetheilt von W. Steiger aus S.) (Beſchluß.)

Ueber die Behandlung der aus Samen zu erziehenden Georginen bemerke ich Folgendes:

Im März oder April ſäe ich den Samen derſelben in Blumentöpfe, welche in die Fenſter eines mäßig erwärmten Zimmers, oder in ein nicht zu warmes Miſtbeet geſtellt werden.

Die zwei Zoll hohen Pflanzen werden Ende Mai theils in große weite Blumentöpfe, theils, in zwei Schuh weiter Entfernung, ins freie Land geſetzt. Gewöhnlich blühen dieſe bei reichlicher Befeuchtung im Herbſt, und ich ſehe dann mehr auf die Reinheit der Farbe, und den Bau der Blumen, als auf ihre Füllung, die oft erſt im zweiten oder dritten Jahre erfolgt. Viele blühen jedoch ſogleich, und vollkommen gefüllt. Ganz einfach ſich zeigende Blumen bleiben auch ſpäter ſo, und verdienen nur dann aufbewahrt und fortgepflanzt zu werden, wenn ſie ſich durch beſonders ſchöne Farben auszeichnen.

Die Wurzeln dieſer Landgeorginen werden eben ſo, wie die größeren behandelt, die Topfgeorginen aber bleiben im Durchwinterungslokal ruhig in ihren Gefäßen, nachdem die Stengel einige Zoll über der Erde abgeſchnitten worden, werden vor aller Feuchtigkeit geſchützt, und ſind dann im Frühjahr oft die erſten, welche treiben.

Dieſe Anzucht zur Vermehrung der Sorten iſt ſehr belohnend, oft gehen aus ihnen wahre Pracht-Exemplare hervor, und die Georgine trägt ihren Trivial-Namen mit Recht.

Ueber die Erziehung der Eriken, Rhododendren, Melaleuken, Metroſideren, Leptoſpermum u. ſ. w. aus Samen.

Mitgetheilt von P. aus W.

(Fortſetzung.)

§. 2. Die Herbeiſchaffung einer guten Haideerde iſt das Erſte, worauf der Blumenfreund bei Erziehung dieſer Pflanzengattungen zu ſehen hat. Ohne den Beſitz derſelben iſt alle Mühe und Sorgfalt, beſonders bei der Cultur der Eriken, vergebens. Die beſte Haideerde findet man auf den Gebirgen, welche große mit Haidekraut (Erica vulgaris) dicht bewachſene Flächen enthalten. Sie beſteht aus gänzlich zerſetztem und verweſetem Haidekraut, iſt von ganz ſchwarzbrauner Farbe und enthält mehr oder minder feinen, weißen Gebirgsſand. Im trocknen Zuſtande iſt ſie ganz leicht und ſtaubartig und nimmt nur ſehr ſchwer das Waſſer an. Hat man Haideerde von dieſer Beſchaffenheit ſich verſchafft, ſo wird dieſelbe ganz fein geſiebt, auf breite viereckige Haufen geſetzt, und bleibt bis zum Gebrauch ein Jahr unter öfterem Umwenden liegen. Zu Anfang März wird ſie nochmals ſo fein als möglich geſiebt und iſt ſo zubereitet zum Gebrauche dienlich. Bei gänzlichem Mangel an Haideerde iſt man genöthigt, dieſelbe durch eine andere Erdmiſchung möglichſt zu erſetzen, welche freilich der guten Haideerde ſehr nachſteht. In dem Falle verſchaffe man ſich aus dem Walde eine gute, reine Lauberde, welche durchaus keine fremdartigen Beſtandtheile enthalten darf; dieſe ſiebe man fein und laſſe ſie gleichfalls ein oder zwei Jahre, bis alle Laubtheile gänzlich zerſetzt ſind, der freien Luft ausgeſetzt. Hierauf ſiebe man dieſelbe nochmals und miſche ⅛ ganz feinen Bergſand hinzu. Auch läßt ſich eine gute ſchwarze Torferde, die aber wenigſtens drei Jahr der freien Luft ausgeſetzt war, als Surrogat für Haideerde gebrauchen. Sie wird ebenfalls mit ⅛ Sand vermiſcht, fein geſiebt, gute Dienſte leiſten, namentlich iſt ſie ſehr dienlich für Melaleuken und Metroſiderosarten. Zur Ausſaat des Haideſamens und der hier genannten übrigen feinen Samen iſt ſie indeſſen gar nicht anwendbar. Melaleuken-, Leptoſpermen- und Metroſiderosarten wuchſen, im zweiten Jahre in reine Topferde verſetzt, ſehr kräftig; auch einige Akazienarten. Wiederholt bemerke ich, daß alle übrigen Erdmiſchungen zur Ausſaat dieſer feinen Samen der Haideerde weit nachſtehen. Zum Verſetzen der jungen Pflänzchen im zweiten Jahre bereite man folgende Erdmiſchung:

1) für Eriken: 4 Theile Haideerde, 1 Theil Sand, 2 Theile Lauberde, 1 Theil Humus oder Dammerde.
2) für Melaleuken, Leptoſpermen, Metroſideren: 3 Theile Haideerde, 1 Theil Sand, 2 Theile Lauberde und 2 Theile Humus.
3) für Rhododendren und Azaleen: 4 Theile Haideerde, 2 Theile Sand, 1 Theil Lauberde, 1 Theil guten, mürben Lehm.

Iſt die Erde zur Ausſaat vorbereitet, ſo ſuche man taugliche Scherben, welche den Samen aufnehmen ſollen, ſich zu verſchaffen. Am zweckmäßigſten ſind flache Geſchirre. Dieſe können, um weniger Platz einzunehmen, von 2 Zoll Höhe und 4 Zoll Breite ins □ ſeyn. Bei dieſen flachen Geſchirren iſt es nöthig, daß mehrere Abzugslöcher in den Böden ſich befinden. Man belege dieſe ſodann ¼ Zoll hoch mit Kiesſteinchen oder zerklopften Scherben, damit das Waſſer ungehinderten Abzug haben kann; fülle die Geſchirre nun mit der zubereiteten Erde, mäßig angedrückt, bis ¼ Zoll vom Rande voll, und ſchreite dann zur Ausſaat. (Fortſ. folgt.)

Neue Pelargonien bei Hrn. Lemon in Paris.

(Beſchluß.)

P. kermesinum, die Blumenkrone 30 Linien im Durchmeſſer, die obern Blumenblätter lebhaft carmoiſin und feuerfarbig, die untern Blumenblätter rein weiß.

P. mirabile majus, ſehr zahlreiche Blüthen mit breiten Blumenkronen, die obern Blumenblätter taubenkehlenartig, violette Flecken auf weißen Flächen, die untern Blumenblätter am Grunde weiß gerandet.

P. pavoninum maximum, große Blüthen mit ſchön gerundeten Blumenblättern, die untern dunkelcarmoiſin mit ſtarken ſammetartigen braunen Flecken; die untern Blumenblätter zart violett.

P. purpureo-coeruleum, mit zahlreichen, großen Blumen, die obern Blumenblätter purpur-violett, durch feuerfarbige Flecken ſchattirt; die untern Blumenblätter am Grunde blau.

P. superbissimum, zahlreiche bündelförmige Blumen, große Blumenkronen, die obern Blumenblätter ſchön gerundet, carmoiſin ſammetartig und ſchön blau gefleckt; die untern Blumenblätter mit purpurfarbigen Rändern, am Grunde lapisblau gerandet.

P. teniescens, oder das Bandbündel, (le Faisceau de rubans.) die Blumenblätter ſehr ausgezeichnet durch die obern mordorée-purpurfarbigen, ſchwarz geſtrichten und blaugefleckten Blumenblätter; die untern ſind lebhaft lilafarbig mit veränderlicher Zeichnung oder verſchiedenen Farbenbändern.

Aus der Revue horticole.

Neue Roſen.

(Beſchluß.)

2) **R. Noisetteana d'Andrezelle.** Ein ſehr ſtarker Strauch mit langen gedrehten Blättern; die Blumen ſind breit, gewöhnlich voll, oft ſehr gefüllt und öffnen ſich ſchön; ſie ſind beim Oeffnen lila-roſafarbig, ſpäter hell lila bläulich.

3) **R. bengalens. Bourbon Desprez, Mdme. Deprez.** Sie iſt nicht weniger lebhaft im Wuchſe als die vorhergehende; die Farbe der Blätter ſtreift vom purpurfarbigen Grün bis zum dunkelſten Graugrün. Die Blumen ſind ſehr gefüllt, haben, wenn ſie vollkommen geöffnet ſind, 3 Zoll im Durchmeſſer; ſie ſind von zierlichem Bau, anfänglich lebhaft roſafarbig, ſpäter roſaviolett und endlich lilafarbig, ſo daß, wenn die Blumen zahlreich blühen, man vier verſchiedene Farben-Schattirungen zu gleicher Zeit an dem Roſenſtocke ſieht.

Syſtematiſche Namen der merkwürdigſten Pflanzen-Gattungen und Arten, ihr Genitiv ꝛc.

Mitgetheilt von L. aus T. (Fortſetzung.)

Am. vittata. Herit. Die gebänderte oder bandirte Amarylle.

Von vitta das Band, denn die überaus ſchönen, innerhalb mit einem blendend weißen Grunde verſehenen trichterförmigen Blumen ſind mit breiten, hellpurpurrothen Streifen durchwebt. — Dieſe am Cap wildwachſende Pflanze wurde von daher zuerſt nach England gebracht, wo ſie im Jahre 1769 zum erſten Male Blüthen und Samen getragen hat.

Am. Belladonna: ſiehe Letzteres.

Ambelania, Aubl. ae, f.

Ein von Aublet entdecktes, milchreiches Staudengewächs, das auf der Inſel Cayenne und in verſchiedenen Gegenden von Guiana, beſonders in großen Wäldern, anzutreffen iſt und dort Ambelani genannt wird. Die Frucht iſt eßbar und angenehm ſäuerlich, jedoch bleibt ihr Saft an Lippen und Zähnen hängen. Des letztern Umſtandes wegen nennen ſie die Creolen Quienbiendents, welches aus: qui tient bien aux dents — zuſammengezogen iſt.

Amblyodum. Palis. Beauv. i, n.

Von ἀμβλύς ſtumpf und ὀδούς Zahn — weil das Periſtom (der häutige Rand, der die Mündung der Büchſe umgiebt) dieſes Mooſes mit ſtumpfen Zähnen geziert iſt.

Ambrosia. L. ae, f. Götterſpeiſe, Traubenkraut.

Ἀμβροσια vom ἀ priv. und βροτός ſterblich, alſo unſterblich — eine Wohlgeruch duftende Flüſſigkeit, welche Unſterblichkeit verleihet. Schon Plinius (XXVII. 8.) erwähnt einer Pflanze dieſes Namens.

(Fortſetzung folgt.)

Varietäten.

Berlin. Im königl. botan. Garten blühten am 22. Aug. folgende bemerkenswerthe Pflanzen: Eryngium aquaticum L. — Gesnera Sellowi Nob. — G. rutil. Mart. — Hedychium maximum Rosc. — Haemanthus carneus Ker. — H. quadrivalvis Jacq. — Amaryllis bland. Ker. — Gladiolus floribundus Jacq. — Geissomeria longiflor. Bot. reg. — Linaria ramosissima Wal. — Euryale ferox Sal. — Banksia marginat. Cav. — Serruria odorat. Sweet. (Protea abrotanifol. Andr. bot. rep.)

Wien. (Fortſetzung.) Neben den bereits erwähnten Preis- und Acceſſitpflanzen verdienen wegen ihrer Schönheit, Neuheit, Ueppigkeit des Wuchſes, Größe oder außerordentlichen Form, nachſtehende Pflanzen einer beſondern Erwähnung: Cussonia triptera und Dodonaea salcifolia, aus dem k. k. Hof-Pflanzengarten zu Schönbrunn; — Rosa Thea indica Lawranceana carmin., énorme, arnauet hybr., centfeuille de Laken, Noisetteana rouge fonce, dann die in vier Exemplaren aufgeſtellten Schizanthus retusus, deren ſchöne Blüthen einen impoſanten Anblick gewährten, aus dem Garten Sr. kaiſerl. Hoheit des Erzherzogs Carl in Baden; Viburnum Tinus mit mehreren tauſend Blüthen überſäet, ein außerordentliches Schauſtück aus dem fürſtl. Schwarzenbergiſchen Garten; — Calceolaria purpurea in einem außergewöhnlichen Blüthe- und Culturſtande, dann Arbutus canariensis, Correa speciosa, Polygala latifolia, Andromeda buxifolia, aus dem fürſtl. Metternich'ſchen Garten am Rennwege, wo alle aus dieſem Garten aufgeſtellten Pflanzen deren vorzüglichen Culturſtand, die Kenntniß und den Fleiß des Gärtners ausſprechen; viele vorzüglich ſchön und üppig blühender Azaleen, Protea cynaroides major, ein großes Exemplar, Banksia grandis, Grevillea rosmarinifolia, ſämmtlich aus dem Garten des Freiherrn v. Hügel; Quercus lanuginosa (Don's Prodrom flor. Nepal.), Indigofera australis, speciosa, Rosa indica, Camellie blanche, odorata pompone rose, hymenée, hybrida de l'île de Bourbon, aus dem Garten des Baron von Pronay; Azalea liliflora, ein bei vier Schuh hohes Exemplar mit mehreren hundert Blumen überſäet, Paeonia arborea semiplena, Rosa Banksiae lutea, Campylia splendens, ein Sämling von 1829, zum erſtenmal in der Blüthe 1833, aus dem Garten des Grafen v. Dietrichſtein; Rosa semperfl., mutabilis aus dem Garten des Grafen von Cſaky; Paeonia papaveracea, Magnolia cordata, Dryandra nervosa, Brownea grandiceps und Trollius belgicus, von dem Handelsgärtner Joſeph Held geſendet; Cycas revoluta, ein Schauſtück ſeiner Größe wegen, vom Handelsgärtner Angelotti geſendet; Pelargonium Hügelinum, Humei austriacum, Lemonianum, Calistum und mehrere aufgeſtellte, aus Samen gezogene Pelargonien, von dem Handelsgärtner Mayer geſendet; Pelargonium Rohlederiae und Pelarg. Hericartianum, aus dem Garten des Hrn. Klier; ein Pelargonium (Sämling), Veſuv genannt, aus dem Garten des Hrn. Grohmann, welcher wegen ſeiner ausgezeichneten Blüthe und Neuheit den mehrſeitigen Wunſch ausſprechen machte, daß der Herr Ueberſender in Zukunft mehrere Pflanzen, die ſeine Kenntniſſe in der Pelargonienkultur beſtätigen, zur allgemeinen Anſicht bringen möchte. (Beſchluß folgt.)

Weimar. Im Garten des Kunſt- und Handelsgärtners Hrn. **Rauſche**, früher zu Donndorf, jetzt hier in **Weimar**, war in dieſem Jahr eine ſeltene Auswahl von Georginen, Aſtern (beſonders Zwergaſtern), Pelargonien und 20 bis 25 ganz neuen, meiſt ſehr ſchönen Blumen, ein vorzüglich mannichfaltiger Levkoyenflor, und es läßt ſich von deſſen Sämereien etwas Gutes erwarten, wie denn überhaupt deſſen erſt ſeit einem halben Jahr begründete Anlage, die von einem regen Eifer und Fleiß zeugt, eine lobende Erwähnung verdient.

St. Petersburg, den 15. März d. J. Ueber den dortigen großen botaniſchen Garten heißt es unter andern: Treten wir in ein tropiſches Haus, ſo begegnet uns gleich mit ihren ungemein großen Blättern im üppigſten Wachsthum im freien Erdbeete eine ſechzehn Fuß hohe und ſehr ausgebreitete Astrapaea Wallichii, voll von den großen rothen Blüthen; dicht nebenbei fällt der Blick auf einen Epiphyt, Zygopetalum crinitum, eine wahre Prachtpflanze mit ſchönen großen gefleckten Blumen, deren Hauch dem Veilchendufte wenig nachgiebt. Crinum amabile ragt mit einem ungeheuren Blüthenſtrauße hoch über die andern Liliaceen empor; weiterhin auf dem Lohbeet prangen ſieben Blumen im ſchönſten Carmin, des Haemanthus multiflorus, eine der erſten Prachtpflanzen, die ich durchgängig in den europäiſchen Gärten nicht wahrnahm, und in den Pflanzenverzeichniſſen ſelten angeführt finde, die hier aber ſo ziemlich allgemein und einſtweilen eine unſerer Winterzierden der Tropenhäuſer in dieſer Jahreszeit iſt. Den äußerſt ſtarken balſamiſchen Citronengeruch, von dem das ganze Gewächshaus durchduftet iſt, wird gewiß Niemand in den kleinen gelben Blumen des krautartigen niedrigen Chloranthus inconspicuus ſuchen. Tritt man durch die hohe Glasthür in ein temperirtes Haus, ſo entzückt uns die königliche Pracht der mannigfaltigſten neuholländiſchen Acacien in Stämmen von mehr als 30 Fuß Höhe, bedeckt mit Tauſenden der lieblichſten hell- und dunkelgelben Blüthenköpfchen und Kätzchen, ſie machen eine wunderſame Wirkung zwiſchen den neuholländiſchen Myrtaceen und Protaceen. Die gelblichrothen großen Blüthenbürſten der Banksia macrostachya, ſo wie die ſeltſame Blattſcheidung der blühenden Canonia capensis geben dem Beobachter viel Stoff zu Betrachtungen.

München. (Fortſetzung.) **Tauſch-Anerbieten** des Hrn. Collegienraths **von Gemünden** daſelbſt.

Pelargonium:

à la mode
modestum
mistinum
morifolium
Max, König v. Baiern
Maximilian, Krpz. v. Baiern
mutabile
Muthianum
Mathison
Montgelas
Martius
Majale
Münchnerin, schöne
magnifol. plen.
megaleon
marginatum
Markofskianum
Mathilde, Pss.
Megaleion
Münchianum
melanarium
macrostephan.
Morawitzky
Marianne, Pss.
Mackbeth
melaneanum
nervosum
Don Nicolo
niveum
nobile
Nimrod
non plus ultra
Nègres roi des
Nelson
Nussington
Nordfort
Northumberld.
nigrita
nimpfenburgense
Nairnia
nerviflorum
Nürnberg, Stadt
nec plus ultra
non plus ultra nov.
Napoleon, Kais.
obscurum
— maj.
odoratissimum
— incisum
Oranien, Prz.
ornatum
Oxford, Lady
optabile
Orphanum
Orleans
Orleans Maid of
odontophyll.
oblatum
obcordatum
optatum
obtusaefolium
Otto, K. v. Gr.
Oddidi King
Octavius
obliquum
O'Conell
Poniatowski
Phariceum
primatum
peltatum
paradoxum
planifolium
pannifol.
pavonia
pavoninum
penecillatum
pensilvanicum
praevalens
prestantissim.
princeps niger
la purete
pulchellum
purpurascens
papilionaceum
platipetalum
Phaedron
perseverans
pink double
piperitum
pudicum.

(Fortſetzung folgt.)

Schönbrunn bei **Wien**, den 26. Sept. In den Gewächshäuſern des hieſigen k. k. Hofgartens blühen jetzt folgende Gewächſe: Baeckea virgata. (Ker.) Aus Neu-Süd-Wallis. Myrtaceae. Dodecandria, Monogynia. — Begonia bulbillifera. (Link et Otto.) Aus Braſilien. Begoniaceae. monoetia, Polyandria. — Begon. pauciflor. (Lindley.) Aus Weſtindien. ꝛc. — Calampelis scabra. (David Don.) Aus Chili. Bignoniaceae. Didynamia, Angiospermia. — Calceolaria bicolor. (Ruiz et Pavon.) Aus Peru. Scrofularinae. Diandria, Monogynia. — Erica cerinthoides. (Linné.) Vom Vorgeb. d. g. Hoffn. Ericeae. Octandria, Monogynia. — Erica Ewerana. (Dryander.) V. Vorg. d. g. Hoffn. Ericeae. Octandria, monogynia. (Beſchluß folgt.)

(Cheirostemon platanoides.) Der Baron von **Karwinsky**, welcher die vereinigten Staaten von Mexico, namentlich Oaxaca in botaniſcher Hinſicht bereiſ't, iſt ſo glücklich geweſen, das eigentliche Vaterland dieſes ſchönen Baumes (mit einzeln ſtehenden Blumen ohne Blumenkrone, aber mit hochrothen Kelchen, die mit feuerrothen Deckblättern umgeben ſind), welches von Humboldts Zeiten an bis auf den heutigen Tag den mexikaniſchen Botanikern unbekannt und ein Deſiderandum geweſen war, auf einer ſeiner Reiſen nach der Südſee zu entdecken. In einem Thale des weſtlichen Andenzuges, zwiſchen San Juan Quieixe und Juquitas (ſchreibt er) iſt das wahre, eigentliche und einzige Vaterland dieſes merkwürdigen Baumes, er iſt längs deſſen ganzen Abhanges auf der Südſeite in ungeheurer Menge, Größe und Stärke anzutreffen, und faſt das einzige Holz dort; die Nectarinen ſeiner Blüthen ſind ſo reich an honigſüßem und duftendem Nectar, daß die vorbeiziehenden Indier hinaufklimmen, und wie aus Bechern aus dieſen ſchönen wunderſamen Bäumen den Honig nicht etwa ſaugen, ſondern ſchlürfen, wie ich ſelbſt geſehen und mitgetrunken habe.

Unter den ſchönblühenden Waſſerpflanzen (heißt es in Flints Geography and History of the Western States Vol. I. p 89 — 90) zeichnet ſich vorzüglich eine durch Pracht aus. Sie erſcheint in höchſter Vollkommenheit auf den Buchten und Seen des Arkanſas-Stromes. Die ſchlammigen Buchten, Bayen und Sümpfe ſind mit den elliptiſchgeformten, ſchön grünen, ſonnenſchirmgroßen Blättern oft ſo dicht bedeckt, daß die Strandläufer trockenen Fußes darüber wandeln. Die Blumen gleichen denen der Nymphaea odorata, oder der neuengländiſchen Waſſerlilie, ſind aber größer. Sie haben einen eben ſo zierlich gebildeten Kelch, und man bemerkt in ihnen daſſelbe herrliche Gelb und Weiß, doch ſind ſie nicht wohlriechend. Am häufigſten trifft man ſie in Cypreſſenſümpfen, von Moskitos und Sumpfvögeln umſchwärmt, über ihren Wurzeln ſchwimmen die Alligators, und auf ihren Blättern ſonnen ſich die Mokaſenſchlangen. Dort entfaltet eine der wunderſamſten Blumen der Erde ihren Kelch!

(Die Blüthezeit der Nelken hinauszuſchieben.) Wann die Nelken ihre Blüthenſtengel treiben wollen, ſchneidet man blühbare Zweige bei dem zweiten oder dritten Knoten von unten ab, ſpaltet ſie ein wenig von unten herauf und ſetzt ſie in Gläſer mit Waſſer. Haben ſie ſich unten verknorpelt und Wurzeln getrieben, ſo verpflanze man ſie in Töpfe mit leichter Erde, halte ſie anfangs ſehr feucht, ſpäter wie gewöhnlich, und laſſe ſie unter Glas ſtehen, bis ſie völlig ausgewachſen ſind. (Journal d'agriculture des Pays-Bas.)

Als ein wirkſames Mittel gegen die Erdflöhe, deſſen Anwendung zugleich das Wachsthum der Pflanzen befördert, empfiehlt man das Begießen derſelben des Abends bei ſtillem Wetter mit Waſſer, worin ſo viel Salz aufgelöſet iſt, als es auflöſen kann, und zwar in ſo ſanfter Weiſe, daß das Waſſer an den Pflanzen hängen bleibt. — Auch empfiehlt man auf eine Portion Sägeſpäne einige Tropfen Steinöl zu träufeln und dieſe Miſchung, nachdem ſie gut untereinander gerührt und völlig vom Steinöl durchzogen, auf die mit den Erdflöhen ſtark behafteten Pflanzen zu ſtreuen. Das Ungeziefer verläßt, durch den ſtarken Geruch vertrieben, auch die in der Nähe ſtehenden nicht beſtreuten Pflanzen und kehrt nicht leicht wieder. — Endlich kann als ein erprobtes Mittel empfohlen werden, die von den Erdflöhen heimgeſuchten Pflanzen öfters mit Waſſer zu begießen, in welches man eine Quantität Hornſpäne gethan und unter mehrmaligem Umrühren einige Zeit hat ſtehen laſſen.

In der Mitte Oktobers blühten in dem Pfarrgarten zu Dreieichenhain (Kreis Offenbach) die blaue Schwertlilie (Iris germanica), die Eſſigroſe (Rosa gallica), die Rosa centifolia und das Polemonium coeruleum.

Den uns gütigſt aus Weimar eingeſendeten Bericht über die am 14., 15. und 16. Oktober c. daſelbſt ſtattgefundene Gemüſe-Ausſtellung haben wir ſeiner Tendenz gemäß in Nr. 22 der gemeinnützigen Mittheilungen über Wein-, Obſt- und Gemüſebau ꝛc. abdrucken laſſen.

Bibliographiſche Notiz über Blumiſtik.

Verzeichniß der im Freien ausdauernden Bäume, Geſträuche und Obſtſorten, ſowie der Staudengewächſe, Georginen u. ſ. w. von James Booth und Söhne, Eigenthümer der Flottbecker Baumſchulen bei Altona. Erſte Abtheilung. (Die 2te Abthlg. enthält Glashauspflanzen.) Hamburg bei Kaiſer u. Fränkel. 1833.

Dieſes 116 Seiten ſtarke, neubearbeitete und höchſt ſauber ausgeſtattete Pflanzen-Verzeichniß iſt bis zum Herbſt 1834 gültig, und kann durch die Redaktion der Blumenzeitung für den Preis von 5 ℛℋ bezogen werden. Es enthält viele neue Pflanzenarten und einen Reichthum von den im Freien ausdauernden Gewächſen, wie man ihn in den berühmten Flottbecker Baumſchulen nur erwarten kann. Mannichfache praktiſche Bemerkungen über die Cultur einzelner Pflanzen-Gattungen erhöhen den Werth dieſes Verzeichniſſes ungemein und ſind gewiß jedem Garten- und Blumenfreunde willkommen.

Wir beſchränken uns hier auf einige Angaben, die dem Gartenfreunde als Blumiſten intereſſant ſeyn können, während wir das, was die Obſtbäume u. ſ. w. betrifft, in den gemeinnützigen Mittheilungen anführen werden.

Unter den Bäumen zu Gruppen in Parks und auf Raſenplätzen finden wir: Aralia spinos., im Freien gezogen, 6 — 8 Fuß hoch. Cotoneaster vulgaris, neue Baumform als Hochſtamm, (die niederhängenden Kronen mit ſchönen rothen Beeren beſetzt, haben ein zierliches Anſehn.) Cytisus purpur., rothbl. Bohnenbaum, hochſtämmig mit Krone, (eine Gruppe dieſer Bäume gewähren durch die zierlichen, niederhängenden, mit rothen Blumen bedeckten Zweige der Krone einen reizenden Anblick.) Fraxinus lentiscifol. var. gracilis, 8 Fuß hoch bis zur Krone; dieſer neue ſehr zierliche Baum treibt in einem Sommer Zweige von 5 — 6 Fuß Länge, welche ſich ſenkrecht zur Erde neigen; er iſt einer der ſchönſten Trauerbäume, aus Samen von Frax. lentiscifol. gewonnen. Unter den immergrünen Sträuchern: Rhododendron maximum album, 15jährige, acclimatiſirte 6 Fuß hohe, ſchön gezogene Exemplare. Trauerbäume: Trauer-Weiden, Trauer-Weiden mit ſehr ſchönen, lockenartigen Blättern, ſchwarze, hängende Weide, Trauer-Akazien, Trauer-Ulmen (ſehr ſchön), Trauer-Eſchen, Trauer-Birken, Trauer-Pappeln, 8 — 10 Fuß hoch, mit niederhängender Krone, Trauer-Buche, Trauer-Bohnenbäume, purpurrother hochſtämmig, der zierlichſte unter den Trauerbäumen.

Außer einer großen Anzahl ſchöner Azaleen, (54 Sorten), die in großen blühbaren Exemplaren vorhanden ſind, findet man noch 40 neue Hybriden und Varietäten von beſonderer Schönheit. Hibiscus syriacus fl. pl., 12 Sorten, ſind bei leichter Bedeckung im Freien ausdauernd und als wirkliche Zierſträucher zu empfehlen. Ilex aquifolium in 12 Varietäten, im Freien gezogene Sträucher. 8 Magnolien und 34 Sorten Rhododendren fürs freie Land. Eine ſehr zahlreiche Roſen-Sammlung von den ausgezeichnetſten Sorten, 130 Centifolien, 28 Noiſette-Roſen, ſtehen ſämmtlich im freien Lande und ſind im Winter bei einiger Laubbedeckung ausdauernd; über 100 Varietäten Pimpinell-Roſen. Die Roſe, Königin von Dänemark, wurzelächt.

Unter den perennirenden Stauden-Gewächſen: findet man zahlreiche und ſchöne Sammlungen von Aconitum, 38 Arten, Anemone, Aster, Campanula, Cypripedium, Delphinium, Helianthemum, Iris, Lilium, Lychnis, Paeonia, (ein ausgezeichnet ſchönes Sortiment von 44 Arten und Varietäten.) Phlox, 56 Arten und Varietäten, Potentilla, Primula, Veronica u. ſ. w. Ganz beſondere Berückſichtigung verdient die Georginen-Sammlung, und zwar ſowohl die gefüllten, mittelhohen Georginen, als auch vorzüglich die prachtvollen Zwerg-Georginen und die anemonenblüthigen und kugelförmigen.

(Berichtigung.) In Nr. 16 der Blumenzeitung S. 1. Sp. 2. Z. 15. von unten muß es heißen „Fettigkeit" ſtatt Fluſſigkeit.

Hierbei eine Beilage: Die Berliner allg. Gartenzeitung betreffend.

In der Nauckſchen Buchhandlung in Berlin iſt erſchienen und durch alle übrigen Buchhandlungen, Zeitungsexpeditionen und Poſtämter zu haben:

Allgemeine Gartenzeitung.

Eine Zeitſchrift für Gärtnerei und alle damit in Beziehung ſtehende Wiſſenſchaften. In Verbindung mit den tüchtigſten Gärtnern und Botanikern des In- und Auslandes herausgegeben von **Fr. Otto**, Königl. Preuß. Garten-Direktor und Inſpektor des botan. Gartens zu Berlin, und **Alb. Dietrich**, Dr. der Philoſophie und Lehrer an der Gärtner-Lehranſtalt zu Berlin.

Von dieſer Zeitſchrift erſcheinen in jedem Jahre 52 ganze Bogen in gr. 4. auf Velinpap., für den Preis von 4 Thlr. pro Jahrgang. Die Verlagshandlung enthält ſich jeder Anpreiſung dieſer Zeitſchrift; die allgemeine große Theilnahme, welche dieſelbe bei ihrem Erſcheinen in allen Theilen Deutſchlands fand und die ſich während deſſen noch beiweitem vermehrt hat, ſpricht genügend für den inneren praktiſchen Werth dieſer die Gartenkunſt und Gartenbotanik befördernden Zeitſchrift. — Für diejenigen, welchen noch kein Blatt derſelben zu Händen gekommen, haben wir hier unten den kurzen Inhalt der erſten 18 Nummern aufgeführt und bemerken noch, daß dieſen Nummern zur Erklärung des Textes 24 Holzſchnitte und 1 Steindruck beigegeben ſind und gegenwärtig im ganzen 26 Nummern die Preſſe verlaſſen haben.

№ 1.

Kultur und Beſchreibung der Kunthia xalapensis Hort. ber. einer neuen Palme aus Mexico von Fr. Otto und Alb. Dietrich. — Über eine neue nutzbare Oxalis-Art von Fr. Otto. — Kultur der Euryale ferox. Salisb. Bot. Mag. 1447. (Anneslea spinosa Andr. Bot. Rep. 618.) Polyandria Monogynia; Nymphaeaceae vom Gärtner Herrn Plaſchnick. — Etwas über Calceolarien von Fr. Otto. — Syringa Iosikaea vom Hrn. Prof. Baron v. Jaquin. — Nachrichten aus den Berliner und Potsdamer Gärten vom Jan. u. Febr. von Fr. Otto.

№ 2.

Beſchreibung der im Königl. botaniſchen Garten bei Berlin angelegten Heitzung mit erwärmten Waſſer vom Königl. Bau-Inſpector Herrn Schramm. (Mit einer Zeichnung.) — Über die Cultur der capiſchen Erica-Arten; 1) ihre Fortpflanzung, 2) der für ihr Wachsthum am beſten geeignete Boden, 3) die verſchiedenen nöthigen Handgriffe.

№ 3.

4) Allgemeine Behandlung der Eriken ſowohl in als, wenn es nöthig iſt, außer dem Hauſe. — Anhang. — Liſte von ſolchen Eriken, welche viel Kälte vertragen können. — Liſte von den am meiſten zierenden Eriken und welche das ganze Jahr hindurch blühen. — Liſte ſolcher Eriken, welche der freien Luft ausgeſetzt, ohne Bedeckung 7°-8° Fahrenheit unter ° vertragen können, ohne im geringſten Schaden zu leiden. — Eriken, welche nur 4-6° Fahrenheit unter ° vertragen können. — Reiſe-Nachricht des Gärtners Karl Beyrich aus Nord-Amerika.

№ 4.

Über die Cultur der Scitamineen v. Fr. Otto. Scitamineen, welche hier im Botaniſchen Garten cultivirt werden. — Correſpondenz Nachricht, St. Petersburg vom $\frac{3}{15}$ März 1833. — Nachrichten aus den Berliner Gärten vom 1-15. April. Einige der vorzüglichſten zum Theil noch neuen und ſeltenen Hyacinthen. — Correſpondenz Nachricht aus Potsdam vom 6. April 1833.

№ 5.

Anzeige von Bollweilers Camellien-Sammlung. Cultur der Camellien — Ueber die Moutan-Pflanze (Paeonia Moutan Sims.)

№ 6.

Nachrichten von der in Cunnouhie befolgten Methode, Ananas und Melonen in einer durch Dampf geheitzten Grube zu ziehen, mit einer Beſchreibung derſelben und des Dampfapparats, von Herrn Alexander Smith. Gärtner des Obriſten Paterſon. — Etwas über blaue Hortenſien. — Über eine Methode Kirſchen zu treiben von Benj. Law. — Beſchreibung der Petre Birne, eine ſchöne, aus Samen gezogene Butterbirne in dem botaniſchen Garten bei Philadelphia, vom Herrn Obriſten Robert Carr. (Eigenthümer des Gartens.) — Nachricht von einem prächtigen Cactus. — Winke über das Pflanzen und die allgemeine Behandlung ausdauernder immergrüner Sträucher.

№ 7.

Ueber Rhizophora Mangle und über die Amerikaniſchen Seeſumpfwaldungen vom Garten Director Herrn Carl Ritter in Preßburg. — Nachtrag zu vorſtehendem Aufſatz von Friedr. Otto. — Ausſtellung ſchönblühender Pflanzen im botaniſchen Garten. — Nachricht von der Otaheitiſchen Methode Arrowroot (Pfeilwurz) zu bereiten vom Herrn Andreas Mathews. — Promenade durch einige Berliner Gärten am 17. April von S. . . r.

N° 8.

Verzeichniß immergrüner Sträucher, welche man in Töpfen in den Pflanzſchulen vorräthig halten ſollte. — Abbildung einer Form der Blumen-Geſtelle des Kunſt- und Handels-Gärtner Herrn Touſſaint. — Die diesjährige Hyazinthenflor in den Berl. Gärten. — Chineſiſche Art, Obſtbäume durch Schnitter fortzupflanzen. — Seltene blühende Pflanzen im botaniſchen Garten den 9. Mai.

N° 9.

Über die Cultur und Nutzanwendung des ächten und offizinellen Rhabarbers Rheum australe. — Auszug aus einem Schreiben des Herrn Baron von Karwinski (datirt aus Hacienda de St. Pedro Nolano, Citade de Oaxaca.) — Monographia generum Aloes et Mesembryanthemi iconibus illustrata. auctore Iosepho Principe de Salm Reifferscheid-Dyck in instituto Lithographia Arnz et Comp. Düsseldorpii, — Cerelus hybridus, ein ſchöner Garten-Cactus, der im botaniſchen Garten jetzt blüht.

N° 10.

Beſchreibung der Calceolaria robusta, einer neuen Zierpflanze aus Valparaiſo von Albert Dietrich. — Methode, Treibhäuſer durch die Circulation heißen Waſſers in luftdicht verſchloſſenen Röhren von geringem Durchmeſſer zu heizen von Herrn A. M. Perkins, (mit einer Abbildung) — Preiſe, ausgeſetzt durch die Caledoniſche Geſellſchaft für Gartenbau für das Jahr 1833. — Drei Prachtpflanzen im botaniſchen Garten. — Schönes Roſen- und Geranien-Sortiment des Herrn Kunſt- und Handelsgärtner Limprecht.

N° 11.

Über die neuholländiſchen Acacien welche unter dem Namen Acacia paradoxa vorkommen von Albert Dietrich. — Eine neue Art Obſtbäume zu ziehen, und eine neue Art ſie zu pfropfen und abzuſäugeln vom Herrn W. Green. (Mit 10 verſchiedenen Abbildungen.) — Cultur der Calceolaria robusta v. Otto. — Cultur der Georginen in Flottbeck bei Altona von James Booth und Söhne. (Beſitzer der Flottbecker Baumſchulen.) — Blühende Pflanzen im Königl. Bot. Garten. — Etwas über die Blumen- und Gemüſe-Cultur in Berlin. Correſpondenz Nachricht. Potsdam.

N° 12.

Zur Synonymik der in unſern Gärten cultivirten Laurinen mit nervigen Blättern (foliis trinerviis und triplinerviis) vom Herrn Präſidenten Nees von Eſenbeck in Breslau. — Über eine üppige Erzeugung von Champignons im freien Lande vom Juni bis zum November von Herrn J. Elles. — Bemerkenswerthe Anzeige über den Ankauf Nordamerikaniſcher Gehölz-Samen für die deutſchen Gärten und Förſten vom Herzogl. Hofgärtner Schoch in Wörlitz. — Recenſion über: Bouchés Naturgeſchichte der ſchädlichen und nützlichen Garten-Inſecten und die bewährteſten Mittel zur Vertilgung der erſtern. — Nachricht von einer Methode große Bäume zu verpflanzen, verſucht von Herrn James Munro, Gartenvorſteher der Herren Dickſon und Turnbull's zu Brechin vom Herrn Loudon.

N° 13.

Eine neue Anordnung der chineſiſchen Chryſanthemum-Arten Chrysanthemum indicum (Anthemis artemisiaefolia Willd.) mit einer verbeſſerten Methode ihrer Cultur von Herrn A. H. Haworth. — Seltene und ſchönblühende Pflanzen im Königl. Botaniſchen Garten den 6. Juni. — Über eine neue Anordnung, Pflanzen für lebende Sammlungen zu etiquettiren von Robert Mallet jun. (Mit 12 Abbildungen.) — Einiges über die Einwirkung der in der Nacht vom 26–27. Mai plötzlich eingetretenen Kälte auf die Vegetation. — Notiz. — Correſpondenz Nachricht aus Paris.

N° 14.

Fourcroya longaeva Karwinski et Zuccarini. Mitgetheilt vom Herrn Präſidenten Nees von Eſenbeck in Breslau. — Über das Pfropfen der Cactus-Arten von E. Schauer, Ober-Gehülfen im botaniſchen Garten zu Breslau. — Bemerkungen über das Clima von Chili. — Intereſſante Nachricht aus Flint's Geogr. and History of the Western States. — Correſpondenz-Nachricht aus St. Petersburg.

N° 15.

Das Ringeln der Pflanzen von Otto. — Leichte Methode Ananaskirſchen (Physalis peruviana) in Zimmern zu ziehen von Albert Dietrich. — Über die Geſchichte und Cultur der fleiſchfarbigen Nelke von Eduard Rudge — Anlage eines botaniſchen Gartens zu Birmingham von der dortigen Gartenbau-Geſellſchaft. — Cultur und Beſchreibung der Funkia undnlata Nob. von den Herausgebern. — Verzeichniß der Japaniſchen Arten der Gattung Hydrangea — Blühende Pflanzen im botaniſchen Garten. Mitte Juni. —

N° 16.

Nachrichten über die diesjährige Blumen-Ausſtellung zu Wien. — Bericht über die diesjährige Pflanzen-Ausſtellung in Berlin.

N° 17.

Cultur und Beſchreibung der Dyckia remotiflora Nob., einer neuen Pflanze aus der Familie der Bromeliaceae. Von den Herausgebern — Auszug aus dem Reiſebericht des Herrn Doctor C. A. Meyer. — Beſuch des botaniſchen Gartens zu Rio de Janeiro. — Bemerkungen über die Geographiſche Vere breitung der Cactus Pflanzen in Braſilien. Vom Herrn Dr. und Prof. v. Martius. — Neue Weinſorte. — Reiſenachricht vom Vorgebirge der guten Hoffnung.

N° 18.

Einige Bemerkungen der frühen Purpur-Guigne, einer neuen Kirſche. Vom Herrn Robert Thompſon, Untergärtner in der Fruchtabtheilung des Hort. Soc. Gartens. — Über den Zuſtand der Botanik auf Japan. Vom Herrn Dr. v. Siebold. — Auszug der vorzüglichſten ſchönblühenden Pflanzen, für die deutſchen Blumen- und Pflanzen-Gärten, nebſt der Cultur-Methode aus R. Sweet British Flower Garden 1823–1829, die hier zum Theil noch ſelten und wohl verdienten eingeführt und cultivirt zu werden. Rudbeckia serotina Taf. 4. Oenothera macrocarpa Taf. 5. Cyclamen vernum Taf. 9. Phlox triflora Taf. 29. — Schönblühende Pflanzen im königlichen botaniſchen Garten vom 8 bis 12. Juli.

Berlin im Auguſt 1833. Die Verlagshandlung.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto-Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttaglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. XXII. Weißenſee, (in Thüringen). November 1833. VI. Jahrg.

Ueber Calceolarien.

(Mitgetheilt von Herrn F. A. Haage jun. in Erfurt.)

(Beſchluß.)

Beſchreibung:

C. striatiflora, ſtrauchartig, Blätter gekerbt, lanzettförmig, unten etwas behaart; Blumen: die Oberfläche der Unterlippe iſt gelb mit blaßkirſchrothen Streifen, die untere Seite derſelben blaßkirſchroth. 16 gr.

C. thyrsiflora, ſtrauchartig, Blätter linienförmig, nach der Spitze gezähnt, glatt, Blumen klein und hellgelb. 12 gr.

C. tricolor, krautartig, Blätter kurzgeſtielt, ei-lanzettförmig, faſt gefilzt; Blumen: die Unterlippe iſt ockergelb mit kaffebrauner Zeichnung, in der Oeffnung kirſchbraun. 14 gr.

C. tricolor Alexandria, ganze Geſtalt wie vorige, nur ſind die Blumen hellerbraun und lila gezeichnet. 16 gr.

C. tricolor elegans wie tricolor, Blumen etwas kleiner, hoch chamois, Ober- und Unterlippe mit ſchönem Lila gezeichnet. 2 Rthlr.

C. tricolor formosa, wie tricolor, Blumen etwas kleiner und blaßgelb mit hellem Braun. 1 Rthlr.

C. tricolor Gilanii wie tricolor, nur daß die Blumen mehr eine dreieckige Form bilden und die Farbe auf der Unterlippe mattbraun iſt, in der Oeffnung ſind einige braune Punkte, die Oberlippe iſt gelb ohne Zeichnung. 16 gr.

C. tricolor Lehmannii wie tricolor, die Oberlippe der Blumen weißlichgelb, die Unterlippe citronengelb mit hellem Braun, die Rückſeite weiß, in der Oeffnung lila. 1 Rthlr.

C. tricolor minor unterſcheidet ſich von tricolor durch etwas weniger behaarte Blätter, und durch ihre kleinern Blumen. 1 Rthlr.

C. tricolor picta, wie tricolor, nur iſt die rothbraune Zeichnung goldgelb punktirt. 1 Rthlr. 8 gr.

C. tricolor sulphurea flammea wie tricolor, Blumen aber etwas kleiner, und mit Hell- und Dunkelbraun gezeichnet, in der Oeffnung dunkellila. 1 Rthlr. 16 gr.

C. tricolor superba wie tricolor, Blumen hoch chamois, Oberlippe mit glänzendem Lila gezeichnet, Unterlippe im Aufblühen ſchwarzroth, welche ſich in eine carmoiſinviolette Farbe verwandelt, die ſchönſte der Mehrfarbigen. 3 Rthlr.

C. tricolor Youngii wie tricolor, die Farbe der Blumen iſt etwas lebhafter, und mehr in Strichen aufgetragen. 1 Rthlr.

C. turbinata, ſtrauchartig, Blätter lanzettförmig, unregelmäßig geſägt und weichbehaart, Blumen zimmtbraun mit rothen Adern. 16 gr.

C. Velutina, ſtrauchartig, Blätter länglich, ausgerändert, wenig behaart, Farbe der Blumen glänzend zimmtbraun. 16 gr.

C. Victory, ſtrauchartig, Blätter elyptiſch, ausgerändert, unten filzig, Blumen beim Aufblühen röthlich braun, am Rande gelb, beim Verblühen goldgelb. 20 gr.

Beſchreibung und Cultur einiger ausgezeichneten neuern Zierpflanzen.

(Mitgetheilt vom Herzogl. Hofgärtner Hrn. J. W. Boſſe in Oldenburg.)

(Fortſetzung.)

Helianthemum vulgare, flore fusco semipleno. *Angl.* ♄. **Gemeines Sonnenröschen**, mit halbgefüllten oder ſproſſenden, $\frac{3}{4}$ Zoll breiten, bräunlich-ſafrangelben, am Grunde kaſtanienbraunen, ſehr hübſchen Blumen. Die Blätter ei-lanzettförmig, am Rande ein wenig umgerollt, gleich den Aeſten weichhaarig, auf beiden Flächen grün. Wird $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch und hat Blüthezeit und Cultur mit dem Vorhergehenden gemein. — Iſt an obgenannten Stellen für 10 gr. zu haben. — Ich kultivire auch noch Varietäten mit weißen und mit hellgelben, gefüllten Blumen.

Malope grandiflora. *Hortul.* **Großblümige Malope.** ☉. Dieſe prächtige neue Zierpflanze gehört zu den Malvaceen, und ähnelt im Wuchs der bekannten Malope trifida; allein die Blüthe iſt in allen Theilen größer, die Blätter ſind eckiger oder mehr gelappt, und ſpitziger gekerbt, meiſtens haben ſie 5 kurze, zugeſpitzte, ſpitz gekerbt-geſägte Lappen und ſind glatt, gleich dem Stengel. Die Kelchtheile ſind gewimpert; die Krontheile 2 Zoll 3 Linien lang, an der abgerundeten Spitze $1\frac{1}{2}$ Zoll breit, am Grunde keilförmig geſchmälert, glänzend roth, mit dunkeln Längsadern durchzogen, an dem ausgebreitetn Rande 3 — $3\frac{1}{2}$ Zoll breit, ſehr prachtvoll. Sie blüht im Juni bis Auguſt und kann ſowohl in Töpfe als ins freie Land gepflanzt werden. Der Same wird im März oder April in ein laues Miſtbeet, im Mai aber auch an warmer Stelle ins freie Land geſäet (wie der Same von Malope trifida). Der Same iſt bei mir, in Erfurt, Hamburg u. a. O. zu haben, im Fall die Witterung nicht zu kalt und naß iſt.

Nolana atriplicifolia. *Hort. Paris.* Meldenblättrige Schellenblume. ⊙. Sie iſt die ſchönſte unter den bekannten Nolanen, und eine der ſchönſten Sommerblumen, welche wir neuern Entdeckungen verdanken. Die Pflanze iſt fleiſchig, dickblättrig, glatt und die auf der Erde hingeſtreckten Stengel haben viele, mit zahlreichen Blüthen geſchmückte Aeſte. Die Blätter ſtumpf, eirund, faſt rautenförmig, geſtielt, mit 2½ — 4 Zoll langer Blattfläche, die obern Blätter nach und nach mehr eirund, kleiner und kürzer geſtielt, die oberſten am Grunde lang gefranzt. Die Blumen ähneln, wenn man ſie nicht ganz nahe beſieht, ſehr denen der dreifarbigen Winde (Convolvulus tricolor); ſie ſind himmelblau, im Grunde weiß und gelb, 1¾ — 2 Zoll breit und haben ſtumpfe, undeutlich 3lappige Saum-Einſchnitte; die Kelcheinſchnitte ſind gewimpert, eilanzettförmig. Viele Samen (Nüſſe) ſitzen gedrängt beiſammen, vom bleibenden Kelche umſchloſſen. — Man ſäet den Samen (der an oberwähnten Orten zu haben iſt) im April ins lauwarme Miſtbeet und verſetzt die Pflanzen im Mai an eine ſonnige Stelle ins Land.

(Fortſetzung folgt.)

Ueber die Erziehung der Eriken, Rhododendren, Melaleuken, Metroſideren, Leptoſpermum u. ſ. w. aus Samen. (Fortſetzung.)

Mitgetheilt von P. aus W.

Die Ausſaat wird verrichtet, indem man die Samen möglichſt gleichförmig auf die Erde ausſtreut, nur äußerſt wenig oder gar nicht bedeckt und dann mittelſt einer ganz feinen meſſingenen Brauſe begießt. Die Samen der Metroſideren, Melaleuken, Kalmien und Eriken darf man gar nicht bedecken, ſondern nur mit der erwähnten feinen Brauſe ſo angießen, daß ſich der feine ſtaubartige Samen beim Eindringen des Waſſers nach und nach mit in die Erde hineinzieht. Die Samen der Leptoſpermenarten bedecke man ungefähr nur ſo ſtark mit ganz fein geſiebter Erde, daß ſie nicht mehr ſichtbar ſind. Die Rhododendronarten und Azaleen bedecke man nur ſo, daß ſie durch nur ganz wenig aufgeſiebte Erde auf dem Boden feſtgehalten werden.

Zur Ausſaat nehme man für alle die erwähnten Pflanzengattungen obige präparirte Haideerde, in der die Samen bei der weiter hin beſchriebenen Pflege und ſorgfältigen Behandlung gut und ſicher keimen werden. Die Zeit der Ausſaat iſt Mitte bis Ende März.

§. 3. Die beſäeten Geſchirre ſtelle man in das Conſervatorium auf die dritte Bank der Stellage, und nicht dicht vorn an die Fenſter, wie Einige thun. Hier trocknen die Geſchirre weniger aus, da ſie von der brennenden Sonnenhitze weniger getroffen ſind. Zu dem nöthigen Begießen der beſäeten Geſchirre iſt die kleine Gießkanne mit einer Brauſe, deren Boden von Meſſingblech gefertigt und in welcher die Spritzlöcher ſo fein als möglich gebohrt ſind, unentbehrlich. Das Meſſingblech iſt dem Eiſenblech deßhalb vorzuziehen, weil es nicht roſtet und daher die Löcher egal bleiben. Stets hat man darauf zu ſehen, daß die beſäeten Geſchirre nie ganz austrocknen, ſondern immer in mäßiger Feuchtigkeit erhalten werden. Man gieße nicht zu viel auf einmal und nicht zu wenig, ſondern bei ſtarker Sonnenhitze ſtets wenig und recht oft. Man gieße ferner nie mit Brunnenwaſſer, ſondern ſtets mit Regen- oder Flußwaſſer, denn das Brunnenwaſſer enthält zu viel ſalz- und kalkartige Subſtanzen, welche ſich auf der Oberfläche der Geſchirre feſtſetzen und die keimenden feinen Samen verderben. Bei genauer Befolgung alles dieſes wird man bald das Vergnügen haben, junge Pflänzchen in Menge aufwachſen zu ſehen. Man verändere aber übrigens den Standort nicht eher, als bis man zur Verpflanzung ſchreiten kann.

(Fortſetzung folgt.)

Berichtigung über Lupinus Cruikshanskii und L. mutabilis.

(S. die Bemerkungen des Hrn. Hofgärtner Richter in Nr. 5. Jahrg. 1833 der Weißenſeer Blumenzeitung.)

Herr Hofgärtner Richter glaubt beide Lupinen für zwei ganz verſchiedene Arten halten zu müſſen, weil ſie beide bei ihm zu ungleicher Zeit zu blühen begannen, und weil die eine weiß, die andere bunt blühet; allein dieſe Eigenſchaften ſind durchaus kein Grund, beide für zwei wahre Species zu halten, denn hier kommt es nicht auf die Färbung der Pflanzentheile, noch auf zufällige Verſpätung der Blüthezeit an (wie jeder Botaniker ſolches weiß), ſondern vielmehr auf die unveränderlichen, gleichen Formen, auf gleichen Wuchs und gleiche Dauer der Pflanze. Beide genannte Lupinen können nach der Philosophia botanica nicht getrennt werden, denn Wuchs und Formen, Dauer und Veränderung der Blüthenfarben ſind bei beiden ganz gleich, wie eine nur oberflächliche Anſicht ergiebt. Da die weißblühende zuerſt unter dem beſſern Namen L. mutabilis bekannt war, ſo dürfte L. Cruikshanskii dieſer als buntblühende Varietät beizugeſellen ſeyn. Dieſe beiden Lupinen laſſen ſich, obgleich einjährig, ſehr wohl in Töpfen durchwintern, und ſie bringen dann, im Mai wieder ins Land gepflanzt, um ſo ſicherer Samen. Die Blüthezeit ändert ſich nach dem Standort und Boden, wie ich ſolches beobachtet habe.

Oldenburg. Boſſe.

Anfrage und Bitte.

Was hat man zu beobachten, um reifen, keimfähigen Samen von Zier-Gewächſen zu erhalten?

In den allermeiſten blumiſtiſchen Schriften iſt zwar die Kultur der Gewächſe ſelbſt abgehandelt, aber die wenigſten, faſt keine, enthalten etwas über die Gewinnung des Samens. Jedem Blumenfreunde, der jährlich viele Koſten an Blumenſämereien wendete, iſt es aber auch wünſchenswerth, von denjenigen Gewächſen, die er aus Samen zog, den er das erſte Mal oft recht theuer bezahlen mußte, für die Folge ſelbſt Samen zu ziehen, aber leider fehlt es dazu noch an einer gründlichen Belehrung. Erfahrne Praktiker würden ſich daher ein großes Verdienſt und den Dank aller Blumenfreunde erwerben, wenn ſie in dieſen ſo ganz dazu geeigneten Blättern die Gewinnung der in den Gärten der Blumenfreunde am öfterſten vorkommenden Blumenſämereien abhandelten, und würde es dabei vorzüglich darauf ankommen zu beſtimmen:

1) die Zeit der Ausſaat.
2) die Zeit der Einſammlung.
3) ob der Same an der Pflanze ganz zur Reife kommen muß, oder auch früher entweder abgenommen oder mit der Pflanze ausgezogen, noch reifen kann.
4) woran man die Reife des Samens erkennt.

Wir beſitzen über die Kenntniß, Erziehung und Aufbewahrung der bei uns einheimiſchen Küchenſämereien bereits ein ſehr ſchätzbares Werk, welches unter dem Titel: „Der deutſche Samengärtner von Gotthard und Eyſerbeck" im Jahr 1806 zu Erfurt herausgegeben iſt, vielleicht möchte ein erfahrner Blumenkultivateur ſich geneigt finden laſſen, eine ähnliche Anweiſung über die Erziehung des Samens der Ziergewächſe auszuarbeiten, und ſelbige als ein beſonderes Werk gleich jenem herauszugeben. Er würde ſich dadurch gewiß den größten Dank aller Blumenfreunde erwerben.

Tilſit in Preußen.

Schlenther, Lieutenant a. D.

Aus der Revue horticole.

Neuere Zierpflanzen.

Fuchsia conica. Dieſe in unſern Gärten noch ganz neue Art iſt viel ſchöner als die Fuchsia gracilis und verdient einen ausgezeichneten Platz. Sie bildet einen äſtigen, 2 bis 4 Fuß hohen Strauch; die Blätter ſind eiförmig, ſpitzig, ſägeförmig gezähnt, auf beiden Seiten glatt, 12 bis 15 Linien lang; ſie ſtehen auf langen rothen Blattſtielen, unten 3zählig und am obern Ende der Zweige entgegengeſetzt. Die winkelſtändigen, langgeſtielten und hängenden Blumen ſind einen Zoll lang; der Fruchtknoten iſt grün; der Kelch von prächtig rother Farbe hat 4 lanzettförmige, zugeſpitzte Lappen. Die Blumenblätter ſind viel kürzer als der Kelch, haben eine ſtark violette Farbe, während ſie ſich noch in der Knoſpe befinden, ſobald aber die Bluthe geöffnet iſt, wird die violette Farbe ſchwächer. Der Griffel iſt weit länger als die Staubfäden und endigt ſich in eine keulenförmige Narbe. Es iſt nicht füglich einzuſehen, warum man dieſer Pflanze den Namen conica gegeben hat. Man kultivirt ſie wie die andern Fuchſien.

Xiphidium albidum. Gehört zur Familie der Commelinen. Der Stengel wird 1 — 2 Fuß hoch und hat zweizeilige, am Grunde ſcheidenartige, lanzettförmige, lederartige, 12 — 15 Zoll lange Blätter; die weißen, 6 — 7 Linien breiten, zahlreichen Blumen ſtehen in einer langen geraden Endtraube. Die Blüthe hat 6 eiförmige Abſchnitte; 3 freie, nackte Staubfäden umgeben den dicken, gerundeten, grünen Fruchtknoten, auf dem der pfriemenförmige Griffel ſteht. Dieſe Pflanze blühte im Jardin des Plantes im Sept. und Okt. Sie verlangt Ananaserde und einen Stand im Warmhauſe. Man vermehrt ſie durch Schößlinge und Zertheilung des Büſchels.

Syſtematiſche Namen der merkwürdigſten Pflanzen-Gattungen und Arten, ihr Genitiv ꝛc.

Mitgetheilt von L. aus T. (Fortſetzung.)

Ambrosia maritima. L. See-Ambroſie.

Von ihr haben alle Theile einen ſtarken angenehmen Geruch und einen aromatiſchen, etwas bittern, jedoch lieblichen Geſchmack, daher der Name.

Amelanchier, (Mespilus L.; Pyrus L. fil.) Felſenbirne, neuengliſcher Miſpelſtrauch, Quandelbeere, Flühbirnlein.

Lobelius (advers. p. 441.) leitet dieſes franzöſiſche Wort von melleus, a, um (von mel, Honig) honigartig — ab, wegen des honigſüßen Geſchmacks, der an dieſem auf Felſen in Deutſchland, der Schweiz, Oeſtreich und Frankreich wildwachſenden ſchönen Strauch befindlichen violetten und beſtaubten, den Heidelbeeren nicht unähnlichen eßbaren Früchte.

Der Geſchmack dieſer Früchte, wenn ſie eingemacht worden, iſt, nach Sprengels Gartenzeitung II. 1804. S. 89, ganz vortrefflich und hier findet man auch die Zubereitung umſtändlich angegeben.

Nach Andern ſoll aber das Wort Amelanchier abſtammen von μηλέα Apfelbaum — und ἄγχειν, die Kehle zuſchnüren — weil die Frucht wegen ihrer Schärfe, wenn ſie genoſſen wird, die Gurgel zuſammenzieht.

Die Ableitung des Wortes Quandelbeere iſt bis jetzt nicht mit Gewißheit ermittelt worden. Der Name Flühbirnlein hingegen kommt her von Flühen oder Felſen, auf denen er zu wachſen pflegt.

Amellus. L. i. masc. Sternkraut, Sternblume.

Von Mella, einem Fluſſe bei Brixia in Gallia cisalpina in der Nähe von Mantua, wo ſie häufig wuchs. Colum. IX. 18, 8. (Fortſetzung folgt.)

Varietäten.

Berlin. In der 123. Verſammlung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues am 13. Oktober wurden unter andern vorgetragen: die neueſten Verhandlungen des Gartenvereins in Perleberg, worunter Abhandlungen über die Kultur der Georginen und Hyazinthen; eine Abhandlung des Herrn Feldermann, Obergärtner des botaniſchen Gartens in Petersburg, über die Kultur des zur Winterflor beſonders geeigneten Haemanthus multiflorus; Bemerkungen des Hrn. Prof. v. Schlechtendahl zu Halle, in Bezug auf die vom Hrn. Prof. Friedrich in Würzburg eingeſandte Diſſertation des Hrn. Dr. Engelmann: de Antholysi prodromus, in der die abnormen Veränderungen des normalen Baues der Blumentheile in einigen Richtungen erörtert worden. Zur Stelle gebracht waren: durch Hrn. Hofgärtner Fintelmann von der Pfaueninſel eine glänzende Collektion von abgeſchnittenen Blumen der Georginen-Sämlinge des Geheimen Kämmeriers Hrn. Timm zu Sanſſouci, worunter insbeſondere einige panaſchirte Sorten in weißem und gelbem Grunde ſich auszeichneten; von Hrn. Hofgärtner Hempel, aus dem Garten Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Albrecht hieſelbſt, ebenfalls eine nicht minder beachtenswerthe Collektion von Georginenblüthen, die in dieſem Jahre aus dem Samen gezogen wurden, und worunter beſonders eine von ihm Prinzeſſin Mariane benannte, von dunkelrother Farbe ſich auszeichnete; vom Hrn. Inſtitutsgärtner Bouché: Varietäten von Lycopersicum und die Probe einer zur Einfaſſung von Raſenplätzen vorzüglich geeigneten Grasart (Festuca heterophylla); aus dem königl. botaniſchen Garten: mit Früchten bedeckte Zweige von Berberis vulgaris dulcis, zur Empfehlung deſſelben als Zierſtrauch; außerdem war auch noch eingeſandt vom Hrn. Cenſor Rupprecht in Wien deſſen intereſſantes Werk über Chrysanthemum indicum, worin 62 Varietäten beſchrieben ſind.

Berlin. Im königl. botaniſchen Garten blühten zu Ende des Monats July folgende bemerkenswerthe Pflanzen: Aloe tenuior Haw., A. Commelini Willd., A. mitraeformis Willd., A. m. elatior Salm., Lomatophyllum macrum Salm. (Aloe macra Hav.), Canna nepalensis Wal., Maranta truncata Lk., Cinnamomum nitidum Hook., Chironia jasminoides Thunb., Cryptostegia grandifl. R. Br., Cerbera laurifol. Bot. Cab., Gonolobus mexican. Hort., Lachnostoma montevidense Lk., Justicia amabilis Hort. angl., Bignonia grandiflora Jacq., Barleria lupulina Bot. Reg., Jacquinia aurantiaca Ait., Lobelia nov. sp., Hamelia ventricosa

Swarz, Wedelia aurea Don., Grindelia coronopifol. Hort. Ber., Bacharis montevidensis Spreng., Chaedanthera chilensis De C., Madia elegans Bot. Reg., Calandrinia glauca Schrad., C. grandifl. Lindl. Bot. Reg., Psidium Cattleyanum Lindl., Spiraea corymbulosa Hort. Ber., Amyris sylvatica Jacq., Pterocarpus indic. Willd., Argemone Hunnemanni N., Nandina domestica Lindl.

Dresden, den 23. Okt. Die diesjährige Frucht- und Pflanzen-Ausſtellung im Palais des großen Gartens zeichnete ſich durch geſchmackvolle Anordnung aus, welche die Hofgärtner Mieth und A. Lehmann beſorgt hatten, und begegnete auch den möglichen Beſorgniſſen wegen nachtheiliger Einwirkung der Witterung auf zarte Gewächshauspflanzen durch Abſonderung derſelben in einem heizbaren Zimmer, dem Verſammlungsſaale der Gartenbaugeſellſchaft, wo ſie ſich die acht Tage hindurch trefflich befanden. Neben manchen Seltenheiten einer gleichſam wieder erwachten Frühlingsflora, in welche die zahlreichen, jetzt ſo beliebten Chile-Gewächſe (aus den königl. Hofgärten, dem akadem. botan. Garten, dem des Hofr. Kreyſig, Prof. von Villers u. A.) zu verſetzen ſchienen, zogen auch mehrere ausgezeichnete Feld- und Gartengewächſe die Aufmerkſamkeit auf ſich.

Dresden, den 1. November 1833. Im Monat Oktober blühten in den Gewächshäuſern des Unterzeichneten in vielen Exemplaren: A.) Passiflora racemosa, — die prachtvolle den ganzen Winter blühende *Verbena chamaedrifol. und *Melindris, — *Arbutus Andrachne, — Datura fastuosa purpurea und alba pl., — Camellia jap. *alba plena, *pomponica alba und rosea pl., — Cam. *paeonifl. pl., — die unvergleichlich wohlriechende *Daphne (Dauphin), — Pelargonium Bentinkianum, — *Lupinus polyphyllus, lituratus, *mutabilis, — Rosa *semperflorens coccinea, — R. semp. *camellia bengal., splendens und Lawrentia, — R. moschata alba pl. — Heliotropium indicum, — Anoda dilleniana, — *Dianthus arboreus purpureus, purpurrothe Baumnelke, gefullt, — *Mimulus rivularis, Thea Bohea und viridis. Thé-bou und grüner Thee, — Erica hybrida, — *Myrthus semperflorens flore pleno, gefüllte immerblühende Myrthe, — *Salpiglossis integrifolia, — Crataegus glabra, — Citrus medica und C. med. dulcis, Citrone mit ſehr guter und ſüßer Frucht. Von dieſen Gewächſen zeichnen ſich die mit * bezeichneten durch ganz beſondere Schönheit der Blüthen oder des Wohlgeruches aus.

B.) Von der ſehr ſchönen **Liatris spicata minor, niedrige Knollenlevkojen**, aus Nordamerika, ſind bei dem Unterzeichneten wieder ſtarke blühbare Knollen, das Stück zu 8 gℛ, 12 Stück zuſammen genommen aber für 3 𝓇ℓ zu erhalten; ingleichen ganz friſcher, eben erſt geernteter Samen davon, die Priſe für 4 gℛ, nebſt Anweiſung zu deren Behandlung für 3 gℛ. — Ebenſo auch von der ganz wunderſchönen und prachtvollen **Beta brasiliensis, braſilianiſcher Mangold**, die gewiß eine der ſchönſten Zierpflanzen, ſelbſt fur die vornehmſten Zimmer, Gärten und Gewächshäuſer iſt, iſt ganz friſcher Samen, die Priſe zu 4 gℛ, von jeder Farbe beſonders, nämlich blendend goldgelb, brennend ſcharlachroth, rein weiß, purpurroth ꝛc. zu bekommen. — Ingleichen ein Sortiment der vorzüglichſten (im allg. T. Gartenmagazin rühmlich erwähnten und in der diesjährigen Dresdner Fruchtausſtellung der Flora aufgeſtellt geweſenen) Kartoffeln; ſo wie übrigens viele andere ſchöne Pflanzen, beſonders aber die oben bei A. genannten, alle voller Knoſpen, für gewiß ſehr mäßige Preiſe, wie z. B. Verbena chamaedrifolia und Melindris 8 — 12 gℛ, Salpiglossis integrifolia 16 gℛ bis 1 𝓇ℓ 8 gℛ, immerblühende gefüllte Myrthe 8 — 12 gℛ, Arbutus Andrachne 2 𝓇ℓ 12 gℛ, mehrere Sorten Camellien und Orangen in verſchiedenen Preiſen, Passiflora racemosa 8 gℛ, Dianthus arboreus, 16 Senker 8 gℛ, ferner ſehr ſtarke Pflanzen von Paeonia arborea fl. pl. rosea 2 𝓇ℓ, P. Whitleyi 1 𝓇ℓ, P. Humei 1 𝓇ℓ, Lupinus arboreus 16 gℛ, L. polyphyllus 8 gℛ, L. lituratus 6 gℛ, Mimulus rivularis 4 gℛ, Braut-Myrthe 4 — 6 gℛ, u. ſ. w., gegen portofreie Einſendung des Betrags zu haben ſind bei

Gottlob Friedrich Seidel,

Eigenthümer und Handelsgärtner in Dresden, Grünegaſſe Nr. 863 b.

Wien. (Beſchluß.) Aus den von dem Wirthsſchaftsbeſitzer Kolb geſendeten Pflanzen: Rosa Caroline Imperiale, zwei Exemplare Grandvillei, welche 10 Blumen in ungemein ſchöner Farbe enthalten, worunter eine die Form und beinahe die Größe einer Paeonia erreicht, Pelargonium Labrusa, urſprünglich aus Samen von dem Gärtner Herrn Carl Baumann erzeugt, welches ſich ſowohl wegen Größe der Blumen und Blumendolden, als auch der ſchönen Farbe beſonders beſonders bemerkbar macht. Auch Herr Biehler am Schottenfelde, von welchem ſeine vorjährige Pelargonienaufſtellung noch in angenehmer Erinnerung ſchwebt, wird dem Pelargonienfreunde diesmal mit einer vorzüglich aus ausländiſchen Pelargonien beſtehenden Ausſtellung erfreuen, indem er ebenfalls jedem gebildeten Blumenfreunde unentgeldlichen Zutritt geſtattet. Herr Steinmetz Mayer, Gartenbeſitzer in Penzing, wird ebenfalls in ſeinem nach Gothiſcher Art ganz aus Stein erbauten, mehrere tauſend Pelargonienpflanzen in ſich ſchließenden, ſehr angenehmen und geräumigen Lokale eine gleich der vorjährigen, großartigen ungemein überraſchende Pelargonienausſtellung veranlaſſen, zu welchem ſeine Humanität jedem gebildeten Blumenfreunde unentgeldlich den Zutritt bewilliget.

Schönbrunn. (Beſchl.) In den Gewächshäuſern des k. k. Hofgartens daſelbſt blühten am 3. Sept. folgende Gewächſe: Erica Ottonii (Hortorum) Vom Vorg. d. g. Hoff. Ericeae. Octandria, Monogynia. — Gloxinia hirsutula. (Lindley.) Aus Braſilien. Gesneria. Didynamia, Angiospermia. — Hedychium Gardnerianum (Wallich.) Aus Nepaul. Scitamineae. Monandria, Monogynia. — Leptostelma maximum. (David Don.) Aus Mexiko. Compositae. Syngenesia, Superflua. — Lobelia caerulea. (Hooker.) V. Vorg. d. g. Hoff. Lobeliaceae. Pentandria, Monogynia. — Papyrus antiquorum. (Willdenow.) Aus Aegypten. Cyperaceae. Triandria, Monogynia. — Phlox cordata. (Elliot.) Aus Carolina. Palemoniaceae. Pentandria, Monogynia. — Phlox elegans. (Hortorum?) Aus Nordamerika. Polemoniaceae. Pentandria Monogynia. — Phlox philadelphica. (Hortorum.) Aus Nordamerika. Polemoniaceae. Pentandria, Monogynia.

St. Petersburg, 14. Mai. Endlich ſind wir auch in dem Beſitz des Lilium Kamtschaticum (acrum) durch den in Kamtſchatka, und zwar in Peter-Paulshafen für den Gartenbau in ſeinem ganzen Umfange angeſtellten Gärtner **Rieder** gelangt. Dieſes Lilium war bisher noch in keinem europäiſchen Garten vorhanden, und iſt aus friſchem Samen, welcher mit der Poſt von Kamtſchatka 4 Monate auf dem Wege geweſen iſt, gut aufgegangen.

Bollweiler. (Beſchluß.) **Camellien-Sammlung**, welche für 1833 nach der Wahl der Herren Gebrüder **Baumann** zu Bollweiler zu veräußern iſt:

C. jap. Warr. Rawsiana, C. Rossi
— — — Revesii
— — — Revés nova
— — — Rivinii
— — — rosea carnea
— — — Rossiana superba
— — — Scarlet nova
— — — Sinica
— — — spatulata
— — — speciosa pink
— — — splendida
— — — staminea

C. jap. Warr. Swetii
— — — versicolor
— — — Welbankii
— — — Woodsii
— oleifera
— oleifolia
— — latifolia
— reticulata
— Sasangua flore alba simpl.
— flore rosea plena
— Thea, Bohea Tea
— Viridis, Green Tea.

Hierbei eine Beilage: Nr. 19. der gemeinnützigen Mittheilungen ꝛc. als Probeblatt.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto-Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. XXIII. Weißenſee, (in Thüringen). November 1833. VI. Jahrg.

Beſchreibung einer ſchönblühenden Zier-Pflanze.

Salvia involucrata, Cavanilles.

(Eingeſandt von Hrn. Fr. P. in W.)

Dieſes ausdauernde Gewächs treibt mehrere aufrechte, äſtige, 3 Fuß hohe, glatte, unten grüne, nach oben roth gefärbte Stengel; die Blätter ſind herzförmig, eirund, langgeſpitzt und ſägeförmig gezähnt, mit ſtumpfen Zähnchen. Ihre ganz nackte Oberfläche iſt weich wie Sammt und ſchön dunkelgrün, die Kehrſeite aber blaßgrün, der lange Blattſtiel iſt roth gefärbt, ſo wie die mittlere Blattrippe. Die Blüthen ſind in eine 6 Zoll lange, aufrecht ſtehende Endähre geordnet und eben ſo prächtig roth als der gemeinſchaftliche Blüthenſtiel, der Kelch und die ſehr großen eirunden, hinfälligen Deckblätter, welche die Blumen in ihrer Jugend einhüllen. Der Kelch iſt dreizähnig, die beiden untern Zähne ſind kürzer. Die Blumenkrone lang, aufrecht, an den Seiten zuſammengedrückt, unten bauchig, mit ſehr kurzen Lippen, die Oberlippe iſt auswärts behaart und kapuzenförmig, die Unterlippe dreilappig, der Mittellappen iſt breiter und ausgehöhlt. Die beiden Staubfäden ragen hervor, und die unfruchtbare Seite des Verknüpfungsgliedes iſt lanzettförmig und außerordentlich groß. Dieſe prachtvolle Salbei hat einen ſchwach gewürzhaften Geruch. Das Vaterland derſelben iſt Mexiko und die Behandlung die der Salvia splendens.

Bemerkung über das Sitzenbleiben der getriebenen Hyacinthen.

(Mitgetheilt von Ed. R. aus D.)

Die meiſten Blumenfreunde, welche ſich mit dem Treiben der Hyacinthen beſchäftigen, werden dabei auch wohl die unangenehme Erfahrung gemacht haben, daß eine oder die andre der zu treibenden Zwiebeln keine vollkommen ausgebildete Blume hervorbringen, ſondern zwiſchen den Blättern verſteckt blühen. Bekanntlich nennt man dies das Sitzenbleiben der Hyacinthen, und man erfährt dieſen Unfall vorzüglich bei den am früheſten getriebenen Zwiebeln. Der Urſachen dieſes unvollkommnen Blühens ſind verſchiedene. Iſt die eingeſetzte Zwiebel nicht vollkommen ausgebildet, woran oft die Witterung in und nach der Blüthe Schuld hat, ſo daß dieſelbe nicht Kraft genug hat, einen gehörigen Blüthenſtengel zu treiben, ſo iſt freilich die beſte Pflege beim Treiben vergebens. Leider kann man dieſen Fehler nicht jedesmal bei der Zwiebel von außen bemerken, und um daher einer ſolchen Verlegenheit zu entgehen, kann man nichts thun, als ſich beim Einkauf der Zwiebeln an einen reellen und erfahrnen Blumiſten, wo man verſichert ſeyn kann, gute, treibbare Zwiebeln zu erhalten, zu wenden. Manchmal liegt aber dieſer Fehler in der Behandlung der Zwiebel, ſo wohl vor als beim Treiben, und in dieſem Falle kann man noch hoffen, durch veränderte Wartung den Unfall zu verbeſſern, wenn man damit nicht zu lange zögert. Ueber die Behandlung der Zwiebeln vor und beim Treiben ſind ſchon mannigfaltige Belehrungen erſchienen, und ich will daher nur die Hauptpunkte dabei kürzlich berühren.

Man pflanze die Zwiebeln ſo zeitig als möglich ein, damit ſie ſich gehörig bewurzeln können, denn davon hängt die Erzeugung eines kräftigen Blüthenſtengels weſentlich ab. Je früher man zu treiben gedenkt, um ſo weniger darf man mit dem Einpflanzen der Zwiebeln zögern. Ende des Auguſt oder Anfang September möchte wohl die beſte Zeit dazu ſeyn, denn wenigſtens acht Wochen müſſen die Zwiebeln zum Bewurzeln Zeit haben.

Zur guten Bewurzelung der Zwiebeln trägt nun hauptſächlich bei, daß ſie nach dem Einpflanzen einer mäßigen Feuchtigkeit und gleichen Temperatur genießen, indem beides das Hervorwachſen und Gedeihen der Wurzeln begünſtigt. Beides bewirkt man am beſten dadurch, daß man die Töpfe, in denen die Zwiebeln in friſche und nahrhafte Erde gepflanzt ſind, in eine zu dem Endzwecke paſſende Grube ſtellt, und mit der herausgenommenen Erde wieder überfüllt, ſo daß die Töpfe etwa einen halben Fuß unter der Oberfläche des Bodens ſtehen. Wer dazu freilich nicht Gelegenheit hat, muß ſeine Töpfe entweder in einen guten Keller oder ſonſt einen paſſenden Ort ſtellen, wo man ſie auch in Sand eingraben oder in Moos packen kann.

(Beſchluß folgt).

Ueber die Erziehung der Eriken, Rhododendren, Melaleuken, Metroſideren, Leptoſpermum u. ſ. w. aus Samen.

(Fortſetzung.)

Mitgetheilt von P. aus W.

§. 4. Die zur Verpflanzung nöthigen Scherben müſſen ſo klein ſeyn, als ſie der Töpfer nur verfertigen kann, höchſtens $2\frac{1}{2}$ Zoll hoch und $1\frac{1}{2}$ Zoll weit. Die Pflänzchen ſind zum Verſetzen tauglich, wenn ſie nur eine ſolche Größe beſitzen, welche geſtattet, ſie mit den Fingern halten und ſo verpflanzen zu können. In jedes Scherbchen ſetze man nur eine Pflanze ganz locker und nicht angedrückt ein, wobei darauf zu ſehen iſt, daß keins der zarten Würzelchen beſchädigt oder gar abgeriſſen werde. Die Erde bringe man ſo fein als möglich an die Würzelchen, ſchüttele das Töpfchen behutſam, damit die Erde ſich gleichförmig ſetze, und bezeichne ſogleich jedes Pflänzchen mit dem ihm zugehörigen Namen. Den verpflanzten Sämlingen gebe man nun ſogleich einen Standort hinter der Stellage, wo ſie ſchattig ſtehen und gehörig anwurzeln können. Nachdem alle gehörig, ſo vorſichtig als möglich, angegoſſen worden ſind, iſt nichts weiter zu beobachten, als die Feuchtigkeit ſo viel als nöthig zu unterhalten, und die Töpfchen niemals ganz austrocknen zu laſſen. Die Melaleuken-, Leptoſpermen- und Metroſideros-Arten habe ich gewöhnlich im Monat Juli verpflanzt, die Azaleen, Rhododendren und Kalmien Ende Auguſt. Die Eriken-Arten ſind am zärtlichſten und wachſen am langſamſten. Gut iſt es, ihnen einen recht ſchattigen Standort im Glashauſe zu geben, wo ſie ſchneller wachſen. Man kann dieſes bewirken, wenn man die mit Haideſamen beſäeten Geſchirre ganz vorn an die Fenſter ſetzt und ihnen durch einen mit Oel getränkten Papierrahmen Schatten macht; ſo ſtehen ſie in ſchwüler, ſchattiger Wärme, welches ihr ſchnelles Keimen und Wachsthum ungemein befördert. Nie darf man indeſſen die Geſchirre trocken werden laſſen, weil faſt in einem Augenblick alle jungen Pflänzchen verloren ſind. Einige ſtellen die Geſchirre der aufgegangenen Haide-Arten auf eine verdeckte Stellage im Freien, wo man zwar recht kräftige, aber auch ſehr langſam wachſende Pflänzchen, die im erſten Jahre gar nicht verſetzt werden können, erhält.

Bemerkt man nun, daß die Pflänzchen angewachſen ſind, welches man an dem friſchen Anſehn derſelben leicht erkennen kann, ſo bringe man ſie auf eine zu dem Behuf eigens gefertigte Stellage, welche mit einem Dache verſehn iſt, und die ganze Stellage vor Regen und Sonnenſchein ſchützt. Die Stellage muß wo möglich auf der Mitternachtsſeite angebracht ſeyn, welche aber auch vor den rauhen Nordwinden geſichert iſt. Auch kann man die Töpfchen auf eine Doppel-Stellage ſetzen, deren ſüdlich liegende Hälfte mit ſolchen Pflanzen beſetzt iſt, welche durch ihr Laub der hintern, nördlichen Hälfte Schatten geben. Hier bleiben die Pflanzen bis zum Monat Oktober ſtehen. Bei der hier erwähnten Behandlung habe ich im erſten Jahre Melaleuken, Leptoſpermen, Metroſideren, Akazien ꝛc. erzogen von 6 — 18 Zoll Höhe. Die verſetzten jungen Haidepflänzchen wachſen ſchneller, wenn man dieſelben im Glashauſe ſtehen läßt, und ihnen wieder denſelben Stand giebt wie früher, nämlich dicht an die Fenſter, durch die vorgeſtellten Papierrahmen vor der Sonne geſchützt. Rhododendren und Azaleen erreichen nur ſehr ſelten gleich im erſten Jahre die zur Verpflanzung erforderliche Größe. (Fortſetzung folgt.)

Ueber Blumen-Befruchtung.

(Mitgetheilt von W. Steiger aus S.)

Ein in früherer Zeit in unſerer Blumenzeitung erſchienener Aufſatz: „Blumiſten-Leid und Troſt“ überſchrieben, hat zu manchen Erörterungen geführt, die dem Blumenfreunde höchſt belehrend ſeyn müſſen, und es iſt zu wünſchen, daß recht oft ſolche Gegenſtände abgehandelt werden mögen. Unter das „Blumiſtenleid“ ſey es mir vergönnt, auch ein Vorkommniß zu zählen, welches manchem Freunde der ſchönſten Kinder der Natur oft ſeine aufgewendete Mühe verleidet, und ihn manche ſchöne Pflanze aufzugeben veranlaßt, deren fortgeſetzte Cultur ihm ſpäterhin erſt Genuß gewährt haben würde.

Oft verſchreibt man ſich Samen ſchönblühender, neuer Gewächſe. Die daraus erzogenen Pflanzen geben entweder keine Stecklinge, oder tragen ſelten oder gar keinen Samen. So ging es mir mit der fremdartigen und ausgezeichnet blühenden Thunbergia alata, die in keiner Sammlung fehlen ſollte, da ihre Blume in ihrem Schlunde dem Auge — freilich nur ſcheinbar — das glänzendſte Sammetſchwarz zeigt, die Pflanze auch ſehr leicht zu ziehen iſt, und fünf bis ſechs Monate lang ſich mit Blüthen bedeckt.

Alle Verſuche, im Stubenfenſter Samen von ihr zu gewinnen, blieben fruchtlos, bis die Natur, die ſicherſte Führerin, mir dazu Anleitung gab.

In vielen Blumen, namentlich in den großblumigen Pelargonien, findet man häufig eine kleine ſchmale Weſpe (Vespa floriformis Linné), welche gewöhnlich ihr Nachtlager in ihnen aufſchlägt. Sie iſt am Abend ſehr träge, und läßt ſich regungslos an andere Orte tragen. Dieſer Weſpe bediente ich mich, ſchob die Schlaftrunkene in den Schlund der Blume, und verſtopfte dieſen mit etwas Baumwolle oder einer andern leichten Subſtanz. Erſt am folgenden Morgen, wenn ſchon lange die Sonne auf meine Pflanzen ſchien, befreite ich die Gefangene aus ihrem dunkeln Kerker, und der ſchönſte Erfolg krönte die kleine Mühe. Ich erhielt verſchiedene Samenkapſeln, und brauchte nun für die Erhaltung der alten Stöcke nicht mehr ängſtlich beſorgt zu ſeyn, da die aus Samen erzogenen ſehr bald nach der Ausſaat blühten.

Daß übrigens derſelbe Erfolg in der Lohe und gleichmäßigen Wärme eines Treibhauſes ohne Künſtelei erreicht werden kann, weiß ich ſehr wohl; allein für Blumenfreunde, die dergleichen nicht beſitzen, dürften doch wohl Fingerzeige der Art nicht unwillkommen ſeyn, um ſo mehr, da dieſe Erfahrung abermals für die Befruchtung der Blumen durch Inſekten ſpricht. Auch in unſern Zeiten hat ja dieſer Gegenſtand wiederholt Widerrede gefunden, und Männer, welche in andern Fächern der Naturwiſſenſchaften ſich rühmlich bekannt machten, haben das Sexualſyſtem Linnés mit vielem Scharfſinn bekämpft. Freilich konnte der längſt geſchiedene Heros dieſer Wiſſenſchaften ihnen nicht mehr nach ſeiner edeln Weiſe vergelten, und ſchwerlich werden ſeine Nachfolger ihre Gegner — wie er es mit Adanſon, Sigesbeck und vielen Andern that, deren Namen er in Pflanzen verewigte — unter die Sterne verſetzen, da es etwas Anderes iſt: noch unentſchiedene wiſſenſchaftliche Sätze bekämpfen, oder natürliche Wahrheiten, die zu Tage liegen, umſtoßen zu wollen.

Nachträglich bemerke ich noch, daß die Thunbergia alata ſich trotz ihrer krautartigen, windenden Stengel leicht durch Stecklinge vermehren läßt.

Blumiſtiſche Anfragen,

um deren gefällige Beantwortung in d. Blättern gebeten wird.

1) Ein Pflanzenliebhaber wünſcht zu wiſſen, ob in Thüringen Verſuche mit Durchwinterung von Rhododendron, Magnolia und Paeonia arborea im Freien gemacht, und ob ſolche gelungen ſind?

2) Vor einigen Jahren iſt in Dresden, bei einer Blumenausſtellung ein Rhododendron fl. atropurpureo ausgeſtellt worden: iſt dies ein Rhododendron ponticum geweſen, und wo und um welchen Preis iſt ein ſolches zu haben?

3) Wo ſind große Exemplare von Pinus palustris, von Oraucaria und Enkianthus quinqueflora zu haben, und wo möglich um billigen Preis?

4) Iſt es Jemandem gelungen, eine Musa paradisiaca im Zimmer in gutem Wachsthum und beſonderer Stärke zu ziehen?

5) Wie iſt am ſchnellſten ein dichter lebendiger Zaun herzuſtellen?

6) Welche iſt die ſchönſte Rosa Thea, Rosa Noisette, Rosa hybrida? und welche die ſchönſte unter den Landroſen?

7) Giebt es wurzelächte Exemplare von Fagus atropurpurea, Aesculus hypocast. flor. rubro?

8) Auf welche Weiſe iſt mit der möglichſten Koſtenerſparniß im Freien eine Wand herzuſtellen, um Spalierobſt daran zu ziehen? da Mauern und hölzerne Wände zu theuer ſind, und Zäune zu langſam wachſen, bis ſie die nöthige Höhe erreicht haben.

S. v. Pf.

Immer grün bleibende Pflanzen-Gruppen.

Um ſchöne immergrüne Gruppen und Anpflanzungen zu bilden, iſt die erſte Regel, ſich nur auf immergrünbleibende Bäume und Sträucher zu beſchränken, und dieſen nicht durch ein Gemiſch anderer, welche im Herbſt das Laub verlieren, den freundlichen Charakter einer wirklich immergrünen Parthie zu benehmen. Von allen Gegenſtänden, welche den Garten zieren, und den feinen Geſchmack des Beſitzers beurkunden, iſt wohl keiner mehr, als dieſer, einiger Berückſichtigung werth. Abgeſehen davon, daß dem Auge durch ein immerwährendes Grün zu allen Jahreszeiten ein großer Genuß gewährt wird, zeichnen ſich auch mehrere ſolcher Pflanzen durch ihre herrlichen Blüthen aus. Nichts bietet in dieſer Art einen angenehmern Anblick dar, als z. B. eine Gruppe acclimatiſirter Rhododendren, prangend mit einer Blumenfülle von weißer, lilla-, hell- und dunkelrother Farbe, geſchmückt außerdem mit üppigen Exemplaren der Kalmia latifol. und angustifol., und wenn die Lage es geſtattet, die ganze Gruppe mit einer Einfaſſung von Kalmia glauca, Daphne Cneorum, Andromeda polifol. major, media oder minor ausgeſtattet. Aber auch die verſchiedenen Ceder-Arten, die gewöhnliche Kirſchlorbeere, die dunkelgrüne portugieſiſche, der baumartige Epheu, die grüne Hülſe nebſt ihren vielen ſchönen Varietäten, und mehrere andere, unſerm Klima angemeſſene Arten, eignen ſich eben ſo gut und zweckmäßig zu immergrünen

Gruppen, und können in den mehrſten Fällen als Hauptgegenſtand derſelben betrachtet werden. Die Rhododendron-Arten u. ſ. w. dazwiſchen gepflanzt, dienen zur Ausſchmückung und Vervollkommnung des Ganzen. (Beſchluß folgt.)

Aus der Revue horticole.

Verfahren um Zwerg-Chryſanthemen, (Chrysanthem. indic. *L.*, Anthemis artemisiaefol. *Willd.*) zu erhalten.

(Von Jacquin.)

Bei Gelegenheit einer Verſammlung der Gartenbau-Geſellſchaft, am 2. Nov. v. J., hatte Hr. Jacquin ein nur 6 — 8 Zoll hohes Chryſanthemum voller Blüthen aufgeſtellt, und gab über das Verfahren, ſolche Zwerg Exemplare zu erhalten, Folgendes an:

Gegen Ende des Monats Auguſt ſchneidet man die Spitzen der Chryſanthemen, wenn ſie mit erbſengroßen Blüthenknoſpen verſehen ſind, *) 6 — 8 Zoll lang ab, pflanzt dieſe als Stecklinge in einen Torf, und ſtellt ſie in ein lauwarmes und ſchattiges Miſtbeet bis zur Bewurzelung. In der Folge giebt man ihnen hinreichend Luft und Licht. Die Knoſpen werden größer und entfalten ihre Blüthen, aber ſie bleiben doch kleiner als bei dem gewöhnlichen Verfahren; die Größe der Blumen ſteht mit der Niedrigkeit der Stengel in gleichem Verhältniſſe, weshalb man leicht glauben könnte, dieſe Pflanzen ſeyen wirkliche Zwergarten.

Dieſes Verfahren iſt übrigens nicht neu; man findet es in dem Gardeners Magazine beſchrieben, und in England gewöhnlich angewendet; aber in Frankreich ſcheint es jetzt zum Erſtenmale ausgeführt worden zu ſeyn. Durch daſſelbe kann man die Chryſanthemen in Miniatur-Exemplaren zur Ausſchmückung der Zimmer erhalten. Es iſt auch gut, daß die Blumenfreunde dies Verfahren kennen, damit ſie nicht vielleicht veranlaßt werden, Zwerg-Chryſanthemen zu kaufen, die weiter nichts, als bewurzelte Stecklinge höherer Sorten ſind.

Ein Mitglied der Verſammlung war begierig, die Wurzeln an dieſen kleinen Pflanzen zu unterſuchen, und man überzeugte ſich, daß mehrere gar keine Wurzeln hatten, obgleich ſie gleich den anderen blühten. Die Feuchtigkeit der Erde hatte allein genügt, daß dieſe Stecklinge ſich länger als 2 Monate lebend erhalten und ihre Bluthen entwickelt haben. Dies erklärt auch die Eigenthümlichkeit bei dieſer Pflanze, daß ihre abgeſchnittenen Zweige, wenn ſie in eine Blumenvaſe in kaltes Waſſer geſtellt werden, ſich ſehr lange Zeit im ſchönſten Zuſtande erhalten.

Syſtematiſche Namen der merkwürdigſten Pflanzen-Gattungen und Arten, ihr Genitiv ꝛc.

Mitgetheilt von L. aus T. (Fortſetzung.)

Amellus (Aster) L. Virgils Aſter, Virgils Sternblume.

Man hält ſie für die nämliche Pflanze, deren Virgil in Georg. IV. 271 (Est etiam flos, cui nomen Amello fecere agricolae etc.) erwähnt.

Amerimnum. Brown. i, n. Karthageniſche Bohne.

ἀμέριμνον (Plin. XXV. 13.) von *ἀμέριμνος* ſorgenfrei; eine Pflanze dieſes Namens hatte bei den Alten die Eigenſchaft, daß deren Genuß einen Sorgen ſtillenden Zuſtand herbeiführe. Andere hingegen behaupten, ihr Name komme davon her, daß ſie ohne beſondere Pflege wachſe und gedeihe.

---

*) Das Abſchneiden der mit Knoſpen verſehenen Spitzen zu Stecklingen, würde bei uns nicht vor Ende September oder erſt im Monat Oktober geſchehen können. Uebrigens erreicht man denſelben Zweck, niedrige, zahlreich bluhende und gut bewurzelte Exemplare zu ziehen, wenn man die Stecklinge von den Spitzen der Chryſanthemen, 4 bis 6 Zoll lang, im Juli oder Anfangs Auguſt abſchneidet, ſie in ein Miſtbeet ſteckt, und im Oktober, wenn die Knoſpen dem Aufbluhen nahe oder ſchon aufgebluht ſind, in Topfe pflanzt. Solche Exemplare eignen ſich ganz beſonders, mit üppig blühender Reſeda vermiſcht, zur Ausſchmuckung der Blumenfenſter im Spatherbſte. Mehrere ſchone Sorten in 1 bis 1 ½ Fuß hohen Exemplaren mit zahlreichen und vollkommen ausgebildeten Bluthen, zieren jetzt, den 30ten Oktober, bei mir das Gewächshaus. Anmerkung des Ueberſetzers.

Amĕthyĕtea. Messerschmid. L. (richtiger Amethystĭna) ae, f. **Amethyſtpflanze. Bläuling.**

Der Amethyſt (von ἀ priv. und μέθυ Wein, weil, wie Plinius 37. 40. anführt, dieſer Stein die Weinfarbe nicht völlig erreicht und ehe er ſich ihr nähert, in die violette Farbe abſtrahlt) iſt bekanntlich ein geringer Edelſtein, zu den Quarzen gehörig, durchſichtig und von violetter Farbe in mancherlei Abſtufung, die ſich aber im Feuer verliert; von dieſer Farbe iſt, vorzüglich bei A. coerulea L. **Sibiriſcher Bläuling**, die Rinde der Zweige, die Blätter ſind blaulichtgrün, und die kleinen, wohlriechenden Blumen hellblau, mithin hat ihr ganzer Habitus ein blaues Anſehen.

Amīca nocturna ſiehe Polianthes.

Ammi. L, ii, neutr. Ammey.

ἄμμι kommt ſchon im Diosc. III. 70 und Ammium in Plin. XX. 15. als eine Pflanze vor, welche dem Cumīnum, dem langen Kümmel, ſehr ähnlich ſey.

Ruellius leitet dieſes Wort ab von ἀμίς das Nachtgeſchirr, weil die Pflanze ſo zum Urin treibe, daß man ſich des Nachtgeſchirres ſehr häufig bedienen müſſe; nach Andern aber ſoll es von ἄμμος der Sand — abſtammen, weil der Samen einem Sandkörnchen ähnlich wäre oder die Pflanze ſelbſt in ſandigen Gegenden wachſe. (Fortſetzung folgt.)

Varietäten.

Berlin. Den 3. Auguſt blühten im hieſigen botaniſchen Garten folgende ſchönblühende Pflanzen: Tradescantia fuscata (Ker.) Aus Braſilien. Dioscorea septemloba (Thunberg.) Vom Vorg. d. g. H. — Sagittaria palaefolia (Mart.) Aus Braſilien. — Stapelia Gussoniana (Mikan.) Von der Inſel Lampodoſe bei Italien. — Casselia serrata (Nees ab Esenb.) Aus Braſilien. — Calceolaria Herberti. (Hort. anglic.) — C. Vernoniana (Hort. anglic.) — C. cinnamomea (Hort. anglic.) — C. hybrida (Hort. anglic.) — C. hybrida pulchella (Hort. anglic.) — Capraria undulata (Linné) V. V. d. g. Hoff. — Cuscuta chilensis? Aus Chili. — Ipomoea Jalapa (Bot. Reg.) Von Jalapa in Amerika. — Convolvulus Purga (Wenderoth). Aus Mexiko. — Lobelia Senecionis (Spreng.) Aus Neuholland. — Cassytha filiformis (Linné). Aus Aegypten. — Rhexia versicolor (Bot. Reg.) Aus Braſilien. — Ruta albiflora (Hook.) Aus Nepaul. — Hermannia inflata (Link et Otto.) Aus Mexiko.

München. (Fortſetzung.) **Tauſch-Anerbieten des Hrn. Collegienraths von Gemünden daſelbſt.**

Pelargonium:

politrinum
pourple roy.
purpur. nov.
Palki
platanifol.
pumilum
principissae
Phillis
prince black
— with
polimorphum
purpur. int. alb.

pidicum
panciflor.
Potteri
Paganini
paucidentat.
pulchritudo
Paulinum
peltat hederofol.
paternum
planiceum
Pedro Don
pays-bas reine d.

pavonia compact.
purum
Plutow
phlox
prophanon
paveanum
propeanum
Perier Casimir
Palfy
pays-bas roi des
Pronayanum

poixilon
poligrammon
Philipp König
phaedimon
parania
porphireon
pinguaefol.
quinquefol.
quercifol.
— ros.
— grandifl.

(Fortſetzung folgt.)

Schönbrunn. In den Gewächshäuſern des k. k. Hofgartens daſelbſt blühten am 24. September folgende Gewächſe: Agave lurida. (Aiton.) (Vulgo: hundertjährige Aloe.) Aus Vera Cruz. Bromeliaceae. Hexandria, Monogynia. — Arthrostemma versicolor. (Decandolle.) Aus Braſilien. Melastomaceae. Octandria, Monogynia. — Cuphea Llaveana. (Hortor. Anglic.) Aus Mexiko. Salicarieae. Dodecandria, Monogynia. — Fuchsia virgata. (Hortorum.) Aus Mexiko. Onagrarieae. Octandria, Monogynia. — Haemanthus coccineus. (Linné.) Vom Vorg. d. g. Hoffn. Amaryllideae. Haxandria, Monogynia. — Leptostelma maximum. (Don.) Aus Mexiko. Compositae. Syngenesia, Superflua. — Malpighia fucata. (Ker.) Aus Weſtindien. Malpighiaceae. Decandria, Trigynia. — Neaea hirsutula. (Schott.) Aus Braſilien. Nyctagineae. Pentandria, Monogynia. — Rhodochiton volubile. (Hort. Monacens.) Scrofularinae. Didynamia, Angiospermia. — Solanum amazonicum. (Jacquin.) Aus Braſilien. Solaneae. Pentandria, Monogynia. — Urtica diversifolia. (Link.) Aus Oſtindien. Urticeae. Monoecia, Tetrandria.

(**Abbildung des Uncidum bicornutum.**) Nro. 59 (Novemberheft) 1831 des Curtis Botanical Magazine enthält eine herrliche Abbildung des Uncidum bicornutum, eines prachtvollen Gewächſes aus der Familie der Orchideen, welches von einem zu Rio de Janeiro anſäſſigen Engländer in Wäldern, 60 Meilen von dieſer Hauptſtadt, im Juni 1830 entdeckt wurde. Das Gewächs, nach welchem die Abbildung gemacht worden, war aus Samen gezogen, und ſtand ſchon im Sommer 1831 in voller Blüthe.

(**Montezuma speciosissima.**) Zu den herrlichſten Bäumen, die ihrer prachtvollen Blumen wegen eine der ſchönſten Zierden der mexikaniſchen Flora ſind (heißt es in einem Schreiben des reiſenden Botanikers, Baron v. Karwinsky, datirt aus der Hacienda di St. Pedro Nolano, Cidade di Oaxaca in Neuſpanien), gehört unſtreitig die Montezuma speciosissima, eine in Europa ſelbſt den Botanikern und Blumiſten von Profeſſion noch wenig bekannte Pflanze aus der Familie der Bombaceae, die vom mexikaniſchen Pflanzenforſcher Seſſé in ſeiner Flora mexicana zuerſt abgebildet, und dann von de Candolle und von Sprengel angeführt worden iſt. Man kannte früher in ganz Mexiko nur fünf Bäume dieſer Art, die in der Gegend von Oaxaca an verſchiedenen Orten wachſen, und gewiß ſchon vor der Eroberung von Mexiko dorthin verpflanzt waren. Sie haben niemals reifen Samen getragen, auch ſich weder durch Ableger, noch durch Wurzelſproſſen vermehren laſſen, ſo ſehr ſich auch die Einwohner um ihre Vermehrung gemüht haben, da ſie die großen purpurrothen Blumen, welche einzeln in den Achſeln der Blätter ſtehen, zum Schmuck der Kirchen und Altäre verwenden, und dann ſehr theuer bezahlen. Ich bin ſo glücklich geweſen, eine Menge dieſer Montezuma-speciosissima-Bäume unfern der Seeküſte bei Tatatepec wild anzutreffen.

Anzeige für Nelkenfreunde. Von meiner aus den vorzüglichſten Sorten beſtehenden Sammlung von Nelken, verkaufe ich das Dutzend in kräftigen Senkern mit Namen und Beſchreibung fur 2 Thlr. pr. Cour. Ein gedrucktes Verzeichniß hierüber ſteht den Liebhabern zu Dienſten. Briefe und Gelder werden portofrei erbeten.

Vogelheerd bei Zerbſt in Anhalt.

Friedrich Halbentz.

Preisverzeichniß der vorräthigen **Gewächſe** aller Art, die auf das Jahr 18$\frac{3}{3}\frac{3}{4}$ in den Pflanzungen und Gärten der Gebrüder **Baumann** ꝛc. zu **Bollweiler** im oberrhein. Departement, in Frankreich, abgegeben werden können.

Das Preisverzeichniß dieſer großartigen Pflanzſchulen enthält eine große Anzahl von **Obſtbäumen** und andern Arten **fruchttragender Bäume** und **Sträucher**, von **Tafelwein-** und anderen vorzüglichen **Traubenſorten**, von **Allee-** und **Zier-Bäumen** und **Zier-Sträuchern** fürs freie Land, unter dieſen: eine ſchöne Sammlung von Azaleen, Cytiſus-Arten, Rhododendrons, Andromeden, eine zahlreiche und ausgeſuchte Roſenſammlung u. ſ. w., ferner von Einzäunungsſträuchern und perennirenden **Staudengewächſen**. Unter den **Orangerie-** und **Gewächshauspflanzen** findet man eine Sammlung Akazien, Amaryllis, Bankſien, die in der Blumenzeitung mehrfach rühmlichſt erwähnte, große und ausgezeichnete **Camellien-Sammlung**, ein ſchönes Sortiment **Citrus-Arten**, Eriken, Gardenien, Nerium, Proteen, bengaliſcher, Thee- und Noiſette-Roſen, von ſeltenen **Palmen** und vielen andern ausgezeichneten Pflanzen.

Hierbei eine Beilage: Nr. 39. des Weißenſee'r allg. Unterhaltungsblattes als Probeblatt.

Der jährliche Pränumerationspreis am Verlagsorte beträgt 1 Thlr. 15 Sgr. — Der jährliche Porto-Anſatz 12 Sgr. — in Summa durch die Poſt alſo jährlich 1 Thlr. 27 Sgr.

Weißenſee'r allg. Unterhaltungsblatt.

Für nebenſtehenden Preis von 1 Thlr. 27 Sgr. jährlich können d. Bl. durch alle Wohllöbl. Poſt-Aemter des In- und Auslandes poſttäglich bezogen werden.

Redakteur und Verleger: Friedrich Häßler.

Nro. 39. Achter Jahrgang. Weißenſee, den 27ten September 1833.

Probe-Blatt.

Eine Stimme aus der Zeit.

Wenn auch ſelten in unſern Blättern eine richtende Stimme über erſcheinende Schriften vernommen wird, ſo glauben wir doch unſern verehrten Leſer auf ein Werkchen aufmerkſam machen zu müſſen, deſſen Hervortreten wir einem in unſerer nächſten Nähe lebenden weltbekannten Verfaſſer zu verdanken haben. Wir halten uns um ſo mehr dazu verpflichtet, da daſſelbe in der Pr. Staats-Ztg. Nro. 228 öffentlich mit einer lobenden Ankündigung angezeigt wurde, und auch in mehreren Blättern, unter andern in: Berliner politiſches Wochenbl. Nro. 34, ſchon Urtheile lautbar geworden. Wir meinen die: „*Merke zum deutſchen Volksthum*, von *Fr. L. Jahn*, Hildburgh., 1833 bei Knopf.“

Mit dem Wahlſpruch: „*Aelter, aber nicht kälter!*“ führt ſich der Verfaſſer des deutſchen Volksthums, der deutſchen Turnkunſt, der Runenblätter, der neuen Runenblätter, in der Vorrede, S. VIII. ein, und dankt es ſeiner Vaterlandsliebe, nicht zu früh „*von des Kloſters Heimlichkeit geplaudert zu haben.*“ Die alte Mähr vom getreuen Eckart, der in ſein Heerhorn ſtößt und alle Leute warnt mit den Worten: *Vorgeſehn! das wüthende Heer kommt!* wendet der Verfaſſer auf ſich an.

Der Verfaſſer bekennt ſich zur Reform, iſt aber ein Feind aller Revolution und Reaction, und ſucht keinen Platz weder auf der äußerſten Rechten, noch auf der äußerſten Linken, und ſeine Merke ſollen in den Zerwürfniſſen der Zeit als geſchichtliches Auskunftsmittel ihre Leſer ſuchen. Eroberer und Umkehrer werden nach des Verf. Meinung, S. 113 u. 114, ſo wenig Gutes, Schönes und Heiliges ſtiften, als Schaaren von Brücknern und Ecknern und heimathloſen Sonnenbrüdern. Die *Umkehr* (*Revolution*) S. 119 wird als *Gottes Geißel* bezeichnet; die *geſchichtliche Entwickelung* (*Reform*) S. 126 als *Gottes Werde-Licht*.

Der griechiſche Weiſe Ariſtoteles nahm den Erfahrungsſatz auf: Welcher Staat den andern überwältigen kann, der will es auch.“ So iſt in den *Merken* die 6te Ueberſchrift S. 62 *Erbfeind*, und wer damit gemeint iſt, werden unſere Leſer ſchon errathen. Weiter unten, S. 232, wo der Verf. nur eine todte Sprache, das ausgeſtorbene Latein, als Unterhandlungsſprache will, ſagt er in dieſer Beziehung: „Es giebt nur *eine* Welt, die franzöſiſche; nur *ein* Land, Frankreich; nur *ein* Volk, die Franzoſen; nur *eine* Stadt, Paris! das iſt der Waidſpruch durch ganz Frankreich, von einem Ende bis zum andern, von einer Geſchichte in die andere. Der Lilienfranzos, der Pikenſpitzenfranzos, der Bienenfranzos und der Krötenfranzos ſind alle gefährlich; aber der nächſte bleibt allemal der giftigſte.“ S. 61 giebt er als Ergebniß ſeiner Forſchungen: *Frankreich hat allemal Alle und Alles verdorben, und Deutſchland und die Deutſchen von Grund aus.*“ S. 58 bekämpft er die *Deutſchlinge*, die ungeſtraft unſer Volksthum höhnen. „Ihnen, fährt er fort, ſoll jede Speiſe gebraten und geſotten in den Mund regnen und die Mißgunſt des Auslands ſie ſegnen.“ S. 49 50. „Aber fremde Wegweiſer ſollen kommen, ſo ſie auf ihren eigenen Eſeln hinanreiten, fremde Träger, ſo ſie auf ihren Polſterſtühlen hinaufſchroten.“ Und die Vorrede ſchließt ſogar mit folgender Verwünſchung: „Unheil, Unglück, Schmach, Schande, Elend, Fluch, Verderben und Tod über Jedermann in jeglichem Volk, der vom Ausland das Heil und den Heiland erwartet.“

Auf einem tiefen und breiten, doch nicht ſichtbaren, geſchichtlichen Unterbau ruhen die Merke, wo ſie kühn, luftig und leicht aufgeſtellt, gleich hängenden Gärten ſchweben. Die Sprache iſt reiner, als im deutſchen Volksthum, einfach und edel; die Wortbildungen ſind noch kecker und zuverſichtlicher, doch weniger auffallend, und gebehrden ſich nicht ſo linkiſch und unbeholfen, wie bei den meiſten Sprachreinigern. Die Schreibart iſt Zwillingsſchweſter des deutſchen Volksthums, und verräth in keinem Zuge, daß ſie über 20 Jahre auseinander ſind. Das deutſche Volksthum iſt mannichfaltiger, die Merke ſind ausführlicher, und doch zu kurz. Man möchte mit dem Verfaſſer zanken, daß er vorauszuſetzen ſcheint, alle Leſer beſäßen außerordentliche Geſchichtserkenntniß.

Mit Recht kann man auch dieſes Werk, das ſich an die früheren des Verfaſſers würdig anreiht, eine reiche Fundgrube nennen, aus welcher jeder Vaterlandsfreund Licht und Leben, Liebe und Luſt ſchöpfen kann.

Die ſämmtlichen Schriften des Verf. gehören zuſammen und ſuchen die Fragen zu beantworten:

1) Was gehört zu einem folgerechten Volk?
2) Wie muß das Deutſche Volk beſonders jetzt handeln?

Und daß auch durch dieſes Werk das Wohl und Heil des Vaterlandes gefördert werden möge, wünſchen wir aus voller Seele.

D. R...r.

Aehnlichkeit und Unterſchied.

In der Galanterieſprache (ſagt Dr. Debeck) nennt man den Liebhaber: „Chapeau,“ alſo *Hut*; in wiefern rechtfertigt die Sache die Benennung? Was haben Hüte und Liebhaber Aehnliches und wie unterſcheiden ſie ſich? Vor Allem ſcheinen Hüte und Liebhaber darin ähnlich zu ſeyn, daß ſie aus *Haſenbälgen* beſtehn; doch ſind ſie darin verſchieden, daß man den Hut blos für den *Kopf* nimmt, bei dem Liebhaber hingegen zieht man den Kopf faſt gar nicht zu Rathe. — Der Hut und die Liebhaber ſind auch darin gleich, daß ſie von den Damen um ſo mehr geliebt werden, je mehr *Federn* ſie haben: allein ſie unterſcheiden ſich darin, daß man den Hut anzieht, wenn die Sonne ſcheint, den Liebhaber aber *anzieht*, wenn die Sonne untergeht. — Der Hut und der Liebhaber ſind darin ähnlich, daß ſie waſſerdicht ſein müſſen, jener bei Regen- und dieſer bei Thränenwaſſer; ſie ſind aber darin verſchieden, daß der Hut vom Regen in's Trockene, der Liebhaber aber oft vom Regen in die Traufe kommt. — Der Hut und der Liebhaber ſind darin ähnlich, daß der Mittelſtand nur einen hat und denſelben ſchont, die höhern Stände deren aber viele haben und ſchonungslos mit ihnen umgehen; ſie ſind aber darin unterſchieden, daß man die Hüte gern hat, wenn ſie recht feſt ſind, die Liebhaber aber deſto mehr liebt, je *loſer* ſie ſind. — Doch iſt die Aehnlichkeit größer als der Unterſchied; Hüte und Liebhaber gehen oft von der gnädigen Frau an das Kammermädchen über; Hüte und Liebhaber werden oft in Geſellſchaften vertauſcht; Hüte und Liebhaber beſtehen oft nur aus Katzenhaaren; Hüte und Liebhaber fliegen oft bei dem erſten Windſtoß leicht davon; Hüte und Liebhaber haben meiſtens hohle Köpfe; Hüte und Liebhaber haben einen beſondern Reiz, ſo lange ſie neu ſind; werden ſie alt, ſo iſt es aus mit ihnen; u. ſ. w. Es iſt alſo entſchieden vortrefflich, daß der Liebhaber Chapeau heißt; die Ehemänner haben daher nichts ſehnlicher zu wünſchen, als daß ihre Frauen ſtets — chapeaulos gehen mögen. Bei dieſer Gelegenheit kann ich nicht umhin zu geſtehen, daß ich mir eine Kenntniß des weiblichen Geſchlechts, aus ihrer Art die Hüte zu tragen, zu eigen gemacht habe, die ich „Hutologie“ nenne. Ein kleines Hütchen, locker auf das Haupt geſetzt und etwas ſchief, verräth mir ein ſchalkhaftes Gemüth; ein großer Hut mit breiten Rändern, in die Stirn gedrückt und rückwärts gen Himmel gekehrt, zeigt von Eigenſinn und Trotz; ein ſchmalgerändertes Hütchen, etwas quer auf's rechte Ohr geſtellt, zeigt von Empfänglichkeit und etwas Liebesſinn; ein großer Hut mit tiefem Kopf, aus der Stirn gerückt, läßt mich ein geniales Gemüth, eine Fehde-Dame, ahnen, u. ſ. w.

Der Theerauſch. *)

In Boſton (Nordamerika) wurde neulich ein Preis von 20 Dollars auf das Mittel geſetzt: „Wie manche der dortigen Frauen vom übermäßigen Genuß des Thees abzuhalten wären?“ und dabei bemerkt, daß in mancher Stadt ſich auch die Damen gar entſetzlich der Trunkenheit ergäben; ſie tränken zwar nicht Wein, nicht Kirſchwaſſer, ſondern puren, blanken Thee, und tränken ſich dann richtig darin einen Rauſch. Zwar ſängen ſie nicht, und ſtolperten nicht wie Unſereins, wenn wir zu tief ins Glas geſehen, ſondern ſie blieben ehrbar ſitzen. Aber ſie führten unter einander ſo wunderbarliche Geſpräche, die von einem Theerauſch die ſonnenklarſten Beweiſe gäben. Es iſt, fährt der Berichterſtatter fort, der Theerauſch aber böſer, als der Rauſch von Wein; denn die ſchönen Damen ſchwatzen alsbald ſo viel Böſes von ihren Nachbarn und Nachbarinnen (als ſie nur wiſſen? o nein!) ſo viel ſie nur können. Zuerſt fangen ſie mit Kindtaufen an, dann geht's über Hochzeiten her, und endlich breiten ſie ſich über Eheſcheidungen aus. Wenn's nichts mehr zu taufen und zu ſcheiden giebt, nehmen ſie Politik vor. Wenigſtens iſt immer von gekrönten Häuptern die Rede. Auch lieben ſie die alte Geſchichte ſehr, denn wenn vor funfzig Jahren eine artige Tochter ſich vergeſſen, ſo muß ſie vor dem Theetiſche noch einmal ſich vergeſſen. In ihrem Rauſche laſſen ſie ſelbſt den Todten keine Ruhe. „Ja, Frau Gevatterin!“ ſagte neulich Frau X. zur Frau Y., „ja wertheſte Freundin! die Frau Z. war (Gott habe ſie ſelig!) eine gute Frau; aber den jungen Schreiber ſahe ſie doch gern.“ — „Ja freilich, Frau X.!“ ſagte die andere, „und mit ihrem jüngſten Kinde war's ſo, ſo! Ich will nichts geſagt haben. Ich weiß aber auch nicht, wie ſich der Schreiber hat mit ihr einlaſſen können?“ — „Das denk' ich auch, herzallerliebſte Frau Tante!“ ſagt die Dritte, „denn die Frau Z. (Gott habe ſie ſelig!) hinkte doch mit einem Fuße.“ — „Hinkte mit beiden Füßen!“ ſagt die Vierte. — „Hatte eine lange Naſe!“ ſagt die Fünfte. — „Hatte Katzenaugen!“ ſagt die Sechſte. — „Hatte den Geizteufel im Leibe!“ ſagt die Siebente. Und ſo ging's fort, bis die ſelige Frau Z. wie ein Drache geworden. Ich habe, ſchließt der Berichterſtatter, eine Frau, die keinem Menſchen, auch wenn ſie das Böſeſte von ihm wüßte, das Geringſte nachreden würde. Aber ſobald ſie mit den andern Frau Baſen am Theetiſch ſitzt, und ſie die dritte Taſſe getrunken hat, iſt ſie, wie alle andern, und ihr Zünglein plappert und klappert mit den andern um die Wette. Iſt der Rauſch aber vorbei, ſo iſt ſie wieder ſo fromm, wie am erſten Tage nach der Hochzeit.

Der Vielfraß Jakob Kahle aus Wittenberg.

Im Jahr 1754 ſtarb zu Wittenberg in ſeinem 79ſten Lebensjahre Jakob Kahle, einer der merkwürdigſten Vielfreſſer neuerer Zeit. Ratten, Mäuſe, Eulen, Raupen, Heuſchrecken ꝛc. waren ihm Leckerbiſſen. Da er oft, wenn die gewöhnlichen Nahrungsmittel nicht zulangten, genöthigt war, auch die Schüſſeln und Teller hinterher zu ſchicken, ſo hatte ihn die Natur mit einem ſehr ſcharfen Gebiß verſehen, ſo daß man in den Steinen, in die er gebiſſen hatte, die Spuren ſeiner Zähne eben ſo deutlich ſah, als wenn man in einen Apfel beißt. Dadurch war er auch in den Stand geſetzt, Glas, Porzellan, Schiefer, Kieſelſteine ꝛc. zu zermalmen. Zum Frühſtücke verzehrte er einſt (gleich dem ſogenannten Pelzfreſſer in Prag) ein ziemlich großes Schwein mit Haut und Haaren, und dennoch war er einige Stunden darauf wieder ſo hungrig, daß er einen mittelmäßigen Hammel mit Fell und Knochen verzehren konnte. Auch riß er wohl die Kacheln aus dem Ofen und ſchlang ſie hinunter. Ja ſein Appetit ging einſt ſo weit, daß er ein bleiernes Schreibzeug mit Dinte, Streuſand, Federn und Federmeſſer, und hierauf ſogar noch den Dudelſack eines reiſenden Polen verſchlang.

Bruchſtück aus dem Berichte eines Schiffbruchs des engl. Schiffes Amphitrite im Angeſichte von Boulogne.

Boulogne, den 31. Auguſt, 3 Uhr Nachmittags.

Das Meer tobt in einem fort, Alles verkundet eine ſchreckliche Nacht. Man ſignaliſirt ein Schiff, das Noth leidet; es iſt ein Dreimaſter und ohne Flagge. Mit dem Fernglaſe kann man ſehen, wie es die hohe See zu erreichen ſtrebt, der Wind treibt es aber der Kuſte zu; wenn es ſtrandet, ſo iſt es um daſſelbe geſchehen.

Halb fünf Uhr.

Das vorhergeſehene Ereigniß iſt eingetroffen; das Schiff iſt vor der Badeanſtalt geſtrandet; das Meer iſt fürchterlicher als jemals; es ebbet. Mit der Lorgnette kann man die Mannſchaft leicht unterſcheiden. Das Schiff zu retten, daran iſt nicht mehr zu denken; die an daſſelbe ſchlagenden Wogen müſſen es zerſchellen.

Sechs Uhr.

Das Boot iſt in See, es kann nicht herankommen; ein Schiffer des Fiſcherbootes, Hennin (vergeſſen Sie dieſen Namen nicht), will ſich ins Meer ſtürzen und retten. Er entkleidet ſich und hat in einer Hand ein Tau; Niemand wagt ihm zu folgen; man ſieht ihn mit den Wogen kämpfen.

Elf Uhr Abends.

Welch fürchterliches Schauſpiel! Ich werde es Zeitlebens nicht vergeſſen! Dreißig Leichname liegen durcheinander in dem Schoppen des der menſchenfreundlichen Geſellſchaft gehörenden Hauſes. Alles iſt umgekommen, 108 Frauen, 12 Kinder, 12 Matroſen! Der brave Hennin hat mehrfach ſein Leben gewagt, aber leider nur wenig retten können. Bis jetzt ſind blos 3 Matroſen gerettet: John Owen, Richard Rice und James Doſei.

---

*) Nach den Unterſuchungen des berühmten Forſchers Silvestre de Sacy, iſt es leider nur zu gewiß, daß die berüchtigten Aſſaſſinen vom Libanon, Erztheetrinker waren, und ihre großen Gewaltäußerungen einem Theerauſche verdankten. D. Redact.

Den 1. Septbr. 8 Uhr.

Ich war um 6 Uhr auf dem Zolle. Während der Nacht hat man bereits 43 weibliche Leichname aufgeleſen. Ich ſah mit meinen Augen im Hafen eine junge Frau aufnehmen, die ein Kind von zwei Jahren in ihren Armen gepreßt hielt. Die Küſte iſt mit Trümmern bedeckt. Das Schiff iſt gewiſſermaßen pulveriſirt.

Eilf Uhr.

Die gefundenen Leichname ſind ins Hoſpital geſchafft worden; es ſind hundert Sarge beſtellt, und die Beerdigung wird morgen ſtatt finden. Vermuthlich wird das Meer zur Fluthzeit noch mehre Korper an's Ufer werfen.

Den 3. Septbr.

Geſtern hatte die Beerdigung von 65 von der See an's Land ausgeſpieenen Leichen ſtatt. Mehr als zweitauſend Menſchen begleiteten den Leichenzug, den der engliſche Conſul anführte. Das Schauſpiel der Beiſetzung der 65 Särge in eine Doppelgruft, an deren Vollendung man noch arbeitete, war ſchauerlich. So eben geht abermals die ſchreckliche Nachricht ein, daß auch das Schiff Anna Emilie, Kapitän Crompton, mit Mann und Maus untergegangen. Noch immer werden von den Wellen Leichname und Schiffstrümmer an's Ufer geworfen. Der gerettete Matroſe Owen iſt erſt 22 Jahre alt; er iſt der jüngſte von 23 Kindern, von denen er und 4 Schweſtern nur allein noch am Leben ſind.

Schottky ÷ Schiller. Schiller über Schottky.

„Hier iſt meine Reichsgeſchichte. —
Zu proſaiſch waren die Gedichte:
Die iſt leider zu poetiſch nur." Falk.

Man hört jetzt von Zeitſchrift zu Zeitſchrift wiederhallen: wie Schottky öffentliche Vorleſungen über Wallenſteins häusliches Leben und die darin entfaltete Liebenswürdigkeit gehalten, nebenbei Schiller hart mitgenommen, weil er ſeines Helden und Schützlings Engelsangeſicht zur Fratze verzerrt. Wir haben Herrn Schottky nicht gehört, wollen auch zu ſeiner Ehre annehmen, daß er die Wahrheit geſagt, dürfen aber keck behaupten, daß er nicht das Wahre getroffen. Einzelne Aufwallungen von Menſchlichkeit gegen einzelne Menſchen in einzelnen Augenblicken beweiſen nichts für den ſittlichen Werth des ganzen Lebens. So könnte jeder Unhold, Verbrecher und Auswurf für heilig gelten, weil er etwas geliebt und ſein Herz an Einiges gehangen.

Schiller hat den Wallenſtein kenntlich gezeichnet, und treffender, als man von dem ihm nur zu Gebote ſtehenden Stoff erwarten ſollte.

Seit der Zeit ſind mehr Quellen entdeckt worden; je mehr aber noch ſonſt unbekannte hervorbrechen, ſie werden keinen Blumenflor auf Wallenſteins Grab hervorſprießen laſſen. Wallenſteins übele Laune, in der Volksſprache Schiefer (Engliſch shiver) war ſo vorherrſchend, daß ihn Sittewalt den Schiefergeneral nennt.

Der Brandenburgiſche Miniſter Schwarzenberg, dem man doch niemals der unöſtreichiſchen Geſinnung geziehen, berichtet an den Kurfürſten Georg Wilhelm über ſeine Geſandtſchaft zu Wallenſtein nach Frankfurt an der Oder im Junius 1628: „Der Herr General (ſ. Berliniſche Monatsſchrift, Julius 1807. Nr. 4.) hatte gerade ſeinen Schiefer, und Sekretarien, Kammerdiener und Edelknaben abgeſchmiert, auch das Glockenläuten und das Herumlaufen der Hunde auf den Straßen unterſagt."

Späterhin, als die Stadt Frankfurt a. d. O. Abgeordnete an Wallenſtein in ſein Hauptlager Halberſtadt ſchicken wollte, gab ihr der ſtatthalternde Markgraf den Rath: „dazu keine gelehrte Leute zu wählen, denn die könne Wallenſtein nicht leiden, ſondern ſchlichte Leute, die ihre Nothdurft einfach, kurz und deutlich vortrügen. Sie ſollten aber die Zeit abpaſſen, wo ſie ihn bei Laune träfen, und dann nach der Rückkehr berichten." (Urkundenſammlung der Marienbibliothek zu Frankfurt a. d. O.)

Die Frankfurter kamen ziemlich gut weg, wurden ſogar zur Tafel gezogen, wo ihnen auffiel, daß die Meſſer keine Spitze hatten, ſondern rund abgeſchliffen waren; daß alles Getränk auf einem eigenen Schenktiſche ſtand, und wer Durſt bekam, ſich eigens zu trinken fordern mußte, worauf dann ſogleich das Trinkgefäß weggeſetzt wurde. (Beſchluß folgt).

Curioſa.

Der Kardinal Richelieu hatte oft die barocke Idee, er ſey ein Pferd. Dann gallopirte er um das Billard herum, ſchlug links und rechts mit den Beinen gegen die Domeſtiken aus, und machte oft Stunden lang einen fürchterlichen Lärm. Wenn er jedoch ausgeſchlafen hatte, wußte er kein Wort mehr von ſeinen Gallopaden und Courbetten.

* * *

Der ſo überaus liebenswürdige und kenntnißreiche Prinz Louis Jules de Bourbon empfand oft einen unwiderſtehlichen Trieb zum Bellen. Niemand konnte dabei ſeine Stimme von der eines kleinen Hundes unterſcheiden. Es überfiel ihn einſt dieſer Hang im Thronzimmer des Königs, während einer feierlichen Audienz. Nicht ohne Zuckungen rannte er an ein Fenſter des Saales und bellte, den Mund mit dem Schnupftuche verhaltend, ſo leiſe als möglich zum Fenſter hinaus.

Neueſtes aus der Nordſee.

Nach Nachrichten aus Oſtende unterm 11. September ſollen die Fiſcher, die vor und nach dem großen Fiſchfange zurückkehren, einſtimmig erklären, die Nordſee ſei nicht mehr fahrbar; ſie würden ſonſt noch 5 — 6 Wochen dort geblieben ſein. Auch verſicherte neulich ein bekannter Gelehrter: die Erde würde wahrſcheinlich nächſtens eine bedeutende Polveränderung erleiden. Die Bremer Schiffe, ſo Auswanderer nach Amerika fördern, ſegeln bereits zwiſchen Irland und Grönland. Merkwürdig wäre es, wenn der Canal (Pas de Calais) vielleicht austrocknete, und Frankreich und England wieder an einander wüchſen. Die ſogenannten Grimaciers würden dann hier ein weites, fruchtbares Feld für ihre Kunſt finden.

Hiſtoriſche Miszellen.

Kaiſer Karl der Dicke hatte etwas von den Gütern und Gerähſchaften eines Nonnenkloſters bei Brescia verſchenkt. Darüber macht ihm Pabſt Johann XIII. in einem Schreiben Vorwürfe, befiehlt ihm, dies zurückzuſtellen, und ſchließt das Schreiben mit den Worten: „Kann nach Verlauf von 60 Tagen hierüber dein Geſandter zu Rom nicht befriedigende Rechenſchaft ablegen, ſo biſt du von dieſer Zeit an excommunicirt; beſſert dich aber auch dieſes nicht, ſo wiſſe, daß man dich mit derben Schlägen klug machen wird."

* * *

Im ſpeieriſchen Stadtrechte heißt es unter andern: Wer den Pflug beraubt; wer dem Bauer oder dem Geſinde etwas zu Leide thut oder dreier Pfennige werth nimmt; wer in der Mühle etwas ſtiehlt, was nicht unter fünf Pfennige werth iſt: den ſoll man radebrechen. Falſche Münzer wurden noch im 15. Jahrh. in Lübeck, Straßburg ꝛc. auf öffentlichem Markte in Oel gekocht.

Briefliches.

Einem Soldaten, der in der Schlacht ein Bein verloren hatte, wurde von ſeinem Vormund gemeldet, daß ſein Vater geſtorben ſey. Der Soldat antwortete hierauf: „Für das Abſterben meines Vaters bin ich Ihnen ſehr verbunden. Dergleichen kleine Familienangelegenheiten ereignen ſich freilich oftmals. Was mich betrifft, ſo befinde ich mich ganz wohl im Lazareth. In der letzten Schlacht habe ich ein Bein verloren; doch iſt mir, Gott ſey Dank! noch eins übrig geblieben, mit welchem ich die Ehre habe zu verharren Ihr ꝛc."

* * *

Ein Arzt ſchrieb einem Kranken, der ihn um Hilfe bat: „Ew. Wohlgeboren ſchreiben mir, daß Dieſelben das Unglück gehabt, mit krummen Gliedermaßen geboren zu werden."

Gemiſchtes.

Viele von den unſern abweichende Gebräuche haben die Japaner. Bei ihnen iſt die Farbe der Freude ſchwarz, die der Trauer weiß. Sie grüßen weder durch eine Kopfverneigung, noch durch einen Händedruck, ſondern durch eine Fußbewegung. Im Hauſe gehen ſie nicht im Négligé, ſondern ſtets feſtlich gekleidet, auf der Straße aber gehen ſie in Lumpen einher. Das Pferd beſteigen ſie jederzeit von der rechten Seite. Iſt ein Japaner eines Verbrechens überwieſen worden, ſo bittet er nicht um Gnade, ſondern nur um Erlaubniß, daß er oder ſein nächſter Verwandter ſich ſelbſt den Bauch aufſchlitzen dürfe.

Ein Hutmacher in London hat einen Hut erfunden, aus deſſen Krämpe ſich auf einen Druck ein vollſtändiger Regenſchirm entfaltet, der ſo leicht ſein ſoll, daß er das gewöhnliche Gewicht des Hutes nicht im geringſten vermehrt. Dieſe Erfindung, wenn kein Nisi dabei iſt, wird ohne Zweifel eine Verbreitung über die ganze Erde erhalten.

Ein Autor in der Morgenſtunde iſt ungenießbar; wenn er gegen Mittag die Feder ausſpritzt, ſo nimm dich in Acht, daß deine weißen Gallakleider davon nicht getroffen werden, und erſt, nachdem die Sonne von ihrem Zenith herabſteigt, wirſt du den Schalk, der dich erheitern, oder den Freund, der dich belehren ſoll, in ihm finden. Fichte behauptete: Er wolle aus jeder Schrift leſen, ob ſie bei Wein, Bier, Kaffee, Thee, Rum, Opium ꝛc. geſchrieben. Eine richtige Schrift müſſe bei Waſſer geſchrieben werden, ſo halte er es mit der ſeinen.

In einer Geſellſchaft kam man auch darauf zu ſprechen, daß der Landesherr eine namhafte Summe zum Ankauf ſpaniſcher Schafe beſtimmt habe. „Nein, das iſt zu toll! bemerkte eine Dame in heiligem Eifer, die herrlichen engliſchen Waaren — dagegen eifert man, die will man nicht hereinlaſſen; ſpaniſche Schafe aber — die werden ſogar verſchrieben. Kann denn der Hof nicht ſo gut, als unſer eins, inländiſchen Schöpſenbraten ſpeiſen?“

In N...burg lief jüngſt ein Dieb durch die Straßen, um den ihn verfolgenden Gerichtsdienern nicht in die Hände zu fallen, und fiel. Als er ſie nun auf ſich zuſpringen ſah, rief er: Meine Herren, laſſen Sie mich nur allein aufſtehen, ich verlange nicht aufgehoben zu werden.

„Mutter!“ redete ein vornehmer Mann, der Luſt zu necken hatte, eine alte Frau an, die eben Gänſe hütete, welche ſich ſtritten und hackten, „ihr haltet keine Zucht, denn eure Untergebene zanken ſich.“ — „Ja, Herr!“ entgegnete dieſe, „es ſind ein Paar Gänſeriche, und das Mannſen macht es halter nicht anders.“

Ein anſtändiger Mann fragte neulich einen Eckenſteher, ob er nicht wüßte, was die Uhr wäre? „Haben Se eene bei ſich?“ fragte dieſer. „Nein! ich habe meine Uhr vergeſſen!“ — Det thut mir leed,“ antwortete der Eckenſteher, „ſonſt hätt' ick mal nachgeſehen! denn ick habe keene Uhr nich.“

Im Kloſter zu Ebrach liegt auch ein Fürſt, Conrad von Teufel, mit ſeiner Mutter Mathilde begraben, daher es noch zu den ſtändigen Kloſterſpäßen gehörte, den Fremden das Grab mit den Worten zu zeigen: Hier ruht auch der Teufel mit ſeiner Mutter.

Ein Arzt, der ſich vorzüglich in der Viehſeuche, welche nach dem ſiebenjährigen Kriege überall wüthete, um den preußiſchen Staat verdient gemacht hatte, ſuchte bei Friedrich II. um den Hofrathstitel nach. Der König ſchrieb: „Hofrath kann's nicht ſeyn; doch allenfalls könnte man ihn zum Viehrathe machen.“

Ein böſes und häßliches Weib wurde von einem Hunde gebiſſen. Man ſtritt, ob der Hund toll war. Ei, ſagte Jemand, wer bei der anbeißt, muß gewiß toll ſein.

In der Bibliothek zu Wolfenbüttel liegt für die liebe Neugierde die Halliſche Bibel aufgeſchlagen, mit dem groben Unterlaſſungsfehler des ehebrecheriſchen Setzers, der aus dem ſechsten Gebote das Nicht ausließ.

Sonſt war in Hamburg der ſonderbare Unterſchied zwiſchen Senatoren cum gradu et sine. Darum ſagte einſt eine Doktorsfrau mit Stolz zu der Frau eines Chirurgen: „Mein Mann hat einen gradum,“ das die Barbiersfrau für „gerade“ nahm, und entgegnete: „Meiner iſt auch nicht krumm.“

Ein Bauer brachte einem Maler ein Bret, worauf er ihm den großen Chriſtoph malen ſollte. Der Maler bemerkte, daß das Bret viel zu klein ſey. Ja, antwortete der Bauer: He kann jo de Föt herunderbammeln laten.

„Wie ſichert man ſich vor Menſchenfeindlichkeit?“ fragte Jemand Champfort. „Nichts iſt leichter,“ antwortete er, „man braucht nur keinen Charakter zu haben und nicht zu denken.“

„Sei gerecht gegen Jedermann!“ ſagt Jean Paul, „gieb auch, wenn du geſchwind ſchreibſt, dem u ſeinen Strich und dem i ſeinen Punkt.“

Göthe erzählt, daß er im Seſſionszimmer des Rathes zu Frankfurt am Main den alten Spruch: „Audiatur et altera pars!“ alſo überſetzt gefunden habe:

Eines Mannes Rede iſt keines Mannes Rede;
Man ſoll ſie billig hören Beede!

Ein Jeſuit wollte einen Abt vexiren, und fragte ihn, wie viel Götter wären? Der Abt antwortete: „Es wäre zu wünſchen, daß es nicht mehr Jeſuiten, als Götter gäbe.“

In Frankreich bekleideten in der Mitte des 16ten Jahrhunderts die „Conseillers du Roi“ mitunter äußerſt ſonderbare und lächerliche Aemter. Das Pariſer Parlament erwähnt 1544 in ſeinen Regiſtern einen Conseiller langueyeur de pourceaux du Roi, deſſen Amt darin beſtand, die Zungen der Schweine zu unterſuchen, ob ſie finnig wären.

Die Satyrs griechiſcher Bildhauer hielten oft kleine Grazien in ſich verborgen. Nicht ohne Gewinn für das Auge kehren zuweilen heutige Weiber und Franzoſen, ja Deutſche es um, und ſind Grazien, in deren Innern man erſt die Satyrs entdeckt.

An der Thüre des Kirchhofs zu Töplitz, wo auch unſer trefflicher Seume ſchläft, ſteht die Inſchrift:

Was wir waren, das ſeid ihr;
Was wir ſind, das werdet ihr.

Liebe die Menſchen, damit ſie dich wieder lieben! — Dies iſt der erſte Grundſatz des mit dem Aberglauben des Pöbels ſo oft verwechſelten hinduſiſchen Moralſyſtems.

Mancher Kritikaſter ähnelt einem Hunde, der um einen Biſſen Fleiſch mühſam große Knochen benagt. —

Wer immer Adagio denkt, Andante ſpricht und Presto handelt, Prestissimo verbeſſert: der iſt ein Lebens-Virtuos!

Die letzte Hexe, eine gewiſſe Maria Renata Segnerin, wurde im Jahre 1749 in Unterzell verbrannt.

Es wurde von Jemandem der Einwurf gemacht: „Die nichts wiſſen, ſtudiren: wenn ſie etwas wüßten, brauchten ſie nicht erſt zu lernen.“

Auf der Eiſenbahn zwiſchen Liverpool und Mancheſter ſind neulich an einem einzigen Tage 2000 Reiſende, gegen 12,000 Centner Waaren, 565 Schweine und ein Bär auf Dampfwagen transportirt worden.

Wie ſonſt die zartduftende Blume auf der ſcharfen Zwiebel wächſt, ſo entſpringt umgekehrt aus der poetiſchen Blume die beißende Kritik.

Zu Clermont, im Departement Puy de Dome, wird jetzt ein Menſch wegen eines Mordes vor die Aſſiſen geſtellt, der vor 18 Jahren begangen wurde, und für welchen bereits zwei Andere das Blutgerüſt unſchuldig beſtiegen haben.

Der Edeldenkende ſchätzt den armen Edlen mehr, als den Unedlen auf des Reichthums glänzenden Höhen.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt=Aemter, Zeitungs=Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto=Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen= Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. XXIV. Weißenſee, (in Thüringen). November 1833. VI. Jahrg.

Beſchreibung und Cultur einiger ausgezeichneten neuern Zierpflanzen.

(Mitgetheilt vom Herzogl. Hofgärtner Hrn. J. W. Boſſe in Oldenburg.)

(Fortſetzung.)

Hypericum linarioides, *mihi.* Frauenflachsartiges Hypericum. ♃. Aus Armenien. — Dieſe ſchöne und reichblumige Art habe ich in keinem mir bekannten botaniſchen Werke beſchrieben gefunden, und ich fand mich wegen der großen Aehnlichkeit des Wuchſes und beſonders der Blätter mit einer feinblättrigen Linarie veranlaßt, ihr einſtweilen den angeführten Namen zu geben. Folgende genaue Beſchreibung möge den Botanikern Anlaß zur Entſcheidung geben, ob dieſe Art, die ich aus Armeniſchem Samen erzog, wirklich neu oder ſchon irgendwo beſchrieben iſt. — Die Stengel ſind am Grunde holzig, oben faſt krautartig, rund, und gleich der ganzen Pflanze glatt; die unfruchtbaren Stengel liegen theils etwas nieder, die Blüthenſtengel aber ſtehen aufrecht, ſind 16 — 20 Zoll hoch, und mit entgegengeſetzten, zahlreichen, 1 — 3 Zoll langen vielblumigen Aeſtchen verſehen. Die Blätter ſind graugrün, linienförmig, ſtumpflich, ohne Drüſen, hellpunctirt, entgegengeſetzt, 4 — 10 Linien lang, 1 — 1 1/2 Linien breit, ſtiellos, am Rande ſehr wenig zurück gerollt. Die zierlichen, hellgelben Blumen bilden eine lange Endrispe von ſchönem Anſehen, welche aus winkelſtändigen 2= — 3=blumigen Stielen zuſammengeſetzt iſt. Die Kelchblättchen ſind ei=lanzettförmig, ſpitzlich, hell=geſtreift und punctirt, theils ohne Drüſen, theils am Rande mit ſchwärzlichen Drüſen verſehen. Die Blumen ſind 3weibig; die Kronblätter 5 Linien lang, länglich, ſtumpf, an der Spitze faſt etwas gekerbelt und mit kleinen ſchwarzen Drüſen faſt gewimpert.

Dieſe empfehlenswerthe, perennirende Pflanze blühet im Mai und Juni, und wird ſowohl durch den Samen (von dem ich mittheilen kann) als durch Theilung vermehrt, wenn gleich auf letztere Art nur ſparſam. Sie liebt einen guten, lockern, mäßig feuchten Sandboden, einen ſonnigen, etwas geſchützten Standort im Freien, und eine leichte Bedeckung bei ſtrenger Winterkälte.

(Fortſetzung folgt.)

Bemerkung über das Sitzenbleiben der getriebenen Hyacinthen. (Beſchluß.)

(Mitgetheilt von Ed. R. aus D.)

Beim Treiben ſelbſt iſt hauptſächlich zu beachten, daß man die Zwiebeln nicht gleich im Anfange einer zu hohen Temperatur ausſetze, ſondern bei geringer Wärme, etwa 6 — 8° R., anfange und von Woche zu Woche um ein paar Grad ſteige. Auch die Sorten der Hyacinthen berückſichtige man dabei, denn einige blühen ſchon von Natur früher, und man richte nach ſeinem Bedürfniſſe die Auswahl ein.

Hat man nun in dieſen angeführten Punkten nichts verſäumt, ſo kann man auch auf eine gute und vollkommne Blume rechnen, und ſieht dann Mühe und Sorgfalt durch die Schönheit der Blüthe belohnt. Trifft es indeſſen dennoch, daß eine Zwiebel ſitzen zu bleiben ſcheint, d. h. bleibt der übrigens geſunde Blüthenſtengel im Wachſen gegen die Blätter zurück, ſo muß man die Blume durch künſtliche Nachhülfe hervorzutreiben ſuchen. Man überdeckt zu dem Behufe die Zwiebeln mit hohen Gläſern oder auch mit von Papier gemachten Düten, was auch zuweilen von gutem Erfolge iſt. Indeſſen hilft dieſes Mittel nicht immer, und ich habe daher einen andern Verſuch gemacht, der faſt immer meinen Abſichten entſprach.

Indem ich nämlich über die Urſachen nachdachte, die wohl das Zurückbleiben des Blüthenſtengels bewirken möchten, während die Blätter ungehindert fortwüchſen, erinnerte ich mich einer Beobachtung, die ich an Hyacinthen im freien Lande gemacht hatte. Sobald nämlich bei dieſen der Blüthenkopf anfängt ſich über die Oberfläche der Erde zu erheben, legen ſich die Blätter mehr oder weniger zurück, ja bei manchen faſt horizontal auf die Erde, und die Blüthe genießt ſo der vollen Einwirkung der Luft und des Lichtes, wodurch der Stengel zum Wachſen gereizt wird, während die Blätter eine Zeit lang anſcheinend im Wachſen zurückbleiben. Alſo den Wachsthum der Blätter zu beſchränken, und der Blüthe den vollen Genuß der Luft und der Wärme zu verſchaffen, mußte bewirkt werden, und die Natur ſchien hier den ſicherſten Weg zu zeigen. Ich bog alſo bei einigen in der Blüthe zurückbleibenden Hyacinthen die Blätter alle behutſam abwärts, ſo daß der größere, obere Theil derſelben noch unter der Horizontal=Linie zu liegen kam, und ſuchte ſie ſo lan=

ge in dieſer Lage zu erhalten, bis der Blüthenſtengel ſich zu der gehörigen Höhe erhoben hatte. Dabei ſtellte ich die Töpfe in eine 2 — 3° R. höhere Temperatur, was man in Treibhäuſern oder auch im Stubenfenſter ſchon dadurch erreicht, wenn man denſelben einen höher befindlichen Standort giebt, und ſorgte dafür, daß die Blüthe dem vollen Lichte ausgeſetzt war. Der Erfolg entſprach auch meinen Verſuchen, denn nach wenigen Tagen hatte ſich der Blüthenſtengel über die Blätter emporgehoben, und brachte die Blume zu gehöriger Vollkommenheit. Durch das Zurückbiegen der Blätter wurde alſo das Wachſen derſelben gehemmt, während der Stengel, durch gleichſam verſtärkten Trieb, ſich ungehindert erheben konnte. Ich theile dieſe Bemerkung andern Blumenfreunden zur weitern Beobachtung mit, und würde mich ſehr freuen, wenn auch bei ihnen dieſes Mittel gleich günſtige Wirkung hervorbringen ſollte. Man wird freilich dieſe Operation nicht früher vornehmen, als bis man wirklich ſiehet, daß die Blume gegen die Blätter zu ſehr zurückbleibt; doch warte man auch nicht zu lange, bis etwa die Blüthen ſchon ſich aufzuſchließen anfangen, wo ſonſt der Stengel dennoch ſehr zurückbleibt.

Eine neue Art, Nelken einzuſchneiden.

Wenn man, wie Schreiber dieſes, einige Hundert Stöcke im freien Grunde ſtehen hat, ſo iſt es zur Zeit des Einſchneidens derſelben bei der verſchiedenen Richtung der Zweige und bei der unangenehmen Stellung oder Knieung des Einſchneiders oft kaum möglich, dieſes Geſchäft mit der gehörigen Richtigkeit und Genauigkeit, die den Erfolg ſichern, vorzunehmen.

Folgende Methode, von der ich noch nie etwas geleſen, iſt aber in allen Richtungen und Lagen anwendbar, und wird wohl auch beim Einſchneiden im Topfe anzuwenden ſein.

Statt nämlich in den gewählten Knoten und aus dieſem aufwärts zu ſchneiden, ſticht man mit dem Federmeſſer da in die Mitte der Gliedeslänge, bis wohin der Einſchnitt gehen ſoll, durch, und fährt damit abwärts ſchneidend in der Mitte des Knotens oder Gelenkes heraus.

Dieß geht ungemein ſchnell, und wenn man dabei den Mittelfinger der linken Hand unterlegt, auch ſehr ſicher und gleichförmig vor ſich, und man kömmt nie in den unangenehmen Fall, den Schenkel zu dünne oder den Zweig gar abzuſchneiden, was bei dem gewöhnlichen Einſchneiden von unten hinauf ſich leider gar oft zuträgt.

Es ſoll mich freuen, wenn ich den Nelkenfreunden hier etwas Intereſſantes bekannt gemacht habe.

München, im Nov. 1833. (— — den.)

Ueber die Erziehung der Eriken, Rhododendren, Melaleuken, Metroſideren, Leptoſpermum u. ſ. w. aus Samen. (Fortſetzung.)

Mitgetheilt von P. aus W.

§. 5. Den nöthigen Winterſtand der Sämlinge erhalten dieſelben während des erſten Winters auf dem äußerſten Geſtelle dicht an den Fenſtern. Die volle Einwirkung des Lichtes iſt das Haupterforderniß im erſten Winter zur Erhaltung und Ausbildung der Samenpflanzen. Mangelt ihnen daſſelbe, ſo fangen ſie an zu kränkeln, die Vegetation wird geſtört, die meiſten bekommen kranke Wurzeln und gehen in den Wintermonaten zu Grunde. Man gieße während des Winters nur dann, wenn die Töpfchen ganz ausgetrocknet ſind und die Erde derſelben ſo beſchaffen iſt, daß ſie den Wurzeln keine Säfte mehr zuführen kann. Man unterſuche dieſes genau, ehe man gieße. Iſt die Erde unten noch naß, und man giebt den Pflanzen demungeachtet Waſſer, ſo können die Wurzeln die Säfte nicht alle ſchnell genug einſaugen, und es entſteht in den feinen Saftgefäßen der Pflanzen eine Stockung, die Poren der Blätter können, beſonders bei trüber Witterung, die angefüllten Saftgefäße nicht ſchleunig genug entledigen und ausſchwitzen, und die Folge davon iſt die Krankheit der Wurzeln. Man gieße übrigens auch nicht zu ſpärlich, oder etwa gar erſt dann, wenn die Pflanze, wie man ſagt, ſchmachtet und die Blätter hängen läßt. Hat man es ja ein Mal verſehen und die Pflanze zu ſtark austrocknen laſſen, ſo gieße man nur ganz wenig auf einmal, damit die Erde nur nach und nach befeuchtet, die welken Würzelchen allmählich ihre gehörige Ausdehnung wieder erhalten und der Pflanze neues Leben geben können.

Was das Lüften des Hauſes in den Wintermonaten betrifft, ſo nehme man hierzu das Thermometer zum Maaßſtab. Bei einer Temperatur im Freien von 8 — 10° R. Wärme lüfte man die Fenſter 2 Zoll ꝛc. Bei höherer Temperatur und Sonnenſchein lüfte man ſo viel als möglich, öffne die an der Decke befindlichen Luftlöcher und die an der Hinterwand angebrachten Zugkanäle. Sie werden nach dem Sinken der Temperatur wiederum geſchloſſen, und zwar ſo, daß das Haus nach dem Verſchluß der Luft noch 6° R. W. enthält.

(Fortſetzung folgt.)

Ueber Drosera rotundifolia.

So eben fällt mir beim Aufſuchen eines Citats Nro. 25. 1829. der Blumenzeitung in die Hände, und ich finde beim Durchblättern viele Merkwürdigkeiten von Drosera rotundifolia, einer angeblich engliſchen Pflanze erzählt. Hätte Deutſchland ſo viele Schillinge, als es Exemplare dieſer Pflanze aufweiſen kann, ſo wollten wir die engliſche Staatsſchuld abtragen und fragen, was Oſtindien und Peru werth ſeyen. Unſern ehrlichen Sonnenthau laſſe ich nicht angliſiren. Der Aberglaube erzählt ſich gar Wunderliches davon und die Homöopathie ſtrebt, ihm große Ehre zu geben.

S. △.

Ueber den Betrug herumziehender Blumenzwiebel-Händler.

Was für eine Clique von betrüglichen Blumenzwiebel-Händlern iſt es wohl, die faſt jedes Jahr in Deutſchland herumziehen, geſudelte Bilder von den zu hoffenden Blumen zeigen, deren Zudringlichkeit man ſich kaum erwehren kann, und die gern ihre Waaren um den vierten Theil des geforderten Preiſes geben, wobei man aber noch immer die angeführte Parthie bleibt. Oft wollen ſie ſogar ihre Waare auf Probe laſſen — was der honette Käufer ſelten annimmt und was ſie auch durch die nachträgliche Bitte zu umgehen wiſſen, ſie ſeyen vom Reiſegelde entblößt und man möge ihnen nur einſtweilen die Hälfte des geforderten Betrages geben. Denſelben Betrüger ſah ich nie wieder kommen, wohl aber tönte mir aus dem Munde ihrer wiederkehrenden Genoſſen ſtets der ächte ſchwäbiſche Dialekt entgegen. Ich warne jeden Blumenfreund vor dieſen Leuten.

S. △.

Anfrage und Bitte.

Durch künſtliche Befruchtung verſchiedener Paſſionsblumen mit einander iſt es mir ſchon zwei Sommer hindurch gelungen, Samen zu gewinnen, aber noch nie, denſelben zum Keimen zu bringen, obgleich ich verſchiedene Verſuche, z. B. in Waſſer mit Salzſäure verſetzt, angeſtellt habe. Sollte vielleicht einer der werthen Blumenfreunde, der Herren Hof- oder Handelsgärtner, Paſſionsblumen-Samen — beſonders ſelbſt gewonnenen — behandelt haben, ſo wird er recht ſehr gebeten, in dieſen Blättern bald möglichſt die Behandlungsweiſe gefälligſt mitzutheilen.

An mehrern andern Pflanzen von verſchiedenen Farben iſt es mir ebenfalls gelungen, durch künſtliche Befruchtung Samen zu gewinnen und dieſen zum Aufgehen zu bringen. So habe ich z. B. von der Anagallis Monelli (blau und roth) eine Spielart gewonnen, mit ganz mattem Lilla und zartem Roth durchaderte Blumen. Eine andere, zwar weniger von der Mutterpflanze abweichende, aber ſchönere Spielart mit lebhaft rothen Blumen und feuerrothen Staubfäden, welche bei der Mutterpflanze nach oben hellroth, nach unten weiß ſind. **H. Böttner.**

Bitte.

In Nro. 14. 1830. der Blumenzeitung wird gefragt: „Was iſt aus der Rieſenhortenſie des Herrn Regierungsrath Gottſchalk zu Ballenſtädt im harten Winter von 1829 bis 1830 geworden?"

Sie hat denſelben glücklich unter ihrer Bedeckung überſtanden, und ich ſah ſie im vorigen Sommer, von dem humanen Bewohner des freundlichen und netten Gartens auf die zuvorkommendſte Weiſe eingeführt, im ſchönſten Gedeihen.

Möchte es doch Herrn Regierungsrath Gottſchalk, welcher ſich früher ſchon ſo große Verdienſte um alle Freunde der ſchönen Natur durch ſein „Taſchenbuch für Reiſende in den Harz" erworben, gefallen, über die Bedachung und Sicherung des vorerwähnten herrlichen Naturprodukts, in dieſen Blättern eine ausführliche Nachricht zu ertheilen. Sie würde gewiß vielen Hortenſienfreunden ſehr willkommen ſeyn, und mit freundlichem Dank aufgenommen werden.

W. Steiger in S.

Beſchreibung einer neuen ſchönen Roſe.

Triumphe de Bollwiller. Eine Rosa bengalensis, durch künſtliche Befruchtung einer der ſchönſten bengaliſchen Roſen mit der Theeroſe, von Herrn Charles Baumann in Bollwiller erzeugt. Sie bildet einen ſtark aufſteigenden Strauch, der bis zur Höhe von 10 franz. Fuß und

darüber wächſt, und den Winter $\frac{1829}{1830}$ bei einer Kälte von 22° R. mit einer Bedeckung im freien Lande ausgehalten hat. Die Aeſte ſind lang, zum Theil verdreht, ganz glatt, von oben purpurkupferfarbig, von unten hellgrün, und an jedem Gelenke mit einem, zuweilen mit zwei, auch mehreren zuſammengedrückten, nach dem Aſt breit zulaufenden, gebogenen, ſehr ſpitzigen und kupferfarbigen Dornen beſetzt; die theilweiſe rückwärts ſtehenden Blätter beſtehen aus 7, zum Theil auch rückwärts ſtehenden, kurz geſtielten, elliptiſchen, zum Theil ausgeſchweiften, ſcharfgezähnten, faſt lederartigen, oben und unten glatten, ſchön dunkelgrünen Blättchen, die bei der Entfaltung ganz kupferfarbig erſcheinen. Der gemeinſchaftliche Blattſtiel iſt auf der halben Länge des untern Glieds geflügelt, die Flügel ſind gefranzt und mit lanzettförmigen, gefranzten Blattanſätzen beſetzt. Die Gelenke des gemeinſchaftlichen Blattſtiels ſind meiſt mit 1, zuweilen auch mit 2 Dornen bewaffnet, und wie die Aeſte oben kupferfarbig und unten grün. Die Knoſpen erſcheinen auf 1½ bis 2 Zoll langen, glatten, an der Baſis mit einem Knie verſehenen, kupferrothen und zuweilen ganz blaſſen Blumenſtielen, und in Büſcheln zu 3, 4, 5 und mehrern beiſammen. Der Fruchtknoten iſt ganz glatt, länglich rund, zuweilen cylindriſch. Die Mündung des Kelchs iſt 5ſpaltig; von den blätterartigen Lappen ſind 2 länglich ausgeſchweift und ſehr fein gefranzt; 3 von gleicher Form ſind theils gefiedert und fein gefranzt. Aus den eichelförmigen, carminpurpurrothen, olivengrünen und zuweilen ſtrohfarbigen Knoſpen entfaltet ſich eine reizend ſchöne, centifolienartige, große alabaſterweiße, zuweilen kugelförmige, nach feinem Thee riechende, etwa 3 Zoll breite, aus ungefähr 60 Blumenblättern beſtehende Roſe, welche nach dem Herz zu ſanft fleiſchfarbig geröthet iſt, und durch die in der Mitte befindlichen vielen goldfarbigen Staubgefäße in den reizendſten Farbenton überläuft, und bei kühler Witterung in's Roſenrothe übergeht. Die Blume hat an Form viel von der Centifolia unica oder laetea, übertrifft dieſe aber inſofern weit, da dieſer Strauch ſowohl wurzelächt im freien Lande und in Töpfen, als auch auf Rosa canina veredelt, beinahe das ganze Jahr hindurch blüht. Er kann als eine der ſchönſten Acquiſitionen für Roſenliebhaber betrachtet, und hoch- und niederſtämmig jeder Blumenparthie zur Zierde verwandt, und beſonders auch zur Bekleidung der Spaliere und Gartenhäuschen benutzt werden, da er, ſo lange die Vegetation vom Froſte nicht geſtört wird, fortwährend blüht. Für Blumentreibereien kann man ihn zur Winterflor empfehlen. Der Mutterſtamm ſtand 3 Jahr im freien Lande ohne zu blühen; ſeine Blume erſchien im Spätjahr 1830. Dieſe Roſe koſtet bei den Herren Gebrüdern Baumann zu Bollwiller, 4 und 5 Franken.

Aus der Revue horticole.

Neue ſchönblühende Pflanzen.

Phlox reflexa Sweet. Bot. Reg. Eine aus Nordamerika ſtammende Pflanze, die im Jahre 1830 in den Jardin des Plantes eingeführt wurde, und die ſchönſte aller bekannten Flammenblumen iſt. Sie perennirt im freien Lande wie die andern Arten; der Stengel iſt 3 Fuß hoch, purpurbraun punktirt; die Blätter ſind entgegengeſetzt, ſitzend, länglich-lanzettförmig, zugeſpitzt, glatt, dick, mehr oder weniger umgebogen. Die endſtändigen, in einer dichten Rispe ſtehenden Blumen ſind groß, purpurviolet, und lebhafter und prächtiger als jede andere Flammenblume. Die Abſchnitte des Rands der Blumenkrone ſind breit, ſie berühren ſich oder gehen übereinander, ein beſonderer Vorzug der Flammenblume.

Dieſe ſchöne Art blüht im September und zum Theil im Oktober. Wir können ſie allen Blumenfreunden beſonders empfehlen.

Costus Pisonis. R. Br. Gehört zur Familie der Scitamineen. Eine Pflanze aus Braſilien, mit einer dicken knolligen Wurzel, aus welcher ſich mehrere 2 bis 3 Fuß hohe, glatte, walzenförmige, einfache Stengel erheben, die mit geſtielten, eiförmigen, langgeſpitzten, 6 bis 7 Zoll langen, und

3 bis 4 Zoll breiten Blättern beſetzt ſind, deren bandförmiger Blattſtiel am Grunde eine Scheide bildet die den Stengel umfaßt. Die endſtändige dichte Blüthenähre beſteht aus großen, dachziegelförmigen, rothen Nebenblättern, zwiſchen welchen die dicken, rothen, über einen Zoll langen Blumen hervorkommen, welche um ſo auffallender erſcheinen, als der Bau der Blumen dieſer Familie etwas Beſonderes und Außergewöhnliches hat. Sie blühte im Jardin des Plantes im Monat September. Man hält ſie im Warmhauſe, giebt ihr Ananaserde und vermehrt ſie durch Wurzelzertheilung.

Varietäten.

Berlin. Am 10. Auguſt blühten im hieſigen königl. botan. Garten folgende ſchönblühende Pflanzen: Caraguata lingulata Lindl. (Tillandsia Jacq.) Aus Jamaica. Pholidota imbricata Lindl. Aus Nepaul. Statice purpur. L. Vom Vorg. d. g. Hoff. Salvia fulgens Cav. (S. cardinal. Humb.) var. floribund. und S. cyanea Nob. Aus Mexiko. Diplocoma villosa Don. (Doronicum villosum Sesse.) Aus Mexiko. Montanoa floribund. La Lave. Aus Mexiko. Moscaria pinnatifida R. et Pav. Aus Chili. Stenactus specios. Hort. angl. Aus Nordamerika. Encelia caulescens Cav. Aus Peru. Russelia scoparia Kunth. Aus Mexiko. Mammillaria tortulensis. Von der Inſel Tortula. Cereus Myosurus Salm (C. tenuis De C.) Aus Braſilien. Fuchsia baccillaris Bot. Mag. und F. arborescens. Aus Mexiko. Acacia undulaefol. Cunningh. und A. lineata Cunningh. Aus Neu-Holland. Pelargon. Comtoum Sweet. V. V. d. g. Hoff. Polyspora axillaris Sweet (Camellia axillar. Sims. Bot. Reg. Von der Inſel Puno Pinang. Malva Mouroana Don. Bot. Mag. Aus Columbia. Passiflora alata Ait. und P. al. var. coerulea. Aus Amerika. Passifl. aurantia Forst. (P. Herbertiana Ker. Bot. Reg.) Aus Neu-Calcedonien.

Bern in der Schweiz, den 20. Nov. 1833. (Auszug aus einem Schreiben von Herrn **May**, gew. Eidgenoſſiſchem Oberſt beim Gen.-Staabe in Bern.) So eben erhalte ich einen Brief vom Grafen M. de **Rouvroy** aus **Lille** (Ryſſel in Belgien), von welchem es im diesjährigen Jahrgange des Bon Jardinier heißt: Er habe Blumen der Tigridia pavonia mit 12 Blumenblättern und 6 Staubfäden aus Saamen erhalten. Auch ich habe in dieſem Sommer zum Erſtenmale, obwohl ich die Tigr. pav. ſeit 15 Jahren im Großen und zwar im Freien kultivire, aus alten Zwiebeln ebenfalls Blumen mit 6, wie ſonſt gewöhnlich mit 3 Blättern erhalten. Der Herr Graf de **Rouvroy** ſchreibt mir: daß Er auch Blumen mit 5 – 6 Blumenblättern und 5 Staubfäden erhalten habe, die nämlichen Zweige haben aber in der Folge wieder ganz einfache Blumen gegeben. Demohngeachtet zweifle Er gar nicht, daß durch fortgeſetzte Kultur die Tigridia ebenſo wie die Hyazinthen, Tulpen und andere Blumenzwiebeln zum **Doppeln** gebracht werden können, — — was Er wie ich nun durch fortgeſetzte Proben zu erhalten ſuchen wollen. Herr Graf de **Rouvroy** ſagt mir: Er habe den Verſuch gemacht, die Erythrina Crista galli im Freien zu ziehen, und Samen davon erhalten. Die neueſten Pflanzen in Belgien ſeyen: die Petunia integrifol., eine Camellia triumphans, eine gelbe bengaliſche Roſe, eine Passiflora phoenicea etc.

Schönbrunn, den 7. Nov. 1833. In den Gewächshäuſern des k. k. Hofgartens blühen jetzt folgende Gewächſe: Banksia integrifolia. (R. Br.) Aus Neu-Süd-Wallis. Proteac. Tetrand., Monog. — Cactus (Rhips.) squamulosus. (Salm.) Aus Braſilien. Cacteae. Decand., Monog. — Chamaerops humilis. (Linné.) Aus Süd-Europa. Palmae. Poligam., Dioec. — Correa speciosa. (Andrews.) Aus Neu-Süd-Wallis. Rutac. Octand., Monog. — Crowea saligna. (Smith.) Aus Neu-Süd-Wallis. Rutac. Decand., Monog. — Erica Sebana. (Aiton.) Vom Vorg. d. g. Hoff. Eric. Octand., Monog. — Fuchsia arborescens. (Sessé.) Aus Mexiko. Onagrar. Octand, Monog. — Illicium parviflorum. (Michaux.) Aus Florida. Polyandria,

Polygyn. — Isodon plectranthoides. (Hortorum.) Vaterland unbekannt. Labiat. Didynam., Gymnosperm. — Oxalis Bowii. (Hortorum.) Vaterland unbekannt. Oxalid. Decand. Pentag. — Statice purpurata. (Jacquin.) Vom Vorg. d. g. Hoff. Plumbagin. Pentand., Pentag.

Paris. Die Georginen behaupten noch immer den erſten Rang unter den Gartenblumen, und die Zahl der gefüllten ſchönen Varietäten, die jährlich aus Samen neu erzogen werden, geht ins Unendliche. Unter den Blumenfreunden findet man die ſchönſten Dahlien-Sammlungen bei den Herrn **Corby**, **David**, **Roblin** und de **Bugny** zu Paris und bei Herrn **Souchet** zu **Fontainebleau**. Während ſich dieſe mit einer kleinen Auswahl der ſchönſten Sorten begnügen, findet man in den Gärtnereien die zahlreichſten Sammlungen zum Verkaufe geſtellt, und zwar vorzüglich bei Herrn **Cels**, Herrn **Noiſette**, den Herren Gebrüdern **Jacquin**, Herrn **Paillet**, Herrn **Découflé** zu **Paris**, bei Herrn **Soulange Bodin** im Garten-Inſtitut zu **Fromont**, und die Sammlung des Herrn **Souſtif** bei Herrn **Fulchiron** zu **Paſſis**. Man cultivirt neben den hohen und Zwerg-Dahlien jetzt auch beſonders die kugel- und anemonenblüthigen. Im vergangenen Jahre wurden im Garten-Inſtitut zu **Fromont** nicht weniger als 3 Morgen Lands mit Sämlingen von Zwerg-Dahlien bepflanzt.

(**Vertilgung der Schwämme in Lohbeeten.**) In den Lohbeeten der Treibhäuſer entwickeln ſich oft und wiederholt Schwämme, die ſich auch über die Erde in den Töpfen ausbreiten, die Pflanzen beſchädigen und leicht tödten. Man nehme alle Töpfe aus dem Lohbeete, und ebne es ſorgfältig, worauf man das ganze Beet mit Urin begießt, ſo daß die Feuchtigkeit gleichmäßig in die Lohe einzieht. Nach einem halben Tage kann man die Töpfe ſchon wieder hinſtellen, und der Reinlichkeit halber breitet man nur einen Finger hoch friſche Lohe über die alte her.

Bibliographiſche Notiz über Blumiſtik.

Der Wintergärtner, oder Anweiſung, die beliebteſten Modeblumen oder Zierpflanzen ohne Treibhäuſer und Miſtbeete in Zimmern, Kellern und andern froſtfreien Behältern zu überwintern, oder für den offenen Garten vorzubereiten. Nach eigenen Erfahrungen bearbeitet von Dr. F. G. **Dietrich**, Großherzogl. Rath und Prof. der Botanik zu Eiſenach. 5te verbeſſ. und vermehrte Aufl. Ulm 1833. Ebnerſche Buchhandlung.

Der Verfaſſer hatte die Abſicht, den Blumenfreunden, welchen keine Gewächshäuſer zur Pflanzen-Ueberwinterung zu Gebot ſtehen, eine Sammlung der vorzüglichſten Zierpflanzen, die ſich durch Anſtand, Wuchs, Geſtalt und Schönheit der Blumen vortheilhaft auszeichnen, und gut in dem Zimmer oder in andern froſtfreien Pflanzenbehältern durchwintert werden können, hiermit zu übergeben. Jeder Blumenfreund wird für ſeinen Geſchmack hinreichende Befriedigung in der Auswahl finden, beſonders da in einem reichlichen Nachtrage viele der neuern Blumenpflanzen abgehandelt worden ſind. Die Zuſammenſtellung der Pflanzen iſt nach den natürlichen Familien geordnet. Die Beſchreibungen ſind deutlich und beſtimmt, und die Culturmethoden nur auf eigene Erfahrungen gegründet.

(**Berichtigungen.**) In Nr. 23. d. Bl. ſoll es heißen: S. 181, Z. 19 v. oben Araucaria ſtatt Oraucaria. — S. 180, Z. 30 v. oben Vespa florisomnis ſtatt floriformis. — S. 183, Z. 6 v. unten Cuphea Claveana ſtatt Cuph. Llaveana.

Gotha, d. 20. November 1833. Beiliegender Catalog von einer reichen Sammlung **ächt gefüllter Georginen**, ſchöner, neuer und ganz neuer Sorten, kann ich allen Georginenfreunden vorzüglich empfehlen. Nur muß ich höflichſt bitten, die Beſtellungen ſo bald als möglich einzuſenden, indem die im vorigen Jahre zu ſpät eingegangenen gar nicht mehr expidirt werden konnten.

Joh. Casp. Grimm,
exped. Mitglied mehrerer Gartenbau-Vereine ꝛc.

Hierbei noch eine **zweite** Beilage: „Verzeichniß von Blumen- und Gemüſe-Saamen des Herrn **Friedrich Hauſche** in **Weimar**.“

Sächs. Cour.	Thlr.	Gr.
Camellia		
striata Sinensis	5	—
superba	3	—
[illegible]	3	—
variegata plena	1	—
venusta	3	
virginalis		—
Waratah alba	[illegible]	
— grandiflora	2	—
Weymaria	2	—
Welbankiana	2	—
Wilbrahamia	4	—
Wiltoniana	3	—
Woodsia	3	—
Canna		
iridiflora w.	1	—
Carissa		
spinarum w.	—	16
Catleya		
Forbesii	4	—
Chamaerops		
humilis	3	—
Chrysophyllum		
argenteum w.	1	—
Cainito w.	1	—
splendens w.	1	—
Citrus		
bergamotta bicol.	1	—
Bigaradia bicol.	1	—
— sans pareille	1	—
— violacea	1	—
Brasiliensis	—	16
de Bolabara	1	—
decumana (Pomp.)	—	16
— fol. variegat.	2	—
hermaphrodita	1	—
japonica	—	16
Limonia à petit fruit	1	—
— de la Calabre	1	—
— melarosa	1	—
— monophylla	—	16
Mandarine	1	—
Maran d'Espagne	1	—
myrtifolia	—	16
— fol. aur. var.	2	—
Perette Noattelle	1	—
Sinensis	1	—
Clethra		
arborea fol. var.	1	—
Clusia		
flava w.	2	—
Coccoloba w.		
macrophylla	20	—
pubescens	10	—
Correa		
alba	—	16
pulchella	2	—
speciosa	2	—
Crataegus		
Indica (Rophiol.)	—	16
Crataeva		
Tapia w.	1	—
Crinum		
amabile w.	5	—
Careyanum w.	5	—
erubescens w.	—	16
giganteum w.	1	—
superbum w.	5	—
zeylanicum w.	1	—
Croton		
variegatum w.	1	—
Crowea		
saligna	1	—
Cupressus		
australis	—	16
sempervirens	—	8
Cussonia		
spicata	2	—
Cyclamen		
Coum	—	6
Cypripedium		
[illegible] w.	2	—
pubescens	2	—
spectabile	2	—
Cyrtanthus w.		
obliquus (stark)	5	—
Cyrtopodium		
speciosum	10	—
Cytisus		
purpureus	—	12
Daphne		
Cneorum	—	16
— erecta	1	—
— maxima	1	—
collina	1	—
[illegible]	1	—
margin. Indic. rub.	2	—
odora	—	16
[illegible]	1	—
Dendrobium		
moschatum w.	3	—
Didymocarpus		
Rexii w.	—	12
Dillwynia		
cinerascens	—	16
Dionaea		
Muscipula	3	—
Diosma		
ciliata	—	16
— villosa	—	16
fragrans	3	—

	Thlr.	Gr.
Diosma		
hirsuta	1	—
speciosa	1	—
[illegible]	1	—
uniflora	1	
pilosa	—	16
Dracaena w.		
Boscii (Bon. jun.)	1	—
Brasiliensis w.	3	—
marginata w.	1	—
terminalis rosea	2	—
Echites		
grandiflora w.	1	—
Elaeodendrum		
orientale w.	2	—
Elichrysum		
fasciculatum	—	16
humile	2	—
spectabile	2	—
vestitum	2	—
Embothrium		
salicifolium	1	—
silaifolium	1	—
Embryopteris		
glutinifera	2	—
Epacris		
diosmaefolia	1	—
grandiflora	1	—
juniperina	1	—
paludosa	1	—
pulchella	1	—
pungens	1	—
purpurascens	1	—
rosea	3	—
Epidendron		
cochleatum w.	1	—
Erica		
abietina	1	—
ardens	2	—
baccans	—	16
Blandfordiana	1	—
concinna	1	—
coralloides	1	—
costata superba	1	—
cruenta	1	—
declinata	1	—
elata	1	—
floribunda	—	16
gracilis	—	16
grandiflora	1	—
— longifolia	1	—
hirta rubra	1	—
— viridis	1	—
hybrida	1	—
incana rubra	—	16
incarnata major	—	16
mammosa	1	—
margaritacea	—	16
Massoni	1	—
nigrita	—	16
Plukenetii	1	—
pomifera	1	—
praegnans	1	—
pyrolaeflora	1	—
quadriflora	1	—
ramentacea	—	16
reflexa	—	16
regerminans	—	16
rosea	1	—
sessiliflora	4	—
speciosa	2	—
stellifera	[illegible]	—
taxifolia	1	—
triumphans	1	—
tubiflora	—	16
Uhria	1	—
ventricosa	1	—
versicolor	1	—
verticillata	2	—
vestita coccinea	2	—
viridiflora	1	—
viscaria	1	—
vulgaris fl. pleno	—	16
Eriospermum		
lanceaefolium	—	12
latifolium	—	12
Eriostemum		
lanceolatum	2	—
Erisma		
latifolia w.	1	—
Escalonia		
floribunda	—	12
Eucalyptus		
neosioides	1	—
aspera	1	—
botryoides	1	—
capitellata	1	—
corymbosa	1	—
microphylla	1	—
pulverulenta	1	—
robusta	1	—
stricta	1	—
Eugenia		
australis	—	12
Jambos	1	—
macrophylla w.	1	—
Euphorbia		
meloformis w.	3	—
Eutaxia		
myrtifolia	—	12

	Thlr.	Gr.
Fabricia		
myrtifolia	—	12
Ficus		
nymphaeifolia w.	5	—
[illegible]		
arborea	1	—
excorticata	1	—
gracilis	—	16
macrostrea	—	16
microphylla	—	16
Galanthe		
veratrifolia w.	5	—
Gardenia		
florida, fl. pl. w.	—	16
radicans	—	16
Thunbergia w.	1	—
Gesneria		
bulbosa	2	—
Gloxinia		
caulescens w.	—	16
hirsuta w.	1	—
speciosa w.	—	8
— alba w.	—	8
Glycine		
bimac. (Kenn. mon.)	—	16
macrophylla (Kenn. cord.)	—	16
Gompholobium		
grandiflorum	1	—
Goodyera		
discolor	1	—
Gordonia		
Lasianthus	1	—
Grevillea		
Baueri	1	—
buxifolia	2	—
juniperina	1	—
linearis	—	16
punicea	1	—
rosmarinifolia	—	16
sulphurea	1	—
Haemanthus		
albiflos w.	1	—
coccineus w.	1	—
multiflorus w.	5	—
Hakea		
acicularis	—	16
amplexicaulis	—	16
cinerea	1	—
dactyloides	—	16
epiglottis	—	16
florida	—	16
glabra	—	16
nitida	1	—
pinifolia	—	16
pubescens	1	—
pugioniformis	—	16
rubricaulis	—	16
ruscifolia	1	—
saligna	—	16
suaveolens	—	16
Hedychium		
carneum w.	1	—
coccineum w.	1	—
elatum w.	1	—
flavum w.	1	—
Gardnerianum w.	1	—
longifolium w.	1	—
maximum w.	1	—
spirale w.	1	
Heliconia		
Bihai w.	1	—
Hernandia		
uvifera w.	3	—
Hibiscus		
rosa Sinensis, flore pleno w.	1	—
Ilex		
aquifolium, fol. var.	1	—
Illicium		
floridanum	1	—
Inga		
unguis cati (Mim.)	1	—
Ixora w.		
cuneifolia	1	—
paniculata	1	—
undulata	1	—
Jacaranda		
filicifolia	2	—
Jacksonia		
lucida	1	—
Jacquinia		
aurantiaca w.	3	—
Jasminum		
azoricum	—	12
flexile w.	—	16
gracile w.	—	12
grandiflorum	—	12
hirsutum w.	—	16
lanceolatum w.	—	16
Laudonianum w.	—	16
multiflorum w.	—	16
Nepaulense	1	—
odoratissimum	—	8
revolutum w.	—	16
Sambac w.	—	16
— fl. pleniss. w.	1	—
trifurcatum	—	16

	Thlr.	Gr.
Jatropha		
urens w.	1	—
Juniperus		
gracilis	—	16
Kalmia		
angustifolia	—	16
glauca	—	16
latifolia	1	—
nitida	—	16
pumila	—	16
Kennedia		
cordata (Gly. bim.)	—	16
monophylla	—	16
prostrata	1	—
Lachenautia		
formosa	—	16
oblata	—	16
Lachnaea		
conglomerata	1	—
purpurea	2	—
Lambertia		
formosa	1	—
Lantana		
Seloniana	—	16
Lasiopetalum		
purpureum	—	16
Laurus		
Camphora	2	—
Cassia w.	2	—
Cinnamomum w.	3	—
Culilaban w.	1	—
glauca	1	—
gracilis	1	—
nitida w.	3	—
Limodorum		
Tankervillea w.	—	16
Liparia		
sphaerica	1	—
Liriodendron		
fragans (Magn. pum.)	1	—
Lomatia		
longifolia	—	16
salaifolia	1	—
Magnolia		
acuminata	2	—
annonaefolia	1	—
auriculata	5	—
glauca 8 gr. bis	1	—
gracilis	1	—
grandiflora	1	—
— Exmouth.	2	—
— rotundifol.	1	—
— salicifolia	1	—
pumila (Lir. fr.)	1	—
purpurea	1	—
Soulangiana	6	—
Thomsoniana	5	—
tripetala	2	—
Yulan (conspic.)	3	—
Mantisia		
saltatoria w.	1	—
Maranta		
bicolor w.	1	—
Curcuma longa w.	1	—
grandis w.	2	—
truncata w.	1	—
zebrina w.	—	16
Mirica		
coerulea w.	1	—
Melaleuca		
bruniades	1	—
cordata	—	16
decussata	—	16
pulchella	—	16
splendens	—	16
suaveolens	—	16
Melastoma w.		
hirsuta	1	—
Malabathrica	2	—
spicata	1	—
Menziesia		
globularis	—	12
Metrosideros		
lanceolata	—	16
linearis	—	16
Lophantha	—	16
marginata	—	16
pinifolia	—	16
sphaeroides	—	16
Mimetes		
purpurea (Prot.)	—	16
Mimosa		
unguis cati w.	1	—
violacea w.	1	—
Murraya		
exotica	1	—
Musa		
coccinea w.	1	—
Myrtus		
Pimenta aromat. w.	2	—
tomentosa	1	—
Nerium		
coronarium flor. albo pleno w.	1	—
Oleander		
— atropurpureum	1	—
— luteum	1	—
— multiflorum pl.	1	—

	Thlr.	Gr.
Nerium		
Oleander		
— speciosum	1	—
— splendens	—	12
Nymphaea w.		
coerulea	1	—
[illegible]	2	—
rubra	2	—
stellata	2	—
versicolor	2	—
Olea		
Capensis	1	—
fragrans	1	—
Maderensis	1	—
marginata w.	1	—
Ornithodium		
coccineum w.	3	—
Paeonia		
arborea	2	—
papaveracea	4	—
Pancratium w.		
Americanum	1	—
amoenum	1	12
angustum	1	12
Canariense	1	12
declinatum	3	—
formosum	2	—
littorale	1	8
multiflorum w.	1	—
nutans	2	—
rotatum	2	—
Passiflora w.		
alata	1	—
carmosina	1	—
insignis	1	—
quadrangularis	1	—
Penaea		
mucronata	1	—
Pereskia w.		
grandifolia	2	—
Pethrophila		
pedunculata	1	—
Phoenix		
silvestris w.	1	—
Phormium		
tenax	—	16
Phylica		
plumosa	—	16
Pimelea		
decussata	4	—
glauca	2	—
incana	2	—
linifolia	1	—
Pinknea		
pubescens	2	—
Pinus		
Canariensis	1	—
palustris	3	—
Pittosporum		
revolutum	1	—
Sinense	1	—
undul. fol. varieg.	1	—
Platilobium		
microphyllum	1	—
Plumeria		
longifolia	1	—
Polygala		
bracteata	—	16
Chamaebuxus	—	16
myrtifolia	—	16
obcordata	1	—
speciosa	1	—
spinosa	1	—
Porliera		
hygrometrica w.	1	—
Primula		
Chinensis	—	8
Prostranthera		
Lasianthus	1	—
violacea	—	16
Protea		
anethifolia	1	—
carnosa	1	—
crithmifolia	2	—
purpurea (Mimet.)	—	16
triternata (Serr.)	1	—
Pterospermum		
acerifolium w.	2	—
Punica		
Granatum fl. pl.	—	16
nana fl. simpl.	1	—
Pyrus		
japonica fl. cocc.	—	12
Renanthera		
lutea w.	3	—
Rhododendron		
arbor. argent.	3	—
azaleoides	1	—
— odoratum	1	—
catabiense	—	15
dauricum	1	—
— atrovirens	1	—
glomeratum	1	—
hybridum	1	—
maculatum	3	—
marginatum	1	—
maximum album	1	—
— roseum	1	—
ponticum 8 gr. bis	2	—
— fol. albo-marg.	2	—
fol. aureo vieg.	1	—
punctatum	—	15
rosmarinifolium	1	

	Thlr.	Gr.
Rhodora		
Canadensis	—	
Robinia		
Chamlagu	—	
Rosa		
A.) Rosiers de Noi		
Amaranthe double		
belle Italienne	—	1
bois de Caryambose	—	1
Carbonari	—	
carnea	—	
delices de Bourbon	—	1
fleur rose et blanche	—	
forme de Pompon	—	1
Mechin	—	1
paniculata	—	1
petales roulés	—	1
pourpre noir	—	1
printems	—	1
Robert	—	1
rose d'hortense d'un grand effet	—	1
rouge	—	1
sempervirens	—	1
spectabilis	—	1
B.) Semperflorens-Rosen		
camellia	—	16
comptoniana	—	12
feuilles de chanvre		12
formosa	—	12
Granval	—	16
hermite	1	—
Laurentii fl. pl.	—	16
monza	—	12
purpurea grandiflora	—	16
unica	1	—
violet clair	—	16
C.) Thee-Rosen.		
carnea	—	16
lutea	1	—
microphylla	1	—
Reine de Golconde		16
sarmenteuse	1	—
venustissima	2	—
Rubentia		
angustifolia	1	—
Ruellia		
grandiflora	1	—
Salpiglossis		
atropurpurea	1	—
Salvia		
involucrata	—	16
Sanseviera		
Guineensis w.	1	—
Saracenia		
purpurea	4	—
Scilla		
maritima	—	16
Selago		
myrtifolia	1	—
Serruria		
triternata (Prot.)	1	—
Sophora		
microphylla	—	16
tetraptera	—	16
Sprengelia		
incarnata	3	—
Statice		
speciosa	1	—
Tartarica	1	—
Stenanthera		
pinifolia	3	—
Stenochilus		
maculatus	1	—
Strophanthus		
dichotomus	1	—
Stuartia		
Malachodendron	1	—
Taxus		
longifolia	—	16
Templetonia		
retusa	2	—
Thamus		
Elephantipes w.	5	—
Thea		
Bohea	1	—
viridis	1	—
Theophrasta		
Americana w.	15	—
integrifolia w.	1	—
longifolia w.	1	—
Thunbergia		
grandiflora w.	2	—
Tradescantia		
fuscata w.	3	—
Tristania		
conferta	1	—
laurina	1	—
neriifolia	1	—
Vaccinium		
corymbosum	—	12
Veltheimia		
viridifolia	—	16
Verbena		
Melanthris	—	16
Wrightia		
coccinea w.	3	—
Xeranthemum		
proliferum	1	—
Yucca		
Draconis fol. var.	5	—
Zamia		
cycadis w.	20	—
pungens w.	30	—
[illegible] w.	6	

Catalog für das Jahr 1833

der

schönsten und auserlesensten ächten

Haarlemer Blumen-Zwiebeln,

von

E. H. Krelage,

Blumist in Haarlem,

in Commission

bei

Herrn Joh. Casp. Grimm

in der Neudietendorfer Commissions-Handlung

in Gotha.

NB. Die folgenden Blumenzwiebeln werden sowohl stückweise, als auch in Rummel von 100, 75, 50, 25 und 12 Stücken abgegeben. Die am allerfrühesten zu treiben sind, habe ich mit *, diejenigen, welche langsamer gezogen werden müssen, mit † bezeichnet; die nicht bezeichneten kommen nur im Freien, in dem Garten fort. Uebrigens können die Herren Abnehmer versichert seyn, dass die grössten und ächtesten Zwiebeln geliefert werden, wofür ich garantire.

E. H. Krelage, Blumist.

Hyacinthen.

Nr.		Thl.	gl.
	* Beste gefüllte schöne Hyacinthen ohne Namen in Rummel, von diversen Farben und Sorten, zur Stuben- und Gartenflor geeignet, 100 Stück	6	—
	* Schöne gefüllte Hyacinthen in Rummel, wovon jede Hauptfarbe besonders gepackt ist, als ⅓ rothe und rosa, ⅓ weisse und gelbe, ⅓ hell- und dunkelblaue, 100 Stück	8	—
	* Beste einfache Hyacinthen ohne Namen, in Rummel, von vielen Sorten und Farben melirt, alle geeignet zur Stuben- und Gartenflor, 100 Stück	6	—
	* Schöne einfache Hyacinthen in Rummel, wovon jede Hauptfarbe besonders gepackt ist, als ⅓ rothe und rosa, ⅓ weisse und gelbe, ⅓ hell- und dunkelblaue, 100 Stück	8	—

Doppelte oder gefüllte dunkelrothe Hyacinthen.

Nr.		Thl.	gl.
1	* Boerhaven, dunkelroth, schön, pr. Stück	—	5
2	* Bouquet tendre, dunkelroth ext. ext.	—	6
3	* Hersilia, extra Prachtblume	—	8
4	* Raphaël	—	6
5	† Carmoisin royal, extra	—	4
6	* Rex rubrorum, extra	—	12

Doppelte oder gefüllte rothe Hyacinthen.

Nr.		Thl.	gl.
7	* Bouquet aimable, früh und schön	—	4
8	* Honnel, sehr schön	—	4
9	* Comte de la Coste, gross extra	—	10
10	* Delice de Flora, gross extra	—	5
11	* Delice du printemps, schön	—	5
12	* Dido, schön	—	3
13	† Diadème de Flora, gross extra	—	3
14	* Duchesse de Parma, rosa extra	—	4
15	† Emilia Galotti, schön	—	4
16	* Eudorus, sehr schön	—	4
17	† Euterpe, gross	—	4
18	* Flos sanguineus, extra schön, mit Grün	—	8
19	* Illustre pyramidale, früh	—	3
20	† La superbe royale, schön	—	3
21	* Madame Zoutman, gross extra	—	5
22	* Marie Louise, extra schön	—	10
23	* Rosenkranz von Flora, sehr schön und früh	—	5
24	* Rouge bleuâtre, schön, blau, roth	—	4
25	* Rouge charmante, extra	—	3

Doppelte oder gefüllte rosenrothe Hyacinthen.

Nr.		Thl.	gl.
26	† Agathe Catharina, extra schön	—	4
27	* A la mode, schön	—	4
28	† Bouquet royale, grosse Prachtbl.	—	20
29	* Brautkleid, extra	—	4
30	* Grossfürst, gross extra, Prachtbl.	—	4
31	* Hugo Grotius, schön	—	4
32	Il pastor fido, früh	—	2
33	* Julia, extra	—	4
34	† L'honneur d'Amsterdam, gross, Prachtblume	—	7
35	* Lord Castlereagh, schön	—	3
36	† Demetrius Soter, sehr schön	—	4
37	† Rose sceptre, gross extra	—	5
38	* Prince Roos, schön	—	2½
39	* Rose mignon, schön	—	2

Doppelte oder gefüllte weisse Hyacinthen.

Nr.		Thl.	gl.
40	Anna Maria, gross extra	—	5
41	Bucentaurus, blendend weiss, extra	—	5
42	* Carolina, schneeweiss, extra	—	6
43	* Dageraad, früh und schön	—	2
44	* Francisca, früh und schön	—	4
45	* Gloria florum, sehr gross	—	5
46	* Hermine, extra	—	3
47	* Jeanette, extra	—	5
48	* La déesse, extra schön	—	7
49	* Mathilde, Prachtblume, extra	—	8
50	* Minerva, schön	—	3½
51	* Sultan Achmet, stark gefüllt, extra	—	5
52	* Sphaera mundi, blaue Herz, Prchtbl.	—	8
53	* Triumph Blandina, extra	—	5
54	* Virgo, extra	—	4
55	† Virgo maximum, gross extra	—	5

Doppelte Hyacinthen, Weiss mit Gelb.

Nr.		Thl.	gl.
56	† Aster, blendend weiss mit gelb	—	4
57	* Couronne blanche, extra	—	3
58	* Don gratuit, sehr schön	—	3
59	* Grand triumph, schön	—	3
60	† Gräfin v. Wehlren, gross, gefüllt	—	2
61	* Nanette, früh extra	—	2½
62	† Sceptre d'or, extra von Geruch	—	4

Doppelte oder gefüllte gelbe Hyacinthen.

No.		Thl.	gl.
63	* Bouquet d'orange, extra Prachtbl.	—	5
64	* Iris de l'or, schön	—	4
65	* Louis d'or, extra	—	5
66	* L'or végétable, schön	—	3½
67	* Ophir d'or, allergrösste	—	3
68	* Pyramyde de jeaune, extra	—	6

Doppelte oder gefüllte Hyacinthen Weiss mit Roth u. Incarnat.

No.		Thl.	gl.
68a	* A la mode, gross extra	—	5
69	† Bijoux des amateurs, schön	—	3
70	† Coeur noir, stark gefüllt mit schwarz extra	—	4
71	† Constantin Elisabeth, gross extra	—	3
72	* Duc de Valois, extra	—	5
73	* Furius Camillus, extra gross	—	6
74	* Grand monarque, extra gross	—	8
75	* Gekroond Juweel van Haarlem, sch.	—	2½
76	* Passe virgo, früh und schön	—	2
77	† Penelope, schön	—	2½
78	* Princesse Louise, extra	—	4
79	† Roi de Bassan, stark gefüllt, extr. gr.	—	8
80	† Violet superbe, gross extra	—	3

Doppelte schwarzblaue Hyacinth.

No.		Thl.	gl.
81	* Buonaparte, Prachtbl., extra gross und schön	—	16
82	* Bleu foncé, schön	—	3½
83	* Couronne des Indes, extra	—	6
84	* Dalumes, schön	—	3
85	* König Sperus, schön	—	3
86	* Mon ami, schön	—	3
87	* Nigritienne, schön	—	3
88	† Velours pourpre, gross	—	3

Doppelte oder gefüllte dunkelblaue Hyacinthen.

No.		Thl.	gl.
89	* Activiteit, früh extra	—	3
90	* A la mode, extra	—	4
91	* Belle mode, extra	—	4
92	* Duc de Normandie, früh extra	—	4½
93	* Duc Louis de Brunsvic, extra	—	4
94	* Graaf Floris, schön	—	3
95	* L'amitié, schön	—	4
96	* L'illustre, halb gefüllt, Prachtbl.	—	4
97	* Lord Wellington, extra Prachtbl.	—	10
98	* Lord Noel, extra Prachtblume	—	5
99	† Maréchal de France, gross extra	—	4
100	* Martinet, Prachtblume, extra	—	10
101	* Mignon van Dryfhout, extra	—	4
102	* Orondates, früh, extra gross	—	9
103	* Passe Polychrates, sehr schön	—	6
104	* Passe tout, früh extra	—	3
105	* Prinz Heinrich von Preussen, extra	—	3
106	* Roi de Mogol, gross	—	4
107	* Rus Riga, früh	—	3
108	* Rudolphus, Prachtblume, extra	—	8
109	* Violet foncé, extra	—	5

Doppelte oder gefüllte hell- und porcellainblaue Hyacinthen.

No.		Thl.	gl.
110	* Belle Agathe, schön	—	4
111	* Bucentaurus, früh extra	—	4
112	* Comte de Bentink, mit violet, extra	—	6
113	* Comtesse de Salisbury, schön	—	4
114	* Duc d'Anjou, sehr schön	—	4
115	* Duc de Luxembourg, bunt extra	—	6
116	† Globe terrestre, gross Prachtblume	—	5
117	* Grand Grisdelyn, extra	—	5
118	* Habit brillant, extra Prachtblume	—	5
119	* König Assingarius, extra Prachtbl.	—	5
120	* La bien aimé, schön	—	2
121	* Pasquin, Prachtblume, gross	—	6
122	* Parmenio, Prachtblume, extra	—	6
123	* Porcelaine Sceptre, extra	—	5
124	* Roi Josaphat, extra	—	5

Frühe einfache dunkelrothe Hyacinthen.

No.		Thl.	gl.
125	* Belle Diane, extra	—	6
126	* Bouquet tendre, besonders schön	—	16
127	* Hergestellter Friede, oder Gellert, extra	—	5
128	* Felicitas, extra zu empfehlen	—	12
129	* La victoire, extra	—	4
130	* Lefrank van Berkley, extra zu empf.	1	—
131	* L'eclair, feuerroth, extra Prachtbl.	1	—
132	* L'eclatante parfaite, extra	—	6
133	* Mars, extra, mit grünen Spitzen, Prachtblume	1	—
134	* Princesse Charlotte, extra	—	10
135	* Prince Albert, extra Prachtblume	—	6

Frühe einfache rothe Hyacinthen.

No.		Thl.	gl.
136	* Aimable Rosette, extra	—	3
137	* Ariadne, sehr schön	—	10
138	* Cardinal, extra schön	—	6
139	* Cato, schön	—	3
140	* Henriette Wilhelmine, extra	—	6
141	* Homerus, früh	—	8
142	* Lord Wellington, gross extra	—	8
143	* Montebello, schöne Blume	—	1
144	* Palais von Utrecht, extra	—	5
145	* Plaisir des Dames, extra Prachtbl.	—	16
146	* Thalia, früh	—	3

Einfache rosenrothe Hyacinthen.

No.		Thl.	gl.
147	* Apollonia, extra	—	4
148	* Acteur, schön	—	3
149	* Actrice, schön	—	4
150	* Emilius, extra Prachtblume	—	6
151	* Konigskroon, extra schön	—	5
152	* Johanne Christine, extra Prachtbl.	—	8
153	* La blanc, extra gross glockig	—	6
154	* La Mignonne, schön	—	3
155	* Lord Nelson, extra Prachtblume	—	10
156	* L'honneur de Sassenheim, extra	—	3
157	* Madame de Pompadour, sehr schön, mit gelb	—	1
158	* Pronkjuweel, gross und schön	—	6
159	* Temple d'Apollo, extra	—	8

Frühe einfache weisse Hyacinthen.

No.		Thl.	gl.
160	* Belle Galathée, schön	—	2½
161	* Blandina, gross und schön	—	3½
162	* Duc de Cumberland, extra	—	4
163	* Gravin van Tuyllingen, früh u schön	—	3
164	* Grand blanche imperiale, extra	—	6
165	* Grand Vainqueur, gross extra	—	6
166	* Grandeur triomphante, schön	—	2
167	* Hercules, gross extra	—	8
168	* La Candeur, extra Prachtblume	—	10
169	* Monarque du Monde, extra	—	4
170	* Pigeon, schön	—	2
171	* Premier noble, extra	—	3
172	* Prince de Gallitzin, extra	—	6
173	* Pronkjuweel, extra	—	5
174	* Staatsraad, Prachtblume	—	8
175	* Staaten Generaal, extra	—	4
176	* Triumph Blandina, extra	—	4
177	* Millium Feise, schön	—	4

Frühe einfache gelbe Hyacinthen.

No.		Thl.	gl.
178	* Adonis, schön	—	3
179	* Belle Galathée	—	5
180	* Kenau Hasselaar, extra	—	4
181	* La plus, schön	—	2
182	* Prince d'Orange, extra	—	4
183	* Ueberwinder, extra	—	5

Frühe einfache schwarzblaue Hyacinthen.

No.		Thl.	gl.
184	* Aigle noir, schön	—	3
185	* Appius, extra	—	4
186	* Baron Haerdt, extra Prachtblume	—	6
187	* Emirus, gross extra	—	3
188	* Königsmantel, extra Prachtblume	—	6
189	* La Crepuscule, extra Prachtblume	—	5
190	* L'amie du coeur, extra zu empfehlen	—	2
191	* Napoleon, extra Prachtblume	—	8
192	* Vulcan, extra, besonders schön	—	12

Frühe einfache dunkelblaue Hyacinthen.

No.		Thl.	gl.
193	* Castor, schön	—	3
194	* Emilius, extra	—	4
195	* Gallus, früh und schön	—	3
196	* Goliath, gross extra	—	4
197	* La modeste, schön	—	2½
198	* Lord Nelson, extra	—	3
199	* Madame la Vallière, extra gross	—	6
200	* Nimrod, extra gross Prachtblume	—	7
201	* Orondates, gross extra	—	5
202	* Passe non plus ultra, extra gross	—	12
203	* Plutarchus, schön	—	4
204	* Staaten Generaal, schön	—	3

Einfache hell- und porcellainblaue Hyacinthen.

No.		Thl.	gl.
205	* Graaf van Buuren, schön	—	3
206	* La Majestueuse, gross extra	—	6
207	* Kaiser Franz, gross extra	—	6
208	* La parfaite, gross	—	2
209	* Lyca, schön	—	3
210	* Porcelaine Sceptre, gross extra	—	4
211	* Passe jupiter, extra Geruch	—	3
212	* Pronkjuweel, extra	—	4
213	* Robinson, gross extra	—	6
214	* Voltaire, gross extra	—	6
215	Hyacinthus muscatus, extra	—	2

Extra frühe Tulipanen, welche besonders zum Winterflor geeignet sind.

No.		Thl.	gl.
216	* Duc van Toll, allerfrüheste	—	½
217	* Gefüllte Duc van Toll, früh u schön	—	½
218	* Gef. Tournesol, extra schön, Prachtblume, sehr zu empfehlen	—	1½

Frühe Tulipanen, die später blühen und langsamer getrieben werden müssen.

No.		Thl.	gl.
219	* Bizzard pronkert, extra	—	2

No.		Thl.	gl.
220	* Belle formé, schön	—	2
221	* Braut von Haarlem, extra	—	2
222	* Clairmont, extra	—	2
223	* Couleur ponceau	—	1
224	* Duchesse de Parma, extra	—	3
225	* Duc van Toll mayor, schön	—	1
226	* Feu constant, schön	—	2
227	* Feu de Moscau	—	2
228	* Gelbe Prince, schön	—	2
229	* Le plus aimable, schön	—	1
230	* Grossmeister, extra	—	2
231	* Pottebakker, extra	—	2
232	* Standaart, extra	—	2
233	* Wappen von Leyden	—	1
234	* Frühe Tulipanen von den schönsten Sorten und Couleuren unter einander in Rummel, 100 Stück	3	—

Doppelte oder gefüllte Tulpen.

No.		Thl.	gl.
235	Admiral Kingsbergen, fein	—	1
236	Bizard d'or, extra	—	3
237	Braun casteel, schön	—	2
238	Blanc bordé pourpre, schön	—	1
239	Buonaparte, braunroth	—	3
240	Couronne violet, schön	—	2
241	Couronne impériale, weiss mit Roth, extra	—	4
242	Duc de Luxembourg, extra	—	4
243	Gelbe Roos, sehr schön	—	1
244	Kaiser Nicolaus, extra	—	4
245	La Belle Alliance, extra extra	—	8
246	Mariage de ma fille, extra	—	6
247	Pourpre impériale, schön	—	3
248	Rex rubrorum, extra extra	—	6
249	Rhinoceros, fein weiss mit roth	—	5
250	Violet Superbe, schön	—	2
251	Doppelte gefüllte Tulipanen von den schönsten Sorten und Couleuren best melirt in Rummel, 100 Stück	2	12
252	Feine späte panachirte Tulpen in 100 der allerschönsten Sorten, extra 50 Sorten m. weissem Grund, Byblumen 50 — mit gelbem Gr., Bizard	15	—
253	Feine späte Byblumen-Tulpen von vielen Sorten in Rummel, extra 100 Stück	4	—
254	Feine späte Bizard-Tulpen von vielen Sorten in Rummel, extra, 100 St.	3	—
255	Monströse Tulpen zur Beetenflor in Rummel, besonders schön, 100 St.	2	—

Oder stückweise mit Namen, wie folgt:

No.		Thl.	gl.
256	Admiral von Constantinopel	—	1
257	Gelbe monstreus	—	1
258	Monstrose rouge	—	1
259	Orange perfecto, roth und gelb	—	1
260	Tulpia spetlea, wohlriechende	—	2
261	Tulipa florentina, wohlriechende	—	1

Vielblum. wohlriechende Tazetten.

No.		Thl.	gl.
262	Vielblumige, wohlriechende Tazetten von vielen Sorten und Farben in Rummel, extra, 100 Stück	3	—

Oder stückweise mit Namen, wie folgt; von den allerschönsten Farben.

Gelbe.

No.		Thl.	gl.
263	* Aigle d'or, sehr schön	—	2
264	* Charlotte de Haarlem, extra	—	2
265	* Grand soleil d'or, früh und schön	—	1½
266	* Mylord, extra	—	2
267	* Ophir d'or, schön	—	2
268	* Prince de Narcisse	—	2

Vielblum. grosse weisse Tazetten.

No.		Thl.	gl.
269	* Hazelman mayor, extra	—	4
270	* Czar von Muscovien, gross	—	2
271	* Grand monarque, gross extra	—	4
272	* Reine du Monde, gross extra	—	2
273	* Grand primo Citronier, extra	—	2
274	* Staaten Generaal, früh und schön	—	1½

Doppelte Narcissen.

No.		Thl.	gl.
275	† Albo pleno odorata, weiss	—	1
276	* Incomparable, schwefelgelbe Füll.	—	1
277	* Orange Phönix, weiss, die Füllung orange	—	1
278	* Van Sion, ganz gelb	—	1
279	* Sulphur kroon, schwefelfarbige, extra	—	1
280	* Tratus Cantus, gelb, extra gefüllt	—	1½
281	† Doppelte goldgelbe wohlriechende Jonquillen, extra schön	—	1½
282	* Frühe einfache wohlriechende Jonquillen, sehr schön	—	½
283	* Grosse einfache Jonquillen, oder Campernellen	—	½

Doppelte oder gef. Ranunkeln.

No.		Thl.	gl.
284	Ranunkeln von mehr denn 100 Sort. in Rummel, extra Farben melirt, 100 Stück	1	—

Grosse gefüllte türk. Ranunkeln.

No.		Thl.	gl.
285	Merveilleuse, gelb extra	—	[illegible]
286	Romano, roth extra	—	[illegible]

Gefüllte Anemonen.

No.		Thl.	gl.
287	Anemonen von den schönsten Sorten und Farben melirt, unter einander in Rummel, 100 Stück	2	—

Iris.

No.		Thl.	gl.
288	Iris anglica, von den schönsten Sort. u. Farben melirt, in extra Rummel, besonders für den Garten zu empfehlen, 100 Stück	2	—
289	Iris hispanica, von den allerschönsten Sorten und Farben melirt, in ext. Rummel, sehr zu empfehlen für den Garten, 100 Stück	1	—
290	* Iris persica, wohlriechende, pr. Stück	—	1
291	Iris Susiana, gross, extra schön, pr. Stück	—	4
292	* Fritillaria Meleagris, od. Kibitzeier, von allen möglichen Sorten und Farben melirt, in extra Rummel, 100 Stück	2	—

Frittularia imperialis, oder Kaiserkronen, zum Treiben.

No.		Thl.	gl.
293	* Roth blühende, gross extra	—	4
294	* Gelb blühende, gross extra	—	4
295	* Flora rubra flor., aurea striata, ext.	—	5
296	* In Rummel extra	—	3

Lilien und Martagons.

No.		Thl.	gl.
297	Lilium candidum fl. albo simplici	—	3
298	— — fl. albo pleno	—	4
299	— — fl. maculata	—	8
300	— calcedonicum, hochroth extra	—	5
301	— bulbiferum, orange roth	—	3
302	— kamtschatkense, orange gelb	—	5
303	— tigrinum oder Sinensis	—	2
304	Martagon, flore orange	—	4
305	— fleischfarbige	—	4
306	— gefüllte pourpre	—	4
307	— Prinz Wilhelm V. pourpre	—	4

Amaryllus.

No.		Thl.	gl.
308	* Amaryllis vittata	—	16
309	* — — major	1	—
310	* — formosissima	—	2
311	* — Johnsony, extra	1	—
312	— longifolia	—	8
313	— Belladonna	—	10

Crocus vernus.

No.		Thl.	gl.
314	100 Crocus, alle blau	—	12
315	100 — alle weisse od. weiss bunte	—	12
316	100 — alle grosse gelbe	—	12
317	100 — alle goldlak	—	12
318	100 — alle schottische od. silberlak, allerfrüheste zum Treiben	—	15
319	100 — von allen Farben unter einander melirt, extra	—	8

Kapsche oder afrikanische Zwiebeln.

Diese schönen niedlichen Blumen brauchen keine besondere Wärme oder Pflege, wenn sie nur vor dem Froste geschützt werden.

No.		Thl.	gl.
320	Iris Pavonia major	—	5
321	— — minor	—	4
322	Iris polystachia flore albo, früh	—	1
323	— — — pourpre	—	1
324	— — — albo striato	—	1
325	— multiflora	—	1
326	— Bulbifera rouge	—	1
327	— grandiflora	—	1
328	— maculata, braun gespickelt	—	1
329	— Tricolor, extra	—	1
330	— Crocata maculata	—	1
331	— — major	—	1
332	— — mit violet, und blaue	—	1

Gladiolus.

No.		Thl.	gl.
333	Gladiolus Alexandrinus, extra	—	8
334	— Byzantinus, gross	—	1
335	— communis fl. albo	—	1
336	— — fl. roseo	—	1

Folgende Sorten müssen vor dem Frost geschützt werden.

No.		Thl.	gl.
337	Gladiolus Psiptacinus	—	4
338	— Floribunda	—	[illegible]
339	— Cardinalis	—	1
340	— flore roseo	—	1

Diverse Zwiebeln.

No.		Thl.	gl.
341	Arum Dracunculus Serpentarius	—	4
342	Frittularia Persica	—	1
343	Pancratium maritimum	—	5
344	Cyclamen Europaeum, roth	—	1
345	— — weiss	—	5
346	Galanthus nivalis fl. pleno	—	1
347	Ornithogalum latifolium fl. album	—	2
348	Antholyza Aethiopica	—	1
349	— Mariana	—	1
350	— Ringens	—	1
351	Hyacinthus plumosus	—	1
352	— monstrosa	—	1
353	— Campanulata	—	1
354	— Belgicus floro coeruleo	—	1
355	— — — rubro	—	1
356	— — — albo	—	1

Verschiedene Sämereien und Pflanzen.

No.		Thl.	gl.
357	100 Sorten Blumensaamen für den Gartenflor	2	—
358	50 dito dito, schöne Sorten	1	—
359	25 — — — —	—	12
360	1 starke Prise Primula veris	—	3
361	1 — — engl. Aurikeln, extra	—	11
362	1 — — Lücker — —	—	4
363	1 — — engl. Sommerlevkojen in 30 Sorten, moy.	—	3
364	1 — — halbengl. dito, diverse Sorten, moy.	—	3
365	1 — — Herbstlevkojen, dito	—	3
366	1 — — Winterlevkojen, dito	—	3

Gemüse-Saamen.

No.		Thl.	gl.
367	1 Loth Blumenkohl, grosser asiatischer	—	8
368	1 — — — cypr. früh.	—	8
369	1 — — — engl. früh.	—	8
370	1 — — — — später.	—	8
371	100 Körner Topfnelken in vielen Sort.	—	16
372	100 — gefüllte Landnelken	—	4

Pflanzen.

No.		Thl.	gl.
373	12 St. in 12 Sort. Pelargon. 1r Qualität	3	13
374	12 — — 12 — — 2r —	3	13
375	12 — Nelken oder Grasblumen in 12 Sorten 1r Qualität	2	13
376	12 — dito dito 2r Qualität	1	12
377	12 — — — 3r —	1	—
378	12 — schön gefüllte Landnelken 12 S.	—	13
379	12 — — — — in Ram.	—	9
380	100 Stück Lücker-Aurikeln, erste Sortirung, lauter sehr grossblühende, extra extra schön	8	—
381	12 — von denselben Sorten	1	13
382	100 — Lücker-Aurikeln, 2te Sortir.	4	—
383	12 — von denselben Sorten	—	12
384	100 — Lücker-Aurikeln, 3te Sortir.	2	6
385	12 — von denselben Sorten	—	8
386	100 — Primula veris, die mehrsten englische	1	8
387	100 — der schönsten engl gepuderten Aurikeln, extra	16	—
388	12 — dergleichen extra mit Nam.	3	—
389	12 — Camellien, in 12 Sorten	12	—
390	36 — Cactus, in 36 Sorten	9	—

Weinreben.

No.		Thl.	gl.
391	20 der besten Sort. mit Namen 3jährige, gut bewurzelte, à St. 3 gl. die ich jedem Freunde empfehlen kann.		

Bemerkungen.

1) Was die Zubereitung der Erde anbetrifft, worauf bei der Erziehung der Blumen bekanntlich viel ankommt, so geschieht sie am besten so, dass man gemeine schwarze lockere Gartenerde mit der von vermoderten Pflanzen und Baumblättern, so wie auch von verfaultem Kuhdünger erhaltenen Erde und mit feinem Sande, jedes zum vierten Theil vermischt, diese Mischung auf ein Beetlager in die Sonne bringt, jährlich einigemal umwendet und unter einander arbeitet, und endlich, wenn sie ganz einer feinen Gartenerde gleicht, vor dem Gebrauch vermittelst eines Siebes von allen groben Theilen reiniget.

2) In Ansehung der Zeit bemerkt man, dass diejenigen Blumenzwiebeln, welche man im Zimmer treiben will, am besten im October und November gepflanzt werden, wiewohl es auch, wenn die Witterung gelinde bleibt, noch im December geschehen kann. Die im letzteren Monat gepflanzten werden zwar eben so schön, aber etwas später blühen.

3) Die Pflanzung selbst geschieht auf folgende Art: man füllt die zu diesem Zweck besonders verfertigten Blumentöpfe oder Scherben, welche nicht allzugross, oben etwa vier bis fünf Zoll breit, unten mit einer kleinen Oeffnung und mit untergestellten Schüsselchen versehen seyn müssen, ungefähr bis zur Hälfte mit der oben beschriebenen Blumenerde an, setzt dann die Blumenzwiebeln ein, bedeckt sie darauf mit der nämlichen Erde bis beinahe zum Rande des Topfs, und drückt dieselbe um die Zwiebel etwas fest.

4) Was die weitere Wartung und Pflege anbelangt, so thut man wohl, wenn man diejenigen Zwiebeln, die früh gepflanzt worden, vier bis fünf Wochen lang der freien Luft aussetzt, oder in die Erde so eingräbt, dass man nichts von den Töpfen sieht, damit sie vorher, ehe sie in ihren Winteraufenthalt versetzt werden, gute Wurzeln ziehen, und desto sicherer gedeihen. Kann man den Blumentöpfen im Zimmer einen solchen Platz anweisen, wo sie Sonne erhalten und dem Ofen nicht zu nahe sind, so verdient dieser vor allen andern den Vorzug. Uebrigens muss diese Erde, so oft sie trocken ist, mässig begossen und das untergestellte Schüsselchen mit lauem Wasser angefüllt werden.

Bei einer solchen Behandlung kann ich alle diejenigen Blumenliebhaber, welche die Zwiebeln von mir beziehen, versichern, dass sie den schönsten Flor erwarten dürfen.

Die Verzeichnisse von Pelargonien, Lücker und englischen Aurickeln, Primula veris, Georginen, Rosen, Camellien, Azaleen, Kalmien, Magnolien, Rhododendron und Paeonien, so wie von allen Sorten Staudengewächsen, Orangerie, Cap- und Treibhauspflanzen werden diesen Herbst ausgegeben.

Briefe und Gelder werden höflichst franco erbeten.

Joh. Casp. Grimm,

expedirendes Mitglied des thüringischen Gartenbau-Vereins in Gotha, und Mitglied der Gartenbau-Gesellschaft zu Frauendorf in Baiern.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion übernommen.

Der Porto-Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5. Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. XXV. Weißenſee, (in Thüringen). Dezember 1833. VI. Jahrg.

Beſchreibung und Cultur einiger ausgezeichneten neuern Zierpflanzen.

(Mitgetheilt vom Herzogl. Hofgärtner Hrn. J. W. Boſſe in Oldenburg).

(Fortſetzung.)

Collomia coccinea, *Lehmann.* Scharlachrothe Collomie aus Chili. ☉. Die Gattung Collomia gehört in die 5. Cl. 1 Ord. nach Linne, und zur Familie der Polemoniaceen. Der Gattungscharakter iſt: ein 5theiliger Kelch, eine trichterförmige Corolle mit 5theiligem Rande, eine 3ſpaltige Narbe, eine 3fächerige, 3 klappige Capſel mit einſaamigen Fächern, und nackter Saame. — Die genannte Art iſt eine liebliche, an 5/4 Fuß hohe Zierpflanze. Der Stengel unten purpurbräunlich, glatt, oben weichzottig, mehr oder minder äſtig. Die Blätter ſtiellos, linien-lanzettförmig und lanzettförmig, am Grunde geſchmälert und ganzrandig, an der Spitze 3ſpaltig und faſt gezähnt, mit lanzettförmigen, ſpitzen Einſchnitten, ohne Glanz, unbehaart, theils etwas fein gewimpert, die oberſten etwas zottig. Die Blumen bilden vielblumige, ſtielloſe End-Köpfchen; die Corolle hat eine gelbe ſchlanke Röhre, die faſt doppelt ſo lang iſt, als die länglich-eirunden, ſtumpflichen, 5 Linien langen, ausgebreiteten Rand-Einſchnitte, die oben ſchön roſen-ſcharlachroth und unten blaß gelbröthlich gefärbt ſind. Die Kelche ſind ſchmierig-klebrig, weichhaarig, und haben lanzettförmige, 2rippige, langgeſpitzte Theile, die kürzer ſind, als die Kronröhre. — Der Saame wird im März in ein Miſtbeet oder in einen Topf geſäet, den man ins warme Miſtbeet ſtellt. Die jungen Pflanzen können anfangs in angemeſſene Töpfe verpflanzt und unter Glas geſtellt werden; im Mai aber, wenn keine Fröſte mehr zu fürchten ſind, kann man ſie mit unverletztem Wurzelballen an eine warme Stelle ins Land pflanzen, wo ſie ſehr reichlich blühen und zeitig genug Samen liefern, im Fall der Sommer nicht zu naß iſt. Vermuthlich kann der Saame auch gleich dem der Collomia grandiflora im Herbſte oder im Frühjahre ins freie Land geſäet werden, welches ich aus Mangel reichlichen Saamens noch nicht habe verſuchen können. Der Saame iſt bei mir und in Hamburg zu bekommen.

(Fortſetzung folgt.)

Nachträgliches. (S. Blumenzeitung Nr. 14 Jahrgang 1833.)

Bei den diesjährigen durch den Ringſchnitt behandelten Sommer-Levkojen, fand ich bemerkenswerth, daß bei verſchiedenen Pflanzen die Samenſchoten theils kurz und gedrungen, theils etwas länger, aber doch immer kürzer als im unverletzten natürlichen Zuſtande, ſich ausgebildet hatten, und muß dieſer Umſtand nach meinem Dafürhalten eine Folge der Operation ſein, die dann auch ſehr wahrſcheinlich auf die Samenbildung Einfluß haben dürfte. Ob nun die Verſchiedenheit der Samenſchotenlänge dem leiſen oder ſtärkern Andruck des Inſtruments zuzuſchreiben, (denn in der Wurzelnähe bin ich, den Schnitt einigemal repetirend, und zwar etwas hart damit umgegangen) darüber fehlen bis jetzt noch die nöthigen Erfahrungen; ich führe dies Letztere deshalb für Blumenfreunde an, damit ſie bei etwanigen Verſuchen auch dieſe härtere Behandlung nicht unberückſichtigt laſſen möchten.

Dieſe Ringſchnittoperation habe ich auch in dieſem Jahre an Elichrysum bracteatum und Calliopsis bicolor (ehedem Coreopsis tinctoria) verſucht; allein ſo ergiebig auch ſonſt bei dieſen Syngeneſiſten eine reiſe Saamenerndte zu ſein pflegte, ſo war nunmehro bei beiden Gewächſen die Sterilität der Saamen ſehr auffallend: in jeglicher Blume hatten ſich nur hin und wieder einige Saamenkörner als befruchtet ausgebildet, und von vier Pflanzen iſt der Saamengewinn nur kärglich ausgefallen.

Schweidnitz. G. A. B.

Ueber die Erziehung der Eriken, Rhododendren, Melaleuken, Metroſideren, Leptoſpermum u. ſ. w. aus Samen. (Fortſetzung).

(Mitgetheilt von P. aus W.)

Vorzügliche Aufmerkſamkeit verwende man auf die Heizung. Zu viel und zu wenig Heizung iſt Beides nachtheilig. Man fange frühzeitig an zu heizen, damit der Feuerungskanal zeitig austrocknet, und das Haus von allen feuchten Dünſten gereinigt werde. Unterläßt man dieſes bis zu der Zeit, wo das Heizen faſt ununterbrochen geſchehen muß, ſo enthält ſehr oft der Kanal noch ſo viel Feuchtigkeit, daß dieſelbe den ſchnellen Durchzug des Rauches verhindert, dieſer dann genöthigt iſt, durch alle Ritzen deſſelben hindurch zu dringen, und das Haus mit undurchdringlichem Qualm anzufüllen, welcher nur äußerſt nachtheilig auf die Pflanzen wirken kann. Man iſt dann genöthigt, die Fenſter und Luftlöcher zu öffnen, wodurch natürlich die Temperatur unterbrochen wird. Tritt im Anfange oder in der Mitte November eine nur mäßige Kälte von 3 — 6 Grad R. ein, ſo mache man in dem Kanale ein ganz kleines, gelindes Feuer an, und unterhalte dieſes ſo lange, bis die Temperatur des Hauſes im Begriff iſt, den 6ten Grad Wärme zu überſteigen. Fällt die Temperatur im Freien zu der Zeit nicht und man hat auch keinen Sonnenſchein zu erwarten, ſo öffne man eins der obern Luftlöcher ſo lange bis die Wärme im Hauſe wieder auf 6 Grad ſteht. Das Feuer unterhalte man dann fort ſo ſchwach als möglich, damit der Kanal immer regelmäßigen Zug behält, und verſtärke es allmählich, je nachdem die Kälte außen zunimmt. Die Feuerung mit Torf iſt der Holzfeuerung deshalb vorzuziehen, weil der Torf eine regelmäßigere Wärme verbreitet als das Holz, weit länger Kohle hält und bedeutend weniger koſtſpielig iſt. Vermuthet man die Nacht keine ſtarke Kälte, ſo verſchließe man Abends gegen 10 Uhr den Kanal durch den am Ausgange deſſelben in dem Schornſteine befindlichen Schieber. Man thue dieſes übrigens auch nur dann, wenn das Feuer gänzlich abgebrannt iſt, nicht mehr raucht und nur noch in Kohlengluth beſteht; außerdem bekommt man Rauch in das Haus. Der Schieber darf auch nicht ganz zugeſchoben werden, um der durch die Kohlengluth ſich entwickelnden Stickluft Ausgang zu verſchaffen. Frühmorgens ſehe man zeitig, gegen 4 Uhr, nach dem Thermometer. Iſt die Temperatur außen noch dieſelbe wie am vorigen Abend, ſo warte man noch ſo lange mit dem Heizen, bis man die Witterung des Tages beurtheilen kann. Zeigt ſich das Wetter gut und deutet es auf einen hellen, ſonnenreichen Tag ſo iſt es nicht nöthig früh noch zu feuern, wenn der Thermometer auch bis gegen 8 Uhr auf 8 Grad fallen ſollte, die dann erſcheinenden Sonnenſtrahlen werden in kurzer Zeit die Wärme ſteigern. Man öffne ſodann, wenn der Thermometer wieder ſechs Grad Wärme zeigt, gleich die Luftlöcher und Fenſter und ſpäterhin bei immer mehr ſteigender Wärme auch die Zugkanäle. — Hat man hingegen früh Morgens um 4 Uhr einen trüben, rauhen, windigen und kalten Tag zu vermuthen, ſo zünde man ſogleich das Feuer an und heize ſo lange ſchwächer und ſtärker fort als die Witterung es erfordert. (Fortſetzung folgt.)

Ueber die Abſtammung der Pflanzen-Namen.

Sehr verdienſtlich und dankenswerth iſt die Unternehmung Ihres Inſerenten, welcher von Zeit zu Zeit für die Blumenzeitung Beiträge „über den Urſprung der Blumennamen“ liefert. Ich vermiſſe ſehr ein Buch, worin ich über die Abſtammung vieler, theils generiſcher, theils Trivialnamen mich in Kenntniß ſetzen könnte. Um darüber belehrt zu werden, würde ich ſelbſt die Anſchaffung eines größern Werkes nicht ſcheuen. Es wäre außerordentlich nützlich und ein Hilfsmittel für das Gedächtniß, wenn die botaniſchen Handbücher ſolche kleine Notizen bei Aufzählung der einzelnen Species enthielten. Was heißt z. B. Thymus herba Barona, Achillea herba Rota? Sind die Namen Quamoclit, Tetrahit, Phu, Nil blos reine Eigennamen, oder haben ſie, wahrſcheinlich zum Theil aus dem Vaterlande der Pflanze ſtammend, eine Nebendeutung — iſt in dieſem Felde die Blumenſprache verloren, und nur auf trockene Nomenclatur zu rechnen? Was denkt ein Unkundiger bei dem Namen Ficus religiosa? Ich habe lange nicht gewußt, warum Rhodiola rosea ſo heiße; endlich erfahre ich aus Perſoon, daß ſie in ihrem Vaterlande nach Roſen rieche: wer die Wurzel des Helleborus niger nicht ausgräbt, was wohl vielen Blumenliebhabern paſſirt, weiß nicht, warum dieſe ſchöne grüne Pflanze mit weißrother Blume den Beinamen niger trage. Ein Sylphium atropurpureum verſchrieb ich

mir in dem Glauben: „à potiori fit denominatio“, daß ich eine ſchöne ſchwarzrothe Blüthe ſehen würde, und ſiehe da, nur der gefärbte Stengel hat den Namen gegeben. Es wäre ſehr zu wünſchen, daß der Grund des generiſchen und Trivialnamens in den größern Handbüchern angegeben würde.

S

△.

Ueber unrichtig geſchriebene Pflanzen-Namen.

Es iſt zu beklagen, daß ſo wenige Gärtner, Botaniker ſind, und ſo viele von einer Pflanzenanalyſe keine Idee haben. Obſchon ich mich gern beſcheide, daß die Zwecke der Blumiſtik und botaniſchen Wiſſenſchaft ſehr verſchieden ſind, ſo dürfte doch wohl letztere nie ſo ganz ausgeſchloſſen bleiben, wie es leider oft der Fall iſt. Haben nun aber auch Verhältniſſe es nicht geſtattet, ſich Kenntniß der lateiniſchen Sprache und der botaniſchen Technik zu verſchaffen, ſo ſollten dieſe Männer doch darauf ſehen, daß der Beſtand der Cataloge ihrer ausgebotenen Sämereien und Pflanzen der Reviſion eines Kenners unterworfen werde, damit ſich nicht die unverzeihlichſten Irrthümer einſchleichen, ja ſogar Fehler auf Fehler gegen die Orthographie darin gehäuft werden. Wer ſo oft mit ganz fremden, gar nicht ähnlichen Generibus, der Species gar nicht zu gedenken, wie ich, angeführt worden iſt, wird meine Klagen gerecht finden. In dem Cataloge eines holländiſchen Zwiebelnhändlers, der große Geſchäfte in Deutſchland macht, leſe ich regelmäßig jedes Jahr Fritularia, Amaryllis longifolio, Gladiolus securigera formosa, Paneratia maritima, Mollis albo, Mollis luteum (ſtatt Allium Moly). Hat denn dieſer Kaufmann keinen kunſtverſtändigen Freund, der ihn auf ſolche begangene Irrthümer aufmerkſam macht, oder iſt ihm ein correcter Catalog minder lieb als die paar Gulden, die er höchſtens für die Sichtung ſeines Sauerteigs zahlen müßte? Lachen muß ich beſonders, wenn ich manchmal die Ueberſetzungen der lateiniſchen Namen leſe. So war neulich Allium pedemontanum durch bergfüßiger Knoblauch überſetzt. Welcher Quartaner hatte hier ſein Meiſterſtück geliefert?

S

△.

Tauſchanerbieten des Herrn Collegial-Raths v. Gemünden zu München.

Pelargonium. (Fortſetzung.)

quinquemaculat.
Queeni
questorium
Quenderii
radula
— fol. var.
— formos.
Rosenthalianum
Ramsden Miss.
Regent Prinz
Reginae
regium maiden.
Rosamunde holde
Rouanne pulcher.
Rowley Lady
Rolown Lady
rubescens
rutilum
rouge et noir
Rose brillante
Renalda
regale
regium
rutilans
Rosalina striata
Rosalia
rugosum
rotundilobum
Rhodiola
Rochester
Rocoll Lady
Rose Agathe
Rochloderianum
Rudolphianum
rubefactum
Ropayanum
Rumford
Reissert
(Fortſetzung folgt.)

Die obiges Tauſchgeſchäft betreffenden Briefe werden jedoch portofrei erbeten.

Anfrage.

Da die Garten-Nelke (Dianthus Caryophyllus) ſeit einem Jahrhundert Gegenſtand der luxurioſeſten Liebhaberei geweſen, und dieſer Zweig des Blumenbaus in unſern Zeiten in Oberitalien auf eine ausgezeichnete Höhe der Vollkommenheit gebracht worden, ſo fragt es ſich, warum deutſche Nelkenliebhaber ſich nicht von dorther neue und ſchöne Sorten kommen laſſen? (Zu Nro. 23. 1829.) ρ.

Ueber die Cultur der Parkinsonia aculeata und Poinciana pulcherrima L. *)

(Von Poiteau.)

Sehr oft ſehen wir beide Pflanzen in den Warmhäuſern der botaniſchen Gärten und Pflanzenliebhaber, und faſt alle Jahre werden ſie aus Samen, die zu uns gelangen, in Menge erzogen, ſelten ſind ſie aber bluhend anzutreffen. Beide gehören aber zu den ſchönſten Zierpflanzen, und beſonders zeichnet ſich die letztere durch den Duft ihrer Blumen aus. Die Urſache des Nichtgedeihens liegt gewöhnlich nur in der fehlerhaften Behandlung der Samenpflanzen, oft auch in der zu magern oder zu lockern Erde. Der Erfolg der nachſtehend angegebenen Cultur wird ſich überall als unfehlbar zeigen. Die Samenpflanze wird in gute, zum 4. Theil mit fruchtbarem Lehm vermiſchte Heideerde gepflanzt und in einem Lohbeete recht warm und feucht, was die Luft anbetrifft, gehalten. Gegen den Winter zu, hierin liegt der eigentliche Kunſtgriff, muß ſie wieder auf friſche Lohe und in gleicher Wärme erhalten werden; die Luft muß dann weniger feucht ſein, der Standort ſehr hell, damit ſich das Holz des Stämmchens gehörig ausbilde. Bei einer Temperatur unter + 16 bis 18° R. würde ſie bald anfangen zu kränkeln, und in der Folge deſſen im 1. oder 2. Jahre ſterben. Die auf ſolche Art gezogenen Pflanzen können nun ohne Gefahr den zweiten Winter bei 12 bis 15° R. Wärme beſtehen, und werden im 3. Jahre im Auguſt die erſten, und dann alle Jahre bei ſonſt guter Pflege ihre Blumen zeigen. **)

---

*) Aus den Annal. de la Loc. d'horticulture de Paris.

**) Vergl. den Aufſatz in Nro. 13 des 6. Jahrg. der Blumenzeitung von demſelben Verfaſſer.

Aus der Revue horticole.

Neue ſchönblühende Pflanzen.

Aster Parisinus Hortul. Ohne Zweifel werden im Pflanzengarten zu Paris unter der großen Anzahl Aſtern eine Menge Hybriden kultivirt, welche die Botaniker als natürliche Arten betrachten. Ihre Unterſcheidungszeichen ſind ſo ſchwer durch Beſchreibungen auszudrücken, daß mehrere Arten bei jeder neuen Ausgabe des Pflanzen-Verzeichniſſes ihre Namen wechſeln. So nannte man lange Zeit hindurch Aster ericoides, was jetzt Aster multiflorus heißt. Wenn die Gärtner ſich darauf legten, dieſe Pflanze eben ſo wie die Pelargonien und Dahlien auszuſäen, ſo würde man die Arten künftig bald nicht mehr herausfinden können. Der Gärtner Hr. Euſtache hat den Samen von Aster multiflorus H. P., den er mit dem Samenſtaube von Aster roseus H. P. befruchtet zu haben verſichert, geſäet, und daraus eine ſehr hübſche neue Pflanze erhalten, die ich Aster Parisinus genannt habe, und welche verdient um ſo eher vermehrt zu werden und einen ausgezeichneten Platz auf unſern Blumenrabatten zu erhalten, als ihre ſehr zahlreichen Blumen dte ſchöne Roſafarbe von A. roseus erhalten haben, und doch noch 3mal größer als die Blumen von A. multiflorus ſind. Ihr Stengel iſt 2 — 3 Fuß hoch, etwas rauh, ſteif, gerade, in eine gleichhohe Riſpe getheilt, wovon jeder Zweig eine große Anzahl Blüthen hat. Die Zweigblätter ſind linienförmig, und die Endblätter linienlanzettförmig, ſämmtlich ganz fein gezähnt. Sie blüht ſehr reichlich im September und Oktober.

Podolepis gracilis, B. M. Die Gattung Podolepis iſt von **Labillardière** feſtgeſtellt und ſo benannt worden, weil die Schuppen der allgemeinen Blumendecke (Anthodium) geſtielt ſind. Die hier in Rede ſtehende iſt einjährig und in Neu-Holland einheimiſch. Der Stengel iſt röthlich, gebogen, 2 Fuß hoch, mit wechſelweiſe ſtehenden, ſitzenden, lanzettförmigen, glatten, glänzenden, etwas dicken, 3 — 5 Zoll langen Blättern verſehen; er theilt ſich in mehrere ausgeſperrte Zweige, welche ſich wieder in mehrere Stiele theilen, deren jeder am Ende eine ſtrahlige Blume, 15 Linien breit, mit weißen Strahlen und roſafarbiger Scheibe trägt. Die Hülle iſt kegelförmig oder verkehrt-kegelförmig und beſteht aus einer großen Anzahl eiförmiger, trockner Schuppen, von denen jede auf einem grünen, fadenförmigen Nagel ſteht, nach einer dieſer Gattung ganz eigenthümlichen Weiſe. Die äußerſten Blüthen ſind lang gezüngelt, mit lanzettförmigen Züngelchen und endigen ſich in ſtumpfen Zähnen. Die Blüthen der Mitte, oder der Scheibe ſind zahlreich, hermaphroditiſch, mit 5 Abtheilungen, aber die äußerſten ſind viel tiefer an die innere Seite geſpalten und werden auf dieſe Weiſe leicht geſchweift, während die mittelſten regelmäßig bleiben. Der Fruchtknoten iſt ſitzend, länglich, faſt 5eckig, mit runzlichen Ecken. Das Federchen iſt ſitzend und beſteht aus 12 bis 15 rauhen Haaren. Dieſe Pflanze iſt ſehr zierlich und kann auf dieſelbe Weiſe wie Xeranthemum annuum kultivirt werden.

Varietäten.

Berlin. Am 19. Sept. blühten im hieſigen botaniſchen Garten folgende bemerkenswerthe Pflanzen: Gasteria decipiens Haw. Vom Vorgeb. d. g. Hoffn. Alstroemeria Salsilla L. A. Südamerika. Tillandsia fasciculata Swartz. Aus Weſtindien. Epidendrum ciliare L. Aus Weſtindien. E. umbellat. Swartz. Aus Jamaika. Sarcocca pruniformis Bot. Reg. 358. Aus Nepaul. Begonia monoptera, B. Martiana, B. bulbillifera Lk. et O. Gratiola tetragona Ell. Aus Nordamerika. Tecoma capensis Bot. Reg. (Bignonia Ait.) Vom Vorgeb. d. g. Hoffn. Mimulus perfoliatus Bot. Reg. (Conobea alata Grah.) Myrsine variabilis R. Br. Aus Neuholland. Ardisia excelsa Ait. (Myrsine Herberdenia). Von Madeira. Carica microcarpa Jacq. Helenium angustifol. Hort. ang. Cacalia cordifol. Kunth. Aus Mexiko. Sellca glutinosa Spr. Aus Montevideo. Neja gracilis. Don Sw. Fl. G. Aus Montevid. Vernonia axilliflora Mart. Aus Braſilien. Cosmea diversifol. Hort. Bot. Aus Mexiko. Perymenium discolor Schrad. A. Mexiko ?). Calydermos longifol. Lag. Aus Mexiko. Leptostelma maxim. Sw. Fl. G. Aus Braſilien. Rudbeckia serotina Sw. Fl. G. Aus Südamer. Echeveria racemosa Schlecht. Linnaea. Aus Mexiko. Calanchoe coccinea Nob. Aus Chili. Melastoma subtriplinervium Lk. et O. Aus Mexiko. Heteronoma diversifolia Dec. Lk. et O. Aus Mexiko. Erythrina crista galli L. Aus Südamerika. Acacia penninervis Sieb. Aus Neuholland. Cristaria Berteroa Hort. Paris. Aus Chili. Erpetium reniforme Sw. Fl. G. (Viola hederacea β. Elatinus Dec.) Aus Neuholland. Passiflora odora Lk. et O. Aus Mexiko. Passiflora gossypifol. Desvaux. Aus Mexiko.

Berlin. In der 124. Verſammlung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuß. Staaten am 14. November d. J. wurden vorgetragen: Bemerkungen des Herrn **Görner** zu **Straupitz** bei Lübben über das Gedeihen der gelben, gefüllten Roſe in ſchattigen Lagen. Eine für dieſe Jahreszeit ſehr bemerkenswerthe Collection einiger noch im Freien in Blüthe geſtandener Georginen-Sorten war aufgeſtellt. Ueberdies waren zur Stelle gebracht aus den Königl. Gärten in Potsdam eine ſchöne Collection abgeſchnittener Blumen von Chrysanthemum, zierliche Stauden von Brassica oleracea var. fol. albis, rubris und violaceis.

Paris. Mit Bedauern haben die Freunde des Gartenweſens ſchon geſehen, wie vor einigen Jahren Hr. **Fulchiron** ſeine prächtige Palmenſammlung an Sr. Maj. den König v. Preußen verkauft hat, und ſeit dieſer Zeit verkauft er allmählich die ſämmtlichen Pflanzen ſeiner Warmhäuſer; fänden ſich Käufer genug, es wäre nichts mehr da. Mit eben ſo großem Bedauern hat man im vorigen Jahre bemerkt, daß Hr. **Bourſault** eine lange Reihe von Glashäuſern, welche man ſeit 30 Jahren bewunderte und die ein herrliches Muſter des Geſchmacks und der Vollkommenheit in Paris, in ganz Frankreich waren, in denen unter den Händen des thätigen und einſichtsvollen Hr. **David** die glänzendſten Culturmethoden ausgeführt wurden, abgebrochen worden ſind. Der Gartenbau iſt hier wirklich im Sinken. Glücklicherweiſe wird aus den Ueberreſten dieſer Sammlungen eine neue entſtehen. Der Herzog von **Rivoli**, Furſt von Eßlingen wird auf dem Boulevard St. **Jacques** eine neue Gartenanlage gründen, wo in großartigen Gewächshäuſern, Pflanzen aller Art, und Ananas in der höchſten Vollkommenheit kultivirt werden ſollen. Die Ausführung iſt Hrn. **Gontier**, einem Zögling von Hrn. **Griſon** anvertraut.

Petersburg. Der hieſige botaniſche Garten iſt gegründet im Jahr 1824. Der Doktor **Fiſcher** war Direktor der reichen und prachtvollen Gärten des Fürſten Rozumoffsky in Moskau. Nach dem Tode deſſelben begab er ſich nach Petersburg und ſuchte um die Gründung eines botaniſchen Gartens nach, welcher der Hauptſtadt des ruſſiſchen Reiches würdig wäre. Durch den kräftigen Schutz der Kaiſerin Mutter begünſtigt, wurde der Doktor Fiſcher bevollmächtigt, auf einer Newa Inſel im Norden der Hauptſtadt gerade auf dem Punkt ſeinen Plan auszuführen, wo Peter der Große mit eignen Händen eine Hütte erbaut und mehrere Linden und Pappeln angepflanzt hatte, die jetzt von bedeutender Höhe (81 Fuß) ſind, und mit tiefer Ehrfurcht erhalten werden. Die Arbeiten wurden im Jahr 1824 begonnen, noch vor dem Winter 1825 beendigt und koſteten 1,000,000 Rubel. Der Garten umfaßt 60 engl. Acker (ácres) enthält ganze Reihen von Arten von Gewächshäuſern, an einem derſelben ſind prächtige Zimmer fur die kaiſerliche Familie angebracht, deren Fenſter die Ausſicht in die Gewächshäuſer haben und ſo die Pflanzen mit der größten Bequemlichkeit betrachten laſſen. Die Gartenverwaltung beſteht aus dem Doktor Fiſcher als Direktor, zwei Obergärtnern und einem trefflichen Blumenmaler. Die Pflanzenſammlung iſt ſchon ſehr beträchtlich. Seit 1825 hat man 12,000 Sorten Samen in 60,000 Töpfe ausgeſaet. Die jährlichen Unterhaltungskoſten ſind auf 68,000 Rubel feſtgeſetzt und der Kaiſer hat 100,000 Rubel hergegeben, um Pflanzen in England und Frankreich einzukaufen, wo Herr Fiſcher eine reiche Erndte gehalten hat, die von London aus nach Petersburg eingeſchifft worden iſt. Das Ganze iſt vollkommen gelungen und nähert ſich mit Rieſenſchritten der Vollkommenheit. —

Prag. Hr. Dr. **Chotsky** von hier, der vor einigen Jahren nach Neuholland gereiſ't, äußert ſich jetzt in einem Schreiben aus Rio de Janeiro unter andern auch über die Urſache, warum die nach Europa kommenden Palmenſamen bisher ſo ſelten zum Keimen und Aufgehen gelangten, welcher Umſtand weniger dem Verdorbenſein als der unrichtigen Behandlung und Verpackungsweiſe derſelben beigemeſſen werden müſſe. „Auch hier (ſchreibt er) ſieht man die Palmen, welche ſich alljährlich des reichſten Fruchtſtandes erfreuen, nur immer einzeln ſtehen, ſo daß eigentliche Palmenwälder zu den Seltenheiten gehören. Dies führt nothwendig auf die Idee, daß das Aufgehen der Palmenſamen auch in ihrem Heimathboden irgend ein natürliches Hinderniß finden müſſe. Unſtreitig beſteht dies in der bedeutenden Menge von Feuchtigkeit, welche dieſe hartſchaligen Samen erheiſchen, wenn ihr Pericarpium ſich öffnen, und der Embryo entwickelt werden ſoll. Fallen daher die Kerne auf irgend eine trockne Stelle, oder iſt das Jahr nicht gehörig naß, ſo können ſich die Kerne nicht entwickeln. Dieſer Umſtand hat wahrſcheinlich das Verfahren herbeigeführt, welches **Rheed** in ſeinem Hort. Malab. erzählt, daß nämlich die Indier die Palmenſamen in einen Brei von zerſtoßenen Schnecken legen, um ihre Keimkraft thätig zu machen. Welche Gründe eben für dieſe Subſtanz ſprechen, läßt ſich ſchwer entſcheiden, aber ich glaube, daß nach dieſen Analogien der Natur und früherer Erfahrung die europäiſchen Gärtner ſich nicht mehr mit der bis jetzt gangbaren Behandlungsweiſe der Palmenſamen begnügen ſollten. Ob etwa außer Schnecken auch Miſt oder Miſtjauche, laues Waſſer oder dergleichen angewendet werden kann, muß verſucht werden, aber ich hege die Ueberzeugung, daß durch ein ähnliches Verfahren Palmenſamen und viele ähnliche Samenarten aufgehen werden, die man wegen gänzlichen Mißlingens bis jetzt als taube Objekte der Samenſendungen angeſehen hat.

(**Vom Fuße des Thüringer Waldes.**) Das Jahr 1833 zeigte viele Eigenheiten, beſonders für das Gewächsreich. Hat man ſeit langen Zeiten ein ſo raſches Erwachen des jungen Frühlingslebens geſehen? Die ſäumige Natur erſchrak, daß im Kalender ſchon Mai ſtand, und wie mit einem Zauberſchlag veränderte ſich vom 1ſten dieſes Monats die Decoration der Fluren. Gerade am letzten Tage dieſes Wonnemonats war gleichſam pour prendre congé, nach ſo drückender Hitze wieder Froſt und darauf wieder der ſchöne Juni, mit deſſen letzten Tagen hinwiederum die liebliche Jahreszeit geſchloſſen war. Welcher ſchaurige Julius, welche Hundstage! während deren Verlauf man recht gut ein Kaffeefeuerchen in der Stube vertragen konnte, denn es fror ſogar in der Nacht vom 26. auf den 27. Auguſt. Jetzt folgten wieder, wie abgeſchnitten, einige heitere warme Tage, und der September war im Ganzen mild und ſchön zu nennen, beſonders auch, weil er keine Fröſte brachte. Selbſt der Oktober war wieder ſehr ſchön, und ſöhnte beſonders die Winzer mit ſich aus: die ſtarken Reife und Fröſte, die er brachte, hatten das Eigenthümliche, daß ſelbſt ſehr zarte Gewächſe, z. B. Georginen, wenig davon gelitten und eine reiche Gartenflor bis zum November blieb. In dieſem letztern Monate verwieſen ſtarke auf einander folgende Fröſte alles zur alten Ordnung. Die Regen im Julius und Auguſt hatten das Beſondere, daß ſie nicht tief eindrangen; obgleich eben nicht viel Winde die Feuchtigkeit verzehrt hatten, war der Boden doch nicht tief durchnäßt. Wie ſehr wurden überſpannte Hoffnung und Kleinmuth in Rückſicht auf die Fruchtbarkeit des Jahres getäuſcht und beide an ein ergebenes Harren auf die Geſchenke des Himmels für die Zukunft verwieſen. In meinem Garten beobachtete ich manches Ungewöhnliche. Lathyrus odoratus ſchoß faſt ganz in üppiges Kraut, gab ſehr wenig Blüthen und gar keinen Samen; Dracocephalum Moldavica gab kein Körnchen Samen, die ganzen Blüthenſtengel waren, als nach einigen heitern Tagen die Pflanzen wieder abgetrocknet, wie mit Staub überdeckt; an Samen von Carthamus tinctorius und Calliopsis bicolor war nicht zu denken; Hypericum calycinum ſetzte erſt im September Blüthen an, die nicht zum Aufbruch gekommen ſind; dagegen hat Tussilago fragrans reichlich im freien Lande geblüht, und der gewöhnliche Helleborus niger gleichzeitig mit dem H. niger praecox mich zu Ende Oktobers mit einer ungewöhnlichen Menge Blüthen erfreut. Sollte dieſer Helleb. niger praecox nicht eine eigene Spezies ausmachen? Die Blätter des Exemplars, welches ich beſitze, ſind viel größer, ſo wie auch tiefer und reichlicher gezähnt als bei dem gemeinen, desgleichen ſind die Blumen größer und ihr reines Weiß changirt nicht in Roth. △.

Da mit der nächſten Nummer der ſechſte Jahrgang der **Blumenzeitung** ſchließt, und mit dem 1ſten Januar 1834 der ſiebente Jahrgang beginnt, ſo erſuche ich beſonders diejenigen verehrlichen Leſer, welche ihre Exemplare durch die Poſt beziehen, ihre desfallſigen Beſtellungen fur das Jahr 1834 geneigteſt wieder ehemoglichſt bei dem Wohllobl. Poſtamte zu bewerkſtelligen, von welchem ſie bisher die Blätter bezogen haben. Form, Tendenz und Preis bleiben wie bisher. Fr. Häßler.

(Hierbei drei Stück Beilagen.)

Verzeichniß

von

größtentheils noch ſeltenen Glashaus-Pflanzen-Sämereien,

welche um beiſtehende billigſte Preiſe beim Gärtner Petſch im Düringerſchen Garten zu Wiesbaden zu bekommen ſind.

	1 Priſe
Acacia verticillata . . .	1½ ggr
— longifolia . . .	1½ ,,
— stricta	2 ,,
— Bauksiae latifolia .	1½ ,,
— Melanoxylon . .	2 ,,
Ageratum coeruleum . .	1 ,,
Arbutus Unedo	1½ ,,
— Andrachne . . .	1½ ,,
Alstroemeria pelegrina .	1½ ,,
Azalea pontica div. spec.	1 ,,
Asclepias linaria . . .	1½ ,,
Antirrhinum montevidense	1 ,,
— bicolor . . .	1 ,,
Andromeda pulverulenta, dauert bedeckt im Freien aus, ſchön	1½ ,,
Begonia bulbifera W. . .	2 ,,
— semperflorens W.	2 ,,
Blumenbachia insignis .	3 ,,
Bossiaea linophylla . .	3 ,,
Calceolaria scabiosaefolia	2 ,,
— Jongy . . .	2 ,,
— pinnata . .	1 ,,
Cistus albidus	1½ ,,
Coronilla iberica . . .	1½ ,,
Canna indica	1 ,,
Cytisus biflorus . . .	1 ,,
Ceanothus globosus . .	1½ ,,
Colutea frutescens . .	1 ,,
Celsia Arcturus . . .	1 ,,
Dianthus caryophyllus, von ganz ausgezeichneten Chorblumen, 50 Korn . .	3 ,,
Dergl. 2te Cl. 50 Korn	2 ,,

	1 Priſe
Eccremocarpus scaber .	1 ggr
Edwardsia mycrophylla .	1½ ,,
— grandiflora .	2 ,,
Gycine bimaculata . . .	3 ,,
— chinensis . . .	1½ ,,
Grevia occidentalis . .	1½ ,,
Hibiscus Manihot . . .	1 ,,
— canabinus . . .	1 ,,
Heminreris urticaefolia .	1 ,,
Iris versicolor	1 ,,
Lantona trifoliata W. .	1½ ,,
Lotus jacobaeus . . .	1 ,,
Lupinus Criukshankii . .	3 ,,
Lobelia erinoides ⊙ . .	1 ,,
Magnolia tripetala . . .	1 ,,
Malva capensis	1 ,,
Maurandia semperflorens .	1 ,,
— Barkleyana .	1½ ,,
Mimosa pudica W. . .	1½ ,,
Mimulus rivularis . . .	1 ,,
Moraea chinensis . . .	1 ,,
Myrica cordifolia . . .	2 ,,
Nicotiana glauca . . .	1 ,,
Passiflora edulis . . .	2 ,,
Podalyria coerulea . . .	1 ,,
Pultenaea cuneata . . .	2 ,,
Psoralea verrucosa . .	2 ,,
Polymnia Rhoedalia . .	2 ,,
Pittosporum undulatum .	2 ,,
Statice crispa	1½ ,,
Sisyringium striatum . .	1 ,,
Stapelia planifera W. . .	2 ,,
Rhododendron maximum div. Couleurs	1 ,,

Die ganze Sammlung von 63 Sorten, von jeder Sorte eine Priſe mit Namen, erlaſſe ich zu 2 Rthlr. 12 gr.

Ferner:

Extragefüllter Wiener Goldlack 100 Körner . . . . . . 1 gr.

3 Sorten Millionair Levkoien, welche vom Frühjahr bis zum Eintritt des Winters ununterbrochen blühen, und vorzüglich empfohlen werden können:

Carminroth
Rothbraun
Weiß mit Lackblatt } von jeder Sorte 50 Körner 4 gr.

18 Sorten vorzüglich gefüllte Sommerlevkoien in 18 Priſen für 12 gr.

50 Sorten ſchönblühende Stauden fürs freie Land, die vorzüglichſten und ſeltneren aus einer Sammlung von 570 Sorten mit Namen, für . . . . . 6 Rthlr.

6 Sorten der ſchönſten Spiräen mit Namen . . . . . 12 gr.

50 Sorten Prachtroſen mit Namen, aus einer großen Sammlung der neueſten ausgewählt 25 Rthlr.

25 Sorten . . . . . . 13 Rthlr.

12 Sorten gefüllte Camellien aus der Sammlung der Gebrüder Baumann in Bollwiller 12 Rthlr.

Weinreben: 2jährige gut bewurzelte, zur Anlegung von Weinbergen, frühe Rießlinge und Kleinberger, das Tauſend 10 Rthlr.

Briefe und Gelder werden franco erbeten; die Zahlung geſchieht in preußiſchem Courant.

Wiesbaden, im Dezember 1833. **Petſch.**

Levkoien-Samen-Anzeige von J. G. Hübner in Erfurt.

Auf meinen bisher von jedem Blumenfreunde für gut befundenen, ſelbſt in Töpfen erzeugten, ein- und zweijährigen Sommer-, Herbſt und Winter-Levkoien-Samen, nebſt Ranunkel-Zwiebeln und Feder-Aſtern, welche um beifolgende Preiſe bei Unterzeichnetem zu haben ſind, werden auch dies Jahr Beſtellungen erbeten.

40 verſchiedene Sorten Sommer=Levkoien=Samen	1 Rß	12 ſgr.
5 = = Herbſt= = =	— =	5 =
9 = = Winter= = = =	— =	9 =
In Rommel 600 ſowohl Sommer=, Herbſt=, als Winter=Levkoien	— =	4 =
Gefüllte Feder= oder Röhren=Aſtern in 8 Sorten à Sorte 100 Körner	— =	6 =
Schön gefüllte Ranunkel=Zwiebeln in Rommel mit 24 Sorten à Sorte 100 Stück	— =	20 =

Schließlich bitte ich ergebenſt, den Beſtellungen, die in frankirten Briefen erbeten werden, gefälligſt ſogleich die Bezahlung in preuß. Courant beifügen zu wollen. Verzeichniſſe ſind bei mir unentgeldlich zu haben.

Erfurt, im Dezember 1833.

J. G. Hübner,
wohnhaft in der Geraer Straße Nro. 191.

Ankündigung. Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuß. Staaten, 19te Lieferung, gr. 4. in farb. Umſchlage geheftet, mit 3 lithog. Beil. Preis 1⅔ Rß. im Selbſtverlage des Vereins, zu haben durch die Nicolaiſche Buchhandlung in Berlin und Stettin. und bei dem Secretär der Geſellſchaft, Heynich, Zimmerſtraße Nro. 81 *a.* in Berlin, Desgleichen:

18te	Lieferung	mit 2	lithog. Beil.	Preis 1⅔	Rß	11te	Lieferung	mit 2	lithog. Beil.	Preis 2	Rß
17te	=	= 3	=	= 1⅔	=	10te	=	= 1	=	= 2	=
16te	=	= 3	=	= 2	=	9te	=	= 2	=	= 1⅔	=
15te	=	= 2	=	= 2⅙	=	8te	=	= 1	=	= 5	=
14te	=	= 1	=	= 2	=	7te	=	= 28	=	= 2⅓	=
13te	=	= 1	=	= 2⅙	=	6te	=	= 2	=	= 1	=
12te	=	= —	=	= 2	=	5te	=	= 8	=	= 3	=

Weimar, im Dezember 1833.

Indem ich den verehrlichen Leſern der Blumenzeitung mein hier anliegendes Samenverzeichniß einer geneigten Durchſicht empfehle, erlaube ich mir die Bemerkung: daß wenn ja bei meinen Sortimentsblumen ein reichhaltiges Numerverzeichniß zu vermiſſen wäre; dieſe dennoch und ganz beſonders einen jeden Blumenfreund vollkommen befriedigen werden, indem es um ſchöne Blumen und nicht um große Sortiments zu thun iſt. Auch von den übrigen Blumenſamen und Pflanzen habe ich nur diejenigen Sorten aufgenommen, welche wirklich ſchön blühend ſind: und da ich alles mit größter Sorgfalt ſelbſt ziehe, ſo kann ich für die Echtheit in jeder Beziehung einſtehn.

Auf Beſtellungen im Betrag von wenigſtens 25 rℓ werden 12 pr. Cent Rabatt gegeben.

Da ich von meiner Seite zur Befriedigung aller billigen Wünſche meiner geneigten Abnehmer alles aufbiete, ſo wird die Bedingung gewiß nicht unbillig erſcheinen, daß ich mit der Beſtellung auch jedesmal die Zahlung erwarte, welche in preuß. Courant auch in ſicheren Anweiſungen zu gewähren iſt.

J. Mooß.

Da mit nächſter Numer der „Blumenzeitung“ der diesjährige Jahrgang ſchließt, und mit dem 1. Januar 1834 der ſiebente Jahrgang beginnt, ſo erſuche ich beſonders diejenigen verehrlichen Leſer, welche ihre Exemplare durch die Poſt beziehen, ihre desfallſigen Beſtellungen für das Jahr 1834 geneigteſt wieder ehemöglichſt bei dem Wohllöbl. Poſtamte zu bewerkſtelligen, von welchem Sie bisher die Blätter bezogen haben.

Außer der „Blumenzeitung“ wird für das nächſte Jahr 1834 ferner bei Unterzeichnetem erſcheinen:

2) Gemeinnützliche Mittheilungen über Wein=, Obſt= und Gemüſebau ꝛc. Zweiter Jahrgang. Jährlich 1 Rß 5 ſgr. 6 ₰.
3) Allgemeines Unterhaltungsblatt. Neunter Jahrgang. Jährlich 1 Rß 27 ſgr.
4) Numismatiſche Zeitung. Jährlich 2 Rß. — 5) Weißenſeer Kreisblatt. — 6) Eckartsbergaer Kreisblatt.

Alle Zeitungs=Expeditionen und Poſt=Aemter, ſo wie alle ſolide Buchhandlungen des In= und Auslandes nehmen Beſtellungen darauf an. Auch können von den frühern Jahrgängen gedachter Zeitſchriften noch vollſtändige Exemplare abgelaſſen werden.

Weißenſee, im Dezember 1833.

Friedrich Häßler.

Verzeichniss
von
beſonders ſchönen, neuen und ganz neuen
gefüllten
Georginen oder Dahlien,
welche zu haben ſind
bei
Johann Caspar Grimm,
Neudietendorfer Commissions-Handlung in Gotha.

1834.

Den Georginenfreunden wird in dieſem Catalog wieder eine reiche Auswahl neuer und ganz neuer Sorten von beſonderer Schönheit, vollkommner Füllung, und ſeltener Farbenpracht, zu billigen Preiſen vorgeführt.

Wird mir die Wahl überlaſſen, ſo erlaſſe ich ſowohl von den niedrigen, als von den mittelhoch- und hochwachſenden Sorten, ausſchließlich der anemonenblüthigen, nachdem Vermehrung vorhanden iſt, 12 Stück ſchöne Sorten zu 1½ Thaler; 12 Stück ſehr ſchöne Sorten zu 2 Thaler; 12 Stück beſſere Sorten zu 3 Thaler; 12 Stück vorzüglich ſchöne Sorten zu 5 Thaler; 12 Stück Prachtblumen zu 8 Thaler; 12 Stück nur neue Prachtblumen zu 10 Thaler; 12 Stück Anemonenblüthige zu 6 Thaler; 100 Stück gute Sorten im Rummel zu 8 Thaler.

Saamen von vorzüglichen Sorten geſammelt, erlaſſe ich 25 Korn zu 4 gGr., 50 Korn zu 8 gGr., 100 Korn zu 12 gGr. Von anemonenblüthigen Georginen iſt dieſes Jahr kein Samen geerntet. —

Bemerkungen.

Die Zahlung geſchieht in Preußiſchem Courant oder in Treſorſcheinen.

Ohne Beifügung des baaren Betrags zu jeder Beſtellungsnote, oder einer ſichern Anweiſung kann nichts verabfolgt werden.

Die Aufträge werden portofrei erwartet, und bitte ergebenſt, nach Verhältniß der Beſtellung für nothwendige Emballage etwas beizulegen.

Die Beſtellung bitte ich auf ein beſonderes Blatt, und nicht in den Brief zu ſchreiben, damit ich dieſes als Beleg wieder mit zurückſenden kann; auch brauchen nur die Nummern der gewünſchten Sorten angegeben zu werden.

Die Beſtellungen werden der Reihe nach, ſo wie ſie eingegangen, vom Monat März bis Mai expedirt, und ſind desfallſige Erinnerungen überflüſſig. Um deutliche Unterſchrift und genaue Angabe des Wohnorts wird gebeten.

Druck von Jerome Hotop.

Kugelblüthige Georginen.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
1	4	4	Dark crimson, die ſchönſte u. wahrhafte Kugel-Georgine	48
2	5	4½	New red crimson, hell purpurfarbig	48

Anemonenblüthige Georginen.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
1	5	3	Anemonifl: Brown, braunroth	16
2	6	3	- Dicks, blutroth	16
3	5	3	- atrosanguinea, dunkelroth	16
4	5	4	- Tricuspidata, karminroth	16
5	5	4	- Booths, Lachsfarbige	16
6	7	4	- Lilacina, lilafarbig	16
7	5	4	- Sabina, orangefarbig	16
8	6	4	- purple crimson, purpur karmoiſin	16
9	6	4	- purpurea elegans, dunkel lilafarbig	16
10	6	4	- large Pink, groß, roſafarbig	16
11	6	4	- spectabilis, purpurviolett	16
12	5	4	- new scarlett, lebhaft ſcharlachroth	16
15	6	3	- feathered light crimson, ſcharlachfarbig	16
16	6	4	- dark red, ſchön dunkelroth	16

Niedrigwachſende oder Zwerg-Georginen.

Dieſe Zwerg-Georginen ſind für kleine Gärten beſonders zu empfehlen, eignen ſich ſehr zu niedrigen Gruppen, oder um einen Vordergrund zu bilden, und zeichnen ſich im Allgemeinen durch ihren außerordentlichen Blüthenreichthum aus.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
19	4	4½	Violett superbe, purpur violett, vielbl.	8
23	4	4	Lucile, ſehr ſchön lila	8
68	4	4	Antoinette, dunkelroſa	8
71	3	4	Damas, violett, vielbl.	8
84	3	4½	Favorite, gelb uud roth	8
85	3	4	Aurantiaca, orangenfarben	8
95	4	4	Grenat superbe, granatfarben, vielbl.	8
98	4	5	Nanine, rein weiß, lila ſchattirt.	12
116	4	4	Star of Brunswick, ſehr ſchön cochenille violett, vielbl.	24
117	4	4	Wells Triumph royal, ſchön tief kirſchroth, vielbl.	24
118	4	5	Aurantiaca rubicunda, orangenfarben und roth	8
119	4	4	Mundula, karmoiſinroth. vielbl.	16
121	4	4	Rubro elegant, ſchön lebhaft ſcharlach, vielbl.	8
133	4	4	Aurantiaca, ſchön orange	12
137	4	4	Amelina, ſchön violett und amaranth, vielbl.	12
141	3	4	Orange multifl., orange vielbl.	8
142	4	4	Lindor, ſchön orange, vielbl.	8
144	4	5	Luteola, chamoisfarbig, vielbl.	8
186	4	4	Amaranthe, amaranth und ponceau	12
194	3	4	Obscura, prächtig purpur granat	24
198	3	4	Zelinda, lebhaft kirſchroth, vielbl.	12
206	4	4	Mutabilis, ſchön karmoiſin, innen braun	12
208	4	4	Lilac pumila, ſchön lila, vielbl.	12
212	4	5	Purpurea, purpur violett	8
213	4	4	Ecarlate superbe, ſehr lebhaft ſcharlach, vielbl.	24
223	4	4	Fimbriata, ſchön dunkel ſammt ſcharlach	16
224	4	4	Ninette, ſchön roſafarben	12
230	4	4½	Buff dwarf, fleiſchfarben, roth ſchattirt, vielbl.	12
233	4	4	Violacea, blaß violett, innen weiß	8
236	4	4	Odier, zinnober, vielbl.	8
237	4	4	Eminent, prächtig ſammt ponceau braun, vielbl.	48
238	4	4	Lord Cochrane, ſehr ſchön braun purpur, vielbl.	24
242	4	4	Redouté, ſehr ſchön karminfarben, vielbl.	16
244	4	4	Amabile, ſchön roſafarben, vielbl.	12
247	4	4	Francisca, ſchön dunkelroſafarben	12
248	3	4	Xeno, dunkelroth, vielbl.	12
254	4	4	Xenophon, ſchön lilaroſa	12
258	4	4	Albicinia, weißlich, krausblätt., vielbl.	12
262	4	5	La vestale, ſehr ſchön reinweiß	24
265	4	5	Large dwarf lilac, purpur lila, vielbl.	12
268	4	5	Bella, prächtig tief amaranth, vielbl.	24
269	4	4	Bellona, prächtig ſammt amethyſt, vielbl.	24
273	4	4½	English Hero, prächtig ſammt karmoiſin purpur, vielbl.	24
276	4	4	Vesuvius. ſchön ſammt braun, vielbl.	12
277	4	4	Starry Pink, ſchön roſa, ſternartig	24
278	4	4	Man of Kent, prächtig karmoiſin purpur	24
282	4	4	Themis, ſehr ſchön kirſch purpur, vielbl.	24
286	3	4	Donna Maria, ſehr ſchön kirſch karmoiſin	12
295	3	4	Superba, violett karmoiſin, vielbl.	12
297	3	4	Confucius, amethyſtfarben	24
302	3	4	Stephanie, prächtig ſammt karmoiſin, vielbl.	48
311	2	3	Well's minima, karmoiſinfarben	16
312	4	4½	Sumit of perfection, amaranth	24
319	4	3	Daphne, ſehr ſchön roſa und weiß, vielbl.	24
324	4	4	Plants purpurea perfecta, ſehr ſchön purpur	24
326	4	4½	Rosea alba, ſehr ſchön roſa und weiß	24
328	4	6	Proteus, prachtvolle ganz neue Blume	48
329	3	4	Lady Banks, roſafarben, vielbl.	12
330	4	5	Dwarf Yellow, ſehr ſchön ſchwefelgelb	24
332	4	6	Marjolin, prächtig granat purpur	12
334	4	4	Philomele, ſehr ſchön kirſchroth, vielbl.	24
341	4	4½	Columbine, prachtvolle feuerigſte, ſcharlach, vielbl.	48
343	4	5	Cramoisie, ſchön purpur karmoiſin, vielbl.	12
348	4	3	Scarlet ranunculus, ſehr ſchön brennend ſcharlach	24
354	4	5	Sulphurea perlucida, prachtvoll gelb, vielbl.	24
357	3	3	Sulphurea minima, ſchwefelgelb vielbl.	12
361	4	4	Dark dwarf, rothbraun, vielbl.	12
366	2	4	Beauty in the Bush, violett purpur	24
367	4	4	Tribulata, ſehr ſchön violett, vielbl.	24
368	4	4	Pulla, ſehr ſchön dunkel ſammtbraun, vielbl.	24
373	4	4½	Victoria superba, ſehr ſchön kirſch karmoiſin, vielbl.	24
375	4	4	Marschall Rosetta, ſehr ſchön roth, vielbl.	24
377	2	4	Well's Deuk, ſehr ſchön kirſchroſa	24
388	4	4½	Lady Stanhope, ſehr ſchön kirſchkarmin	24
391	4	6	Royal lilac, prachtvoll lila, vielbl.	24
412	4	4	Pavonina, orangegelb und roth, vielbl.	12
419	4	4	Rouge bandé, roth, hellgelb gerändert	12
420	3	4	Icentia, ſchön dunkelviolett	8
421	4	5	Phoenix, prächtig ſammt ponceau	24
430	4	4	Cora, ſehr ſchön roſa und karmoiſin, vielbl.	24
431	4	5	Mayor, prächtig dunkel ſammtroth	12
434	4	4	Mentor, dunkel ſammtroth	12
442	4	4	Lila amoena, ſehr ſchön lila, vielbl.	12
446	4	4½	Dwarf golden Yellow, prächtig citronengelb	24
458	4	4½	Delphine, weiß mit violettem Schein	24
464	4	4	Fatime, ſchön citrongelb	12
470	3	4	Albinia, weiß, vielbl.	12
473	4	5	Espe, prachtvoll violett, mit karmoiſinfarb. Einfaſſung	24
491	3	4	Pygmaea, ſchön orangefarbig, vielbl.	24

Mittelhohe und hochwachſende Georginen.

Rein weisse.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
89	7	4	Lactea, ſchön weiß	8
104	5	4	Seratim Squibb's, ſehr ſchön weiß, nach inn. röthl. ſchein.	24
105	6	4½	Roi des Blancs, ſehr ſchön ganz rein weiß	24
125	6	4	Cygnus, milchweiß	12
187	6	4½	Vesta, rein weiß	8
209	6	4½	Mountains of snow, ganz rein weiß	24
211	6	4	Praecellentissima, zart weiß mit röthlichen Schein	24
241	6	4	Princesse Caroline, weiß mit zarten roſa Schein	12
255	5	4	Virginie, weiß mit lila Schein	16
299	5½	4	Donna Lisetta, weiß	12
303	6	4½	Nivalis, ſchön weiß	16
304	7	4	Blanc superbe, rein weiß	12
409	6	4	Anna, weiß, gelblichen Schein, vielbl.	12
428	5	4	Alabaster, rein weiß, vielbl.	12

Weiss mit andern Farben.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
16	7	4	Albicans, weiß, violett ſcheinend	8
18	6	5	Lilacina alba, lila weiß	8

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
30	6	4	Blanc rosé, weiß mit roſa Schein	12
37	6	4½	Blanc et violet, weiß mit violetten Schein	12
90	6	4	Blanc varié, weiß, lebhaft violett geſprenkelt	12
151	6	4½	Dumosa, ſchön weiß mit lila Schein	12
164	6	4	Alba rosea, weiß mit roſa Schein	12
178	6	4	Lady Lacon, weiß mit violetter Kante	16
183	5	4½	Saladin, weiß, violett geſprenkelt	16
234	5½	4	Leopoldine, weiß, violett getuſcht, innen weiß	12
284	5	4	Rosalinde, weiß, die Spitzen der Blätter lila umſchloſſen	12
370	6	4½	Alba lilacina, weiß mit lila	12
436	5	4	Rosetta, weiß und lila	16
439	5	5	Leda, prächtig weiß mit roſa Schein	24
462	5	4	Striata magnifica, weiß, lebh. roſa geſtr., innen weiß	24
480	5	4½	Sylvia, weiß, zart violett getuſcht	24

Rosafarbige.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
27	7	4	Actäon, ſehr ſchön roſa	12
55	6	4½	Angelina, ſchön roſafarben, innen weiß	12
61	6	4½	Rosalvina, ſehr ſchön roſa und weiß	16
77	6	4	Maria, roſa, violett geſtreift	8
94	5	3½	Rosa dentata, ſchön roſa, gezackt	8
127	5	4	Sappho, ſehr ſchön gelblich roſa, vielbl.	16
156	5	4½	Rosaletta, roſa innen weiß	12
160	5	4	Rosa amoena, roſafarbig, innen weiß	12
168	5	4	Rosea multifl., ſchön roſa, vielbl.	8
170	6	5	Animata, ſehr ſchön roſafarbig	12
316	5½	5	La demoiselle, ſehr ſchön roſa, innen weiß	16
320	6	4	Rosa nacarat, ſehr ſchön zart roſa, innen weiß	16
321	8	4	Rosa satiné, ſehr ſchön roſa	16
372	6	5	Rosa grandiflora, roſa mit purpur Schein	12
392	8	4	Duc of York, ſchön roſa	12
394	6	5	Pillichody, purpur roſa, weiß ſchattirt	12
404	5	4½	Thecla, roſa und weiß, ponceaufarben beſpritzt	48
497	5	4	Rosea alba, roſafarben, innen weiß	12
437	6	5	Amabile, zart roſa, innen weiß	16
449	5	4½	ſchöne Auguste, roſa innen weiß, violett getüpft	24
451	5	4	Leontine, roſa und weiß, roſa getuſcht	24
471	6	4½	Cölestine, prächtig roſa	24
472	5	3	Rosamunde, ſchön roſa, innen weiß	12
475	5	5	Rosalie, prächtig dunkelroſa nach innen weiß	24

Lilafarbige.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
124	5	6	Expansa, ſchön dunkellila	
157	6	4½	Juliet, ſchön lila	12
267	6	4½	Agathe, ſchön zart lila	12
281	6	4	Lila multifl., ſchön lila, vielbl.	12
289	5	5	Lila grandiflora, ſchön lila	8
323	6	5	Jessica, ſehr ſchön lila	24
398	6	4	Sublata, ſehr ſchön roſa lila	16

Violette.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
10	5	4	Violacea, ſehr ſchön violett	12
14	5	5	Prinz Friedrich, ſchön dunkelviolett	12
21	6	4	Violette multifl., ſchön violett, vielbl.	8
28	6	4½	Violacina, ſchön hellviolett	8
35	5½	4½	Violacea variabilis, ſchön hellviolett und weiß	12
38	5	4	Fanny, ſchön kirſchviolett, vielbl.	12
42	6	4½	Heinrich, ſchön ſammt violett	12
53	7	4½	Velour violette, ſammt violett	12
62	7	4	Violette á bandes, violett mit karmoiſin Einfaſſung	12
91	7	6	Purpurea violacea, prächtig purpur violett	12
100	5	3	Ranunculiflora, ſchön violett mit weißlicher Kante	24
176	6	5	Langley's purple, prächtig violett	12
191	6	5	Hugues, prächtig violett	12
197	6	4½	Atalante, ſehr ſchön violett und weiß bunt	12
259	5	4	Ranunculoides, ſchön purpur violett	8
263	6	4	Elisa, violettroth mit hellen Adern	8
403	4½	4	Fumosa, violett und purpur	12
414	6	4½	Ottocar, prächtig ſammt violett	24
426	5	5	Politor, prächtig ſammt violett, innen dunkel	12
429	5	5	Ariadne, prächtig violett	16
474	6	4	Violette elegant, ſehr ſchön purpur violett, vielbl.	12

Purpurfarbige.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
8	6	4½	Erecta, ſehr ſchön violett purpur	12
12	5	4½	Purpurea, ſchön purpurfarben	8
20	6	4	Purpurea elata, ſchön purpurfarben	12
25	7	4	Purpurea bicolor, ſchön zweifarbig purpur	12
32	6	4	Purpurea superba, ſchön purpurfarben	12
52	7	5	Cornelia, prächtig ſammt purpur	12
192	6	4	Regida, granat purpur	12
199	5½	5	Collvills perfecta, prächtig karmoiſin purpur	24
245	6	5	Purpurea striata, purpurfarb. mit lebh. hellen Streifen	12
275	6	4	Girardon braun purpur, vielbl.	12
280	6	5	Chamäleon, purpurfarbig, prächtig regelmäßig lebhaft lila bandirt	24
335	6	5	Thouin, ſammt purpur	12
375	6	4	Henriette Wilhelmine, purpur mit weiß geſtreift	12
402	5	4	Dorilas, dunkel ſammt purpur	12

Braune.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
9	6	5	Velours brun, ſammt braun	12
179	6	5	Beauty of Sussex, prächtig karmoiſin braun	12
180	8	5	Louis Philipp, prächtig ſammt karmoiſin braun	16
190	6	4	Grenat d' Orient, granatfarben	12
195	6	5	Empereur d' Autriche, ſammt braun	16
296	6	5	Coronada, ſehr ſchön ſammt braun	16
200	6	5	Leopold, ſehr ſchön ſammt braun	12
251	10	6	Louis Spohr, tief ſammt braun	12
291	7	4	Bruno, ſchön braun	8
318	5	5	Mogul, prächtig dunkel ſammt granat	48
400	5	5	Orpheus, ſchön dunkelbraun	12
440	7	5	Sesostris, prächtig dunkel ſammtbraun	16
454	5	4	Ethna, ſehr dunkel ſammtbraun	12
477	5	4	Nobla, ſehr ſchön ſammt karmoiſinbraun	8
478	5	5	Cordula, dunkel ſammtbraun	8
488	5	4	Grenada, ſchön granat braun	8

Carmoisinfarbige.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
65	6	5	Crimson, ſchön karmoiſinfarben	8
75	5	4	Miaulis, ſammt karmoiſin	8
86	6	4	Cramoisie superbe, ſchön karmoiſinfarbig, vielbl.	12
128	5	4½	Excelsa, ſehr ſchön karmoiſinfarbig, vielbl.	12
135	6	4	Fiametta, karmoiſin, mit ſammtbrauner Einfaſſung	12
177	7	4½	Handsome Aliance, karmoiſin mit weißem Herz	16
210	6	4½	Beauty of England, prächtig ſammt karmoiſin	12
301	7	4½	Archiduc Jean, dunkel ſammtroth karmoiſin	12
349	6	4	Dennisii, prächtig karmoiſinfarben	48
352	5	5	Cicero, prächtig karmoiſinroth	48
416	6	5	Theseus, prächtig ſammt karmoiſin	12
423	5	4	Justiniana, prächtig ſammt karmoiſin	12
424	5	5	Riehl, prächtig ſammt karmoiſin	24
466	5	5	Sultan, prächtig karmoiſin	12
475	5	4	Uminsky, prächtig ſammt karmoiſin	12
476	5	5	Grandesse, prächtig granat karmoiſin	24
492	5	4	Juliane, ſehr ſchön kirſchkarmoiſin, vielbl.	24

Carminfarbige.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
79	6	4	Muttata, prächtig karmin	12
169	5½	5	Achilles, prächtig karmin	8
249	6	4	Mme. Bilotti, roſa karmin, vielbl.	12
260	5	5	Ludolphus, karmin, roſa orange	12
287	5	4	Triumph purple, prächtig roſa karmin, vielbl.	12
308	8	5	Archiduc Louis, prächtig karminfarben	12
358	6	4	Casimir de Lavigne, ſehr ſchön roſa karmin	12
359	5	5	Surpasse Triumph Royal, prachtvoll roſa karmin	48
448	5	4½	Orphea, prächtig roſakarmin	24
487	6	5	Gloria, prächtig roſa karmin	48
499	6	5	Josephe, prächtig ponceau karmin	12

Dunkelrothe, braunrothe.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
4	5	5	Rubescens, dunkelroth	12
15	5	5	Triomphe de Louvain, braunroth	8

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
72	5	5	Rouge superbe, dunkelroth	12
203	6	5	Radiata, ſammt rothbraun	12
204	7	4½	Fastuosa, ſchön dunkelroth	12
239	6	5	Beauty of Hartfort, prächtig dunkel ſammtroth	16
240	6	5	Jupiter, ſammt braunroth mit tief geſchlitzten Blatt	16
272	6	4½	Queen of Augusta, prachtvoll ſammt amaranth, vielbl.	24
342	6	5	Duco di san - Cristina, prachtvoll ſammt amaranth	24
413	6	5	Hirta, dunkelkupferfarbig	12
467	6	4	Decora, ſehr ſchön dunkelroth	12

Hellrothe.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
112	7	4	Dodonea, ſchön roth	8
121	5	4	Viloresi, ſchön lebhaft roth	12
139	5	4	Rubra fulgens, ſehr ſchön roth	12
202	5½	4½	Lady Farnborough, ſchön ſammtroth	12
285	6	4	Clärchen, ſehr ſchön roth	12
408	6	4	Ardescens, ſehr ſchön lebhaft roth	12
438	6	4½	Harlequin, mit rothen u. gelben Blättern, auch ſo geſtr.	24
463	6	4	Rouge velouté, ſehr ſchön lebhaft ſammtroth	12
484	5	4	Budley, ſehr ſchön lebhaft ſammtroth	12
486	6	4	Varians, ſehr ſchön roth	12

Ponceaufarbige.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
92	8	5	Sun flower, ponceaufarben	12
115	5	4	Coccinea praenitens, ſchön ponceau	12
149	7	4	Gesner, prächtig ſammt ponceau, vielbl.	24
214	5	4	Morning star, ſehr ſchön lebhaft ponceau, vielbl.	12
216	8	4	Charles Pictet, ſehr ſchön ponceau	12
293	6	5	Lindleyana, ſammtbraun ponceau	12
356	8	6	Couynard, prächtig ponceau und ſammt karmoiſin	16
379	5	4	Brillanta, ſehr ſchön ponceau, vielbl.	8
382	7	4	Diadema, prachtvoll ſammt ponceau	12
389	6	4	Royal William, ſammt ponceau	24
496	7	5	Romeo, ſehr ſchön ſammt ponceau mit karmoiſin Schein	12

Scharlachfarbige.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
26	7	4½	Ardescens, ſchön ſcharlach	8
31	5	4½	Splendida, ſehr ſchön ſcharlach, vielbl.	16
47	6	6	Eclipse, dunkelſcharlach	8
81	6	4½	Belvedére, ſehr ſchön dunkelſcharlach	12
87	6	4½	Distincta, prächtig ſammt ſcharlach	12
113	6	4	Ecarlate, ſehr ſchön lebhaft ſcharlach	8
120	6	4	Bertram, prächtig ſcharlach	16
136	6	4	Saturn, ſehr ſchön ſcharlach	12
140	5	4	Canaris, dunkelſcharlach	12
152	5	4	Surpasse l'ecarlate, prächtig ſcharlach, vielbl.	48
201	6	4½	Scarlet Turban, prächtig ſehr lebhaft ſcharlach	24
220	8	4½	Prince de Metternich, ſehr ſchön ſcharlach	12
271	5	4	Ecarlate brillante, ſchön ſcharlachroth	12
307	5½	5	Soulange Bodin, lebhaft ſcharlach	12
313	6	5	Dubourg, prächtig lebhaft ſcharlach	24
340	6	4	Perle du Genre, coclicot	16
385	6	5	Comte de Rouvroy, prachtvoll lebhaft ſcharlach	24
410	6	4	Avemann, ſchön lebhaft ſcharlach	12
418	5	4	Feu ardent, ſehr lebhaft ſcharlach	8
422	5	4½	Comet, prächtig ſammt ſcharlach	24
465	5	4	Romulus, prächtig ſammt ſcharlach	16
468	5	4	Apollonius, ſehr ſchön matt ſcharlach	8
481	6	4½	Rumpfini, ſchön lebhaft ſcharlach	12
483	6	5	Formosa, prächtig lebhaft ſammt ſcharlach	12
405	6	5	Nestor, ſehr ſchön dunkel ſcharlach	12

Zinnober- und Nasturciumfarben.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
58	5	4	Henriette, ziegelroth	8
64	5	4	Johanna, orange zinnober	8
132	5	4	Fulgida, leuchtend zinnober	12
148	5	4	Brigitta, ſehr ſchön lebhaft zinnober	16
175	7	4	Priam Young's, prächtig lebhaft naſturcium	24
182	8	5	Suprem Squibb's, prächtig lebhaft naſturcium	24
222	6	4½	Crimson Seadling, tief zinnober	12
327	6	4	Flora speciosa, ſchön orange zinnober	12
397	7	5	Saint - Ours, ſammt naſturcium	12
425	5	4½	Theodore, prächtig ſammt zinnober	24
452	6	6	Jessonda, ſehr ſchön dunkel zinnoberfarben	12
457	7	4	Egmont, lebhaft zinnober	12
479	6	4	Ida, prächtig zinnober	24
494	6	4½	Schwediana, prächtig lebhaft naſturciumfarben	16

Orangefarbige.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
45	5½	5	Isabella, prächtig hoch orangeroth	12
74	6	4	Heloise, ſehr ſchön orange	12
78	5	4½	Oenone, ſehr ſchön hell orangegelb	16
80	6	6	Soleil d'or, prächtig orange und gelb	12
107	5	4½	Aurantiaca, ſehr ſchön orange	8
108	6	5	Ades, prächtig ſammt orange	24
109	5	4	Malvina, orangenfarben, vielbl.	12
111	6	4½	Lutescens, orangenroth	12
226	6	4½	Aurantiaca superba, ſehr ſchön orange	12
227	7	6	Aurantiaca magnifica, prachtvoll orange	16
228	6	4½	Duc d' Orleans, ſehr lebhaft golden orange	16
256	6	5	Aurantiaca pallida, hell orangefarben	12
279	7	5	Aurantiaca splendens, ſehr ſchön lebhaft orange	8
350	6	4½	Aurantiaca speciosa, ſehr ſchön ſammt orange	16
365	7	4½	Orange superbe, lebhaft orange und roth	12
435	5	5	Bicollorata, orangenfarben mit roth ſchattirt	16
453	6	4	Aurea variegata, ſehr ſchön goldgelb mit roth geſprenk.	12
460	5	4	Mirabilis, (fol. atropurp.) lebh. orange. in dunk. Laube	12
497	6	4	Arethusa, ſehr ſchön orange	12

Fleisch- und Nankinfarben.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
44	6	4	Camelina picta, chamoisfarben mit lila Spitzen	12
63	6	6	La Victorieuse, nankinfarben	12
66	5	5	Bijoux de Parade, prächtig dunkelchamois	12
70	5	4½	Lucina, hellgelb mit orange	12
193	6	4	Clementine, prächtig hellgelb	16
217	6	4	Latone, ſchön hell ockergelb	12
264	8	6	Marianna, gelb mit kirſchroth	8
292	6	5	Ochorille, hell ockergelb	8
406	5	4½	Mandarin, ockergelb und roth	12
411	5	4	Pomone, chamoisröthlich, vielbl.	12
445	5	4	schöne Mathilde, chamois, roſa angehaucht, mit gelbem Grund und Spitzen	24
459	5½	6	Armida, prächtig nankinfarben	12
485	6	4	Fuscata elegans, angenehm lebhaft nankinröthlich	12
498	6	4	Concordia, ſehr ſchön chamoisröthlich	24

Goldgelb, ſchwefelgelb, citrongelb.

Nummer.	Fußhöhe der Pflanz.	Zolldurchm. d. Blumen.		gGr.
5	5	5	Sulphurea ambla, ſchön citrongelb	8
40	7	4	Transparent, weißgelb in röthlich ſchillernd	12
43	5	4	Sulphurea multifl., ſchwefelgelb, vielbl.	8
69	6	4½	Geisterholm, weißgelb	16
76	6	5	Martinet, ſchwefelgelb	12
97	5	5	Calipso, ſchwefelgelb und roth getuſcht	24
110	6	4	Sulphurea speciosa, ſchwefelgelb, vielbl.	12
129	5	6	Sulphurea flavescens, ſchwefelgelb mit nankin Schein	8
154	7	4	D'oré brillante, ſchön citrongelb	12
165	5	4½	Pavonia, goldgelb mit lebh. rother Schattirung, vielbl.	24
205	6	4	Alceste, ſchön ſchwefelgelb, vielbl.	12
215	6	4	Nemesis, ſehr ſchön citrongelb, vielbl.	12
221	6	4	Aurea miniata, goldfarben und mennigroth, vielbl.	12
266	6	4	Anlitta, ſehr ſchön citrongelb, vielbl.	12
288	5	5	Aurea, ſehr ſchön röthlich goldgelb	8
290	5	4	Matavai, ſehr ſchön ſchwefelgelb	12
374	6	4½	Florissima elegans, ſehr ſchön lebh. citrongelb, vielbl.	12
399	6	5	Vittata, prächtig lebh. ſchwefelg., zuweilen roth geſtreift	12
401	6	4½	Esther, ganz blaßgelb, mit roth lebhaft ſchattirt	12
443	5	4½	Yelva, ſehr ſchön ſchwefelgelb, vielbl.	24
444	6	4½	Citron pyramide, lebhaft citrongelb	12
455	5	4½	Sulphurea superba, ſehr ſchön lebhaft ſchwefelgelb	24
461	6	5	Venus urania, prächtig rein königsgelb	24
469	5	4	Graciosa, ſehr ſchön gelb, zuweilen roth geſtrichelt	12
493	6	5	Galathe, ſehr ſchön ſchwefelgelb	24

Verzeichniß
von
Gemüſe-, Rabatten- und Topf-Blumenſaamen,
welche für das Jahr 1834 ganz ächt und friſch zu haben ſind
im Baumgarten zu Weimar,
bei
J. Mooß,
Tit. fürſtl. Heſſen-Rotenburg. Hofgärtner.

Kohl und Kraut.

à Loth	gGr.	Pf.
Blumenkohl, großer Cypriſcher ſpäter beſter	8	—
— — früher Cypriſcher	7	—
Kraut oder Kopfkohl, Erfurter großes weißes	1	6
— — — Holländ., weißes frühes	1	6
— — — Braunſchweiger, großes plattes	1	8
— — — Erfurter blutrothes, zu Sallat	1	8
— — — Holländiſch, kleines ſchwarzrothes frühes	2	—
Wirſing oder Herzkohl, Erfurter großer gelber Winter-	1	6
— — — gewöhnlicher krauſer grüner	1	—
— — — Blumenthaler gelber Savoyer	1	6
— — — Ulmer niedr. ganz frühſter extra	2	4
Kohl, Brüßler Sproſſen- oder Roſenkohl	1	6
— Franzöſiſcher bunter Plumage-	1	6
— grüner Federkohl	1	—
— hoher grüner krauſer Winter-	1	—
— hoher blauer	1	—
— niedriger grüner	—	9
— — blauer	—	9
— Schnitt- oder Frühlingskohl, krauſer blauer	—	4
— Engl. grüner blumenkohlblättriger	—	6
Seekohl (Crambe maritima)	2	—
[illegible] oder Morcoll	—	4
Oberkohlrabi, große weiße ſpäte	1	—
— Engliſche weiße frühe	1	6
— — blaue	2	—
— Wiener, kleinblättrige niedrige weiße früheſte	2	6
Unterkohlrabi oder Kohlrüben, große weiße	1	—
— — gelbe Schwediſche od. Rutabaga, extra	1	6

Wurzeln- und Rübenſaamen.

à Loth	gGr.	Pf.
Carotten od. Möhren, frühe kurze rothe zum Treiben	1	—
— — — Frankfurter dunkelrothe lange	1	—
— — — Braunſchweiger lange rothe	—	6
— — — Erfurter lange rothgelbe	—	6
Wurzeln, Cichorien-, lange glatte	—	9
— Hafer-Wurzel	1	—
— Paſtinak-, große	—	6
— Peterſilie-, Erfurter lange dicke	1	—
— Rapontika	—	6
— Scorzonere oder Schwarzwurzel	1	—
— Sellerie, Holländiſcher großer Knollen-	1	6
— — krausblättriger	1	6
Zuckerwurzel	1	6
Rüben, weiße Holländiſche frühe Mai-	—	6
— gelbe lange	1	—
— lange weiße Herbſt- oder Stoppel-	—	6
— blutrothe Sallat- oder [illegible]	—	6
— goldgelbe Sallat- oder [illegible]	—	6
Runkel- oder Dickrüben, ganz große rothe à Pfund	4	—
Radies, weiße frühe Holländiſche kurzlaubige runde	1	—
— roſenrothe runde	1	6
Rettig, Erfurter großer ſchwarzer Winter-	1	—
— Wiener Sommer-	1	—

Erbſen.

	gGr.	Pf.
A. Zucker-Erbſen:		
frühe weißblühende [illegible] à Pfund	6	—
große graue blaublühende Säbel- —	5	—
früheſte niedrige Zwerg- —	5	—
B. Kneifel-Erbſen:		
frühe große Mai- à Pfund	3	6
Erfurter frühe große Klunker- —	2	—
Franzöſiſche frühe Zwerg-, extra —	5	—
[illegible] frühe	4	—
Spargelerbſen à Loth	—	6

Bohnen.

	gGr.	Pf.
A. Stangenbohnen:		
Arabiſche große bunte Feuerbohne à Pfund	4	—
— weiße	4	—
lange breite weiße Schwertbohne (extra) —	5	—
— bunte Schwert- (ſehr volltragend) —	5	—
kleine weiße Perl- oder [illegible]bohne —	4	—
rothmarmorirte ſogenannte Zuckerbohne —	3	—
grüne weißſchalige [illegible]	4	—
B. Buſch- oder Zwergbohnen:		
ſchwarze oder Florentiner —	3	—
weiße Schwert-, extra —	3	—
weiße liebſte Holländ., vorzüglich zum Treiben.	3	
gelbe Dattel- —	3	—
C. Puffbohnen:		
frühe grüne Mailänder —	3	—
rothe Engliſche —	3	—
große Martin- —	2	—
Türkiſch oder Welſch Korn (Zea Mais) —	4	—

Küchenkräuter.

à Loth	gGr.	Pf.
Baſilicum, großes Küchen-	1	6
Bohnenkraut	1	—
Dill	—	6
Fenchel, gemeiner	—	6
Gartenkreſſe, gefüllte krausblättrige	1	—
— — einfache breitblättrige	—	6
Yſop	1	—
Körbel, gewöhnlicher	—	4
— — gefüllter	—	8
Lavendel oder Spicke	1	—
Löffelkraut	1	6
Majoran, Franzöſiſcher buſchiger	1	6
Meliſſe, feine Citronen-	2	—
Peterſilie, einfache Schnitt-	—	4
— gefüllte krausblättrige	—	9
Pimpinell	1	—
Portulack, gelber	1	6
Salbey, gewöhnliche	1	—
Spinat, breitblättriger rundkörniger	—	4
— ſchmalblättriger ſpitzkörniger	—	3
Thymian	1	6
Weinraute	1	6

Sallat-Sorten.

	gGr.	Pf.
Aſiatiſcher, großer gelber	2	4
Prinzenkopf, engl.	2	—
Arabiſcher, größter beſter	2	—
Schwedenkopf, brauner	2	—
Mohrenkopf oder Kaiſerſallat	2	—
Forellen-, großer bunter	1	6
Steinkopf-, früher feſter grüner (Winterſallat)	1	6
Melange der beſten Sorten	1	—
Winter-Endivien, krausblättrige gelbe	1	6
Sommer-Endivien oder Bindſallat	1	6
Rabinschen	—	6

Zwiebeln.

à Loth	gGr.	Pf.
Erfurter blaßrothe runde harte	1	6
Holländiſche runde ſilberweiße, extra	2	6
— blutrothe	2	—
— lange gelbe ſüße Birn-	2	—
Porree, dicker Winter-	1	6

Kern-Sorten.

	gGr.	Pf.
Artiſchocken, große	2	6
Gurkenkerne, Erfurter grüne volltragende	1	—
— Naumburger grüne Schlangen-	2	—
— Hall'ſche mittellange grüne	1	6
— weiße Schlangen- à Priſe 1 Gr.	4	—
— frühe grüne Stachl- zum Treiben	1	—
— allerfrüheſte kurze Miſtbeet- à Loth	2	6
Cucumis deliciosus odoratus, wohlſchmeckende, wie Ananas riechende Gurke . 6 Priſe	1	—
Kürbiskerne.		
Melonenkürbis, größter, (erreicht ein Gewicht von 200 Pfund) . 6 Kerne	1	—
Zierkürbis in 12 der ſchönſten Sorten mit Namen, die einzelne Priſe 1 Gr. zuſammen	8	—
Melonen, ein Sortiment in 8 der beſten Sorten	8	—
— Schlangenmelone 3—4 Fuß lang, à Priſe	1	—
— Orangenmelone, ſehr volltragend u. gut à Pr.	1	6
— Angurie mit rothem Fleiſch, extra	1	—
Spargelkerne, Darmſtädter weiße à Pfund	8	—

Blumenſaamen.

Sommergewächſe, oder einjährige.

Von allen in Loth angegebenen Sorten, ſind auch Priſen zu 1 gGr. zu haben, niemals aber halbe Priſen.

	gGr.	Pf.
Aster chinensis fl. pl., gefüllte Röhraſtern: No 1. Dunkelroth. 2. Dunkelblau. 3 Fleiſchfarbe. 4 Weiß. 5 Roſa. 6. Hellblau. 7. Blau mit Weiß. 8. Roth mit Weiß. 9. Hellblau mit weißer Blatteinfaſſung. 10. Hochroth mit weißer Blatteinfaſſung . . die Priſe à 100 Körner	1	6
Dieſe zehn Sorten von jeder Sorte eine Priſe	12	—
Dieſelben 8 Sorten gemiſcht die Priſe zu 400 Kr.	3	—
Aster annuus, Zwerg-Aſtern in 6 Farben gemiſcht à 200 Körner	1	6
Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoyen, in folgenden, ſehr viel gefüllte gebenden Sorten:		
Engliſche Sorten.		
No 1. Apfelblüthe. 2 Lichtblau. 3. Kupferroth 4 Roſenfarbe. 5 Rothbraun. 6. Aſchblau. 7. Carminroth. 8. Blaßbraun. 9. Mordorée. 10. Blaßlilla. 11 Ziegelroth. 12 Violett. 13. Weiß 14. Carminroth, lackblättrig 15 Fleiſchfarbig, lackblättrig. 16 Mordorée, lackblättrig. 17. Weiß, lackblättrig 18 Zimmtbraun, lackblättrig. 19 Rothbraun, lackblättrig à 100 Körner	1	6
Halb-Engliſche Sorten.		
No. 20 Fleiſchfarbig. 21. Weiß. 22 Hellblau. 23. Dunkelblau. 24. Blaßbraun. 25 Mordorée. 26. Hochcarminroth. 27. Dunkelkupferroth. 28. Dunkelroſa. 29 Ziegelroth. 30. Aſchgrau à 100 Körner	1	6
Spätblühende od. perennirende Sorten.		
No 31. Carmoiſinroth, Engl 32 Dunkelblau, Engl 33 Kupferfarbe, Engl. 34. Weiß, Engl. 35. Carmoiſinroth, Halbengl. 36. Dunkelbraun, Halbengl. 37 Fleiſchfarbig, Halbengl 38. Ziegelroth, Halbengl. 39. Weiß, Halbengl. 40. Carminroth, Halbengl. lackbl. à 100 Körner	1	6
Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen: A Hochroth. D. Weiß. E. Dunkelblau. H. Hellviolett. I. Zimmt- oder Kupferf. K. Violette Baumlevkoye. L Roſa. A A. Carmoiſin, brennend. A. B. Weiß, lackbl. C. Carminroth, lackbl. à 100 Körner	1	—
Das Sortiment Sommer-, Herbſt- und Winter-Levkoyen in 50 Sorten . . . 2 Rthlr.	12	—
desgl. engl. und halbengl. Sommer-Levkoyen in 30 Sorten . . 1 Rthlr.	6	—
desgl. halb engl. Sommer-Levkoyen in 12 Sorten	16	—
12 Sorten Sommerlevkoyen gemiſcht circa 400 Kr.	4	—
8 Sorten Herbſt-Levkoyen gemiſcht circa 400 Kr.	4	—
6 Sorten Winterlevkoyen gemiſcht, circa 400 Kr.	4	—
Adonis autumnalis, hochrothes Adonisröschen	1	6
Ageratum mexicanum, blaues Ageratum	1	6
Agrostemma coeli rosa, glattblättrige Gartenrade	1	—
Amaranthus caudatus, Fuchsſchwanz	1	—
— — speciosus, prächtiger	1	—
Antirrhinum orontium, Kalbsnaſe	1	—
— — triphyllum, dreibl. Löwenmaul	1	—
Anoda dillenia, blaue Anoda, ſchön	1	6
Anthemis arabica, Arabiſche Camille	1	—
Aster tenellus, zarte kleine blaue Aſter	1	—
Athanasia annua, jährige Athanaſie	1	—
Briza maxima, größtes Zittergras	1	—
— minor, kleines Zittergras	1	—
Cacalia sonchifolia, rothe Cacalie	1	6
Calceolaria pinnata, gefied. Pantoffelblume (ſchön!)	2	—
Calendula officinalis fl. pl. aureo, goldgelbe gefüllte Ringelblume	1	—
— pluvialis, Regen-Ringelblume	1	—
Campanula speculum, Venusſpiegel, blau, weiß und roth	1	6
Centaurea cyanus, Gartenkornblume, verſchiedene Farben	—	9
— moschata fl. albo, weiße Flockenblume	1	—
— — fl. coeruleo, blaue	1	—
— suaveolens, gelbe wohlriechende	1	6
Centranthus calcitrapa (Valeriana calcitrapa)	1	—
Cerinthe major, große Wachsblume	1	—
Cheiranthus maritimus, Meerlevkoye, roth und weiße	1	—
Chrysanthemum carinatum, ſchönſte Wucherblume	1	6
— coronarium fl. pl. albo, weißgefüllte	1	—
— — fl. pl. aureo, goldgelbgefüllte	1	—
Clarkia pulchella, ſchönſte Clarkia (beſ. ſchön u. neu!)	1	6
Convolvulus bicolor, zweifarbige Winde	1	—
— tricolor, dreifarbige Winde	1	—
Coreopsis tinctoria, färbende Wanzenblume	1	—
Corydalis aurea, goldfarbiger Erdrauch	1	—
Collinsia grandiflora, großbl. Collinſia, neu	1	6
— linearis, ſchmalblättrige	1	—
Cotula coronopifolia, zu Einfaſſungen (ſchön)	1	6
Chenopodium aromaticum, gewürzhafter Gänſefuß	1	6
Crepis barbata, bärtiger Pippau	1	—
— rubra, roſenrothe und weiße Grundfeſte	1	—

Verzeichniß

für das Jahr 1834

von Blumen- und Gemüse-Saamen,

welcher von der besten Qualität um beigeſetzte Preiſe zu haben iſt

bei

Friedrich Rauſche,

Kunſt- und Handelsgärtner in Weimar (vormals in Tonndorf).

Die Preiſe ſind nach Preußiſchem Courant geſtellt, der Thaler zu 24 gGroſchen oder 1 fl. 48 kr.

Kohl-Saamen.

	Loth gr	pf
1 Blumenkohl, ganz früher, großer Cypriſcher	8	—
2 — mittelfrüher, Engliſcher	7	—
3a — ſpäter, großer ſpäter	8	—
3b Meer- oder Seekohl, crambe maritima, ſehr delikat	4	—
4 Kraut oder Kopfkohl, weißes, frühes Erfurter	1	—
5 — — — — großes ſpätes dergl.	1	6
6 — — — — niedriges, ganz frühes ſpitziges Yorkſhire	3	—
7 — — — — groß ſpitz. Winnigſtädt.	2	—
8 — — — — Braunſchw. groß platt.	1	6
9 — — — frühes, niedrig., Erfurt. Rothkr.	2	—
10 — — — ſpätes, groß. Holland. blutroth.	2	—
11 Wirſing od. Herzkohl, krauſer, grüner Herbſt	1	—
12 — — großer Erfurter Winter	1	6
13 — — früher, niedriger Ulmer	2	6
14 — — ſpäter, großer dergl.	2	—
15 — — Brüßler Sproſſen- oder Roſenkohl	2	—
16 Krauskohl od. Blaukohl, grüner niedriger Winter	—	6
17 — — brauner dergleichen	—	9
18 — — grüner und blauer, melirt	—	6
19 — — dunkelbrauner, niedriger Bardowicker	1	—
20 Schnitt- oder Frühlingskohl	—	4
21 — — großblättriger, Engliſcher	—	6
22 Oberkohlrabi, große weiße	1	—
23 — — frühe Engliſche	1	6
24 — — — niedrige Wiener	2	6
25 — große blaue	1	—
26 Kohlrüben oder Unterkohlrabi, weiße	1	—
27 — — — gelbe	1	6

Wurzel- und Rüben-Saamen.

	Loth gr	pf
28 Carotten oder Möhren, frühe kurze Holländiſche, zum Treiben	1	—
29 — — — frühe lange Hornſche dergleichen	1	—
30 — — — lange rothe Engliſche, 1 Pfund 12 gr.	—	9
31 — — — gewöhnliche, lange gelbe, 1 Pfund 10 gr.	—	6
32 — — — [illegible], lange weißgelbe, 1 Pfd. 9 gr.	—	6
33 Cichorien-Wurzel	—	9
34 Paſtinat-Wurzel	—	4
35 Peterſilienwurzel	—	6
36 Scorzonere- oder Schwarzwurzel	1	—
37 Haberwurzeln	1	—
38 Zuckerwurzeln	1	6
39 Knollenſellerie, großer	1	—
40 Rüben, große lange weiße Feld, 1 Pfund 7 gr.	—	6
41 — lange, runde, weiße Mai	—	9
42 — — — gelbe dergleichen	1	—
43 — kleine Teltower oder Märkiſche	1	—
44 Runkelrüben, lange, über ſich wachſende, rothe, 1 Pfd. 8 gr.	—	4
45 — — gelbe	—	6
46 — — runde rothe	—	6
47 — — runde weiße	—	6
48 Rothe Rüben, lange zum Salat	—	6
49 — — runde dergleichen	—	9
50 Mangold	—	6

Radies und Rettige.

	Loth gr	pf
51 Radies, frühe, runde, weiße Monats	1	—
52 " " " rothe dergleichen	1	—
53 " " " roſenrothe dergleichen	1	4
54 " " lange dergleichen	1	6
55 Rettige, Erfurter lange ſchwarze Winter	1	6
56 " Holländiſche runde dergleichen	1	—
57 " " " Sommer	1	—
58 " Wiener, gelbe Sommer	1	—

Erbſen-Sorten.

	Loth gr	pf
59 Zucker-Erbſen, frühe, Engliſche weißblühende 1 Pfund 6 gr.	—	4
60 " große Engl. weißblühende Schwerdt 1 Pfd. 7 gr.	—	4
61 " " blaublühende, graue dergl. 1 Pfd. 5 gr.	—	4
62 " frühe, niedrige Zwerg 1 Pfund 6 gr.	—	4
63 [illegible]-Erbſen, frühe, niedrige Mai 1 Pfund 4 gr.	—	3
64 " früheſte, niedrige Engliſche 1 Pfund 5 gr.	—	3
65 " Erfurter, große Klunker 1 Pfund 2 gr.	—	2
66 " ſpäte Gold- oder [illegible] 1 Pfund 3 gr.	—	2
67 " frühe, niedrige Zwerg 1 Pfund 3 gr.	—	2

Bohnen-Sorten.

	Loth gr	pf
68 Stangenbohnen, lange, weiße, breite Schwerdt 1 Pfund 8 gr.	—	4
69 " bunte, breite Schwerdt 1 Pfund 6 "	—	4
70 " Arabiſche oder Feuerbohnen 1 Pfund 4 "	—	3
71 " " " " weiße 1 Pfund 5 "	—	4
72 " bunte Spargel- oder Zucker 1 Pfund 5 "	—	3
73 " kleine Perl- oder [illegible], zum Einmachen 1 Pfund 5 "	—	3
74 " bunte weißſchaalige [illegible] 1 Pfund 12 "	—	9
75 Buſchbohnen, frühe, gelbe Schwerdt zum Treiben 1 Pfund 4 "	—	3
76 " frühe ſchwarze zum Treiben 1 Pfund 4 "	—	3
77 " frühe, weiße Holländiſche dergleichen 1 Pfund 5 "	—	4
78 " bunte Zucker 1 Pfund 4 "	—	3
79 " frühe, weiße, kleine Erfurter Feld 1 Pfund 2 "	—	2
80 Puffbohnen, gewöhnliche große Garten 1 Pfund 2 "	—	2
81 " ganz große weiße Windſor 1 Pfund 5 "	—	3
82 " ganz rothe dergleichen 1 Pfund 5 "	—	3
83 " große grüne [illegible] 1 Pfund 4 "	—	3
84 " ſehr niedrige Zwerg, zum Einfaſſen der Rabatten 1 Pfund 6 "	—	4

Salat-Saamen.

	Loth gr	pf
85 Kopfſalat, früher, gelber Steinkopf, auch zum Treiben	2	—
86 " früher, grauer dergleichen	2	6
87 " großer, gelber [illegible]	2	6
88 " großer, gelber [illegible]	2	—
89 " großer, gelber Sicilianiſcher	1	6
90 " großer, gelber Prinzenkopf	1	6
91 " großer, gelber Schwedenkopf	1	6
92 " großer, brauner [illegible]	2	—
93 " großer, bunter Forellen	3	—
94 " kleiner Blutforellen oder Herzblatt	2	—
95 " großer, gelber Berliner	1	6
96 " großer, gelber Mailänder, mit gelbem Saamen	1	6
97 " Bunter	1	—
98 " Melange	1	—
99 " Stech- oder Sternſalat	—	9
100 " Bindſalat, Römiſcher großer gelber	2	—
101 " " " rother	2	—
102 Endivien, grüne krauſe Winter	1	—
103 " breiter [illegible]	1	—
104 " gelbe Engliſche Sommer	2	—
105 Rapünzchen oder Feldſalat	—	6

Zwiebel-Saamen.

	Loth gr	pf
106 Zwiebeln, große rothe harte Erfurter	1	—
107 " große blaßrothe harte Holländiſche	1	6
108 " große ſilberweiße Holländiſche	2	—
109 " große, lange, ſüße Birn	2	—
110 " große, rothe Spaniſche Pflanz	1	—
111 " große, gelbe Spaniſche Pflanz	1	—
112 " große, weiße Spaniſche Pflanz	1	6
113 Porree oder Spaniſcher Lauch, Winter	1	6

Steck-Zwiebeln.

	Loth gr	pf
114 Steckzwiebeln, gelbrothe, mehre Sorten 100 Stück	3	—
115 " Rokambol 100 Stück	6	—
116 " Schalotten, große 100 Stück	6	—
117 " Schalotten, kleinere 100 Stück	4	—
118 " Knoblauch 100 Stück	6	—

Küchen- und Suppenkräuter-Saamen.

	Loth gr	pf
119 Baſilicum, großer	1	6
120 " kleiner	2	—
121 Boretſch oder Gurkenkraut	1	6
122 Dill	—	6
123 Fenchel	—	6
124 Gartenkreſſe	—	6
125 " gefüllte, krauſe	1	—
126 Kerbel	—	6
127 " gefüllter	1	—
128 Majoran	4	—
129 Peterſilie	—	6
130 " gefüllte, krauſe	1	—
131 Portulack, gelber	1	6
132 Salbei	1	6
133 Spinat, langblättriger 1 Pfund 5 gr.	—	4
134 " rundblättriger 1 Pfund 5 gr.	—	4
135 " großer, breitbl. Engl. 1 Pfund 6 gr.	—	6
136 Thimian	2	—
137 Weinraute	1	6

Kern-Sorten.

	Loth gr	pf
138 Artiſchocken, große	2	6
139 Cardon d'Espagne, ſpaniſche Cardy	2	—
140 Gurkenkern, grüne Erfurter Mittellange	1	6
141 " grüne, lange Holländiſche Schlangen	2	—
142 " weiße, lange Holländiſche Schlangen	4	—
143 Melonenkern, Melange	6	—
144 " in Sorten	8	—
145 Kürbiskern, gewöhnliche große Feld	—	6
146 " große Herkuleskeulen 6 Kern	2	—
147 " große Türkenbund 6 Kern	2	—
148 " große Melonen, 100 Pfund ſchwer 6 Kern	2	—
149 " große Centner 6 Kern	2	—
150 " große Flaſchen 6 Kern	2	—
151 " kleine, Apfel, Birn, Spiel 6 Kern	1	—
152 Spargelkern, Darmſtädter	1	—

Blumen-Saamen.

Einige d. vorzüglichſten ſchönblüh. Sommergewächſe.

	1 Priſe gr	pf
153 Adonis autumnalis, rothe Herbſt-Adonis	1	—
154 Adonis flammea, feuriges Adonis-Röschen	1	6
155 Agrostema coeli rosa, glattblättrige Rade	1	6
156 Amaranthus caudatus, Fuchsſchwanz	1	—
157 " sanguineus, blutrother Amaranth	1	—
158 Anoda dillenii, blaue Anoda, ſchön	1	6
159 Anthemis arabica, Arabiſche Kamille	1	6
160 Antirrhinum speciosum, ſchönſtes	1	—
161 " triphyllum, dreiblättr. Löwenmaul	1	—
162 " versicolor, buntes dergleichen	1	6
163 Arctotis calendulacea, ringelblumenart. Bärenohr	1	—
164 Athanasia annua	2	—
165 Atriplex hortensis	1	—
166 " sanguinea, blutrothe Gartenmelde	1	—
167 Aster chinensis fl. pl., gefüllte Chineſ. Federaſter	1	—
168 Extragefüllte Röhrenaſter in folgenden Sorten: 1) Dunkelroth. 2) Dunkelroth und Weiß. 3) Fleiſchfarbig. 4) Dunkelblau. 5) Dunkelblau mit Weiß. 6) Blaßroth. 7) Blaßroth mit Weiß. 8) Blaßblau. 9) [illegible] 10) [illegible] 11) Fleiſchfarbig-roth. 12) Aſchgrau. 13) Blaßrother Bandaſter 14) Dunkelrother dergl. 15) Dunkelblauer dergl. 16) Blaßblau dergl. 17) Hellblau mit Weiß. 18) Dunkelkarmoiſin. Jede Sorte zu 100 Körnern	2	—
19) Zwerg-, Blaßroth mit Weiß, Band- 20) Zwerg-blauroth, Band- 21) Roth mit Weiß, Zwerg- 22) Carmoiſin mit Weiß, Zwerg-. Jede Sorte zu 100 Körnern	2	—
Das ganze Sortiment in 22 Priſen, jede 50 Körner	20	—
Das ganze Sortiment melirt zu 400 Körnern	4	—
Das ganze Sortiment melirt 1 Loth	12	—
169 Niedr. dunkelrothe gefüllte Türk. Aſter. 100 Körn.	2	—
170 Argemone ochroleuca, okerfarbiger, neu u. ſchön	2	—
171 Atropa physalodes, Tollkraut	1	—
172 Cacalia sonchifolia, ſcharlachrothe Cacalie	2	—
173 Calendula hortens. fl. pl., gefüllte Gartenringelbl.	1	—
174 " " " aurea, goldgelbe dergl.	1	6
175 " pluvialis, Regen verkünd. Ringelbl.	1	—
176 " hybrida, Baſtard-Ringelblume, ſchön	1	6
177 Calliopsis bicolor, das ſchöne Geſicht	2	—
178 Campanula speculum, blauer Frauenſpiegel	1	6
179 " " fl. albo, weißer dergl.	2	—
180 Capsicum annuum, rother ſpaniſcher Pfeffer	1	—
181 Carthamus tinctorius, Saflor, 1 Loth 2 gr.	—	6
182 Catananche coerulea, blaue Raſſelblume	1	6
183 " lutea, gelbe dergleichen	1	6
184 Centaurea americana, 3 Körner	4	—
185 " cyanus fl. pl., gefüllte Kornblume	1	—
186 " moschata fl. albo, weiße Biſamflockenbl.	1	—
187 " " " rubra, rothe dergl.	1	—
188 " suaveolens, ſtark riechende dergl.	1	6
189 " crocodylium, Krokodillblume	1	—
190 Centranthus calcitrapa, Valeriane	1	6
191 Cerinthe major, große Wachsblume	1	—
192 Cheiranthus annuus fl. pleno, gefüllte Sommerlevkoyen in vielen Farben, 1 Loth	10	—

Ferner in folgenden ſehr ſtark ins Gefüllte fallenden Sorten, jedem Blumenliebhaber beſonders zu empfehlen.

	gr	pf
I. Engliſche Sorten.		
193 Nr. 1. Hellaſchgrau. 2. Violettblau. 3. Blaßblau. 4. Hochroth. 5. Ziegelroth. 6. Violett. 7. Dunkelmordoree. 8. Schwarzbraun. 9 Weiß. 10. Carminroth. 11. Blaßbraun. 12. Dunkelbraun. 13. Dunkelaſchgrau. 14. Metzgerbraun. 15. Roſa. 16. Kupferfarbe. 17. Pfirſichblüth. 78. Blaßlilla. Von jeder Sorte die Priſe zu 100 Körnern	1	6
II. Engliſche mit dem Lackblatte. 18. Metzgerbraun. 19. Zimmtbraun. 20. Weiß. 21. Fleiſchfarbig. 22. Mordoree. 23. Hochroth. 24. Blaßbraun. 25. Blaßziegelroth. 26. Dunkelblau. 70. Roſa. 72. Blaßblau. 80. Aſchgrau. 82. Kaſtanienbraun. Die Priſe von jeder Sorte zu 100 Körner	1	6
III. Halbengliſche oder Pyramiden-Sommerlevkoyen. 27. Carmoiſin. 28. Dunkelmordoree. 29. Pfirſichblüth. 30. Ziegelroth. 31. Lilla. 32. Blaßbraun. 33 Roſa. 34. Hellblau 35. Zimmtbraun. 71. Weiß. 73. Aſchgrau. 74. Kupferroth. 75. Violett. 76. Dunkelbraun. 57. Kaſtanienbraun. Die Priſe jeder Sorte.	1	6
IV. Halbengliſche mit dem Lackblatte. 36. Roſa. 37. Hellblau. 38. Weiß. 39. Violett. Die Priſe jeder Sorte	1	6
V. Herbſt- oder Baſtard-Levkoyen. 40 Roſa. 41. Dunkelbraun Engl. 42. Violett Engl. 43. Dunkelziegelroth. 44. Hochroth Engl. 45 Fleiſchfarbe. 46. Weiß Engl. 47. Caſtanienbraun. 48. Carminroth. 49. Hellziegelroth. 50. Pfirſichblüth. 51. Carminroth Engl. mit dem Lackblatt. 52. Dunkelmordoree Engl. 53. Carminroth Engl. 54 Blaßbraun. 55. Lilla. 56. Kupferbraun Engl. 59. Ziegelroth mit Lackblatt. 100 Körner von jeder Sorte	1	6

Von vorſtehenden Sorten Levkoyen ſind nachſtehende Sortimente zu haben:

	Loth	gr	pf
194	Ein Sortiment von 10 ſchönen Sorten, jede zu 100 Körnern . . . — rf	14	—
195	Ein Sortiment von 15 ſchönen Sorten, jede zu 100 Körnern . . — ,	20	—
196	Desgl. 20 ſchöne Sorten, jede zu 200 K. 2 ,	4	—
197	Desgl. 21 ſchöne Sorten, jede zu 100 K. 2 ,	10	—
198	Desgl. 30 ſchöne Sorten, jede zu 100 K. 2 ,	16	—
199	Desgl. 35 ſchöne Sorten, jede zu 100 K. 2 ,	6	—
200	Desgl. 40 ſchöne Sorten Sommer- und Winterlevkoyen, jede zu 100 Körnern 2 ,	12	—
201	Cheiranthus cheiri fl. pleno, gefüllter brauner Wiener Goldlack, 100 Körner . .	1	6
202	Cheiranthus cheiri fl. plenissimo, extragefüllter dunkelbrauner Goldlack, 100 Körner	8	—
203	Cheiranthus cheiri atro violaceo, ſchwarzbrauner Lack, 100 Körner . . .	2	—
204	Cheiranthus incanus fl. pleno, gefüllte Winterlevkoyen, melirt à Loth 12 gr. und in folgenden ſehr ſtark im Gefüllte fallende Sorten: VI. Winterlevkoyen. Lit. A. Hochroth. B. Roſa. C. Weiß. D. Rothe Kirſchlevkoye. E. Hochroth und Lackblatt. F. Weiß mit Lackblatt. G. Zimmtbraun. H. Hellviolett. I. Violette Baumlevkoye. K. Carminroth. L. Blaulila. M. Dunkelroth, baumartig. N. Violett mit Lackblatt. O. Weiß, Schwarzloch. 100 Körner von jeder Sorte . . .	1	6
205	Das ganze Sortiment v. 14 Sorten, jede zu 100 K.	20	—
206	Melange in 400 Körnern . . . Sowohl v. Sommer- als Winterlevkoyen kann unter 100 K. von einer Sorte nicht gegeben werden.	6	—
207	Cheiranthus maritimus, Grasleve zum Einfaſſen der Rabatten . .	1	—
208	Cheiranthus maritimus fl. albo, weiße .	1	—
209	Cheiranthus tricuspidatus, dreiſpitzige Levkoye	2	—
210	Chrysanthemum carinatum, ſchöne Wucherbl.	1	6
211	„ „ aureum, goldgelbe	2	—
212	„ coronarium albo pl., weißgefüllte	1	—
213	„ „ luteo pl., gelbgefüllte	1	—
214	Clarkia pulchella, ſchöne Clarkie, ganz neu u. ſchön	4	—
215	„ „ mit ganz dunkeln Blumen	4	—
216	„ „ fl. albo . . .	4	—
217	Collinsia grandifl., großbl. Collinſie, neu u. ſchön	4	—
218	Collomia grandifl., großblumige Collomie, desgl.	3	—
219	„ linearis, ſchmalblättrige . .	2	—
220	„ pinnatifida, gefiederte . .	3	—
221	Convolvulus bicolor, zweifarbige Winde .	1	—
222	„ tricolor, dreifarbige Winde	1	—
223	Coreopsis Leucanthemum, goldgelbe Wanzenbl.	1	—
224	Crepis barbata (Tolpis), gelbe Grundfeſte	1	—
225	„ rubra, rothe Grundfeſte . .	1	—
226	Corydalis aurea, goldgelber Erdrauch .	1	6
227	Cosmea bipinnat., doppelt gefiederte Cosmen	1	6
228	Cynoglossum linifol., weißbl. Vergißmeinnicht	—	6
229	Cyrticapnos Africanus, Afrikaniſche Blaſenraute	1	—
230	Delphinium Ajacis elatior, hohe gefüllte Ritterſporn, in 8 Farben gemiſcht à Loth .	6	—
231	Delphinium Ajacis fl. pleno, extragefüllter niedriger Ritterſporn, 10 Farben à Loth . und in folgenden extragefüllten Sorten:	6	—
232	Nro. 1. Weiß. 2. Blaßlilla. 3. Blaßziegelroth. 4. Violett. 5. Blaßblau. 6. Blaßbraun. 7. Dunkelziegelroth. 8. Aſchblau. 9. Milchweiß. 10. Lederfarbig. 1 Loth in Sorten .	4	—
	Das ganze Sortiment, ~~von jeder~~ Sorte 1 Priſe	12	—
	Das ganze ~~Sortiment~~ in 400 Körnern melirt	6	—
~~233 Delph~~	~~inium~~ consolida pl., hoher gefüllter Levkoyen-Ritterſporn . . .	1	—
234	Das ganze Sortiment davon in 6 Sorten, von jeder 1 Priſe	8	—
235	Das ganze Sortiment melirt, 1 Loth :	6	—
236	Dracocephalum Moldavicum, blaue und weiße Türkiſche Meliſſe	1	—
237	Echium Creticum, Cretiſcher Natterkopf .	1	—
238	„ grandiflorum, großblumiger .	1	6
239	Elychrisum lucidum, glänzende Strohblume	1	6
240	„ bracteatum fl. albo . .	4	—
241	Euphorbia literat., rothſtreifige Wolfsmilch	1	—
242	Galineoga trilobata, dreilappige Galinſoge	1	6
243	Gilia capitat., kopfförmige Gilie, neu und ſchön	1	6
244	Glaucium phoeniceum, ſcharlachrothbl. Hornmohn	1	6
245	Goridella nigellastrum . . .	1	—
246	Grahamia aromatica, gewürzhafte Grahamie, neu	2	—
247	Georgina variabilis fl. pleno, gefüllte .	2	—
248	„ extragefüllte, blos von Hauptblumen geſammelt, 100 Körner	6	—
249	Ein Sortiment extragefüllter Georginen in 24 Sorten, jede zu 25 Körnern 1 rf 12 gr .		
250	Hebenstreitia aurea, goldfarbige Hebenſte.	1	6
251	„ tenuifolia, feinblättrige .	1	6
252	Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblumen	1	—
253	„ „ „ aurantiaca, goldgelbe	1	—
254	„ „ „ sulphurea, ſchwefelgelbe	1	—
255	„ „ nanus, niedriggefüllte .	1	6
256	Hibiscus Trionum, Stunden-Hibiskus .	1	—
257	„ vesicarius, Blaſen-Hibiskus, ſchön	1	—
258	„ longifolius, langblättriger .	1	—
259	Hippocrepis multisiliquos., vielfrucht. Hufeiſenkr.	1	—
260	Hyoscyamus pictus, bemaltes Bilſenkraut	1	—
261	Iberis amara, weiße Schleifenblume, 1 Loth 3 gr	—	6
262	„ umbellata, Doldentragende . .	1	—
263	„ pinnata, gefiederte dergleichen .	1	6
264	„ umbellata purpurea, dunkelrothe .	1	6
265	Impatiens balsamina plena, gefüllte Balſaminen, verſchiedene Sorten, melirt à Loth 16 gr und in folgenden ſehr ſtark gefüllten Sorten:	1	—
266	Nr. 1. Violett. 2. Scharlachroth. 3. Fleiſchfarbig. 4. Braunroth. 5. Weiß. 6. Dunkellilla. 7. Weiß mit carmin- und ſcharlachrothen Streifen. 8. Carmoiſinroth. 9. Weiß mit Scharlach. 10. Weiß mit Lilla. 11. Weiß mit Kupfer. 12. Blaßroth. 13. Silberweiß. 14. Roſa. 15. Dunkelcarmin. 16. Weiß mit Carmin und Lilla. 17. Lilla und Carmoiſin. 100 Körner	3	—
267	Das ganze Sortiment von 16 Sorten, à 25 Körner	21	—
268	Das ganze Sortiment von 12 Sorten, à 25 Körner	10	—
269	Das ganze Sortiment von 6 Sorten, à 25 Körner	8	—
270	Ipomea coccinea, ſcharlachrothe Trichterwinde	2	—
271	„ purpurea, purpurrothe . .	1	—
272	„ Sibirica, Sibiriſche . . .	1	—
273	„ triloba, dreilappige, ſchön .	1	6
274	Ein Sortiment von 12 verſchiedenen Sorten Trichterwinden	10	—
275	Kalmia vesicaria, neue großblumige Kelmie	3	—
276	Lathyrus articulatus, gefiederte rothe Wicke	1	—
277	„ odoratus, wohlriechende ſpaniſche Wicke, 1 Loth 2 gr . .	1	—
278	„ „ striatus, neu u. ſchön. 1 Loth 8 gr	2	—
279	„ in Sorten: weiß, dunkelroth, dunkel mit hellroth, ſchwarzblau mit hellblau, ſchwarzblau mit violett, 1 Loth .	3	—
280	„ tingitanus, Afrikaniſche . .	1	—
281	„ tumidus, zweifelhafte . .	1	—
282	„ sativus, himmelblaue Wicke .	1	—
283	Lavatera trimestris, rothe Sommerpappel	1	6
284	Leonurus nepalensis, nepaliſche Mutterwurzel	1	—
285	Lopezia excellaris, doldenblüthige Lopezie	1	6
286	Lotus tetragonobilis, Spargelerbſe zum Einfaſſen der Rabatten, 2 Loth 2 gr. ,	—	—

287	Lupinus albus, weiße Lupine, 1 Loth 2 gr.	1	—
288	Lupinus angustifol. coerul., ſchmalblättrige blaue Lupine. 1 Loth 2 gr. .	1	—
289	Lupinus angustifol. luteus, gelbe. 1 Loth 2 gr.	1	—
290	„ bicolor, zweifarbige, niedlich. 4 Körner	3	—
291	„ pilosus, haarige, rothe, gelbe und fleiſchfarbige. 1 Loth 2 gr.	1	—
292	„ flore variegatus, 2 Korn . .	1	—
293	Lychnis Corsica, Korſiſche Lychnis .	2	—
294	„ laeta	1	—
295	Lycopsis versicolor, bunte Lolopſis, niedlich	2	6
296	Madia elegans, ganz neu und ſchön .	4	—
297	Malope trifida, dreitheilige Malope, ſchön	1	6
298	„ grandiflora, ganz neu, vorzüglich ſchön	4	—
299	Malva Mauritiana, weiß und roth .	1	—
300	„ fragrans, wohlriechende . .	1	2
301	Maurulea violacea, violette Maurulea .	1	6
302	Mirabilis Jalappa, rothe Jalappe, diverſe Sorten	1	—
303	„ longiflora, langblumige, diverſe Sorten	1	—
304	Nemophylla phaceloides, ganz neu u. ſchön, 4 K	2	—
305	Nicotiana Langsdorfii, gelbblühender Taback	1	—
306	„ nyctaginiflora, nächtlichblühender	1	6
307	„ vincaeflora, weißblühender .	1	6
308	„ undulata, wellenförmiger .	1	—
309	„ acuminata, zugeſpitzter, aus Chili	1	—
310	„ octovalvis, achttheiliger . .	1	6
311	„ glauca, 15 bis 20 Fuß hoch .	4	—
312	„ atrosanguinea, ganz neu, vorzügl. ſchön	6	—
313	Nigella Damascena, gefüllter Schwarzkümmel	1	—
314	„ Cretica.	1	—
315	„ Hispanica.	1	6
316	Oenothera amoena, angen. Nachtkerze neu u. ſchön	1	—
317	„ „ pavonia, dergl. mit roth. Schildern	4	—
318	„ muricata, weichſtachlichte . .	1	—
319	„ rhizocarpa, knollige, ſtengelloſe .	1	—
320	„ Lindleyana, Lindley's Nachtkerze, ſchön	2	—
321	„ „ pavonia, dergl. mit roth. Schildern	4	—
322	„ grandiflora, großblumige . .	1	—
323	„ odorata, wohlriechende . .	1	—
324	„ purpurea, purpurrothe . .	1	—
325	„ longiflora, langblüthige . .	1	—
326	„ Romanzowii, blaue . .	1	—
327	„ suaveolens, wohlriech. . .	1	—
328	„ tetraptera, vierflüglige . .	1	—
329	„ „ anisoloba, anisblättrige, ſehr ſchöne gelbe Oenothera . .	4	—
330	Papaver hortensis fl. pleno, großer, gefüllter Gartenmohn, 1 Loth 3 gr.	1	—
331	„ „ „ versicol., geſtreifte Gartm.	1	—
332	„ rhoeas fl. pleno, gefüllter Ranunkelmohn, 1 Loth 4 gr.	1	—
333	Pocockia Cretica, Cretiſche Pocockie .	1	6
334	Polygonum orientale, roth. morgenl. Knöterig	1	—
335	„ „ fl. albo, weißer dergl.	1	—
336	Reseda odorata, wohlriechende Reſeda, 1 Loth 5 gr	1	—
337	Ricinus Africanus, Afrikaniſche Wunderblume	1	6
338	Ricinus communis, gemeine dergl. 1 Loth 6 gr	1	6
339	Ricinus lividus, rothblättriger . .	1	6
340	Ricinus viridis, grüner . . .	1	6
341	Rudbeckia alat., geflügelte Rudbeckie .	1	6
342	Rudbeck. amplexicaulis, den Stengel umfaſſ.	1	6
343	Rudbeck. oppositifol., paarblättrige .	1	6
344	Salvia horminum, blaublühende Scharlachſalbey	1	—
345	„ „ rothblühende dergleichen	1	—
346	Sanvitalia procumbens, geſtreckte Sanvitalie	1	6
347	Scabios. atropurpur., ſchwarzrothe Scabioſe	1	—
348	„ „ dergleichen große .	1	6
349	„ stellata, weiße Stern-Scabioſe	1	—
350	Schyzanthus pinnat. gefied. Schyzanth., neu u. ſch.	3	—
351	Scorzonera tingitan., goldgelbe Haferwurzel	1	—
352	Scorpiurus muric., ſtumpfſtachlicht. Scorpionskr.	1	—
353	„ vermiculat., wurmförm. Raupenklee	1	—
354	Senecio elegans albo pl., weißgefülltes Kreuzk.	1	6
355	„ „ purpureo pl., purpurroth. dgl	1	—
356	„ „ roseo pl., roſenrothes dergl.	1	6
357	„ „ violac., violett dergleichen.	4	—
358	Silene armeria, Garten-Silene . .	1	—
359	„ Atocion, niedrige, roſenrothe .	1	6
360	„ quinquevulner., fünfeckige . .	1	—
361	„ vespertin., Abend-Silene . .	1	—
362	Solanum lycopersicum, rother Liebesapfel	1	—
363	„ „ aurea, gelber dergl.	1	—
364	Sycios angulat., eckige Haargurke zur ſchnellen Bekleidung von Lauben	1	—
365	Tagetes coronopifol., ſtarkriechende Sammetbl.	2	—
366	„ erect. fl. pl. aurantiaco, goldgelbe gefüllte Sammetblume . .	1	—
367	„ erecta fl. pl. sulphur., ſchwefelgelbe	1	—
368	„ patul. fl. pl., ausgebreitete .	1	—
369	„ prostrat., niedergebogene dergl., neu	1	6
370	„ minim. fl. pl., kleinſte gefüllte .	1	—
371	„ patula fl. pl. ranunculoides, ſchön	2	—
372	„ striat., geſtreifte . . .	1	6
373	Trachimeni coerul., ganz neu, 1 Kern 1 gr	1	—
374	Trifolium incarnatum, incarnatrothblüh. Klee	1	—
375	„ melilotus fl. coeruleo, blau. Melilotenkl.	1	—
376	„ speciosum, prächtiger . .	1	6
377	Tropaeolum majus, große Indianiſche Kreſſe	1	—
378	„ minus, kleine . . .	1	6
379	„ fusc., ganz neu, purpurfarb. 2 Körn.	4	—
380	Viccia fab. fl. rubro, rothblühende amerikaniſche Puffbohne, 4 Körner	1	6
381	Valerianella conject. . . .	1	6
382	Viola tricolor grandiflor., großbl. Stiefmütterch.	1	—
383	„ „ „ nigr., ſchwarzes dgl.	1	6
384	Xeranthemum annuum, Papierblume .	1	—
385	„ „ fl. pl. albo, weißgefüllte	1	6
386	„ „ coeruleo pl., blau dergl.	1	—
387	Ximenesia enceloides, geöhrte Ximeneſie	1	—
388	Zoegea centaur.	2	—
389	Zinnia aur., goldgelbe Zinnie . .	1	6
390	„ elb., ganz neu . . .	2	—
391	„ coccin., ganz neu, ſehr ſchön .	4	—
392	„ elegans, ſchönblühende .	2	—
393	„ grandifl., großblum., blau .	1	6
394	„ multifl., vielblumige . .	1	—
395	„ paucifl., wenigblühende . .	1	—
396	„ revolut., zurückgebogene . .	2	—
397	„ verticillat., wirbelförmige .	1	—
398	Ein Sortiment ſchönblühender Blumenſaamen in 100 Sorten . . . . 2 Thlr.	—	—
399	In 75 Sorten . . . . 1 ,	16	—
400	In 50 Sorten . . . . 1 ,	—	—
401	In 36 Sorten . . . . — ,	20	—
402	In 24 Sorten . . . . — ,	16	—
403	In 12 Sorten . . . . — ,	8	—

Saamen von ſchönblühenden, perennirenden, im Freien ausdauernden Blumen, auf Rabatten und engliſche Garten-Anlagen zu verpflanzen.

404	Aconitum album, weißer Sturmhut .	2	—
405	Actaea racemos., traubige Schwarzwurzel	2	—
406	Adenophora suaveolens, wohlriechendes Kernglöckchen	2	—
407	Agrostema coronar., rothe Gartenrade .	1	—
408	„ „ alba, weiße dergleichen	1	—
409	„ flos Jovis, Jupiters Rade .	1	—

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Fur Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion ubernommen.

Der Porto-Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr 9 pf. (4 gGr. 6 pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 pf. (4 gGr. 6 pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

Nº XXVI. Weißenſee, (in Thüringen). Dezember 1833. VI. Jahrg.

Neue und ſeltene Blumen.

Blumen- und Gartenfreunden widme ich die ergebene Anzeige, daß mein neues Samen-Verzeichniß pro 1834 erſchienen und ſofort von mir zu beziehen iſt. Es enthält auch diesmal, obſchon die Witterung manche ſchöne Hoffnung eines guten Samenbaues zerſtörte, der neueſten und ſchönſten Blumen ſehr viele, wovon ich hier nur einige im Auszuge mittheile.

a) Sommergewächſe. Argemone nova species. — Aster chinensis, 6 Sorten Zwergaſter, à 100 Körner 2 gr. Calandrinia nov. species. C. speciosa. Centaurea americ. 4 gr. Clarkia pulchella fl. albo 4. Collinsia grandiflor. 3 gr. Delphinium Ajacis bicolor ¼ Loth 6 gr. Elychrisum bracteatum fl. albo 3 gr. Gilia capitata fl. albo 4 gr. Impatiens Balsamina nana 15 K. 4 gr. Lupinus Cruikschanskii 3 gr. L. mutabilis 3 gr. Madia elegans 4 gr. Malope grandifl. 4 gr. Mimulus anticolor 2 gr. M. quinquevulnerus 6 gr. M. variegatus 3 gr. Mirabilis longiflor. fl. violaceo 4 gr. Nolana atriplicifol. 3 gr. Oenothera taraxifol. 4 gr. Podolepis gracilis 4 gr. Salpiglossis atropurpur. 3. S. Barkleyan. 4 gr. S. Bark. albifl. 4 gr. S. Bark. lillacea 6 gr. S. B. fuscat. 8 gr. S. Bark. intermedia 6 gr. S. B. speciosa 8 gr. S. picta 4 gr. S. straminea 3 gr. Tithonia tagetiflor. 3 Körner 8 gr. Trachymene coerulea 4 gr. Tropaeolum majus var. bruneum 4 gr. Zinnia elegans fl. albo 4 gr. — fl. carneo 4 gr. — fl. coccineo 4 gr. — fl. coccineo grandifl. 6 gr. — fl. incarnato 6 gr. lillacea tenuiflor. 4 gr. fl. roseo 4 gr. fl. violaceo 6 gr. Zoegea Leptaurea 2 gr.

b) Perennirende. Aquilegia bicolor (grandifl.) 3. Corthusa Mathioli 3 gr. Delphinium chinensis, 2 Farben, à 3 gr. D. grandifl. fl. albo 4 gr. Echinops bannaticus 3 gr. Eryngium alpinum 2 gr. Galardia aristata 3 gr. G. bicolor 2 gr. Lupinus polyphyllus div. Sorten 3 gr. L. pol. albus 4 gr. Ononis rotundifol. 3 gr. Penstemon ovatus 4 gr. Silene compacta 3 gr. Wahlenbergia grandiflor. 3 gr.

c) Topfgewächſe. Acacia salicifol. 3 K. 8 gr. Amphierephis intermedia 3 gr. Begonia heracleifol. 3 gr. B. incarnata 3 gr. Calceolaria arachnoidea 6 gr. C. atropurpurea 12 gr. bicolor 6 gr. cericea 8 gr. coerulescens 10 gr. corymbosa 4 gr. crenatiflor. 8 gr. Leonidas 16 gr. lutescens rosea 12 gr. Millerii 16 gr. Pressii aurantiac. 10 gr. Pr. purpurea 10 gr. punicea 10 gr. sanguinea 8 gr. Taylori 16 gr. tricolor 8 gr. Alexandria 10 gr. Gilani 8 gr. Youngii 12 gr. picta 12 gr. turbinata 8 gr. Campanula pyramid. fl. albo 3 gr. Celosia pyramid. 4 gr. Coffea arabica 2 K. 4 gr. Eccremocarpus scaber 3 gr. Francoa appenticulata 6 gr. Ipomopsis elegans 8 gr. Kunthia xalapensis 8 gr. Lophospermum scandens 3 gr. Marica coerulea 3 gr. Paeonia arborea 2 K. 6 gr. Passiflora kermesina 3 K. 4 gr. Ludonii 3 K. 6 gr. princeps rubra 3 K. 4 gr. Primula chinensis fl. albo 4 gr. Salpiglossis integrifolia 12 gr. Schyzanthus retusus 12 gr.

Unter den hier aufgeführten Blumen-Samen verdienen die neuen, ſehr ſchönen Salpigloſſen, die eine wahre Zierde in Töpfen und im freien Lande ſind, beſondere Aufmerkſamkeit; ſie variiren in den mannichfaltigſten Farben, ſo daß aus den hier angezeigten noch 10 bis 20 andere entſpringen werden; ſie lieben einen mehr trocknen als feuchten Standort, und müſſen bei anhaltendem Regen bedeckt werden.

Auch die ſchönen Formen der Zinnia elegans ſind prachtvoll zu nennen, und ſie erheben dieſes ſo lange bekannte Sommergewächs zu den vorzüglichſten unſerer Schmuckblumen.

Ueber die Calceolarien habe ich bereits in Nr. 19 dieſer Blätter das Nöthige geſagt, und wiederhole nur, daß die Anzucht wegen des ſehr feinen Samens zwar mühſam aber außerordentlich belohnend iſt.

Die allerneueſte Pflanze in Samen, und die vielleicht noch in keinem Verzeichniß zu finden ſein dürfte, iſt die prachtvolle Schyzanthus retusus, eine mehrjährige immergrüne Pflanze aus Chili, bisher nur in wenigen engliſchen Gärten bekannt, wo ſie noch ſehr theuer gehalten wurde; bei zeitiger Ausſaat blüht ſie im erſten Sommer und kann durch Stecklinge leicht vermehrt werden; ſie brillirt ſowohl in Töpfen als auch im freien Lande bis ſpät im Herbſt.

Dieſer zur Seite kann die nicht minder ſchöne Salpiglossis integrifolia (nach Hock) oder Petunica mirabilis (nach Reichenbach) geſtellt werden; ſie iſt, wie jene, eine Zierde in Töpfen, und blüht bei mehrmaligem Verſetzen vom Juni bis Nov. Im freien Lande wuchert ſie in jedem Boden und läßt ſich zu Gruppirungen mit andern Pflanzen als auch zu Parthien für ſich allein trefflich benutzen und hier gewähren die tauſende von purpurvioletten Blumen einen überaus reizenden Anblick. Zum Samentragen iſt dieſe Prachtpflanze nicht ſehr geneigt, und ſelbſt künſtliche Befruchtung verfehlt ihren Zweck; deſto leichter vermehrt ſie ſich durch Stecklinge, ſo wie auch häufig die aufliegenden Zweige Wurzeln ſchlagen. Zum Durchwintern genügt ein froſtfreier Behälter, wo Licht und wenigſtens einige Stunden die Sonne einwirken kann.

Noch empfehle ich eine ſehr niedliche einjährige Fettpflanze, das Sedum coeruleum (Ledb.) vom Althaigebirge in Aſien, die ſich zu einer zarten Einfaſſung der Blumenbeete benutzen läßt. Der Same iſt außerordentlich fein, und muß deshalb im Topf angezogen werden, die man mit etwas ſandiger, guter Erde anfüllt, den Samen ohne ihn zu bedecken blos aufſäet, durch einen Unterſetznapf befeuchtet und mit einer Glasſcheibe belegt. Sind die jungen Pflänzchen erſtarkt, ſo pflanzt man ſie auf eine ſonnige Stelle ins freie Land; hier machen ſie beſonders auf einer erhöhten Stelle einen ſehr lieblichen Effect, indem die ganzen Pflanzen mit tauſenden von blauen Sternchen wie überſäet ſind; ſie nüanciren auch in heller und dunkler Farbe. Die Priſe koſtet 6 gr.

Alle übrigen Sämereien, als vollſtändige Sortimente von Aſtern, Balſaminen, Levkoyen, Ritterſporn, Malven, Nelken, u. d. m. ſo wie alle gangbaren Gemüſeſorten ſind, wie früher zu haben. Erfurt, im Dezember 1833.

Friedrich Adolph Haage jun.

Ueber die Erziehung der Eriken, Rhododendren, Melaleuken, Metroſideren, Leptoſpermum u. ſ. w. aus Samen. (Fortſetzung).

(Mitgetheilt von P. aus W.)

§. 7. Iſt der Winter glücklich überſtanden und hat man keine Fröſte mehr zu befürchten, ſo bringe man die Pflanzen auf eine Stellage gegen Morgen oder Abend, lockere dieſelben und putze ſie aus, welches auch während des Winters öfters geſchehen muß, und gieße ſie zuweilen mit einer feinen Brauſe, damit der Staub und alle Unreinigkeit gehörig abgeſchwemmt werde. Man gieße anfangs, wenn es die Witterung geſtattet, täglich Morgens, ſpäter, bei zunehmender Wärme und wenn warme Nächte eintreten, Abends. Das Aufſtellen der Pflanzen auf die Stellage muß möglichſt geſchmackvoll geſchehen. Die hohen Pflanzen bringe man in die Mitte, ſo daß die Stellage nach beiden Seiten durch immer niedrigere Pflanzen Fall bekommt, und ſo dem Auge einen gefälligen Anblick darbietet.

§. 8. Das Verſetzen der Pflanzen wird im Monat Juni vorgenommen. Die im §. 1. beſchriebene Erde ſiebe man vor dem Gebrauch nochmals, und mache dann den Anfang mit dem Verſetzen nach folgender Vorſchrift: Man nehme die Pflanze mit dem Töpfchen in die linke Hand, drehe ſie ſo um, daß man das Töpfchen durch einen leichten Stoß von derſelben entledigt, nehme ſodann den Wurzelrallen und lockere die alte Erde rund um mit einem Hölzchen etwas auf und ſchneide alle feinen filzartig verwachſenen Wurzeln mit einem ſcharfen Meſſer ab. Man entblöße die Wurzeln übrigens nie zu ſtark von der Erde, ſondern ſtets nur ſo, daß die Pflanze noch einen guten Wurzelballen behält. Dann nehme man die zum Verſetzen nöthigen Töpfe, welche im Durchſchnitt einen Zoll weiter ſeyn müſſen, als die erſtern, belege das Abzugsloch mit einer hohlliegenden Scherbe, bringe dann ½ Zoll hoch Erde darauf, ſetze die Pflanze ein, und füttre dieſelbe mit Erde gehörig rundum aus. Nach dem Verſetzen derſelben gieße man ſogleich jede Pflanze an und ſtelle ſie ſämmtlich einige Tage lang auf den mit Bretern belegten Boden in Schatten.

Die im verfloſſenen Herbſt nicht verpflanzten Eriken, Azaleen, Rhododendren ꝛc. verpflanze man nun ebenfalls einzeln in kleine Scherben, und ſtelle ſie dann ſo lange in Schatten im Freien oder in dem Glashaus, bis ſie durch ihr geſundes Ausſehen auf die Bewurzelung ſchließen laſſen.

(Fortſetzung folgt.)

Beſchreibung und Cultur einiger ausgezeichneten neuern Zierpflanzen.

(Mitgetheilt vom Herzogl. Hofgärtner Hrn. J. W. Boſſe in Oldenburg).

(Fortſetzung.)

Cleome spinosa L. Dornige Cleome. Eine einjährige Zierpflanze, einheimiſch in Oſtindien und Braſilien. Der Stengel iſt aufrecht, 4 — 6 Fuß hoch, klebrig-weichhaarig, gleich den Aeſten an der Baſis der Blattſtiele mit ſcharfen Dornen verſehen. Die Blätter geſtielt, 5- und 7zählig, fingerförmig; die Blättchen 1 1/2 — 2 1/2 Zoll lang, 16 — 18 Linien breit, oval-eirund, an beiden Enden zugeſpitzt, kurzſtielig, glatt, nur auf den Rippen und Adern der Unterfläche mehr oder minder weichhaarig; die Blütheſtandsblätter kurzſtielig, einfach, eirund-herzförmig, theils herzförmig. Die Blumen 6fädig, ſchön, weiß, äußerlich in's Röthliche ſchimmernd, in reichblumigen Endtrauben; die Kronblätter 9 — 10 Linien lang. Die Hülſe glatt. — Blüht vom Juni, Juli bis Spätherbſt. — Der Samen von dieſer Art, wie auch von Cleome pungens, C'. rosea u. a. wird im März oder April in

einen Topf in lockere Lauberde geſäet, und dieſer in ein warmes Miſtbeet geſenkt. Die jungen Pflanzen werden anfangs in 4zöllige, ſpäterhin nochmals mit unverſehrten Wurzelballen in 8zöllige Töpfe verpflanzt, und ſtets unter Glas warm, mäßig feucht, bei warmer Witterung aber auch luftig gehalten. Im Juni kann man aus den Töpfen mehrere Pflanzen an eine warme, ſonnige Stelle in's Land ſetzen, woſelbſt ſie reichlich blühen, und, wenn der Sommer günſtig iſt, und der Boden nicht zu fett, (wodurch die einjährigen Pflanzen mehr in's Kraut treiben, aber minder geneigt ſind, Samen anzuſetzen), auch reifen Samen tragen.

Beantwortung

der in Nro. 20 des fünften Jahrgangs der Blumenzeitung enthaltenen Anfrage: Welche Pflanze wohl am beſten und zweckmäßigſten zur Bekleidung einer Laube ſey?

Unter allen hierzu geeigneten Pflanzen gebührt unſtreitig der Aristolochia *) Sipho **). L'Herit. der Heberblume oder dem Pfeifenſtrauch, der erſte Platz.

Es gehört dieſer nordamerikaniſche Strauch zur 20. Claſſe (Gynandria) und 4. Ordnung (Hexandria) des Linnéiſchen Syſtems. Sein Stamm theilt ſich unten in einige Zweige, welche ſich an den Bäumen, Mauern ꝛc. hinaufwinden und eine beträchtliche Höhe erreichen. An denſelben ſtehen ziemlich große herzförmige Blätter auf dunkelbraunen, glatten Stielen; ſie ſind 8 — 10 Zoll lang und 6 — 8 Zoll breit, oben hellgrün, glatt, unten aber mit einzelnen feinen Härchen beſetzt. Die kelchloſen Blumen, die aber erſt an 5- — 6jährigen Stöcken erſcheinen, kommen im Juni und Juli einzeln aus den Winkeln der Blätterſtiele hervor und ſtehen auf ſchwachen 2 bis 3 Zoll langen Stielen, ſind ſchwarz-purpurroth, ſehr gekrümmt, die Mündung dreilappig, innerhalb gelb punktirt und ſind mit ihren Stielen einer türkiſchen Tabakspfeife nicht unähnlich.

Der Fruchtknoten ſitzt unter der Krone und wird zu einer ſechsfächrigen Kapſel, welche viele Aehnlichkeit mit einer Gurke hat und vielen Samen in ſich faßt.

Außer den oben angegebenen Kennzeichen unterſcheidet ſich dieſe herrliche Pflanze auch im Winter, wenn ſie entblättert iſt, durch die Narben der abgefallenen Blattſtiele. Dieſe bilden die Form eines Pferdehufs (wie bei Lonicera alpigena. L.) und umgeben ein erhabenes, weißes, gelbliches Polſter, auf welchem drei kegelförmige, mit einem wolligen Ueberzuge bekleidete Knospen ſitzen, wovon die oberſte die größte iſt.

---

*) Von ἄριστος und λοχεία, (Dioskorides III. 4.) alſo eine Pflanze, die gut zur Beförderung der Geburt ſey. Daher habe — erzählt der Scholaſt Nicander — Ariſtoteles die Erfindung deſſelben einem Weibe beigelegt. Plin. 25. 8. Aristolochiae nomen gravidae dedisse videntur, quoniam est ἀρίστη λεχούσαις.

Dagegen ſagt Cicero: die Ariſtolochia habe ihren Namen von einem gewiſſen Ariſtolochus, der ſie gegen den Schlangenbiß brauche. Ein Traum habe ihn auf dieſe Pflanze geholfen. (Quid scammoniae radix ad purgandum, quid aristolochia ad morsus serpentium possit, quae nomen ex inventore reperit, rem ipsam inventor ex somno, video, quod satis est, cur possit, nescio. De divinatione I. cap. 10.)

**) Von σίφων, ein hohler Körper, denn die Blüthe iſt röhrenförmig, daher die deutſchen Benennungen.

„Ein äußerſt merkwürdiges Phänomen — ſagt Willdenow in der zweiten Ausg. ſeines Grundriſſes zur Kräuterkunde 1799 p. 210. — zeigt ſich an den Blättern dieſer Pflanze, was man für Reproduction halten könnte, es aber nicht zu ſeyn ſcheint und dafür auch jetzt noch nicht erklärt iſt.

Es zeigen ſich nämlich auf den Blättern zuweilen unregelmäßige Nähte, die wie mit Kunſt verfertigt zu ſeyn ſcheinen, indem die Blattſubſtanz der obern Fläche der untern zugekehrt iſt, ſo wie die Schneider eine umgeſchlagene Naht verfertigen. Was iſt dieſes eigentlich? Von Inſekten rührt es nicht her. Da ich nicht ſelbſt einen Garten habe, ſo fehlt es mir an Gelegenheit, Verſuche und Beobachtungen darüber zu machen.“

Aber auch dem Einſender dieſes iſt es nach 16jährigen Beobachtungen nicht gelungen, ein einziges dergleichen unregelmäßigen Blätter zu entdecken, doch hat ſich ihm dabei die Bemerkung aufgedrungen, daß die Blätter dieſes Strauchs ſehr ſelten von Inſekten benagt werden.

Durch Stecklinge im Treibkaſten läßt er ſich ſehr gut vermehren und er hält die härteſten Winter aus, ohne einer Strohdecke zu bedürfen. Aber er verlangt einen guten nahrhaften, mit Kuhmiſt gedüngten Boden und gedeiht in ſolchem vortrefflich.

Zur Anlegung einer Laube ſind vier Exemplare hinreichend, um dieſelbe nach 6 — 8 Jahren überall zu beſchatten.

Es iſt die einzige mir bekannte Schlingpflanze, welche mit ihren ſchönen Blättern eine Laube von innen eben ſo, wie von außen deckt; mit einem Worte, ſie iſt es, die den von dem Anfrager verlangten ſechs Erforderniſſen vollkommen entſpricht und alſo zu dem erwähnten Zwecke mit Recht empfohlen werden kann.

T. im Nov. 1833. C. A. L.

Eine eigenthümliche Erſcheinung am Veratrum nigrum. Anfrage.

Als ich im vergangenen Sommer einmal früh in meinen Garten kam, fand ich an einem kräftigen Stocke von Veratrum nigrum ſechs Blätter theils ganz, theils nur einzelne Parthien derſelben, wie mit kochendem Waſſer verbrüht, ſo daß ſie ſich auf der Stelle beim gelindeſten Drucke der Finger zerreiben ließen und bald völlig abſtarben. Ich kann für gewiß annehmen, daß kein heißes oder ſcharfes Liquidum die Pflanze getroffen, auch war der Gang der Beſchädigung nicht der einer von oben nach unten gelaufenen Flüſſigkeit, ſondern es mußte Krankheit der Pflanze die Veranlaſſung gegeben haben, wovon ich jedoch erſt einige Tage früher, wo ich ſie genau beobachtet, keine Spur wahrgenommen hatte. Der ganze Stock kränkelte wohl 14 Tage lang, obwohl ich an ſeinen, die Erde berührenden

Theilen nichts-Krankhaftes fand. Haben Gartenbeſitzer ſchon ähnliche Erfahrungen gemacht und können ſie Erklärung darüber geben? △.

Hyazinthen in Kohlrabriköpfen oder rothen Rüben zu treiben.

Herr Dr. Dietrich, Prof. der Botanik in Eiſenach, theilt in ſeinem „Wintergärtner“ Weimar, b. Gädicke, 1818, welches Werk eigens gemachte Erfahrungen darbietet, folgende beluſtigende Verfahrungsweiſe, „die Hyazinthen in Kohlrabiköpfen oder rothen Rüben zu treiben,“ mit. Man ſchneidet vom Kohlrabi unten am Wurzelſtuhle ein Scheibchen ab, das aber nicht größer ſein darf, als die Zwiebel rund iſt. Nun ſchneidet man das Fleiſch aus dem Kohlrabi heraus, doch ſo, daß die äußere Schaale nicht verlezt werde. Auf dieſe Höhlung ſetzt man die Hyazinthe, deren unterer Theil nur hineinpaſſen muß, gießt Waſſer in die Oeffnung, bindet ein Band um den Kohlrabi, hängt ihn ins Fenſter, die Zwiebel oben ſtehend, und ſie blüht mit dem Kohlrabi zugleich, wenn man alle zwei bis drei Tage friſch temperirtes Regenwaſſer giebt. Die rothe Rübe höhlt man an der Krone aus, und ſie treibt mit der Hyazinthenblüthe zugleich rothe Blätter. Im Dezember kann man mit dieſer Treibmethode den Anfang machen.

J. R.

Blumiſtiſche Bemerkungen.

In Nro. 18. der Blumenzeitung von 1830 findet ſich eine Vermehrungsart der Cacten angegeben, nach welcher die Spitze derſelben verwundet, junge Pflanzen auszutreiben, veranlaßt wird. Die Erfahrung aber lehrt, daß Wunden an dieſen Saftpflanzen, wenn ſie nicht ſehr ſorgfältig behandelt werden, leicht Fäulniß und das Verderben derſelben zur Folge haben. Von einem ſehr einſichtsvollen Kunſtgärtner erhielt ich im vorigen Jahre die Mittheilung einer der oben erwähnten ähnlichen Vermehrungsart, die viel weniger nachtheilig für das Leben dieſer Pflanzen erſcheint, ob ſie gleich allemal ihren zierlichen Wuchs und ihre regelmäßige Form verlieren. Man legt nämlich auf die Spitze des fleiſchigen Körpers ein Stückchen brennenden Schwamm; dadurch wird eine Wunde verurſacht, aber auch durch die Hitze des verkohlenden Schwammes gleich wieder zugeheilt. So erreicht man ſeinen Endzweck ſchnell und ohne Gefahr, die Pflanze zu verlieren. Ein Cactus Pseudomammillaris gab mir in ſechs Tagen vier abnehmbare ſchöne junge Pflanzen. Für den Handelsgärtner iſt dies gewiß ein ſehr vortheilhaftes Verfahren, da er gewöhnlich bei ſeinen Stammpflanzen weniger auf Schönheit, als Ergiebigkeit ſieht.

Im Jahr 1806 ſah ich bei einem berühmten Handelsgärtner einen Hortenſien-Mutterſtock, welcher ihm nach ſeiner Verſicherung im Laufe von 6 Jahren zweihundert Thaler einbrachte; freilich auch verſtümmelt genug ausſah, aber von dem Beſitzer ſehr werth gehalten wurde. Damals war aber auch die Hortenſie eine noch nicht ſo allgemein verbreitete und bekannte Pflanze, die man jetzt kaum einzeln beſitzt, ſondern ganze Gruppen im Lande und in Töpfen, ja ſogar Lauben, wie man in Berlin und Caſſel von ihr bildet.

S. L.

Bei den Cactus-Arten, beſonders bei dem C. specios. und Epiphyllum specios. (alatus) ſcheint es, daß ſie alsdann reichlicher blühen, wenn man ihnen, nachdem ſie die gewünſchte Höhe und Größe erlangt haben, die Spitzen da wegſchneidet, wo ſich die kleinen Wurzelfaſern zeigen. Es iſt als wenn die Natur daburch einen Wink gebe, daß dort eine neue Pflanze ſich bilden, und eine Fortpflanzung durch Trennung bezeichnen wolle. — Nach Befolgung dieſer Maxime hat ſich ſchon an einigen Exemplaren dieſer Gewächſe die obige Meinung bewährt.

Schweidnitz, im Dez. 1833. G. A. B.

Neue Pelargonien. *)

In der Pelargonien-Sammlung des Hrn. Lemon in Paris ſah man im vergangenen Jahre drei prächtige neue Pelargonien, die ſich durch ihren Farbenreichthum ganz beſonders auszeichneten:

Pelargonium pelagineum, hat einen aufrechten, feſten Stengel, kappenförmige, gefaltete, tief gezähnte Blätter, eine aufrechte Blumendolde, aus 8 bis 12 Blumen beſtehend, die 2½ Zoll breit, purpur-violett ſind und rein himmelblaue Längelinien und Streifen haben. Es iſt aus Samen vom Pel. poiteanum gezogen worden.

Pelarg. resplendens. Eine kräftig wachſende, faſt ganz glatte Pflanze. Die Blätter ſind kappenförmig, gefaltet, mit großen Zähnen. Der Blüthenſtiel ſteht aufrecht und iſt purpurfarbig. Die Blumendolde iſt aufrecht, hat 8 Blüthen, die 2½ Zoll breit ſind; die drei untern Blumenblätter haben einen königsblauen Nagel und lebhaft purpurfarbigen Saum; die obern Blumenblätter ſind dunkel mordoreefarbig, mit einem violettſchwarzen netzförmigen Gewebe, feuerroth gefleckt, mit einem ſilberfarbigen Schimmer. Dieſe Blume iſt die farbenreichſte und zeigt eine Farbenverſchiedenheit, wie man ſie bei keinem andern Pelargonium antrifft.

Pelarg, superpurpureum. Eine ſich gut aufrecht haltende Pflanze, mit kappenförmigen, gefalteten, faſt gelappten Blättern, die ſpitz gezähnt und ein wenig rauh ſind. Der Blüthenſtiel iſt purpurfarbig, rauh; die Blumendolde hat 6 bis 8 Blüthen, die 2¼ Zoll breit, in der Mitte rein purpurviolett, übrigens hellglänzend purpurfarbig ſind, mit einem violettſchwarzen netzförmigen Gewebe, auf einem bräunlichrothen, an den Rändern dunklern Scheine. Es iſt aus Samen vom Pel, gloriosum gezogen worden.

---

*) Aus der Revue horticole.

Verfahren um Camellien zu treiben.*)

Die Camellien werden gleich nach der Blüthe in ſehr nahrhafte, etwas ſchwere Erde verpflanzt, dann warm geſtellt, und vor brennenden Sonnenſtrahlen geſchützt, wonach ſie bald kräftig treiben. Sobald ſich die Blüthenknoſpen zeigen, ſo kommen ſie bis zum Monat Juli in ein Kalthaus, und dann ins Freie an einen etwas ſchattigen, geſchützten Ort. Auf dieſe Weiſe erhält man, wenn man ſeine Pflanzen nicht alle auf einmal, ſondern in angemeſſenen Zeiträumen, ſo wie ſie verblühen, umſetzt, eine Flor dieſer ſchönen Blumen, die vom November bis in den Mai dauert. Die getriebenen Pflanzen werden nach dem Verblühen ebenfalls wieder verſetzt, und wie vorher behandelt.

---

*) Aus den Annales de l'Institut Royal Horticple de Fromont.

Varietäten.

Berlin. Am 6. Nov. blühten im hieſigen botaniſchen Garten folgende bemerkenswerthe Pflanzen: Sagittaria echinocarpa Mart. Aus Braſilien. Aloe virens Haw. und Aloe glauca elatior Haw. Vom Vorgebirg der guten Hoffnung. Griffinia hyacinthin. R. Br. Aus Braſilien. Crinum brevifolium Bot. Reg. (Cr. bracteatum Willd.) Von der Inſel St. Mauritii. Bletia hyacinthina R. Br. Aus China. Vanda multiflor. Lindl. Aus China. Epidendrum nutans Swartz. Aus Jamaika. Aristolochia macrura Gomez. Aus Braſilien. Clerodendron emirnense Bojer. Aus Madagascar. Salvia semiatrata Zuc. Aus Mexiko. S. Grahami Hort. angl. Aus Mexiko? S. pulchella De C. Aus Südamerika. S. Boosiana Jacq. (S. amoena Bot. Reg.) Aus Peru. Calceolaria purpur. Grah. Aus Chili. Jacquinia macrocarpa Cavan. Aus Mexiko, Canarina Campanula L. Von den canariſchen Inſeln. Mammillaria geminispina Haw. und M. Mystas Mart. Aus Mexiko. Cereus truncatus Haw. und C. Altensteinii Nob. Aus Braſilien. Borbonia lanceolat. L. V. Vorgeb. d. g. Hoffn. Daviesia mimosoides R. Br. Aus Neu-Süd-Wales. Aspalathus arachnoides Ecklon. V. Vorgeb. d. g. Hoffn. Scottia angustifol. Lindl. Aus Neuholland. Indigofera psoraloides L. V. Vorgeb. d. g. Hoffn. Crotalaria arborescens Lam. (C. incanescens L. Suppl.) Vom Vorgeb. d. g. Hoffn. Malpighia glabra L. Aus Weſtindien. Galphimia mollis Kunth. Aus Mexiko. Penaea mucronat. L. V. Vorgeb. d. g. Hoffn. Candollea cuneiformis Labill. Aus Neuholland. Außerdem blühten mehrere Ericae, Calceolariae, Polygalae, Acaciae und andere Pflanzen.

Wien, den 10. Dez. In den Gewächshäuſern des k. k. Hofgartens zu Schönbrunn blühen jetzt folgende Gewächſe: Acacia falcat. (Decandolle.) Aus Neu-Süd-Wallis. Leguminosae. Polygamia, Monoecia. — A. penninervis. (Sieber.) Aus N.-S.-W. Legum. — A. quadrangularis. (Link.) Vaterland unbekannt. Legum. — A. suaveolens. (Willd.) Aus N.-S.-W. Legum. etc. — Aloe (Haworthia) reticulat. (Haworth.) Vom Vorgeb. d. g. Hoffnung. Hemerocallideae. Hexand., Monogyn. — Aristolochia indic. (Linné.) Aus Oſtindien. Aristolochieae. Gynand., Hexand. — Campelia Zanonia. (Richard.) Aus Südamerika. Commelineae. Hexand., Monogyn. — Canarina Campanula. (Linné.) Von den canariſchen Inſeln. Campanulac. Hexandr., Mongyn. — Daphne oleoides. (Schreber.) Von der Inſel Creta. Thymelaeae. Octand., Monogyn. — Erica concinna. (Aiton.) Vom Vorg. d. g. Hoffn. Ericeae. Octand., Monogyn. — E. melanthera. (L.) V. Vorg. d. g. Hoffn. — Zieria lanceolat. (Robert Brown.) Aus Neu-Süd-Wallis. Rutaceae. Tetandr., Monogyn.

Paris. Die Gartenbau-Geſellſchaft von Paris hat die nächſte öffentliche Ausſtellung der Erzeugniſſe des Gartenbaues zum 27. Februar 1834 feſtgeſetzt, von wo ſie bis zum 2ten März dauern wird. Wahrſcheinlich wird ſie in dem Saal St. Jean des Hôtel-de-Ville ſtattfinden. Die Geſellſchaft hat dieſe Zeit zu Gunſten der Blumentreiberei gewählt und zur Abwechſelung der zur Ausſtellung gebrachten blühenden Pflanzen. Eine goldne Denkmünze iſt als Preis für eine ſchöne Dahlien-Varietät in völliger Blüthe und vollkommenem Wachsthum ausgeſetzt, und eine ſilberne Denkmünze für eine in gleichem Zuſtande befindliche Amaryllis formosissima. Auch iſt eine Preisbewerbung bis zum Jahre 1838 eröffnet worden, für die Erhaltung des Tafelobſtes bis zu dem, nach ſeiner gewöhnlichen Dauer, ſpäteſten Zeitraume. Drei Preiſe, jeder von 200 Franks, ſind für diejenigen drei Bewerber beſtimmt, welche den im Programme feſtgeſetzten Bedingungen am beſten nachkommen.

Nantes. Am 22. Sept. 1833 feierte die unter dem Schutze der Königin ſtehende Gartenbaugeſellſchaft zu Nantes ihr jährliches Blumenfeſt zum fünften Male. Die Civil- und Militair-Behörden der Stadt beehrten es, wie gewöhnlich, mit ihrer Gegenwart. Der Börſenſaal, den der Handelsſtand jedes Jahr der Geſellſchaft zu dieſem Zweck überläßt, iſt ein dazu ſo ſehr geeigneter Ort, daß er für ſolch eine Feierlichkeit nichts zu wünſchen übrig läßt. Er war mit den ſchönſten und ſeltenſten Pflanzen geſchmückt. Der Vice-Präſident, Herr Hecto, der berühmteſte und eifrigſte Gartenbau-Freund zu Nantes, eröffnete die Sitzung mit einer Rede, in welcher er die Vortheile ſolcher Vereine darlegte. Der Sekretair der Geſellſchaft erſtattete hierauf Bericht von dem Reſultat der Beſichtigungen, die bei den praktiſchen Gärtnern gemacht worden waren, und nannte nachſtehende Preiſe, die im Namen der Königin, der Schutzherrin der Geſellſchaft, folgendermaßen vertheilt wurden:

Den Ehren-Preis, beſtehend in einer goldnen Denkmünze, erhielt der Baum- und Blumengärtner Hr. P. Nerière. (Beſchl. f.)

Erfurt. In den letzten Tagen des Monats Dezember wurden auf hieſigem Markte blühende Veilchenſträußchen zum Verkauf ausgeboten. Auch blühten an der Bergſtraße noch Pfirſiche, Mandeln, Weinblumen, Roſen u. ſ. w.

Außer der Blumenzeitung erſcheint bei Unterzeichnetem pro 1834 noch 2) das Weißenſee'r allg. Unterhaltungsblatt; 3) die Numismatiſche Zeitung; 4) Gemeinnützliche Mittheilungen über Wein-, Obſt- und Gemüſebau ꝛc. Fr. Häßler.

Hierbei vier Blumen-Samen-Verzeichniſſe, als Beilagen.

		Preiſe gr	pf
410	Althaea ros. pl., gefüllte Stock- oder Wintermalve	1	—
411	„ ficifol. aurea, Gelbmalve	2	—
412	„ Chinensis pl., gefüllte niedrige	2	—
413	Ein Sortiment von 15 Sort. ſchöner Wintermalv.	12	—
414	Ammobium alatum, geflügelte Ammobie, ganz neue Immortelle	2	—
415	Anthericum liliago, Lilien Zaunblume	2	—
416	„ liliastrum, andere	1	—
417	Antirrhinum bicolor, zweifarbiges Löwenmaul	2	—
418	„ majus, großes dergl., diverſe Sort.	2	—
419	Aquilegia vulgaris pl., gef. Akeley div. 10 Sorten	1	—
420	„ „ ſpecios., prachtvolle dergl.	1	—
421	„ Canadensis, rother Canadiſcher dgl.	1	6
422	„ vulgaris fl. pl. albo, weiß, gefüllt	1	6
423	„ „ stellata, ſehr ſchön, geſtreift	1	6
424	„ viridiflor., grüne dergl.	1	—
425	Aristolochia Sipho, großblättr. Oſterluzey, 12 K.	1	8
426	Asclepias incarnat., fleiſchrothe Seidenpflanze	2	—
427	Aster amelloides, amellenart. Sternblume, ſchön	1	6
428	Astragalus galegiformis, [illegible]	2	—
429	„ alopecuroides, wieſenfuchsſchwanzart.	1	—
430	Betonica grandifl., großblumige Betonike	2	—
431	Campanula med. fl. albo pl., weiß gef. Glockenbl.	1	6
432	„ „ „ coeruleo pl., blaugefüllte	1	6
433	„ pyramidalis, pyramidenförmige	1	8
434	Centaurea atropurpur., ſchöne dunkelr. Flockenbl.	1	6
435	„ calocephal., ſchönköpfige	2	—
436	„ montan., Bergflockenblume	1	—
437	Chelone glabr., glatte Schildblume	2	—
438	„ campanulata, glockenförmige	2	—
439	„ pubescens, feinbehaarte	1	6
440	Chelidonium aurantiacum, gelbrother Hornmohn	1	6
441	Collinsonia grandifl., großblumige Collinſonie	1	—
442	Corydalis fungosa, kletternder Erdrauch	1	—
443	„ nobilis, edler	1	—
444	Cortusa Matthioli, Europäiſche Cortuſe	3	—
445	Cynoglossum pictum, gefleckte Hundszunge	4	—
446	Delphinium Americanum, Amerikan. Rittersporn	1	—
447	„ crassifolium, dickblättriger	1	6
448	„ elatum, hoher	2	—
449	„ grandiflorum, großblumiger	1	6
450	„ floridum, Caroliniſcher	1	6
451	„ intermedium, halbhoher	1	6
452	„ spinium, [illegible]	1	6
453	„ speciosum, prächtiger	1	6
454	„ perenne, ausdauernder Rittersporn	1	6
	in 12 diverſen Sorten. 1 Loth	8	—
455	Dianthus barbatus, Bartnelken, verſchiedene Sorten, 1 Loth 3 x	1	—
456	„ „ pl., gefüllte dgl., 1 Loth 4 x	1	—
457	„ Chinensis fl. pl., gefüllte Chineſer Nelken. 1 Loth 12 x	2	—
458	„ Chinensis fl. pleno atro, ganz gefüllte dergl. 100 Körner	2	—
459	„ caryophyllus pl., gefüllte Gartennelken	1	—
460	„ „ „ ſel. von Nummerblumen geſammelt. 100 Körner	11	
461	„ „ pl., dergl. von Rangblumen, 100 Körner	3	—
462	„ plumarius pl., gefüllte Federnelken	1	
463	„ superbus, ſtolze Nelke	1	6
464	Digitalis Alba, weißer Fingerhut	2	—
465	„ ferruginea, roſtfarbiger	1	6
466	„ lanata, wollichter	1	8
467	„ lutea, gelber	1	8
468	„ purpurea, purpurrother	1	6
469	„ Thapsus	2	—
470	„ Wanneri, ſehr ſchön	3	—
471	Erinus Alpinus, Alpenbalſam, niedlich	1	6
472	Erythrolaena conspicua, neue prachtvolle Pflanze, 3 Körner	4	—
473	Eupatorium ageratoides, Ageratum-Alpenkraut	1	6
474	Ferraria undulata, gekräuſelte Ferrarie	1	6
475	Galega oriental., orientaliſche Geißraute	1	6
476	Geum coccineum, ſcharlachrothes Geum, neue, ſehr ſchöne Staude	3	—
477	„ ranunculoides, ranunkelartiges	1	—
478	Gentiana asclepiad., ſchwalbenwurzelblättr. Enzian	2	—
479	„ pneumonanthe, dunkelblaue	2	—
480	„ punctata, punktirter	2	—
481	Hedysarum coronarium, hochroth. Hahnenkopfklee	1	—
482	„ „ flore albo, weißer	1	
483	Helianthemum appeninum	2	—
484	„ punctatum	2	—
485	Hesperis matronal., blaue Nachtviole	1	—
486	„ tristis, graue wohlriechende	1	—
487	Hypericum Ascyron, Johanniskraut	1	6
488	„ pulchrum, ſchönes	1	6
489	Iris Sibiric., Sibiriſche Schwertel	1	6
490	Isatis canescens, weißlicher Waid, hübſch	1	6
491	Ixia bulbocodium, zwiebelartige Irie	2	—
492	Lachenalia serotin., ſpäte Lachenalie	4	—
493	Lathyrus latifol., breitblätter. Bouquetwicke	2	—
494	Lobelia cardinal., rothe Kardinalblume	1	—
495	„ syphilitic., blaue	2	—
496	Lotus cytisoides, bohnbaumartiger Schotenklee	2	—
497	„ peregrinus, fremder	1	—
498	Lunaria rediviv., Mondviole	1	—
499	Lupinus Nootkaensis	1	
500	„ perennis, dauernde Lupine	2	—
501	„ variegatus, bunte	2	—
502	Lychnis chalcedonica, rothe Calcedon. Lychnis	1	6
503	Matricaria parthenium fl. pl., gefülltes Mutterkr.	1	—
504	Mimulus guttatus, gefleckte Gauklerblume	1	—
505	„ ringens, rachenförmige	2	—
506	„ littoralis, Bach-, neu und ſchön	2	—
507	Oenothera glauca, graugrüne Nachtkerze	4	—
508	„ pumila, niedrige	2	—
509	„ spectabilis, anſehnlich, ſchön	1	—
510	Ononis natrix, gelbe Hauhechel	2	—
511	Paeonia albiflor., weißblühende Pfingſtroſe	1	—
512	„ arietina Andersonii, arietiſche	3	—
513	„ „ carnea, fleiſchfarbige dgl.	3	—
514	„ corallina, ganzblättr. Pfingſtroſe	3	—
515	„ edulis, eßbar	1	—
516	„ Humei, Humeiſ	3	—
517	„ humilis, niedrige	4	—
518	„ mollis, weiche	2	—
519	„ pallida, blaſſe	3	—
520	„ paradoxa, ſeltſame	3	—
521	„ peregrin., fremde	3	—
522	„ „ gracilis, ſchöne	2	—
523	„ Piccniana, Piceniſche	3	—
524	„ pubescens, feinbehaarte	3	—
525	„ Sabinia	3	—
526	„ tenuifol.	3	—
527	„ simplicifol., einfachblättrige	3	—
528	„ Tatarica, Tatariſche	3	—
529	Papaver nudicaule, nackſtänglicher Mohn	2	—
530	„ orientale, morgenländiſcher	1	6
531	Podalyria australis, neuholländiſche Podalyrie	2	—
532	„ alba, weiße	2	—
533	Potentilla atrosanguinea, dunkelroth Fingerkraut	2	—
534	„ Nepalensis seu formosa, ſchön	3	—
535	„ grandiflor., großblumiges	1	—
536	„ hirta, ſteifhaariges	1	—
537	Primula auricula, Lütker und Engliſche Aurikel	4	—
538	„ cortusoides, ſchönſte Primel	3	—
539	„ farinosa, beſtaubte	4	—
540	„ veris, Engliſche oder Deutſche Primel	2	—
541	Rudbeckia purpur., purpurrothe Rudbeckie	1	—
542	Salvia pendula, hängender Salbey, hübſch	2	—
543	Scabiosa prolifer., ſproſſende Scabioſe	1	6
544	Silene longifl., langblühige Selene	1	—
545	„ ornata, prächtige dunkelrothe	1	—
546	Statice auriculaefol., aurikelblättrige Grasnelke	3	—
547	„ [illegible]	3	—
548	Teucrium flavescens, gelber Art Gamander	1	6
549	Tulipa Gesneriana diversicolor, Gartentulpe	3	—
550	Valeriana rubra, rothe Baldrian	1	—
551	„ alba, weißer	1	—
552	Verbascum nigrum, ſchwärzliche Königskerze	3	—
553	„ Phoeniceum, violettrothe	1	6
554	Verbena angustifol., ſchmal lanzettblättr. Eiſenkraut	1	6
555	„ hastata, ſpießförmig blättriges	1	6
556	Veronica incana, beſtäubter Ehrenpreis	2	—
557	„ pallida, bleicher	1	6
558	Viola bicolor fl. sulphureo grandifl., ſchwefelgelbes Stiefmütterchen	4	—
559	Ein Sortim. v. 15 Sorten div. perennir. Blumen	12	—
560	Ein dergl. von 30 Sorten	2	—

Einige ſchönblüh. Topfgewächsblumen-Saamen welche [illegible] warm ſtehen wollen.

Die mit * bezeichneten ſind einjährige, ** Stauden-, *** Strauch- oder Baumartige, W die warm ſtehen wollen, K Glashauspflanzen.

		gr	pf
561	***W Acacia acanthocarp., ſtachelſchotige Akazie, 6 Körner	3	—
562	***K „ armata, bewaffnete 3 Körner	3	—
563	„ decipiens, täuſchende 1 Körner	1	—
564	„ floribunda, vielblüth. 2 Körner	2	—
565	„ glauca, graugrüne 3 Körner	3	—
566	„ latifol., breitblättrige 3 Körner	1	—
567	„ longifol., langblättr. 3 Körner	4	—
568	„ lophanta, haubenförm. 3 Körner	2	—
569	„ melanoxylon 2 Körner	1	—
570	„ myrtifol., myrtenblättr. 3 Körner	2	—
571	„ pinifol., fichtenblättr. 2 Körner	2	—
572	„ stricta, ſteife 3 Körner	2	—
573	„ verticillata, wirtelblätt. 6 Körner	2	—
574	*W Aeschynomene sesban, Schaamſchote	2	—
575	**K Agapanthus umbellat., doldentr. Schmucklilie	2	—
576	Alstroemeria pelegrina, bunte Alſtrömerie	3	—
577	*W Amaranthus bicolor, zweifarbig Amaranth	2	—
578	„ tricolor, dreifarbiger	2	—
579	**W Amaryllis vittata, geſtreifte Amaryllis	1	—
580	Anagallis fruticosa, roth od. blaublüh. Gauchheil	1	—
581	*Anastatica hierochuntica, Jerichoroſe	2	—
582	***K Arbutus Unedo, Erdbeerbaum	2	—
583	Arctotis superba, prächtiges Bärohr	2	—
584	***W Ardisia crenulat., kerbige Spitzblume, 3 K.	2	—
585	*Argemone Mexican., Mexik. weiß. Stachelmohn	1	6
586	***K Asclepias fruticos., ſtrauchart. Seidenpfl.	2	—
587	***W „ nivea, weißblühende	1	6
588	***K Aster argophyllus, Biſam Aſter	3	—
589	***W Asclepias curassavic., Curaſſaviſche Seidenpfl.	1	6
590	***K Azalea pontica, pontiſcher Felſenſtrauch	3	—
591	W Basella rubra, rothe Baſelle	2	—
592	*W Begonia hirtella, rauhes Schiefblatt	3	—
593	„ semperflorens, immerblühendes	2	—
594	„ spathulacea	2	—
595	***W Blumenbachia insignis, neu. 3 Körner	1	—
596	*W Browallia elat. fl. albo, weiße aufrechtſtehende Browallie	2	—
597	Bryonia grandis, ſtattliche Zaunrübe	1	6
598	Calandrinia grandifl., ganz neu	2	—
599	**K Campanul. versicolor, bunte Glockenblume	2	—
600	**W Canna gigantea, Rieſenblumenrohr 3 Körner	3	—
601	„ indica 3 Körner	1	—
602	„ limbata 3 Körner	2	—
603	„ lutea, gelbes 3 Körner	2	—
604	„ Mexicana 2 Körner	3	—
605	„ Nepalensis 4 Körner	3	—
606	„ reflexa, zurückgebogenes 2 Körner	2	—
607	„ rubricaule, rothſtängliges 1 Körner	4	—
608	„ angulata 1 Körner	1	—
609	„ speciosa, prächtiges 4 Körner	2	—
610	*W Calceolaria pinnat., gefiederte Pantoffelbl.	1	6
611	„ scabiosaefol., ſcabioſenblättr.	3	—
612	„ integrifol., ganzblättrige	4	—
613	***K Calothamn. quadrifid., vierſ. grüner Caloth.	1	—
614	*W Capsicum baccatum, beerentrag. Beißbeere	2	—
615	„ cerasiforme, kirſchenähnliche	1	6
616	„ grossum, großfrüchtige	1	6
617	„ nigrum, ſchwarze	1	6
618	Cardiospermum Halicacabum, Herzſaame	1	6
619	***Cassia grandis, große Caſſie	2	—
620	„ Marylandica, Marylandiſche	2	—
621	„ nictitans	2	—
622	***K Casuarina torulosa, gebrechliche Kaſuarine, 4 K.	2	—
623	*W Celosia cristat. major, großer Hahnenkamm	1	6
624	„ „ minor, kleiner	2	—
625	„ elegans, [illegible]	1	6
626	**K Chironia confert., [illegible] Chironie	3	—
627	***K Cineraria amelloid., amellenart. Aſchenpfl.	1	6
628	„ lactea	2	—
629	Cytisus elongat., verlängerter Bohnenbaum	2	—
630	„ [illegible]	2	—
631	„ purpur., rother	2	—
632	*Cleome gigant., Rieſen-Cleome	2	—
633	„ pungens, ſtechende	2	—
634	„ violac., violette	2	—
635	***K Clethra arbor., baumartige Clethra	2	—
636	Cobaea scandens, ſteigende Cobee. 2 Körner	1	—
637	Colutea frutescens, Capiſche Blaſenſtrauch	2	—
638	**W Commelina coelestis, himmelblaue Commeline	1	6
639	*Coix lacryme, Thränengras	2	—
640	***K Coronilla glauc., graue Peltſchen	1	—
641	Corysema ilicifol., ſtechpalmblättrige, 4 K.	2	—
642	„ Rhombeum	2	—
643	*W Crotalaria incan., Klapperſchote	2	—
644	***W „ canescens, weißliche	2	—
645	„ purpur. 3 Körner	2	—
646	***K Cupressus pyramidal., Pyramiden-Cypreſſe	1	6
647	„ sempervirens, immergrüne	1	6
648	„ thyoides, lebensbaumartige	1	6
649	Cyclamen Persicum, Perſiſche Erdſcheibe, 6 K.	1	—
650	*W Datura fastuos. coerul. pl., blauer Stechapfel	3	—
651	„ „ albo pleno, weißgefüllter	4	—
652	***K Digitalis canariensis	2	—
653	Diosma rubr., rother Götterduft, 3 Körner	4	—
654	*W Dolichos Capensis, weißblühende Faſeln	1	6
655	„ Lablab, Aegyptiſche	1	6
656	„ sesquipedalis	2	—
657	„ tranquebaricus	2	—
658	***K Doodia lucid., glänzende Doodie	2	—
659	Dracocephalum canariense, Canariſcher Drachenkopf	2	—
660	Eremocarpus scaber	2	—
661	Elychrysum fulgidum, ſtrahlende Strohblume	1	6
662	Eric. Daboecia, Irländiſche Heide	3	—
663	„ multiflor., vielblumige	2	—
664	„ nigrit., ſchwarzknopfige	3	—
665	Franco sonchifoli, gänſediſtelblättrige	3	—
666	Genista Canariensis, Canariſcher Ginſter, 6 K.	2	—
667	**W Gloxinia formos., ſchöne Gloxinie	1	6
668	„ Schottii, 4 K.	1	—
669	***W Glycine coccin., ſcharlachrothe Glycine	2	—
670	„ precatoria, Paternoſterbohne	1	—

	Preiſe	gr	pf
671	***K Gnaphalium foetidum, ſtinkendes Ruhrkraut	1	6
672	*W Gomphrena globos. alb., weiß Kugelamaranth	1	6
673	" " carnea, fleiſchfarbig	1	6
674	" " rubra, rother	1	6
675	***W Gossypium Chinense, Chineſ. Baumwolle, 4 K.	3	—
676	" herbaceum, krautartig. 4 Körner	2	—
677	Hedysarum gyrans, bewegliches Süßklee, 3 K.	4	—
678	" pictum, geflecktes	4	—
679	" vespertilionis, fledermausförm.	2	—
680	*W Heliotropium grandifl., großbl. Sonnenwende	3	—
681	***K Hamimeria urticaefol., neſſelblättr. Hellblume	2	—
682	***W Hibiscus Abelmoschus, Biſam-Hibiskus	2	—
683	" aculeatus, ſtachliger, 3 Körner	2	—
684	*W " cannabinus, hanfartiger, 4 Körner	2	6
685	" esculentus, eßbarer, 4 Körner	2	—
686	***W " Manihot, ſchwefelgelber, 4 Körner	2	—
687	" moschatus . . . 3 Körner	2	—
688	Hunnemannia fumariaefl., neue prachtvolle immergrüne Topfpflanze. 2 Körner	3	—
689	***K Hyoscyamus aureus, goldfarbnes Bilſenkr.	2	—
690	*W Indigofera tinctoria, ächt färbender Indigo	2	—
691	Ipomaea coccin., ſcharlachr. Trichterwinde, 4 K.	1	—
692	" hederacea, epheublättrige, ſchön	1	6
693	" luteola, gelbliche	2	—
694	" Nil, prächtige dergl. 3 Körner	3	—
695	" pestigridis, tigerfußblättr. 3 Körner	2	—
696	" Quamoclit, gefiederte 4 Körner	3	—
697	" tuberosa, Knollentragende, 4 Körner	1	—
698	***K Kalmia glauca, graue Kalmie	6	—
699	" paniculat., riſpenartige	2	—
700	* Kaulfussia amelloides, amellenartige Kaulfuſſie	2	—
701	***K Kennedia rubicunda, dunkelrothe. 3 K.	4	—
702	Lavatera arbor., baumartige Malve	1	—
703	" olbia, olbiſche	2	—
704	Leptosperm. ambiguum, zweifelh. Seemyrthe	3	—
705	" juniperinum, wachholderartige	3	—
706	" lucidum, glänzende	3	—
707	" myrtifol., myrthenblättr.	4	—
708	" pubescens, feinbehaarte	3	—
709	" pupigarum	3	—
710	" rubricaule, rothſtenglige	2	—
711	" scandens	4	—
712	" scoparium, Beſen-	3	—
713	* Lobelia erinoides, ſchmalſtielige Lobelie	1	6
714	" secunda, ſchöne dunkelblaue	2	—
715	" splendens, glänzende	4	—
716	***K Lotus argenteus, ſilberblättr. Schotenklee	1	6
717	" Jacobaeus, Jakobsklee	1	6
718	Lychnis fulgens, blitzende Lychnis	2	—
719	Malva Capensis, Capiſche Malve	2	—
720	" miniata, zinnoberrothe	1	6
721	" " grandifl., ſehr ſchön	4	—
722	*W Martynia proboscidea, Gemſenhorn. 3 K.	2	—
723	***K Maurandia antirrhiniflor., löwenmaulblüthige Maurandie	1	—
724	" Barkleyana, prachtvoll	2	—
725	" semperflorens	1	6
726	Melaleuca decussat., buchsbaumbl. Cajaputbaum	4	—
727	" hypericifol., Johannisbeerblättrig.	2	—
728	" pulchella, ſchöner	4	—
729	*W Mesembryanthemum crystallinum, Eiskraut	2	—
730	" pomeridianum, Nachmittagblühendes, ſchön	2	—
731	" spectabile, prachtvoll.	2	—
732	" tricolor, ſehr ſchön	2	—
733	" umbellat., blaublüh.	2	—
734	***K Metrosideros angustifol., ſchmalblättriges Eiſenmaaß	3	—
735	" crassifol., dickblättriges	4	—
736	" linariifol., leinkrautblättriges	3	—
737	" lophanta, buſchelblüthiges	4	—
738	" marginat., gerändertes	3	—
739	" rugulos.	3	—
740	" saligna, weidenblättriges	3	—
741	" speciosa glauc.	4	—
742	" viminalis	4	—
743	***W Mimosa pudic., ſchamhafte Sinnpfl., 4 K.	3	—
744	Mimulus variegatus, neu und ſchön	2	—
745	*W Momordica Balsamin., Balſamapfel, 3 K.	1	—
746	" Charantia, gurkenähnl. 4 K.	1	6
747	" Luffa, Ceyloniſcher. 4 K.	1	6
748	***K Myrica cerifera, gemeiner Wachsbaum	2	—
749	" serrat., gezähnter	2	—
750	Nolana paradox., bewaffnete Schellenblume	2	—
751	* " prostrata, liegende	1	—
752	*W Ocymum bullat., großblättr. grün. Schiffsbaſilie.	3	—
753	" " nigrum, ſchwarzer	4	—
754	" minimum, kleinſter	1	6
755	" polistachium, biſamduftend	2	—
756	" urticifol., neſſelblättriger	2	—
757	" nigrum, ſchwarzer	2	—
758	Oryza sativa, gemeiner Reis	2	—
759	***W Passiflora foetid., ſtarkriechende Paſſionsbl.	2	—
760	***K Pelargon. specios. nov., mehr. S. neue Pelarg.	3	—
761	Ein Sort. davon in 12 Sort., v. jeder 4 Körn. 1 Rt	-	—
762	*W Pentapetes phoenicea, ſcharlache. Pentapetes	2	—
763	" ovata, eiförmige	1	6
764	***W Phyllanthus juglandifol., nußbl. Blattblume	2	—
765	***K Phylica paniculat., riſpenblüthige	2	—
766	Polygala myrtifol., myrthenbl. Polygala. 3 K.	2	—
767	**K Primul. Chinensis, Chineſ. immerbl. Primel	4	—
768	***K Pterophylla anethifol., dillblättrige. 3 Kör.	4	—
769	Rhododendron Catabiense, ſchöne Alpenroſe	3	—
770	" maximum, größte	3	—
771	" " album, weiße	4	—
772	" Ponticum, Pontiſche	2	—
773	" " album, weiße	3	—
774	" " carneum, fleiſchfarb.	3	—
775	" " lillacine, lillafarbiges	3	—
776	" " roseum, roſenrothe	3	—
777	" " spec. div., 8 Sorten	3	—
778	***W Rivina Brasiliensis, Braſiliſche Rivina	2	—
779	" humilis, niedrige	2	—
780	Ruellia formos., ſcharlachrothe Ruellie	1	6
781	" tuberos., knollige	1	—
782	Salvia coccin., ſcharlachrothe Salbei	1	6
783	" splendens, leuchtende, ſchön, 6 Körn.	3	—
784	Salpiglossus straminea, kann auch ins freie Land gepflanzt werden, ganz neu	4	—
785	" atropurpur.	4	—
786	" Barkleyana	4	—
787	Salpiglossus Barkleyan. albiflor.	4	—
788	" " lillacina	4	—
789	" " speciosa	4	—
790	" integrifol. 1 Korn	4	—
791	" intermedia	4	—
792	" " variegata	4	—
793	" picta	4	—
794	**K Sempervivum aureum, ſchönes Hauslaub	3	—
795	" parviflorum, kleinblumiger	3	—
796	" sediforme, kleinblättriger	4	—
797	***K Senecio illicifolia, ſtechpalmenblättr. Kreuzkr.	2	—
798	***W Sida mollissima, weiche Sida	2	—
799	" ricinoides, wunderbaumblättrige	2	—
800	*W Solan. melongena fructu albo, weißfrüchtig	2	—
801	" " " coeruleo, blaue	2	—
802	**K " pseudo-capsicum, Judenkirſche	1	—
803	Sparmannia Africana, Afrikan. Sparmannie	2	—
804	* Spermacoce rubra, rothe	1	—
805	***K Spartium junceum, Spaniſches Geniſte	1	—
806	" monospermum, einſaamiges, 4 K.	2	—
807	* Spilanthus oleraceus, Fleckblume	1	1
808	***K Staurocanthus aphyllus . 4 Körner	3	—
809	Sophora tetraptera, vierflügel. Soph., 4 K.	2	—
810	**W Talinum purpureum, purpurrothe Talinie	3	—
811	***K Thuja australis, ſüdlicher Lebensbaum	3	—
812	" orientalis, morgenländiſcher	2	—
813	***W Thunbergia alat., geflügelte Thunbergie, ſehr ſchöne Schlingpflanze, blüht das ganze Jahr. 1 K.	4	—
814	** Trachelium coeruleum, blaues Halskraut	2	—
815	* Tradescantia undata, ſchön lila	2	—
816	*K Verbena Aubletia, ſchönſtes Eiſenkraut (kann auch ins freie Land gepflanzt werden)	3	—
817	***W Verbesina alat., geflügelte Verbeſine	2	—
818	Viola bicolor et hederacea, ganz neu	2	—
819	Ein Sortiment von 10 Sorten ſchönen Topfgewächsſaamen . . . . 1 Rt	—	—
820	Desgleichen von 30 Sorten . . 1 "	12	—
821	Desgleichen von 60 Sorten . . 2 "	12	—

Einige Blumenzwiebeln u. Knollengewächſe, die bis April trocken verſandt werden können.

822	Amaryllis formosissima . .	1 Stück	3	—
823	" reginae	1 Stück 1 Rt	—	—
824	" purpurea	1 Stück	12	—
825	" tubispatha	1 "	4	—
826	" vittata	1 "	20	—
827	" vivipara	1 "	12	—
828	Begonia discolor	1 "	3	—
829	Canna flaccida, ſehr ſchön .	1 "	12	—
830	" gigantea	1 "	8	—
831	" glauca	1 "	6	—
832	" limbata	1 "	6	—
833	" lutea	1 "	4	—
834	" rubicaulis	1 "	4	—
835	" speciosa	1 "	6	—
836	Comelina coelestis	1 "	2	—
837	Cyclamen Aleppicum	1 "	10	—
838	" Europaeum	1 "	6	—
839	" Persicum	1 "	6	—
840	Cyrilla pulchella	1 "	2	—
841	Ferraria tigrida	1 "	2	—
842	Gloxinia coccinala	1 "	16	—
843	" farinosa	1 "	8	—
844	" " fl. albo . .	1 "	12	—
845	" maculata	1 "	4	—
846	" Schottii	1 "	10	—
847	Iris Susiana	1 "	4	—
848	Kaempheria galanga	1 "	8	—
849	Lachenalia tricolor	1 "	2	—
850	" rubra	1 "	2	—
851	Lilium tygrinum	4 "	6	—
852	Georgina variabilis fl. pl., gef. Georginen		6	—
853	Ein Sortiment extragefüllter Georginen in 12 Sorten, Prachtblumen vom erſten Range mit Charakteriſtik	4 Rt	12	—
854	Dergleichen in 24 Sorten . . .	8 Rt	—	—
855	Dergleichen in 36 Sorten . . .	10 Rt	12	—
856	Dergleichen in 48 Sorten . . .	15 Rt	—	—
857	Anemonen, gefüllte holländ. blühbar,	1 St.	2	—
858	Ranunkeln dergleichen	1 St.	1	—
859	" deutſche	1 St.	—	9
860	Tuberoſen	1 St.	1	6
861	" einfache	1 St.	1	—

Einige Blumenpflanzen und Sträucher.

Nelkenſenker.

		Rt	gr
862	Nelkenſenker, 12 Stück in 12 der vorzüglichſten Sorten mit Namen	2	—
863	Nelkenſenker, 12 Stück dieſelben ohne Namen . .	1	8
864	" 24 — in 24 Sorten mit Namen . .	4	—
865	" Sämlinge, von beſten Sorten geſammelt, 100 Stück	—	16

Aurikeln und Primeln.

		Rt	gr
866	Aurikel, Engliſche 12 Stück in 12 der vorzüglichſten Sorten mit Namen	4	—
867	Aurikel, dieſelben, ohne Namen	3	—
868	" Luiker, 12 Stück in 12 Sorten . . .	1	16
869	" dieſelben ohne Namen	—	18
870	" Engl. und Luiker, 100 Stück in Rommel .	3	—
871	Primeln, Engl. 12 in 12 Sorten	—	12
872	" teutſche dergleichen	—	8
873	" Engl. und teutſche, 100 Stück in Rommel .	1	8
874	Ein Sortiment Chrysanthemum Indicum in 16 ſehr ſchön gefüllten Sorten	2	12
875	Desgleichen in 8 Sorten	1	16
876	Ein Sortiment Rosa semperflorens, immerblühende Topfroſen in 12 der beſten Sorten mit Namen . . .	3	12
877	Ein Sortiment dergleichen in 20 Sorten . . .	5	—
878	Ein Sortiment gefüllte Prachtroſen in 12 Sorten, ins Freie zu pflanzen	2	—
879	Ein Sortiment ſchönblühender Zierſträucher in kleine Gartenanlagen, 30 Sorten	4	—
880	Ein Sortiment desgleichen in 12 Sorten . . .	1	5
881	Ein Sortiment ſchönblühender Staudengewächſe, auf Rabatten zu pflanzen, in 24 Sorten	2	12
882	Dergleichen von 12 auserwählten ſchönen Sorten .	1	8
883	Ein Sortiment ſchönblühender Glashauspflanzen, die ſich in Zimmern durchwintern laſſen, 12 Sorten . . .	2	12
884	Ein Sortiment dergleichen in 24 Sorten . . .	5	—
885	Ein Sortiment ſchönblühender neuer Engliſcher Pelargonien in 12 Sorten mit Namen	5	—
886	Ein Sortiment dergleichen in 24 Sorten . . .	9	—
887	Spargelpflanzen, Darmſtädter, dreijährige, 100 St. .	1	6

Bemerkungen.

Alle gefälligen Beſtellungen, welche ich mir portofrei und namentlich die auf meinen bekanntlich ſehr ſtark in's Gefüllte gehenden Levkoienſamen möglichſt bald erbitte, wobei ich den reſp. Abnehmern, welche Beſtellungen auf gute Levkoien und andere Sämereien in größeren Quantitäten für ſich ſammeln wollen, einen billigen Rabatt zu ſichern und die weitere gütige Verbreitung und Mittheilung meiner Verzeichniſſe und Empfehlung meiner Sämereien dankbar anerkennen werde, werde ich ſchleunig beſorgen.

Die Bezahlung bitte ich der Beſtellung gleich beizufügen, da ich ſie der Kürze wegen außerdem mittelſt Poſt-Vorſchuſſes entnehmen werde. — Die Emballage wird beſonders berechnet, und Treſorſcheine, Wiener Bankozeddel, Wechſel und Anweiſung auf ſolide Häuſer werden nach dem Cours in Zahlung angenommen.

Verzeichniſſe über die bei mir zu habenden Pflanzen werden in Kurzem erſcheinen.

Wiederholen muß ich, daß unfrankirte Aufträge nicht berückſichtigt werden können.

Weimar, im November 1833.

Friedrich Rauſche,
Kunſt- und Handelsgärtner, ordentliches Mitglied des Vereines
für Blumiſtik und Gartenanlagen in Weimar.

Verzeichniß
von
Gemüſe-, Rabatten- und Topf-Blumenſaamen,
welche für das Jahr 1834 ganz ächt und friſch zu haben ſind
im Baumgarten zu Weimar,
bei
J. Mook,
Tit. fürſtl. Heſſen-Rotenburg. Hofgärtner.

Kohl und Kraut.

	à Loth gGr.	Pf.
Blumenkohl, großer Kapiſcher ſpäter beſter .	8	—
— — früher Cypriſcher . .	7	—
Kraut oder Kopfkohl, Erfurter großes weißes	1	6
— — — Holländ., weißes frühes	1	6
— — — Braunſchweiger, großes plattes	1	8
— — — Erfurter blutrothes, zu Sallat	1	8
— — — Holländiſch, kleines ſchwarzrothes frühes . . .	2	—
Wirſing oder Herzkohl, Erfurter großer gelber Winter- . . .	1	6
— — — gewöhnlicher krauſer grüner	1	—
— — — Blumenthaler gelber Savoyer	1	6
— — — Ulmer niedr. ganz früher extra	2	4
Kohl, Brüßler Sproſſen- oder Roſenkohl .	1	6
— Franzöſiſcher bunter Plumage- . .	1	6
— grüner Federkohl	1	—
— hoher grüner krauſer Winter- . .	1	—
— hoher blauer . . .	1	—
— niedriger grüner . . .	—	9
— — blauer . . .	—	9
— Schnitt- oder Frühlingskohl, krauſer blauer	—	4
— Engl. grüner blumenkohlblättriger	—	6
Seekohl (Crambe maritima) . . .	2	—
Beißkohl oder Mangold . . .	—	4
Oberkohlrabi, große weiße ſpäte . .	1	—
— Engliſche weiße frühe . .	1	6
— — blaue . . .	2	—
— Wiener, kleinblättrige niedrige weiße frühſte . .	2	6
Unterkohlrabi oder Kohlrüben, große weiße . .	1	—
— — gelbe Schwediſche od. Rutobaga, extra	1	6

Wurzel- und Rübenſaamen.

	gGr.	Pf.
Carotten od. Möhren, frühe kurze rothe zum Treiben	1	—
— — — Frankfurter dunkelrothe lange	1	—
— — — Braunſchweiger lange rothe	—	6
— — — Erfurter lange rothgelbe	—	6
Wurzeln, Cichorien-, lange glatte . . .	—	9
— Haſer-Wurzel . . .	1	—
— Paſtinak-, große . . .	—	6
— Peterſilien-, Erfurter lange dicke .	1	—
— Rapontika . . .	—	6
— Scorzoner- oder Schwarzwurzel .	1	—
— Sellerie, Holländiſcher großer Knollen-	1	6
— — krausblättriger . . .	1	6
Zuckerwurzel	1	6
Rüben, weiße Holländiſche frühe Mai- . .	—	9
— gelbe dergl. . . .	1	—
— lange weiße Herbſt- oder Guckel- .	—	6
— blutrothe Sallat- oder Einmach- . .	—	6
— goldgelbe Sallat- oder Einmach- .	—	6
Runkel- oder Dickrüben, ganz große rothe à Pfund	4	—
Radies, weiße frühe Holländiſche kurzlaubige runde	1	—
— roſenrothe runde . . .	1	6
Rettig, Erfurter großer ſchwarzer Winter- .	1	—
— Wiener Sommer-	1	—

Erbſen.

	gGr.	Pf.
A. Zucker-Erbſen:		
frühe weißblühende Engl. . à Pfund	6	—
große graue blaublühende Säbel- . . —	6	—
frühſte niedrige Zwerg- . . . —	5	—
B. Kneifel-Erbſen:		
frühe große Mai- . . . . . à Pfund	3	6
Erfurter frühe große Klunker- . —	2	—
Franzöſiſche frühe Zwerg-, extra . —	5	—
Gutenburger frühe	4	—
Spargelerbſen . . à Loth	—	6

Bohnen.

	gGr.	Pf.
A. Stangenbohnen:		
Arabiſche große bunte Feuerbohne . à Pfund	4	—
— weiße . .	4	—
lange breite weiße Schwertbohne (extra) —	6	—
— bunte Schwert- (ſehr volltragend)	5	—
kleine weiße Perl- oder Sallatbohne . —	4	—
rothmarmorirte fadenloſe Zuckerbohne —	3	—
graue weißſchaalige Zuckerbohne .	4	—
B. Buſch- oder Zwergbohnen:		
ſchwarze oder Florentiner . . . —	3	—
weiße Schwerdt-, extra . . . . —	3	—
weiße früheſte Holländ., vorzüglich zum Treiben.	3	—
C. Puffbohnen:		
frühe grüne Mailänder . . —	3	—
rothe Engliſche . . —	3	—
große Garten- . . —	2	—
Türkiſch oder Welſch Korn (Zea Mais) —	4	—

Küchenkräuter.

	gGr.	Pf.
Baſilicum, großes Küchen- . . . à Loth	1	6
Bohnenkraut	1	—
Dill	—	6
Fenchel, gemeiner . . .	—	6
Gartenkreſſe, gefüllte krausblättrige . .	1	—
— — einfache breitblättrige . .	—	6
Iſop	1	—
Körbel, gewöhnlicher . . .	—	4
— — gefüllter . . .	—	8
Lavendel oder Spicke . . .	1	—
Löffelkraut	1	6
Majoran, Franzöſiſcher buſchiger . .	1	6
Meliſſe, feine Citronen- . . .	2	—
Peterſilie, einfache Schnitt- . .	—	4
— gefüllte krausblättrige . .	—	9
Pimpinell	1	—
Portulack, gelber . . .	1	6
Salbey, gewöhnliche . . .	1	—
Spinat, breitblättriger rundkörniger .	—	4
— ſchmalblättriger ſpitzkörniger .	—	3
Thymian	1	6
Weinraute	1	6

Sallat-Sorten.

	gGr.	Pf.
Aſiatiſcher, großer gelber . . .	2	4
Prinzenkopf, engl. . . .	2	—
Arabiſcher, größter beſter . .	2	—
Schwedenkopf, brauner . . .	2	—
Mohrenkopf oder Kaiſerſallat . .	2	—
Forellen-, großer bunter . .	1	6
Steinkopf-, früher feſter grüner (Winterſallat)	1	6
Melange der beſten Sorten . .	1	—
Winter-Endivien, krausblättriger gelber .	1	6
ommer-Endivien oder Bindſallat . .	1	6
dinschen	—	6

Zwiebeln.

	à Loth gGr.	Pf.
Erfurter blaßrothe runde harte . .	1	6
Holländiſche runde ſilberweiße, extra .	2	6
— blutrothe . . .	2	—
— lange gelbe ſüße Birn- . .	3	—
Porree, dicker Winter- . . .	1	6

Kern-Sorten.

	gGr.	Pf.
Artiſchocken, große . . .	2	6
Gurkenkerne, Erfurter grüne volltragende .	1	—
— Naumburger grüne Schlangen-	2	—
— Halliſche mittellange grüne . .	1	6
— weiße Schlangen- . . à Priſe 1 Gr.	4	—
— frühe grüne Stadl- zum Treiben	1	—
— allerfrüheſte kurze Miſtbeet- à Loth	2	6
Cucumis deliciosus odoratus, wohlſchmeckende, wie Ananas riechende Gurke . . à Priſe	1	—
Kürbiskerne.		
Melonenkürbis, größter, (erreicht ein Gewicht von 200 Pfund) . . . . . . 6 Kerne	1	—
Zierkürbis in 12 der ſchönſten Sorten mit Namen, die einzelne Priſe 1 Gr. zuſammen	8	—
Melonen, ein Sortiment in 8 der beſten Sorten	8	—
— Schlangenmelone, 3—4 Fuß lang, à Priſe	1	—
— Orangenmelone, ſehr volltragend u. gut à Pr.	1	6
— Anguria mit rothem Fleiſch, extra	1	—
Spargelkerne, Darmſtädter weiße . à Pfund	8	—

Blumenſaamen.

Sommergewächſe, oder einjährige.

Von allen in Loth angegebenen Sorten, ſind auch Priſen zu 1 gGr. zu haben, niemals aber halbe Priſen.

	gGr.	Pf.
Aster chinensis fl. pl., gefüllte Röhraſter: No. 1. Dunkelroth. 2. Dunkelblau. 3 Fleiſchfarbe. 4. Weiß. 5. Roſa. 6. Hellblau. 7. Blau mit Weiß. 8. Roth mit Weiß. 9. Hellblau mit weißer Blatteinfaſſung. 10. Hellroth mit weißer Blatteinfaſſung . . die Priſe à 100 Körner	1	6
Dieſe zehn Sorten von jeder Sorte eine Priſe	12	—
Hiervon 8 Sorten gemiſcht die Priſe in 400 Kr.	3	—
Aster annuus, Zwerg-Aſtern in 6 Farben gemiſcht à 200 Körner	1	6
Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoyen, in folgenden, ſehr viel gefüllte gebenden Sorten:		
Engliſche Sorten.		
No. 1. Apfelblüthe. 2. Lichtblau. 3. Kupferroth. 4 Rosenfarbe. 5. Rothbraun. 6. Aschblau. 7. Carminroth. 8. Blaſsbraun. 9. Mordorée. 10. Blaſslilla. 11 Ziegelroth. 12. Violett. 13. Weiſs. 14. Carminroth, lackblättrig. 15. Fleischfarbig, lackblättrig. 16 Mordorée, lackblättrig. 17. Weiſs, lackblättrig. 18. Zimmtbraun, lackblättrig. 19 Rothbraun, lackblättrig à 100 Körner	1	6
Halb-Engliſche Sorten.		
No. 20. Fleischfarbig. 21. Weiſs. 22. Hellblau. 23. Dunkelblau. 24. Blaſsbraun. 25 Mordorée. 26. Hochcarminroth. 27. Dunkelkupferroth. 28. Dunkelrosa. 29. Ziegelroth. 30. Aschgrau à 100 Körner	1	6
Spätblühende od. perennirende Sorten.		
No. 31. Carmoisinroth, Engl. 32. Dunkelblau, Engl. 33 Kupferfarbe, Engl. 34. Weiſs, Engl. 35. Carmoisinroth, Halbengl. 36. Dunkelbraun, Halbengl. 37. Fleischfarbig, Halbengl. 38. Ziegelroth, Halbengl. 39. Weiſs, Halbengl. 40. Carminroth, Halbengl. Lackbl. à 100 Körner	1	6
Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen: A Hochroth. D. Weiſs. E. Dunkelblau. H. Hellviolett. I. Zimmt- oder Kupferf. K. Violette Baumlevkoye. L. Rosa. A A. Carmoisin, brennend. A. B. Weiſs, lackbl. C. Carminroth, lackbl. à 100 Körner	1	—
Das Sortiment Sommer-, Herbſt- und Winter-Levkoyen in 50 Sorten . . . 2 Rthlr.	12	—
desgl. engl. und halbengl. Sommer-Levkoyen in 50 Sorten . . . . 1 Rthlr.	6	—
desgl. bloß engl. Sommer-Levkoyen in 12 Sorten	16	—
12 Sorten Sommerlevkoyen gemiſcht circa 400 Kr.	4	—
[illegible] Levkoyen gemiſcht circa 400 Kr.	4	—
6 Sorten Winterlevkoyen gemiſcht, circa 400 Kr.	2	—
Adonis autumnalis, hochrothes Adonisröschen	1	6
Ageratum mexicanum, blaues Ageratum .	1	6
Agrostemma coeli rosa, glattblättrige Gartenrade	1	—
Amaranthus caudatus, Fuchsſchwanz . .	1	—
— — speciosus, prächtiger . . .	1	—
Antirrhinum orontium, Kalbsnaſe . .	1	—
— — triphyllum, dreibl. Löwenmaul	1	—
Anoda dillenia, blaue Anoda, ſchön . .	1	6
Anthemis arabica, Arabiſche Camille . .	1	—
Aster tenellus, zarte kleine blaue Aſter . .	1	—
Athanasia annua, jährige Athanaſie .	1	—
Bryza maxima, größtes Zittergras .	1	—
— minor, kleines Zittergras .	1	—
Cacalia sonchifolia, rothe Cacalie . .	1	6
Calceolaria pinnata, gefied. Pantoffelblume (ſchön!)	2	—
Calendula officinalis fl. pl. aureo, goldgelbe gefüllte Ringelblume .	1	—
— pluvialis, Regen-Ringelblume .	1	—
Campanula speculum, Venusſpiegel, blau, weiß und roth	1	6
Centaurea cyanus, Gartenkornblume, verſchiedene Farben . .	—	9
— moschata fl. albo, weiße Flockenblume	1	—
— — fl. coeruleo, blaue .	1	—
— suaveolens, gelbe wohlriechende .	1	6
Centranthus calcitrapa (Valeriana calcitrapa)	1	—
Cerinthe major, große Wachsblume . .	1	—
Cheiranthus maritimus, Meerlevkoye, roth und weiße	1	—
Chrysanthemum carinatum, ſchönſte Wucherblume	1	6
— coronarium fl. pl. albo, weißgefüllte . . .	1	—
— — fl. pl. aureo, goldgelbgefüllte	1	—
Clarkia pulchella, (ſchöne Clarkia, ſehr ſchön u. neu!)	1	6
Convolvulus bicolor, zweifarbige Winde	1	—
— tricolor, dreifarbige Winde .	1	—
Coreopsis tinctoria, färbende Wanzenblume	1	—
Corydalis aurea, goldfarbener Erdrauch	1	—
Collinsia grandiflora, großbl. Collinſia, neu	1	6
— linearis, ſchmalblättrige — . . .	1	—
Cotula coronopifolia, zu Einfaſſungen (ſchön)	1	6
Chenopodium aromaticum, gewürzhafter Gänſefuß	1	6
Crepis barbata, bärtiger Pippau . . .	1	—
— rubra, roſenrothe und weiße Grundfeſte	1	—

	à Priſe gGr.	Pf.
Cuphea viscosissima, klebrige Cuphea . .	1	6
Delphinium Ajacis, gefüllter niedriger ſehr ſchöner Ritterſporn, in 8 Farben à Loth	6	—
und in folgenden Sorten: No. 1. weiß. No. 2 blaßlilla. No. 3. blaßziegelroth. No. 4. violet. No. 5 hellblau. No. 6. blaßbraun. No. 7. dunkelziegelroth. No. 8. aſchblau. No. 9 milchweiß. No. 10. leberfarben. Von jeder dieſer 10 Sorten eine Priſe	10	—
Delphinium consolida fl. pl., gefüllter Levkoyen-Ritterſp., in 6 Farben . à Q.	1	6
Dracocephalum Moldavica, weißer Türkiſcher Drachenkopf .	1	—
— — fl. coeruleo, blauer	1	—
Echium creticum, cretiſche Stachelkolbe .	1	—
— grandiflorum, großbl. Stachelkolbe	1	6
Elichrysum lucidum, glänzende Strohblume	1	6
— bracteatum fl. albo, weiße neue .	2	
Erodium gruinum, candiſcher Reiherſchnabel .	1	—
Georgina variab. fl. pl., extra gefüllte Georgine, 100 Kr.	6	—
Gilia capitata, knopfförmige Gilie, (ſehr ſchön!)	1	6
Glaucium phoeniceum, ſcharlachrother Hornmohn	1	6
Gypsophila elegans, ſchöne Gypſophila.	1	6
Helianthus annuus, fl. aureo pl., goldgelbgefüllte	1	—
Hibiscus trionum, Stunden-Eibiſch . .	1	—
Iberis amara, weiße Schleifenblume . . .	1	—
— umbellata, bunte doldentragende . .	1	6
— — alba (superba), weiße doldentragende	1	6
— — fl. rubro, rothe (ſchön!)	2	—
— odorata, wohlriechende . . .	1	6
— pinnata, gefiederte . .	1	—
Impatiens balsamina fl. pl., gefüllte Balſaminen, in 12 Farben extra . 100 Körner	3	—
und in folgenden Sorten: No. 1. weiß. No. 2. violett, No. 3 kupferfarbig. No. 4 ſcharlach, No 5. lilla. No. 6. dunkelroſa, No. 7. purpur, No. 8. fleiſchfarbig. No. 9. weiß mit purpur, No. 10. weiß mit ſcharlach. No 11. weiß mit Kupfer, No. 12. weiß mit carmoiſin.		
Das ganze Sortiment in 12 Sorten à Pr. 16 Kr.	12	—
Ipomoea purpurea, verſchiedenfarbige Trichterwinde . . Pr.	1	—
Kelmia vesicaria, Blaſen-Ketmie (ſchön!)	1	6
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke à Loth	2	—
— striatus, blau u. roth geſtreifte (neu u. ſchön!) . .	1	—
Lavatera trimestris fl. albo, weiße Sommerpappel	1	—
— — fl. rubro, rothe . .	1	—
Lupinus Cruikschanki, Cruikſhank's Lupine, ſehr ſchön . . à 4 Körner	2	—
Lupinus major, Lupinen, weiß, blau u. roth .	—	9
— mycranthus, kleinſte Lupine . .	1	—
Madea elegans, ſchöne Madea, prachtvoll .	3	—
Malope trifida, dreitheilige Malope .	1	6
— grandiflora, großblumige, (prächtig!) .	3	—
Malva mauritiana, Mauritaniſche Malve .	—	9
Mirabilis jalappa, Jalappe, diverse Farben .	1	—
— dichotoma, gabelförmige . .	1	—
— longiflora, langblüthige wohlriechende	1	—
— hybrida, Baſtard, (ſchön!) . .	1	6
Momordica elaterium, Spritz-Gurke . .	1	—
Nemophylla phacelioides, blaue Nemophylla, neu und ſchön!	2	—
Nicotiana nyctaginiflora, wie Jasmin riechender Taback, (ſchön) . . .	1	6
Nigella damascena, Garten-Schwarzkümmel	—	9
— damascena nana pl., gefüllter Zwerg-Schwarzkümmel . .	1	—
Oenothera amoena, cruciata, Lindleyana, longifolia, muricata, odorata, purpurea, tetraptera, undulata, von jeder Sorte die Priſe	1	—
— taraxacifolia, die weißen Blumen 3—4 Zoll groß	2	—
Papaver rhoeas fl. pl., gef. Ranunkel-Mohn à Loth	4	—
— somniferum fl. pl., hoher gef. Mohn à Loth	3	—
— plenissimum, gefüllteſter . .	1	—
Polygonum orientale fl. rubeo, Morgenländiſcher, ſuchterig rother .	1	—
Reseda odorata, wohlriechende Reſeda , à Loth	3	6
— alba, weiße Reſeda . .	1	—
— phyteuma, Rapwurzel-Reſeda .	1	—
Ricinus communis, gemeiner Wunderbaum .	1	6
Rudbeckia amplexicaulis, ſtängelumfaſſende Rudb.	1	—
Salpiglossus atropurpureus, ſchwarzrothe Salpigl.	3	—
— Barkleyanus, Barkley's Salpigloſſus	4	—
— — speciosissimus, prächtigſte Salpigloſſus . . .	6	—
— picta, bemalte	8	—
— stramineus fl. albo, weißliche Salpig.	2	—
— — fl. aureo, weiß mit goldgelb	2	—
— . — fl. fusco, weiß mit braun	3	—

Die Salpigloſſus ſind jedem Blumenfreunde beſonders zu empfehlen, ſie blühen im erſten Jahre, laſſen ſich bei guter Behandlung aber auch durchwintern und paſſen ſowohl für den Topf als auch für's Land.

	gGr.	Pf.
Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie .	1	6
Scabiosa atropurpurea, in 12 Farben . .	1	—
— atrop nana, niedrige . . .	1	6
— — major, großblumige in acht Farben, (vorzüglich ſchön!) . .	1	6
— stellata, ſternförmige . .	1	—
Schizanthus pinnatus, (neues, ſehr ſchönes Sommergewächs!) . .	2	—
— grandiflorus, großblumiger . .	2	—
Scorzonera tingitana, Haferwurz . .	—	9
Senecio elegans fl. pl. albo, weißgef. Kreuzkraut	1	6
— — fl. pl. rubro, rothgefülltes	1	6
Silene quinquevulnera, fünfflecktige Silene .	1	—
— pendula, hängende Silene . . .	1	—
Solanum lycopersicum fructu rubro, rothfrüchtiger Liebesapfel . .	1	—
— — — fr. luteo, gelbfrüchtiger	1	—
Sycios angulata eckige Haargurke zu Bekleidungen	1	—
Tagetes erecta fl. pl. aureo, aufrechte gefüllte hochgelbe Sammtblume . .	1	6
— — fl. pl. sulphureo, ſchwefelgelbe .	1	6
— fl. pl. patula, braungelbe ausgebreitete	1	—
Trifolium melilotus fl. coeruleo, blauer Meliloten Klee	1	—
Tropaeolum majus große Spaniſche Kreſſe à Loth	1	—
— majus fl. bruneo, braune (neu prächtig!)	3	—
— hybridum, Baſtard . . .	1	—
Tithonia tagetiflora, ſammtblumenartige Tithonie	1	6
Vicia faba, rothe wohlriechende Puffbohne 4 Kr.	1	—
Viola tricolor grandiflorum, dreifarbig großblumiges Stiefmütterchen .	1	—
Xeranthemum annuum fl. albo, weiße Papierblume	1	—
— — an. fl. coeruleo, blaue . .	1	—
— — fl. albo pleno, weiße gefüllte	2	—
— — fl. coeruleo pl., blaue gefüllte	2	—
Zinnia multiflora rubra, rothe vielblumige Zinnie	1	—
— — fl. luteo, gelbe — —	1	—
— — fl. sulphureo, ſchwefelgelb. — —	1	6
— elegans, ſchöne Z. . .	2	—
— — fl. albo, ſchöne weiße . .	2	—
— — coccinea, ſcharlachrothe unvergl.	3	—
— grandiflora, großblumige Z. .	1	6

	à Priſe gGr.	Pf.
Zinnia tenuiflora, ſchmalblättrige Z. . .	1	—
— verticillata, wirtelſtändige Z. . . .	1	[illegible]
Ein Sortim. Sommergewächſe in 50 Priſen nach meiner Wahl 1 Rthlr. 12 Gr.		
Ein Sortim. dergl. in 30 Priſen nach meiner Wahl 20 Gr.		
Ein Sortim. dergl. in 18 Priſen nach meiner Wahl 12 Gr.		
Ein Sortiment dergl. in 12 Pr. der ſchönſten à 12 Gr.		

Einige perennirende Blumenſaamen,

oder ſolche, die mehrere Jahre dauern, und beſonders ſchönblühend ſind.

	gGr.	Pf.
Aconitum variegatum, bunter Sturmhut .	1	—
— Willdenowianum, Willdenow's .	1	—
Adenophora denticulata, Keulenglöckchen, (ſchön!)	1	6
Agrostemma coronaria fl. rub., rothe Gartenrade	1	—
— — fl. albo, weiße . . .	1	—
Althaea rosea fl. pl., gefüllte ſehr ſchöne Winter-Malven in 12 Farben . .	1	—
— ficifolia aureo pl., gefüllteſte Feigenbl.	2	—
Amobium alatum, Zweizeilen-Amobium (neu!)	2	—
Antirrhinum majus, großes Löwenmaul 8 Farben	1	—
— bicolor, weiß mit rothen Lippen .	1	[illegible]
Aquilegia vulgaris, gef. blühende Akeley in 6 Sort.	1	—
— speciosa, prächtige Akeley . .	1	[illegible]
— bicolor, zweifarbige gefüllte . .	1	—
— canadensis, canadiſche Akeley .	1	[illegible]
— striata, geſtreifte gefüllte, (ſehr ſchön!)	1	[illegible]
Asclepias incarnata, incarnate Seidenpflanze	1	[illegible]
— syriaca, Syriſche . . .	1	—
Beta brasiliensis, roth, gelb und weiße Beta à Pr. von jeder Farbe	2	—
Campanula medium fl. albo pl., weiß gefüllte Glockenblume . . .	1	[illegible]
— coerulea pl., blau gefüllte —	1	[illegible]
— medium gemeine einf. Glockenblume, blau, weiß und milchblau . .	1	—
— pyramidalis, pyramidenförmige .	1	[illegible]
— versicolor, verſchiedenfarbige .	2	—
Cheiranthus cheiri fl. pl., Wiener braungefüllter Stangenlack, extra . 100 Körner	2	—
— — halbgefüllter mit ſehr ſtarken Blumenbüſcheln . 100 Körner	1	[illegible]
— — fl. semipl. coeruleo, blauer halbgefüllter Buſchlack . 100 Körner	1	—
Coreopsis Atkinsonii, Atkinſon's Wanzenblume	1	[illegible]
Delphinium exaltatum, Ritterſporn . .	1	—
— hirsutum, wolliger . .	1	—
— grandiflorum, großblumiger .	1	[illegible]
Dianthus barbatus, Bartnelken in viel. Farben à Loth	4	—
— barbatus fl. pl gefüllte Bartnelke .	1	—
— chinensis, Chineſernelken in vielen Farben	1	—
— — fl. pl., gefüllte Chineſernelken .	1	[illegible]
— caryophyllus, beſte Topfnelken, von 100 der beſten Sorten geſammelt 100 Körner	16	—
— von 50 Sorten geſammelt 100 Kr.	10	—
— von gefüllten Landblumen . . 100 Kr.	3	—
— superbus, ſtolze Nelke , . .	1	6
Dictamnus fraxinella fl. rubro, rother Diptam	1	—
Digitalis alba, weißer Fingerhut . . .	1	—
— ferruginea, roſtfarbiger . . ,	1	—
— grandiflora, großblumiger . .	1	—
— purpurea, purpurrother . . .	1	—
Francoa sonchifolia, diſtelblättrige Francoa, (neu und ſchön!)	2	—
Geum coccineum, ſcharlachr. Geum (ſehr ſchön!)	2	—
Glaucium fulvum, rothgelber Hornmohn .	1	—
Hedysarum coronarium fl. rubro, hochrother Hahnenkopf (muß im Winter bedeckt werden) . . .	1	—
— — fl. albo, weißer . .	1	—
Hemerocallis jap. coeruleo, Japaniſche blaue Taglilie	1	6
Hesperis matronalis, blaue Viole . .	1	—
— tristis, graue Nachtviole . . .	1	—
Lathyrus latifolius, breitblättrige Wicke .	1	—
Linum perenne, perennirender Flachs . .	1	—
— grandiflorum, großblumiger Lein . .	1	—
Lupinus polyphyllus, neue prächtige Lupine, 6 Kr.	2	—
Lychnis chalcedonica, ſcharlachrothe Lychnis	1	—
— — fl. carneo, fleiſchfarbige	1	—
— — ferruginea, roſtfarbige	1	—
— fulgens, blitzende (ſehr ſchön!) .	1	6
Malva moschata, Moſchusmalve . . .	1	—
Matricaria parthenium fl. pl., gef. Mutterkraut	1	—
Mimulus guttatus, gelber Gaukler . . .	1	6
Papaver orientale, morgenländiſcher Mohn .	1	—
— bracteatum, deckblättriger Mohn, (ſchön!)	1	6
— nudicaule, nacktſtänglicher Mohn .	1	—
Penstemon pubescens, weichhaariger Bartfaden	1	6
Polemonium coeruleum, blaues Sperrkraut .	1	—
Podalyria australis, auſtraliſche Podalirie .	2	—
Potentilla atrosanguinea, dunkelrothes Fingerkraut	2	—
— nepalense, Nepaliſches . . .	1	6
— formosa, ſchönes , ...	1	6
Primula auricula, Engl. u. Lücker Aurikelſaamen, von Topf No. Blumen extra .	4	—
— auricula, von den ſchönſten Sorten Engl. Topf No. Blumen geſammelt, eine Priſe in circa 200 Kr. . .	4	—
— cortusoides	1	—
— veris, Engl. und Teutſche Primel, von den ſchönſten Blumen . . .	2	—
Salvia affinis, in drei Farben	1	—
Trifolium odoratissimum, wohlriechender Klee	1	—
Valeriana rubra, rother Baldrian . .	1	—
Veronica longiflora, langblumiger Ehrenpreis	1	—
— multicaulis, vielſtenglicher . .	1	—
Ein Sortiment Perennen von 30 der ſchönſten Sorten in 30 Priſen . .	20	—
Ein dergl. in 16 Priſen . .	10	—

Topfgewächſe-Blumenſaamen.

Die mit w bezeichneten, wollen warm ſtehen.

		gGr.	Pf.
Acacia armata, bewaffnete Acacie . .	2 Kr.	2	—
— decurrens, . .	3 Kr.	2	—
— latifolia, breitblättrige .	2 Kr.	2	—
— longifolia, langblättrige . .	2 Kr.	2	—
— lophanta, büſchelblüthige . ,	3 Kr.	2	—
— stricta, ſteife .	3 Kr.	2	—
— undulata, wellenförmige	2 Kr.	2	—
— verticillata, wirtelblättrige . .	6 Kr.	2	—
Alstroemeria pelegrina, bunte Alſtrömerie	4 Kr.	1	—
Amaranthus tricolor w., dreifarbiger Amaranth		1	—
Anagallis fruticosa, rother Gauchheil .		1	6
Argemone mexicana, Stachelmohn . .		1	—
— grandiflora, großblumiger Stachelmohn		2	—
Ardisia crenulata w., kerbige Spitzblume .		2	—
Asclepias curassavica w., Südamerikaniſche Seidenpflanze . .		1	6
— nivea w., weiße . . .		1	6
Aster argophyllus, Weiße Aſter . . .		1	6
Basella lucida, glanzblättrige Baſelle . . .		1	—

	à Priſe	gGr.	Pf.
Blumenbachia insignis, Blumenbachie	6 Kr.	1	6
Browallia elata fl. coeruleo w., blaue Browallie		1	—
Cactus mammillaris w., Igel Cactus		2	—
Calandrina grandiflora, großblumige Calandrine		2	—
— speciosa, prächtige, (beide neu!)		2	—
Canna indica, Indianiſches Blumenrohr	4 Kr.	1	—
— coccinea, ſcharlachrothes	3 Kr.	1	—
— glauca, graugrünes	3 Kr.	1	6
— limbata, geſäumtes	3 Kr.	1	6
— mexicana, Mexicaniſches	3 Kr.	1	—
— sanguinea, blutrothes	3 Kr.	1	6
— speciosa w., prächtiges Blumenrohr	4 Kr.	1	6
Capsicum cerasiforme w., kirſchähnl. Beißbeere		1	—
— grossum w., große		1	—
Cardiospermum halicacabum w., glatter Herzſaame		1	—
Catananche coerulea, blaue Raſſelblume		1	6
Celosia cristata w., Hahnenkamm, in 6 Farben, (extra groß)		1	6
— argentea, ſilberähriger		1	6
— paniculata, riſpenförmiger		1	6
— pyramidalis w., pyramidenartiger neuer federartiger prächtiger		2	—
Cleome pentaphylla, fünftheilige Cleome		1	—
— mycrantha		1	—
Commelina coelestis w., blaue Commeline		1	6
Convolvulus siculus w., Sicilianiſche Winde		1	—
Coix lacryma, Thränengras	3 Kr.	1	—
Coronilla glauca, gelbe Peltſche		1	—
Cyclamen persicum, perſiſche Erdſcheibe		1	6
Datura fastuosa fl. pl. violaceo w., gefüllter blauer Stechapfel		2	—
— — fl. pl. albo, gefüllter weißer		2	—
— ceratocaule, hornſtängl.		1	—
Didymocarpus semperflorens, immerblühend. D.		1	6
Dolichos lablab w., Aegyptiſche Faſel		1	—
Eccremocarpus scaber, ſcharfer Eccremer ſehr ſchön!		3	—
Gloxinia formosa w., ſchöne Gloxinie		1	6
Gnaphalium odoratum, ſtarkriechendes Ruhrkraut		1	—
Gomphrena globosa fl. albo w., weißer Kugelamaranth		1	—
— — fl. carneo w., fleiſchfarbiger		1	—
— — fl. rubro w., rother		1	—
Grahamia aromatica, gewürzhafte Grahamie, (ſehr prächtig!)		1	6
Haemanthus puniceus w., dunkelrothe Blutblume	3 Kr.	1	6
Harrachia speciosa w., prächtige Harrachie	6 Kr.	2	—
Hedysarum vespertilionis w., fledermausblättriger Hahnenkopf	6 Kr.	1	6
— paniculatum, riſpenförmiger	4 Kr.	1	—
Hemimeris urticifolia w., neſſelbl. Halbblume		1	—
Heliotropium indicum, Indiſche Sonnenwende		1	6
Hibiscus Humboldtii w., Humboldt's Hibiſc.		1	—
— cannabinus w., hanfartiger		1	—
— manihot w., ſchwefelgelber	3 Kr.	1	6
— africanus, afrikaniſcher, (neu und ſchön!)		2	—
Ipomoea coccinea w., ſcharlachrothe Trichterwinde		1	6
— quamoclit, gefiederte	3 Kr.	1	6
— tuberosa, knollige	4 Kr.	1	—
— Nil, prächtige	3 Kr.	1	6
Kaulfussia amelloides, amellenartige Kaulfuſſie		1	6
Lophospermum scandens, rankende neue prächtige		2	—
Malva miniata, zinnoberrothe Malve		1	—
— elegans, ſchöne Malve		1	6
Maurandia semperfl., immerblühende Maurandie		2	—
— Barklayana, Barkl. Maur. (ſehr ſchön!)		2	—
— — bicolor, zweifarbige		1	6
Melaleuca hypericifolia, johannisbeerblättriger Cajaputbaum		1	6
Mesembrianthemum crystallinum, Eiskraut		1	6
— — pinnatifidum, gefiedertes		1	6
— — tricolor, dreifarbiges		2	—
Metrosideros glauca, graugrüne v. M.		1	6
— — lanceolata, lanzettförmiges		2	—
— — linophylla, büſchelblüthiges		2	—
Mimosa pudica, ſchamhafte Sinnpflanze	4 Kr.	2	—
Mimulus rivularis, geſleckte Affenblume		2	—
— variegatus, weiß mit purpurroth, (ſehr ſchön!)		1	—
Myristica balsamina, Balſamapfel	4 Kr.	1	—
Ocymum macrophyllum, großblättrige Myrte		1	6
— maximum, großes Baſilicum		1	6
— minimum, kleinſtes		1	6
Passiflora gracilis w., ſchlanke Paſſionsblume	4 Kr.		
Pelargonium spec. div., Kranichſchnabel, neue blumige	25 Kr.	2	—
Polygala myrtifolia, myrtenblättrige Polygal	4 Kr.	1	—
Rhododendron ponticum, pontiſche Alpenroſe		2	—
— — maximum, größte		2	—
Rivinia humilis w., rothfrüchtige Rivinie		1	6
Salvia coccinea, ſcharlachrothe Salbey		1	—
Solanum corallinum, Korallkirſche		1	—
— melongena fr. albo, weißer eiförmiger Nachtſchatten		1	—
— — fructu coeruleo, blauer		1	—
Spartium junceum, Spaniſche wohlriechende Pfrieme		1	—
Spermacocia rubra, rothe Spermacoce		1	6
Stilidium adnatum, angewachſene Säulenblume		1	6
Trachelium coeruleum, blaues Halskraut		3	—
Trachymene coerulea, blaue Trachym. (ſehr ſchön!)		2	—
Verbena Aubletia, Eiſenkraut			
Veltheimia capensis w., Capiſche Veltheimie	3 Körn.	1	—

Ein Sortiment Topfgewächsſamen nach meiner Wahl in 30 Priſen à 1 Rthlr.

Ein Sortim. dergl. in 20 Priſen à 14 Gr.

Ein Sortim. dergl. in 12 Priſen 8 Gr.

Blumenzwiebeln und Knollen, welche bis April trocken verſandt werden können.

		à Stück gGr.	Pf.
Amaryllis Belladonna		6	—
— formosissima		3	—
— vittata w.		12	—
— purpurea w.		8	—
— Reginae		8	—
— undulata w.		3	—
Begonia discolor		3	—
Canna indica w.		4	—
— mexicana		4	—
— coccinea		4	—
— speciosa w.		6	—
— glauca		8	—
— sanguinea		6	—
Commelina coelestis	4 Stück	6	—
Cymbidium pulchellum w.	8 Stück	4	—
Cyrilla pulchella w.		4	—
Ferraria tigridia		1	6
Gloxinia coccinea w.		8	—

	à Stück gGr.	Pf.
Gloxinia formosa w.	4	—
— — fl. albo w.	6	—
— maculata w.	3	—
Ipomoea tuberosa	3	—
Kaempferia Galanga w.	6	—
Polyanthes Tuberosa, gefüllte Tuberoſe	1	6
Ranunkeln, gefüllte Holländiſche, 100 Stück 1 Rthlr.	8	—

Georginenwurzeln

in richtig gefüllten Sorten.

Georgina var. alba, weiße, 5–6 Fuß hoch	6	—
— — — purpurea, weiß mit purpurnen Rändern, 4–5 Fuß hoch	12	—
— — amaranthacea, amaranthrothe, 5–6 F. hoch	8	—
— — anemonaeflora purp. elegans, anemonenblüthig, 4 F. h.	10	—
— — atrococcinea formosa, dunkelſcharlach, 4–5 Fuß hoch	10	—
— — — grandiflora, dunkelſcharlach großbl., 4–5 F. hoch	10	—
— — atrococc. alicii paradoxa, 5–6 F. hoch	6	—
— — atropurpurea, dunkelpurpurrothe, 5–6 F. hoch	4	—
— — — incomparabilis, unvergleichliche, 3–4 F. hoch	8	—
— — — nigricans, ſchwarzpurpurne, 4–5 F. hoch	6	—
— — aurea multifl., goldgelbe vielbl. 4–5 Fuß hoch	8	—
— — — rubra lillacina, gelb mit roth und lilla, 6–7 F. hoch	10	—
— — aurantiaca rubra, orangefarbige mit roth, 5–6 F. hoch	6	—
— — — maxima, größte orangefarbige, 4–6 F. hoch	10	—
— — — rubra major, große orangefarbige mit roth, 3–4 F. h.	8	—
— — badia, kaſtanienbraune, 6–7 F. hoch	8	—
— — — rubra, kaſtanienbraun mit roth, 5–6 F. hoch	6	—
— — carmonina alba, carmoiſin mit weiß, 4–5 F. hoch	8	—
— — carnea, fleiſchfarbige, 5–6 F. hoch	6	—
— — coccinea, ſcharlachrothe, 4–5 F. hoch	8	—
— — — elegans, ſchöne ſcharlachrothe, 4–5 Fuß hoch	8	—
— — — formosa, ſchönſte ſcharlachrothe, 4–6 F. hoch	10	—
— — — grandiflora, großbl. ſcharlachrothe, 4–5 F. hoch	8	—
— — — lutea, ſcharlach mit gelb, 3–4 F. hoch	8	—
— — — ranunculoides, ſcharlachranunkel, 4–5 F. hoch	10	—
— — — speciosa, prächtig ſcharlach, 7–8 F. hoch	8	—
— — cuprea, kupferrothe, 4–5 F. hoch	8	—
— — ferruginea, roſtfarb., 4–5 F. hoch	6	—
— — flavescens, bleichgelbe, 5–6 F. hoch	8	—
— — fuscata, braunrothe, 4–5 F. hoch	8	—
— — — miniata, zimmtbraunrothe, 4–5 F. hoch	4	—
— — incarnata, incarnatrothe 6–7 F. h.	6	—
— — lactea, milchweiße, 4–6 F. hoch	12	—
— — lateritia, ziegelrothe, 4–5 F. hoch	6	—
— — lillacina, lilla, 5–6 Fuß hoch	4	—
— — — albica, blaßlilla, 6–7 F. h.	8	—
— — — carmoisina, lilla mit carmoiſin [illegible], 4–6 F. hoch	10	—
— — — grandiflora, [illegible] lilla, 6–7 Fuß hoch	6	—
— — lutea ranunculoides, gelbe ranunkelbl., 3–4 Fuß hoch	6	—
— — lutea laciniata, gelbe ſchlitzblättrige, 4–5 F. hoch	6	—
— — ochroleuca lillacina, ochergelb mit lilla, 4–6 F. hoch	6	—
— — ochroleuca, ochergelb, 5–6 F. hoch	6	—
— — punicea, hochrothe, 4–6 F. hoch	8	—
— — purpurea, purpurrothe, 5–6 F. hoch	4	—
— — — luminosa, ſchönſte purpurrothe, 5–6 F. hoch	6	—
— — — laciniata, purpurrothe ſchlitzbl., 3–4 F. hoch		—
— — — ranunculiflora, purpur ranunkelbl. 4–6 F. hoch	8	—
— — — speciosa, prächtig purpurrothe, 4–5 Fuß hoch	6	—
— — rosea, roſenrothe, 4–5 F. hoch	6	—
— — — albida, blaßroſa, 4–6 F. h.	8	—
— — — lillacina, roſa mit lilla, 3–4 Fuß hoch	6	—
— — — lillacina albida, roſa mit blaßlilla, 5–6 Fuß hoch	6	—
— — — minor, kleine roſenrothe, 3–4 F. hoch	4	—
— — — variegata, roſa und weiße, 5–6 Fuß hoch	6	—
— — rubicunda, röthliche, 4–5 F. hoch	6	—
— — rubra aurea punctata, roth mit gelb, 4–5 F. hoch	6	—
— — rubra grandiflora, rothe großblumige, 4–5 F. hoch	8	—
— — ruberrima pulchra, röthlichſchillernd, 4–5 F. hoch	6	—
— — sanguinea, dunkelblutrothe, 3–4 Fuß hoch	8	—
— — sulphurea speciosa, prächtigſchwefelgelbe, 5–6 F. h.	12	—
— — violacea, violette, 6–7 F. hoch	6	—
— — vitellina, dottergelbe, 6–7 F. hoch	6	—
— — xerampelina, rothbraune, 3–4 Fuß hoch	6	—
— — xerampelina grandiflora, rothbraune großblumige, 5–6 F. h.	8	—

Ein Sortiment gefüllte Georginen in 40 Sorten à 6 Rthlr.
Ein Sortiment dergl. in 30 Sorten à 4 Rthlr.
Ein Sortiment der ſchönſten in 20 Sorten à 5 Rthlr.
Ein Sortim. Prachtblumen in 12 Sorten à 3 Rthlr.

Aurikel- und Primel-Pflanzen.

12 Stück in 12 Sorten Engliſche Aurikel mit Namen und Farbenbezeichnung 3 Rthlr.	—	
12 Stück in 12 Sorten Lücker Aurikel mit Namen und Farbenbezeichnung 1 Rthlr.	12	
12 Stück in 12 Sorten dieſelben ohne Namen und Farbenbezeichnung	20	
12 Stück in 12 Sorten Primeln ohne Namen und Farbenbezeichnung	12	

	à Stück gGr.	Pf.
12 Stück ſchöne Engliſche Primeln . .	8	—
12 — Teutſche Primeln . .	4	—

Ein Sortiment Chryſanthemum indicum in 16 Sorten . . . à 2 Rthlr.	—	—
Ein Sortiment dergl. in 8 Sorten der neueſten und ſchönſten . . à 1 Rthlr.	6	—
Ein Sortiment Roſa semperflorens et sempervirens, immerblühende und immergrüne Topf-Roſen in 30 Sorten . . à 6 Rthlr.	—	—
Ein Sortim. dergl. in 18 Sorten der beſten 3 Rthl.	—	—
Ein Sortiment bloß immerblühende in 12 der allerſchönſten Sorten . . à 2 Rthlr.	12	—
Ein Sortiment Roſenabſenker für's freie Land mit Namen in 50 Sorten . . à 5 Rthlr.	—	—
Ein Sortiment dergl. beſſere in 30 Sort. 4 Rthlr.	—	—
Ein Sortiment Prachtroſen in 20 Sorten 4 Rthlr.	—	—
Ein Sortiment ſchönblühender Staudengewächſe für Rabatten in 50 Sorten mit Namen à 3 Rthlr.	—	—
Ein Sortiment dergl. beſſere in 30 Sorten 2 Rthlr.	—	—
Ein Sortiment dergl. allerſchönſte Arten in 20 Sorten . . . 2 Rthlr.	6	—
Ein Sortiment Zierſträucher mit Namen in 30 Sorten . . . 2 Rthlr.	12	—
Ein Sortim. dergl. in 20 Sort. mit Namen 2 Rthlr.	—	—
Ein Sortiment dergl. die ſchönſt. in 12 Sort. 1 Rthlr.	12	—

Nelken,

wovon im Frühjahr 1834 gutbewurzelte Senker, das Dutzend zu 2 Rthlr. abgegeben werden können; werden weniger als 12 Stück beſtellt, ſo wird das Stück mit 5 Gr. berechnet.

No. 1. Annchen, g. ffx. m. roſa u. braſchtblau.
— 2. Lina, w. hol. P. m. braſchtcarm.
— 4. Begatto, P. ffx. chamois m. violpuce.
— 5. Panache ſuperbe, w. engl. B. m. cram. u. violprpr.
— 6. Henriette Sternberg, w. hol. P. m, dklroſa.
— 7. Polyxena, g. P. ffx. mit dklfeu.
— 8. M. Seiferth, D. roſa m. aſchgr.
— 9. Koenigin Hebe, g. ſez. P. m. apfelbl.
— 10. Nannette, g. P. m chair.
— 11. Paoli, B. w m. dklcram. u aſchblau.
— 13. Iffland, g. ffx. m. aur. u. aſchgr.
— 15. Phoebus, B. w. m. carmoiſin u. aſchgrau.
— 18. Thalia, w. hol. P. m. grau.
— 19. Prinzeſs v. Neuwied, w. n. D. P. m. violet.
— 20. v. Viregg, hochg. röm. P. P. m. incarn. u. braun.
— 22. Clotilde, g. P. P. m. ſcharl. u br.
— 26. Bentant Plank, D. B. glz Kupfre mit violpuce u. ſcharl.
— 27. Elfriede, g. P. m. ſcharl. rar. illum,
— 28. Feldmarſchallin, g. röm P. m. br.
— 30 Dorette, P.P. blaßg. m. roſa u aſchgr.
— 31. Blandine, w. röm P. m feu.
— 32 Hector, g. P. m. feu.
— 34. Wieland, g. hol. P.P. m. prpr. u. br.
— 35. Seltow, D. aſchgr. m feurigprpr.
— 36. Koenig Jerome, B. rußgr. m. hell u. dklbr.
— 37. Demetrius, g. h. P.P. m. gr. u. aur.
— 38. Herold, w. hol. P. m blaßviolet.
— 39. Aurora, g. ffx. m. feu u. aſchgr.
— 41. Parthenope, blaßg. B. P m. dklprpr.
— 43. Gräfin Schulenburg, g. röm. P.P. m. feu u. br.
— 44 Schoene von Soest, D. w. m. roſa.
— 46. Bath Schwabe, ffx. hochg. m. ponceau.
— 47. Marone B., P. ffx. cham. m. rothbr.
— 48. Saleſca, D.D. ſilbergr. m. incarn.
— 50. Senne, w röm. P. m. ponceau.
— 52. Fürst Wrede, D. D. blaugr. [illegible] feur.prpr.
— 53. Frau v. Otto, B. w. m. [illegible] u. br.
— 54. Nanni, g. P m. viol[illegible] n D. P. m. ſcharl.
— 55. Baron v. Steinb[illegible] D. ſchwarzbr m. feur purp.
— 58. Hofrath So[illegible] hol. P. m. ſchwarzbr. ſehr groß.
— 59. Lilling[illegible] ffx. cham. m. feu u. aſchbl.
— 60. N[illegible]a, g. ffx. m. dklfeu.
— 61. [illegible]jax, w. B. m. glz. aſchgr. u. Zinober.
— [illegible]. Gratioſa, B. roſa m. gr. u. violpuce.
— 68 Dr. Fothergill, engl D. blaugr. m. feur prpr.
— 70. La Belle, w. n. D. P. m. braun.
— 71. Barkley, B. w. m. ſcharl. u. braſchtkupfer.
— 72. Cammer-Rath Brandt, g. P. ffx. m. feu u. aſchblau.
— 81. Herzogin Louiſe von Weimar, w. röm. P. P. m. Kupfer u. p.
— 83. Ambroſius, D. glz. aſchgr. u. ſcharl
— 85. Charlotte v. Daſſel, w. hol. P. m. pfirſichbl.
— 86. Theſis, g. röm. P. m. dklbraun.
— 91. Gmelin, D. rothbr. m. violpuce.
— 95 Lafleur, P w. m. braſchtroſa.
— 96. Willies, g. P. ffx. m. roſa.
— 98 Graf Kalkreuth, engl. D. dklbr. m. ſammetart. prpr.
— 99. Jeannette Franke, D. glz. blaugr. m. Zinnober.
— 105. Cora, w. P. m. feu.
— 108. Grenoble, P. purpur m. w. geſtriben.
— 111. Rath Stolle, D. B. blaugr. m. Zinober prpr. u. violpuce.
— 117. Prinzeſs Maria v. Weimar, P. blaßg. m. pomp.
— 121. Friedr. Wilhelm, hochg. röm. P. m. ponc.
— 122. Gräfin Henckel, B. kupferr. m. hagelw. u. br.
— 126. Perseus, ffx. cham. m. braſchtkupfer.
— 127. Andromeda, D. dklroſa m. violprpr.
— 128. Fornarina, n. D. P. blaßgr. m. violpurpr.
— 130. Friedr. Krodel, Pantalon roſa m. w.
— 132. Herzog Erich, P. w. m. prpr.
— 134. Minka, w. D. m. hochfeu.
— 135. Heliodore, w. D. P. m. ſcharl. größte!
— 136. Joanes v. Eyck, w. engl. D. m. violet.
— 137. Crispin, ffx. lederg. m. braſchtkupfr.
— 140. Herzogin Ida, w. röm. P. m. hochroſa.
— 145. Constantia, fam. auror. m. aſchgr.
— 149. Atropos, w. D. B. m. roſa aſchgr. u. br.
— 150. Schiller II, w. engl. D. m. Zinober.
— 154 Dr Weismantel, w. D. B. m. chair. u. prpr.
— 155 Selecta, w. P. m. braſchtroſe.
— 157. W. Apollonius, hol. P. hagelw. m. br.
— 159 Geh. Hofr. Huschke, blaßg. P.P. m. prpr. u. feu.
— 160. Amalia, w. röm. P.P. m. violet u. prpr.
— 161. Gloire de Baireuth, B. blaugr. m. prpr u. ſchwarz.
— 165. Desquilpeux, g. P. m. hochroſa.
— 169. Buonarotta, P. hochg. m. incarn.
— 171. Franz Ellinger, w. D. B. m. hellponceau u. ſtahlbl.
— 172. Decime, w. P.P. m. braſchtroſa u. br.
— 173 Testrembre, flamb dklaſchgr. m. feu.
— 175. Feucendreux, flamb. aſchgr. m. feu.
— 176 Obermedic.-Rath v. Froriep, engl. D. glänz. aſchgr. m. prpr.
— 178. Carlos, ffx. blaßfeu m aſchblau.
— 179. Geh. Hofr. Starke, w. P. m. kirſchbr.
— 181. Bonaventura, B. glzaſchgr. m. feu u. br.
No. 182 R. Oswald, g hol. P.P. m br. u. aur.
— 184. Jessonda, P. ffx. hellroth m. dklbr.
— 185. Medea, w. P. m. roſa.
— 186. Annunciate, B. kupferr m. hagelw. u. ſchwarz.
— 187. Laetitia, P. g m cram
— 190. Attila, D. ſcharl m. weiß (ſelten).
— 194. Crispa, engl. D. dklbr. m. feurig prpr.
— 196. Mootz, D. hagelw. m. dklbr.
— 197. Prinz Carl v. Preuſſen, D. dklroth m. hagelw.
— 200. v. Stollberg, ffx. aur. m. aſchgr.
— 204 v. Sternau, ffx ſchwarzbr. mit feu
— 210. Mackeroth, g. P. m. cram.
— 213. Max G., D. mordoré m. ponceau glz.
— 214. Nigrette, P.P. blaßg. m. lackroth u. br.
— 220. Cornelia, D. aſchgr. m. roſa.
— 221. Hortenſia, w. fam. m. cramoiſ.
— 222. P. Nonplusultra, engl. B. kupferr. m. ſcharl. u. ſtahlbl.
— 223 Grohmann, D. glzkupferroth mit ſcharl.
— 224. Prof. Leonhardi, w B. m. ziegelr. u br.
— 227. Betty, g. P. m. dklroſa.
— 237. Euphroſine, g. P. m. lackroth.
— 238. Seraphine, D. braun m. cram,
— 239. Ludovicus, g. P.P. m. hell u dunkelbr.
— 242. Schmaling, P. ſchwefelg. m. dklcarmoiſ.
— 245. v. Knebel, g. P. m ſcharl.
— 251. Iberis, w. Rand P. m. violprpr.
— 252. Pakodes, P. g. m. pompad.
— 257. Henriette S., P. w. m. cram, rar. Blum.
— 259. Lycurg, D. B dklkupferr m. ponc. puceu. ſchw
— 260. Harmonia, P. w. m. dunkelfeu.
— 261. v. Thümmel, dklkupferf. B. m. feu u. ſchw
— 262. Venus Urania, ſchwefelg. röm. P. P. mit [illegible] u. kupferg.
— 264. M. Parthenope, w. P. m. braſchtroſa.
— 265. Spallanzani, g. B. ffx. m. aur. u. aſchgr.
— 266. Iwan, w. engl. D. m. prpr.
— 267. Rentamtm. Weber, B. aſchgr. m. ſcharl. u. violpuce
— 268. Adele, w. P.P. m. cram. u. kirſchbr.
— 269. Sophie M., g. P.P. m. cram. u. feu.
— 270. M. Thalia, B. blaßroſa m. violpuce u. feu.
— 271. Roſenberg, P. g. m. roſa.
— 275. Bellis, w. P. m. ſcharl.
— 277. Minos, w. P. m. braſchtroſa.
— 279. Pourpre aimable, w. ſp P. m. dklpurpr.
— 281. Aglaja, w. engl. D. m. ponceau.
— 283 Emilius, w. hol. P. m cram.
— 286. Helmina, B. blaßg. m. feu u. br.
— 290. Plato, P. hochg. m. violprpr.
— 292. Monstroſa, ffx. aurora m. aſchblau.
— 295. Osyris, ffx. hellroth m. dkl.puce.
— 301. Ceres, w. P. m. hellkupfer.
— 303. Palmyra, w. P. m. hochfeu.
— 308. Fürst Wrede, D. D. blaugr. m. feurigprpr.
— 311. Fr. v. Otto, B. w. m. Zinnober u. br.
— 315. Alabelle, B. glz. grau m. ſcharl. u. puce.
— 317. Lord Belgrave II. w. engl. B. m. chair, [illegible] u. prpr.
— 319. von Houwald, w. engl. D. m. prpr.
— 322. Epimenides, P. ffx. g m. braſchtprpr.
— 323. Hauptm. v. Parchwitz, P. w. m. kupferfeu.
— 325. Rolla, ffx. ledergelb m. ſcharl.
— 331. Baron v. Eschwege, D. B. glz. aſchgr. m. prpr. u. puce.
— 332. Amalia J., w. P. m. violet.
— 334. Euryanthe, hochg. P. m. ponceau,
— 336. Lord Wellington, w. B. m. Kupfer u. puce.
— 338. Freund Genast, g. P. ffx. m. roſa u. aſchbl.
— 339. Frau Capellmeiſter Hummel, D. aſchbl. m Zinnober.
— 340. Blanca, hochg. P.P. m. mordoré u. br.
— 345. Friederike Krakow, ffx. g. m. cram. u. aſchgr.
— 346. Jean Paul, D. w. m. puce.
— 352. Leibgardist, hochg. röm. P. m. ponc.
— 354. Commiss. Theuſs, hochg. P. m. feu.
— 358. Herzog. v. Meiningen, g. P.P. m. roſa u. br.
— 359. Coeleſtine K., g. hol. P. m. pomp.
— 363 Herder, B. incarn. m. violpuce u. br.
— 365. La plus aimable, w P.P. m. roſa u. aſchgr.
— 370. Eos, B. aſchgr. mit ſcharl. u. puce.
— 373. Superint. Umlauf, P. ffx. hochg. m. aur. u. aſ[illegible]r.
— 377. Landesdir. R. Ludecus, D. D. aſchgr. m. b[illegible]eu.
— 382. Capit. Canaris, D. B. glz. kupfer. m[illegible] feu, ponc. u. ſtahlbl.
— 385. Latona, fam. weiß m. roſa.
— 391. W. Cedmulli, hochg. P.P. m. br. u. [illegible]ſa.
— 395. Merope, w. P. m. dklroſa r. il.
— 403. Gen. Diebitsch, P. ffx. cham. m[illegible] hochfeu.
— 408. Dr. Starke, w. P. m. kupferroth.
— 410. Gräfin Fritsch, hochg. P.P. m. f[illegible] u. dklprpr.
— 412. Laura S., P. hagelw. m. dklr[illegible]
— 414. Prometheus, P. w. m. kupfe[illegible]
— 417. Geh. Commr. Kruse, D. gl[illegible] kupfer. m. puce.
— 420. Ludovico, B. w. m. roſa [illegible]. br.
— 424 Capellmeister Hummel, [illegible]. g. m. ceriſe.
— 425. Herzog Bernhard, ffx. lederg. m. roſa.
— 430. Rothe Krebs, g. ffx. m. Zinnober geſtr. u. getuſcht.
— 434. Julius K., g. ffx. m. ſcharl.
— 436. Probst Voeckler, w. P. m. kirſchbr.
— 441. Cendrillon, g. ffx. m. cram. u. aſchgr.
— 445. Blandina, w. P. m. [illegible]
— 453. L. v. Bethhoven, ffx. cham. m. dklprpr.
— 461. Gustav Adolph, w. engl. D. m. ponceau.
— 465. Pythia, D. blaug. m. incarn.
— 467. Apollodorus, ffx. cham u. pomp
— 474. Iphigenia, g. P.P. m. feu u. braſchtroſa.
— 476. Betty Hummel, hochg. ffx. m. feu u. aſchbl.
— 480. Eclypsus, B. kupferr. m. Zinnober u. ſcharl.
— 485. Thusnelda, B. glz. kupferroth m. ſcharl. u. weiß.
— 490. Phyllis, w. röm. P.P. m. incarn. u. br.
— 491. La belle Comtesse, D. kirſchr. m. hagelw.

12 Stück Nelken vom 1ſten Rang nach eigner Wahl . . .	2	Rthlr.	—	Gr.
12 Stück Nelken nach meiner Wahl und Vermehrung . .	1	—	12	—
12 Stück Nelken vom 2ten Rang dergl.	1	—	—	—
12 — — in 12 Sorten ohne No. und Namen . .	—	—	12	—
12 St. Nelken ſchöne gefüllte auf Rabatten	—	—	8	—

12 Stück der beliebteſten Topfpflanzen für die Zimmer paſſend in 12 Sorten	3	—	—	—

Nachricht.

Ueber meine Staudengewächſe, Roſen ꝛc. ſteht ein beſonderes Verzeichniß zu Dienſten.

Bei Pflanzen iſt nach Verhältniß für Kiſten und Emballage etwas zu vergüten, und der Betrag der Beſtellung gleich beyzufügen.

Um zeitige portofreie Einſendung der Beſtellungen und um deutliche Unterſchrift mit genauer Angabe des Wohnortes wird höflichſt gebeten.

J. Mootz

Verzeichniß für das Jahr 1834
über
- und ausländiſche Gemüſe- und Blumenſämereien, ſchönen Georginen u. ſ. w.

welche beſonders ächt für nachſtehend billige Preiſe zu haben ſind
bei

Friedrich Carl Brückner,

Kunſt- und Handelsgärtner in Arnſtadt.

Bemerkungen.

Preiſe ſind in preuß. Cour. geſetzt, den Thaler zu 24 Groſchen.
r und Gelder werden portofrei erwartet, und der Emballage eine kleine Vergütung berechnet.
igen reſp. Garten- und Blumenfreunde, mit denen ich noch nicht die Ehre hatte, in Verbindung zu ſtehen, werden gebeten, die Zahlung baar beizufügen, oder ihre gütigen Aufträge mit Rimeſſen, oder hinlänglicher Nachweiſung zu begleiten, außerdem ich es für genehmigt anſehe, den Betrag von der Poſt zu entnehmen.

	1 Loth	gr	pf
	I. Küchenkräuter.		
	Baſilikum, mittelgroßes . . ;	1	6
	Bohnenkraut, (Satureja officinalis) .	1	—
	Dill . . . . 1 Pfund 3 gr.	—	6
	Fenchel, großer Anies- . . .	1	—
	Gartenkreſſe, krausblättrige . .	1	—
	„ gewöhnliche . . .	—	6
	Kerbel	—	6
	Lavendel	1	—
	Majoran, franzöſiſcher . .	1	6
	Mangold, großblättriger Schweizer .	—	6
	Melde, großblättrige . . .	—	6
	Peterſilie, gewöhnliche Schnitt- 1 Pfd. 3 gr.	—	6
	„ krausblättrige . 1 Pfd. 7 gr.	1	—
	Pimpinell	1	—
	Portulack, grüner . . .	1	6
	„ gelber . . .	1	6
	Spinat, Engl. großblättriger . 1 Pfund	7	—
	„ ordinairer Stachelkorn . .	4	—
	Taback, baumartiger (Nicotiana fruticosa) 1 Loth	1	—
	Waizen, türkiſcher, (Zea, Mays) . .	—	—
	Weber-Tuchkarten, große franzöſiſche .	1	—
	II. Kohlſaamen.		
	Blumenkohl, großer Kapiſcher . .	7	—
	„ cypriſcher, früheſter . .	7	—
	„ engliſcher mittelfrüher .	7	—
	„ holländiſcher ſpäter . .	4	—
	Brokoli, oder Spargelkohl, weißer .	2	—
	„ „ „ violetter .	2	—
	Kraut oder Kopfkohl, Erfurter, großes weißes	1	6
	„ Stotternheimer breites Herbſt- .	1	6
	„ Erfurter, roth niedrig frühes, zum Sallat	2	—
	„ Ulmer großes ſpätes Centner- .	1	6
	Wirſing od. Borskohl, Erf. großer gelber Winter-	1	6
	„ Ulmer, beſter früher Kopf- . .	1	6
	„ ordinairer grüner Winter- .	1	—
	Kohl, Brüſſ'ler Sproſſen- oder Roſen- .	2	—
	„ franzöſiſcher, bunter Blumage- .	1	6
	„ niedriger blauer Winter-Krauskohl	—	6
	„ „ grüner „ „	—	6
	„ Schnitt- oder Frühlings-Blattkohl, krauſer	—	6
	„ „ „ „ „ Engl. grüner blumenkohlart.	—	6
	„ Blatt- od. ewiger, trägt ſehr ſelten Saamen, 1 Pr.	2	—
	Glaskohlrabi, Wiener, kleinlaub., niedr., frühe, weiße	2	—
	„ blaue frühe . . .	2	—
	„ Engl. weiße großblättrige .	1	6
45	Kohlrabi, gewöhnliche große ſpäte . . .	—	9
46	Kohlrüben, große weiße Acker- . .	—	9
47	„ gelbe . . .	1	6
	III. Wurzeln und Rüben.		
48	Carotten oder Möhren, holl.; kurze, frühe, zum Treiben, 1 Pfund 10 gr.	—	9
49	„ Hornſche, frühe lange rothe .	—	9
50	„ Frankfurter dunkelrothe lange .	1	—
51	„ Erfurter, lange, rothgelbe . .	—	6
52	„ Saalfelder blaßgelbe . .	—	4
53	Wurzeln, Rapunzel oder Schinken Sellerie	1	—
54	„ Paſtinak . . .	—	6
55	„ Peterſilie, Erfurter lange dicke .	—	9
56	„ Scorzoner- oder Schwarzwurzel ,	—	9
57	„ Sellerie, großer holländiſcher Knoll	1	6
58	„ Zuckerwurzel . . .	1	6
59	Rüben, holländiſche weiße Mai- . .	—	6
60	„ Teltower oder Märkiſche . .	1	—
61	„ weiße, lange Herbſt- oder Stoppel-	—	6
62	„ blaue Herbſt-, jede gut , .	1	—
63	„ blutrothe Salat-, (rothe Rüben)	—	6
64	Runkelrüben, lange über ſich wachſ. Guckel, 1 Pfd.	4	—
65	„ gelbe runde Zucker- , 1 Pfd.	6	—
66	„ gelbe lange „ . 1 Loth	—	6
	IV. Salat-Saamen.		
67	Salat, Steinkopf, gelber früher holl. zum Treiben auf Miſtbeete	2	6
68	„ Arabiſcher, großer gelber Kopf- .	2	6
69	„ Aſiatiſcher, großer gelber Kopf- ,	3	—
70	„ Forellen-, großer bunter , .	2	6
71	„ Schwedenkopf-, früher . .	2	—
72	„ Prinzenkopf- oder Berliner .	3	—
73	„ Mailander, gelber früher . .	2	—
74	„ Winter-, beſter . . .	2	—
75	„ mehrere Sorten untereinander .	1	6
76	„ franz. eichenblättr., ganz neuer feiner, 1 Pr.	2	—
77	„ Römiſch panaſchirt. (Romaine panachée) —	2	—
78	„ „ geſteckter (flagellée) —	2	—
79	Sommer-Endivien, Römiſcher Bindſalat 1 Loth	1	—
80	Winter-Endivien, krausblättrige . .	1	—
81	Rapünzchen, oder Feldſalat . .	—	6
	V. Zwiebel-Saamen.		
82	Zwiebeln, Erfurter, runde, blaßrothe ;	1	6
83	„ holländiſche, gelbe lange Birn .	2	—
84	Winterzwiebel, feine weiße . , .	1	—
85	Porree, Winter-, dicker Stangen . .	2	—
86	Schalotten-Zwiebel . . . 100 Stück	4	—
87	„ große Däniſche , 12 Stück	2	—
88	Perlauch oder Pickzwiebel . . 100 Stück	3	—
89	Rockenbollen . , . . 100 Stück	4	—
90	Steckzwiebeln, getrocknete, lange Birn-, 100 Stück	2	—
	VI. Radies und Rettige.		
91	Radies, holländiſche, weiße, runde Monats-	1	—
92	„ „ dunkelrothe runde Monats-	1	—
93	„ „ roſenrothe runde Monats-	1	6
94	„ lange rothe Forellen . .	1	6
95	„ „ roſenrothe . . .	1	6
96	Rettig, Erfurter langer ſchwarzer Winter-	1	—
97	„ „ runder ſchwarzer Winter-	1	—
98	„ Wiener gelber Sommer- . .	1	6
99	„ rothſchaliger Herbſt- . .	1	—
100	„ weißer langer Herbſt- . .	1	—
	VII. Kern-Sorten.		
101	Artiſchocken, große franzöſiſche . .	3	6
102	Cardi, ſpaniſche . . .	1	6
103	Gurkenkern, ganz große Aſtracaniſche, werden 1½ Fuß lang und ½ Fuß dick, 1 Pr.	2	—

No.		gr	pf
104	Gurkenkern, ganz große weiße engl. auf Beete zum Treiben, 1 Priſe	1	—
105	„ lange grüne Schlangen- 1 Loth	3	—
106	„ mittellange grüne holländiſche —	2	6
107	„ ordinaire frühe volltragende —	1	6
108	Melonenkern, Melange, in vielen Sorten, 1 Pr.	2	—
109	Ein Sortiment von 20 der beſten Sorten	12	—
110	Ein Sortiment von 12 der beſten Sorten	8	—
111	Kleine runde Tiger-Melone, . . 1 Pr.	2	—
112	Schlangen-Melonen, Cucum. anguineus 1 Pr.	2	—
113	Türkenbund-Melone . . . 1 Pr.	2	—
114	Königs-Kantalupe . . . 1 Pr.	2	—
115	Sehr vorzügliche gute grüne ſpaniſche Melone, hält ſich ſehr lange. 1 Pr.	3	—
116	Melone, kleine frühzeitige . . .	1	6
117	„ ganz frühe Trauben . .	1	6
118	Kürbis, allergrößter geſtickter Rieſen-, Cucurbita Melopepo, 6 Körner	1	—
119	„ Wachsfleiſch-, Cucurb. ceratocreas —	1	—
120	„ Paraſol- oder Schirm-Kürbis, 3 Korn.	1	6
121	„ Türkenbundähnlicher . . 6 Korn.	1	—
122	„ Kronenkürbis . . . 4 Korn.	1	—
123	„ Birn-, großer mit Warzen 4 Korn.	1	—
124	„ Apfelſinen- . . . . 12 Korn.	1	—
125	„ Stachelbeer- (Cucurb. groſſularia) 1 Priſe	1	—
126	Spargelkern, Darmſtädter weiße . 1 Loth	—	6
	VIII. Erbſen-Sorten.		
127	Zucker-Erbſen, engl., frühe, weißblüh. 1 Pfund	4	—
128	„ große weiße Schwert .	5	—
129	„ große blaublühende . ,	4	—
130	„ franzöſiſche niedrige Zwerg- ,	6	—
131	Kneifel- oder Pahlerbſen, frühe nieder, Mai- ,	3	—
132	„ allerfr., werden 14 Tage früher ,	5	—
133	„ frühe Klunker . . . ,	2	—
134	Spargelerbſen, die jungen Schoten als Salat zubereitet, 1 Loth	—	6
	IX. Bohnen-Sorten.		
135	Stangenbohnen, Arabiſche große od. Feuer- 1 Pfd.	5	—
136	„ weiße, lange, breite Schwert- ,	6	—
137	„ bunte „ „ „ ,	5	—
138	„ bunte fleiſchige Spargel- od. Eier- ,	6	—
139	„ weiße Capiſche . . . ,	6	—
140	Buſchbohnen, früheſte ſchwarze, Amerikaniſche ,	4	—
141	„ weiße Schwert- . . . ,	4	—
142	„ „ frühe holl. Schwert-, z. Treiben ,	6	—
143	„ bunte Dattel- . . . ,	6	—
144	„ blaßgelbe neue franzöſiſche . ,	6	—
145	Puffbohnen, große weiße Windſor- ,	2	—
	X. Blumen-Saamen.		
	1) Sommergewächſe oder einjährige.	1	—
146	Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen, à Pr.	1	—
147	„ autumnalis, Herbſt- „ .	1	6
148	Ageratum mexican., blaublühender hübſcher Agrat .	1	—
149	Agrostemma coeli rosa, glattblättrige Rade .	1	—
150	Amaranthus cruentus, dunkelrother Amarant ,	1	—
151	„ hypochondriacus, trauriger Amar. .	1	—
152	„ speciosus, prächtiger Amarant .	1	6
153	Anoda dilleniana, blaue Anode, ſchön .	1	6
154	Anthemis arabica, arabiſche Kamille .	1	—
155	„ buphthalmoides, einrängige Kamille .	1	—
156	Antirrhinum triphyllum, dreiblättr. Löwenmaul	1	—
157	„ versicolor, buntes „	2	—
158	Argemone ochroleuca, ockerfarb. Stachelmohn, neu	1	—
159	Arctotis calendulacea, ringelblumenbl. Bärenohr	6	—
160	Aster chinensis fl. pl., Gartenaſter in 12 Farb. 1 Lth.		
161	Acht gefüllte Feder- od. Röhrenaſtern, in folg. S.: No. 1. Dunkelroth. 2. Dunkelroth mit Weiß. 3. Fleiſchfarbe, frühe. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelblau mit Weiß. 6. Blaßroth. 7. Blaßroth mit Weiß. 8. Blaßblau. 9. Gelbweiß. 10. Silberweiß. 11. Fleiſchfarbe. 12. Blaßrothe Band-. 13. Dunkelrothe Band-. 14. Dunkelblaue Band-. 15. Hellblaue Band. 16. Dunkelcarmoiſinroth.	1	6
	Jede Sorte einzeln à Priſe 100 Körner ,	13	—
162	Das ganze Sortim. benannter 16 S. in 16 Pr. à 100 K	10	—
163	„ „ „ „ „ „ „ „ à 50 K.	5	—
164	„ „ „ gemiſcht von circa 400 Korn	1	—
165	Aster tenellus, zarte hellblaue Aſter, 1 Priſe	1	6
166	Athanasia annua, jährige Athanaſie . .	1	—
167	Blitum capitatum, kopfförmiger Erdbeerſpinat	1	—
168	„ virgatum, ruthenförmiger „	1	—
169	Briza maxima, größtes Zittergras 1 Loth 1 gr.	1	6
170	Browallia elata fl. albo, weiße Browallie .	1	6
171	„ „ „ coeruleo, blaue Browallie	1	6
172	„ demissa, darniederliegende Browallie	1	—
173	Cacalia sonchifol., ſcharlachrothe Cacalie .	1	—
174	Calandrinia adscendens, purpurrothe Calandrinie	1	—
175	Calendula pluvialis, regenanzeigende Ringelbl.	—	6
176	„ officinalis, gefüllte ranunkelartige	1	—
177	Calliopsis bicolor, zfarb. Schöngeſicht, 1 Loth 9 gr.	1	—
178	Campanula speculum, Venusſpiegel, 1 Loth 6 gr.	1	—
179	Capsicum annuum, ſpaniſcher Pfeffer, 4 Sorten		
180	Centaurea cyanus, Gartenkornblume in vielen	1	—
	Farben, 1 Loth 4 gr.	1	—
181	„ moschata fl. albo, weiße Biſamflockenbl.	1	—
182	„ „ „ coeruleo, blaue dergl.	1	—
183	„ suaveolens, wohlriechende . .	1	—
184	Centranthus calcitrapa, Valeriane . .	1	—
185	Cerinthe major, große Wachsblume . .		
186	Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoye in vielen Farben, 1 Loth	12	—
	Ferner in folgenden vorzüglichen Sorten, die ſehr ſtark ins Gefüllte ſchlagen, und empfohlen zu werden verdienen:		
	I. Deutſche.		
187	No. 1. Weiß. 2. Fleiſchfarbe. 3. Roſa. 4. Apfelblüthe. 5. Blaßziegelroth. 6. Ziegelroth. 7. Carminroth. 8. Carmoiſinroth. 9. Dunkelcarmoiſinroth. 10. Kupferroth. 11. Lederfarben. 12. Zimmtbraun. 13. Mordorébraun. 14. Rothgrau. 15. Mohngrau. 16. Aſchgrau. 17. Blaßbraun. 18. Dunkelſchwarzbraun. 19. Aſchroſa. 20. Blaßblau. 21. Violett.		
	1 Priſe von 100 Korn .	1	6
	1 Priſe von 400 Korn gemiſcht	4	—
	II. Engliſche mit dem Lackblatt.		
188	No. 22. Roſa. 23. Fleiſchfarbe. 24. Weiß.		

No.	Preiſe	gr	pf
	25. Blaßbraun. 26. Ziegelroth. 27. Carminroth. 28. Mohnblau. 29. Aſchgrau. 30. Dunkelgrau. 31. Violett. 32. Rothbraun. 33. Schwarzbraun.		
	1 Priſe von 100 Korn	1	6
	1 Priſe von 400 Korn gemiſcht	4	—

III. Halbengliſche.

No.	Preiſe	gr	pf
189	No. 34. Dunkelblau. 35. Weiß. 36. Pfirſichblüthe. 37. Blaßroth. 38. Carminroth. 39. Blaßblau. 40. Kupferroth. 41. Blaßbraun. 42. Zimmtbraun. 43. Hochaſchgrau. 44. Dunkelgrau. 45. Dunkelſchwarzbraun. 46. Schwarzbraun. 47. Aſchroſa. 48. Fleiſchfarbe.		
	1 Priſe von 100 Korn	1	6
	1 Priſe von 400 Korn gemiſcht	4	—

IV. Herbſt- oder Baſtard-Levkoyen.

No.	Preiſe	gr	pf
190	No. 49. Carminroth, engl. 50. Dunkelbraun, halbengl. 51. Veilchenblau, engl. 52. Kaſtanienbraun, Lackblatt, engl. 53. Fleiſchfarbe, halbengl. 54. Lila, Lackbl., halbengl. 55. Carminroth, Lackbl., engl. 56. Weiß, engl. 57. Weiß, Lackbl., halbengl. 58. Ziegelroth, engl. 59. Rothbraun, engl. 60. Schwarzbraun, Lackblatt, engl.		
	1 Priſe von 100 Korn	1	6
	1 Priſe von 400 Korn gemiſcht	4	—
	Von dieſen genannten 60 Sorten Sommer- und Herbſt-Levkoyen ſind folgende Sortimente zu haben:		
191	Ein Sortiment v. 12 guten Sorten, à 100 K.	12	—
192	Ein Sortiment v. 24 guten Sorten, à 100 K. 1 ℛ	—	—
193	Ein Sortiment v. 40 guten Sorten, à 100 K. 1 ℛ	12	—
194	Ein Sortiment v. 50 guten Sorten, à 100 K. 2 ℛ	—	—
195	Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen in folgenden ſehr gut ins Gefüllte gehenden Sorten: A. Weiß mit Lackblatt. B. Dunkelblau. C. Carminroth, Lackblatt. D. Rothbraun. E. Hochroſa. F. Pfirſichblüthe. G. Carmoiſinroth, Lackblatt. H. Weiß. I. Dunkelcarmoiſinroth. K. Carmoiſin. L. Carminroth. M. Kupferroth.		
	1 Priſe von 100 Korn	1	—
	1 „ von 400 Korn gemiſcht	3	—
	Das ganze Sortiment von 12 Sorten	10	—
196	Cheiranthus cheiri fl. pl., gefüllter brauner Goldlack, 100 Korn	1	—
197	„ „ „ „ einfacher dunkelbrauner Stangenlack 100 K.	2	—
198	„ „ violetter einfacher, 100 K.	1	—
199	„ „ maritim., Meerlevk., rothe, 1 Pr.	1	—
200	„ „ „ „ weiße	1	—
201	Chrysanthemum carinatum, breitſ. Goldwucherbl.	1	6
202	„ „ elegans, neue, 1 Pr.	2	—
203	„ coronarium fl. pl. albo, gef. weiße	1	—
204	„ „ „ luteo, „ gelbe	1	—
205	Clarkia pulchella, ſchöne rothe Clarkie, Prachtbl.	2	—
206	„ „ fl. albo, weißblühende, neu	4	—
207	Collomia grandifl., großblumige Collomie, ſchön	2	6
208	„ linearis, ſchmalblättrige	1	6
209	„ pinnatifida, gefiederte	2	6
210	Collinsia grandifl., niedliche blaue Collinſie	1	6
211	Convolvulus tricolor, dreifarbige Winde	1	—
212	Corydalis aurea, goldfarbiger Erdrauch	1	—
213	Cosmea bipinnat., doppeltgefiederte Cosmea	1	6
214	Cotula aurea, goldgelbe Cotula, ſehr hübſch zu Einfaſſungen, 1 Loth 12 gr	1	—
215	Crepis rubra, rother Pippau	1	—
216	„ fl. albo, weißer dergl.	1	—
217	„ dioscorides, dioscoriſcher	1	—
218	Cynoglossum linifol., weiß Vergißmeinnicht 1 Pr.	2	—
219	Datura Metel, weißblüh. Stechapfel, ſchön. 1 Pr.	1	—
220	Delphinium humile fl. pl., niedriger gefüllter Ritterſporn, 1 Loth	6	—
221	Dracocephalum Moldavicum, türkiſche Meliſſe	1	—
222	Echium creticum, braunrother Natterkopf, hübſch	1	6
223	„ grandiflorum, großblumiger Natterkopf	1	—
224	Elychrisum lucidum, glänzende Strohblume	1	—
225	„ „ fl. albo (bracteatum), mit weißen Blumen, neu und ſchön, 1 Pr.	3	—
226	Erodium ciconium, Kranichſchnabel	1	6
227	Euphorbia litterata, rothfleckige Wolfsmilch	1	6
228	„ lathyris, kreuzblättrige dergl.	1	—
229	Galinsoga trilobata, dreilappige Galinſoga	1	6
230	Gilia capitata, kopfförmige Gilie, ſchön	1	6
231	Grahamia aromatica, gewürzh. Grahamie, angen.	1	6
232	Hebenstreitia tenuifol., feinblättr. Hebenſtreitie	1	6
233	Hedysarum capitatum, kopfförmiger Süßklee	1	6
234	Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenbl.	1	—
235	„ maximus, größte dergleichen	1	—
236	„ nanus, niedrige Zwerg-	1	—
237	Hibiscus trionum, Stunden-Hibiskus	1	—
238	„ vesicarius, Blaſen-Hibiskus	1	—
239	Iberis amara, weiße Schleifenblume 1 Loth	3	—
240	„ umbellata, doldenblüthige Schleifenbl.	4	—
241	„ pinnata odorata, gefiederte wohlriech. 1 Pr.	1	—
242	Impatiens Balsamina fl. div., gef. Balſaminen, 1 L.	16	—
243	„ und von nachſtehenden 14 Sorten, à 100 Korn	2	6
244	No. 1. Weiß. 2. Roth. 3. Kupferfarbe. 4. Fleiſchfarbe. 5. Aſchroſa. 6. Blaßlilla. 7. Scharlachroth. 8. Carmoiſin mit Weiß. 9. Blau und Weiß. 10. Scharlach und Weiß. 11. Dunkellilla. 12. Blauroth und Weiß. 13. Weiß mit Kupfer. 14. Pfirſichblüthe.		
245	Das ganze Sortiment von 14 Sort. à Pr. 50 Korn	25	—
246	Das ganze Sortiment von 14 Sort. „ 25 „	15	—
247	Das ganze Sortiment von 12 Korn.	8	—
248	Neue ſcharlachrothe Zwerg-Balſamine 1 Priſe	3	—
249	Ipomea purpur. fl. div., Trichterwinden, 1 Loth 4 gr. 1 Priſe	1	—
250	„ triloba, dreilappige Trichterwinden	1	6
251	Kaulfussia amelloides, ſchöne blaue Kaulfuſſie	1	6
252	Ketmia vesicaria, großblättrige Blaſen-Ketmie	2	—
253	Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke, 1 Loth	1	—
254	„ striatus, geſtreifte neue 1 Priſe	1	6
255	„ tingitanus, tangieriſche	1	—
256	Lavatera trimestris fl. albo, weiße Sommerpappel	1	—
257	„ „ „ rubro, rothe dergl.	1	—
258	Leonurus nepalensis, nepalſche Mutterwurz	1	—
259	Lopezia mexicana, mexikaniſche Lopezie	1	—
260	Lupinus albus, weiße Lupine	1	—
261	„ angustifol. coerul., ſchmalbl. blaue, 1 Pr.	1	—
262	„ „ lutea, ſchmalblättr. gelbe	1	—
263	„ pilosus, behaarte große	1	—
264	Madia elegans, ſchöne Madie, ganz neu, aus N.-W.-Amerika	3	—
265	Malope trifida, dreitheilige Malope, ſchön	1	—
266	„ grandifl., großblühende ſchöne, neu	4	—
267	Malva mauritiana, weiß und rothe mauritaniſche Malve	1	—
268	„ „ fl. var., bunte dergleichen	1	6
269	Manulea violacea, violette Manulee	1	6
270	Mirabilis jalappa, gem. Jalappe, in 7 Farb. 1 L. 3 gr	1	—
271	„ longiflor., langbl. wohlriech. 1 Loth 3 gr	1	—
272	Moluccella laevis, glatter Trichterkelch	1	—
273	Nicotiana acuminata, zugeſpitzte Tabackblume	1	—
274	„ nyctaginiflor., nächtlich blühende	1	—
275	„ undulat., wellenförmige	1	—
276	„ vincaefl., weißblühende	1	—
277	„ virginiana, virginiſche grünblühende	1	—
278	„ quadrivalvis, vierklappige	1	—
279	Nigella damascena, Schwarzkümmel (Braut im Grünen)	1	—
280	„ hispanica, desgl. mit großen dunk. Blättern	1	6

No.	Preiſe	gr	pf
281	Nonnea rosea, roſenrothe Nonnea	1	
282	Oenothera amoena, angenehme Nachtkerze	1	
283	„ capensis, capiſche	1	
284	„ Lindleyana, Lindley's	1	
285	„ grandifl., großblumige	1	
286	„ longiflor., langblühende	1	
287	„ odorat., wohlriechende	1	
288	„ purpur., purpurrothe	1	
289	„ rosea, roſenrothe	1	
290	„ spectabilis, prächtige	1	
291	„ taraxacifol., gezähntbl., große prächtige, neu	2	
292	„ undulata, wellenförmige	1	
293	„ villosa, rauhe	1	
294	Papaver rhoeas fl. pl., gef. Ranunkelmohn 1 L. 4 gr	1	
295	„ somniferum fl. pl., gefüllter großer Gartenmohn 1 Loth 3 gr	1	
296	„ striatum, geſtreifter Picottmohn 1 L. 4 gr	1	
297	„ plenissimum, allerdickſter gef. 1 „ 4 „	1	
298	Pisum zeylanicum, zeylaniſche Blatterbſe	1	
299	Pleatocephalus americana, großblühende amerikaniſche Flockenblume, ſchöne	1	
300	Polygonum orientale, morgenländiſcher Knöterich	1	
301	Reseda odorata, wohlriechende Reſeda 1 Loth	1	
302	„ alba, weiße Reſede . . 1 Priſe	1	
303	„ luteola, gelbliche Reſeda	1	
304	Ricinus communis, gemeiner Wunderbaum	1	
305	Rudbeckia alata, geflügelte Rudbeckie, ſchön	1	
306	„ amplexicaul., ſtengelumfaſſende, ſchön	1	
307	Salpiglossis atropurpur., ſchwarzpurpurne Salpigloſſe 1 Pr.	1	
308	„ „ speciosa, prächtige	1	
309	„ Barkleyana, Barkley's	1	
310	„ „ albiflor., Barkl. weißbl.	1	
311	„ „ lilacina, „ lilafarb.	1	
312	„ „ specios., „ prächtige	1	
313	„ intermedia, mittelartige	1	
314	„ „ variegat., mittelart. bunte	1	
315	„ picta, bemalte	1	
316	„ straminea, ſtrohfarbige	1	
317	Das ganze Sortiment von vorſtehenden 10 Sorten koſtet nur 1 ℛ		
	Dieſe Salpigloſſen ſind wahre Prachtpflanzen aus Chili, und ſowohl für den Garten als auch für Töpfe geeignet.		
318	Salvia horminum, blauhaariger Salbei	1	
319	„ „ rothhaariger Salbei	1	
320	„ prismatica, prismaförmiger Salbei	1	
321	Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie	1	
322	Scabiosa atropurpur., ſchwarzrothe Scabioſe	1	
323	„ „ major, große ſehr ſchöne in 8 Sort.	1	
324	„ stellata, ſternförmige Scabioſe	1	
325	Schizanthus pinnatus, gefied. Schizanthe, ſchön	1	
326	Senecio elegans, fl. pl. albo, weißgef. Kreuzkraut	1	
327	„ „ „ „ rubro, rothgefülltes	1	
328	Silene armeria, Gartenſilene	1	
329	„ pendula, ſchöne Beutelſilene 1 Loth 4 gr	1	
330	„ quinquevulnera, fünffleckige	1	
331	Solanum lycopersic., rothe u. gelbe Liebesapfel	1	
332	Spilanthus oleraceus, krautartige Fleckblume	1	
333	Sycios angulata, eckige Haargurke z. Bekleid. d. Lauben	1	
334	Tagetes erecta maj., große gef. orangenf. Sammtbl.	1	
335	„ „ „ sulphurea, ſchwefelgelbe	1	
336	„ minima, kleinſte	1	
337	„ patula fl. pl., ausgebreitete gefüllte	1	
338	„ „ ranunculoides, ranunkelart. ſchön	1	
339	Tolpis barbata, bärtiger Pippau	1	—
340	Trifolium incarnatum, ſchönrother Klee	1	—
341	Tropaeolum majus, große indian. Kreſſe 1 L. 2 gr	1	—
342	„ minus, kleine dergl.	1	—
343	Vicia faba fl. rubro, rothblüh. Puffbohne 1 Loth	1	—
344	Viola tricolor grandifl., großbl. Stiefmütterchen	1	—
345	„ „ nigrum cum luteum, ſchwarzblau m. gelb	1	—
346	Verbena aubletia, ſchönſtes Eiſenkraut	1	6
347	Xeranthem. annuum fl. pl. alb., weißgef. Papierbl.	1	6
348	„ „ „ „ coeruleo, blaugefüllte	1	6
349	Zinnia aurea, goldgelbe Zinnie	1	—
350	„ discolor, entfärbte Zinnie, neu	2	—
351	„ elegans, ſchöne	2	—
352	„ „ fl. coccineo, ſchöne ſcharlachrothe Zinnie, ein höchſt prachtvolles Sommergewächs auch für Töpfe	4	—
353	„ grandifl., großblumige	1	—
354	„ multifl. rubra, rothe	1	—
355	„ „ lutea, gelbe	1	—
356	„ tenuiflor., ſchmalblüthige	1	—
357	„ verticillat., quirlförmige	1	6
	Ein Sortiment ſchönblühender Sommergewächſe:		
358	Von 100 Sorten 2 ℛ	—	—
359	Von 50 Sorten 1 ℛ	—	—
360	Von 25 Sorten	20	—
361	Von 12 Sorten	6	—

2. Perennirende Blumen-Saamen oder ſolche die im freien Lande ausdauern.

No.	Preiſe	gr	pf
362	Agrostema coronaria, gekrönte Rade (Vexirnelke)	1	—
363	Allium odorum, wohlriechender Lauch	1	—
364	„ atroviolaceum, dunkelvioletter Lauch	1	—
365	Althea rosea, fl. pl. div., gefüllte Wintermalven in vielen Sorten 1 Loth	4	—
	Ferner in folgenden überaus ſchön gefüllten Sorten:		
366	No. 1. Weiß. 2. Schwefelgelb. 3. Carmoiſin. 4. Pfirſichblüthe. 5. Dunkellilla. 6. Wiener Goldlack. 7. Aſchgrau. 8. Zinnober. 9. Hochroſa. 10. Kirſchroth. 11. Schwarz. 12. Braunroth. 13. Fleiſchfarbe. 14. Dunkellilla mit rothen Streifen. 15. Goldlack mit dunkelorangefarbigem Kelch. 16. Mohnblau. 17. Roth und Weiß geſtreift. 18. Schwarzbraun. 19. Hohe italieniſche, 20. Niedrige italieniſche Topf-.		
367	Das ganze Sort. v. 20 S. in 20 Priſen 16 gr, 1 Pr.	1	—
368	Ammobium alatum, geflüg. Ammobie, neue Immortelle, ſchön	2	—
369	Anthericum liliastrum, unächte Zaunblume	1	—
370	Antirrhinum majus, großes Löwenmaul	1	—
371	„ flellora, „ „	1	—
372	„ bicolor, zweifarbiges	2	—
373	Aquilegia canadensis, canadiſcher Akley, ſchön	2	—
374	„ vulgaris fl. pl., gefüllter in vielen Farb.	1	—
375	„ „ fl. albo, weißblühender, ſchön	1	—
376	„ striata, geſtreifter, ſehr ſchön	1	—
377	Astrantia major, große Aſtrantie	1	—
378	Astragalus galegiformis, geisrautenartige Canarienvogelſtaude	1	—
379	Beta aurea brasiliensis, ſchöner Mangold mit goldgelbem Blattſtiel 1 Loth	1	—
380	„ coccinea, dgl. mit ſcharlachr. Blattſt. 6 gr	1	—
381	„ carmoisina, „ karmoiſine. „	1	—
382	Campanula lactiflor., milchweiße Glockenblume	1	
383	„ medium, Mariaglockenblume, weiß, lilla und blau, 1 Loth 8 gr	1	—
384	„ „ fl. pl. coerul., blaugefüllte	1	
385	„ „ „ „ lillacea, lillagefüllte	1	
386	Chelone barbata, bärtige Chelone	1	
387	Clematis maritima, Meeresſtrand-Waldrebe	1	—
388	Delphinium elatum, hoher Ritterſporn	1	—
389	„ grandiflorum, großblumiger	2	—
390	Dianthus barbatus fl. div., Bartnelken in vielen Farben, 1 Loth	4	—
391	„ „ fl. pleno, gefüllte, 1 Priſe	1	—
392	„ caryophyllus fl. pl., extra ſchöne gefüllte Topfnelken, 100 Korn	16	—

No.		Priſe	gr	pf
393	Dianthus caryophyllus fl. pl., extra ſchöne Land-nelken	100 Korn	1	—
394	" chinensis fl. pl., extra gef. Chineſernelk.	1 P.	1	6
395	" plumarius, gef. Federnelken	1 Loth 4 K.	1	—
396	Dictamnus fraxinell. fl. albo, weißer Diptam	12 K.	1	6
397	" " rubro, rother	1 L. 4	1	—
398	Digitalis ambigua, zweifelhafter Fingerhut		1	—
399	" [illegible], niedrige		1	—
400	" purpur., rother		1	—
401	" fl. albo, weißer		1	—
402	Dracocephalum peregrinum, Drachenkopf		1	—
403	" Ruyſchiana, ſchwediſcher		1	—
404	" ſibiricum, ſibiriſcher		1	—
405	" virginianum, virginiſcher		1	—
406	Eryngium planum, Mannstreu		1	—
407	Eſchſcholzia californica, Eſchſcholzie, neue a. Californ.		2	—
408	Galega officinalis, weiß u. blaue Geißraute	1 L. 4 K.	1	—
409	" orientalis, morgenländiſche		1	6
410	" perſica, perſiſche		1	6
411	Georgina variabilis fl. pl., veränd. Georgine v. den vorzüglichſten Blumen geſammelt, 1. Rang	100 K.	4	—
412	[illegible] . 2ter	100 K.	2	—
413	Glycyrrhiza echinata, ſtachliches Süßholz	1 Priſe	1	—
414	Geum coccineum, ſcharlachrothe Geum		3	—
415	Gypſophila dubia, zweifelhaftes Gypskraut		1	—
416	" paniculata, riſpenartiges		1	—
417	Hedyſarum canadenſe, kanadiſcher Hahnenkopf		1	—
418	" coronarium fl. albo, weiße Kronenklee		1	—
419	" " rubro, rother		1	—
420	Helleborus niger, ſchwarze Nieswurz		1	—
421	Hemerocallis japonic., japan. Taglilie, ſchön		1	—
422	Heſperis triſtis, graue Nachtviole		1	—
423	Hieracium aurantiacum, pomeranzenf. Habichtskr.		1	—
424	Iris florentina, florentiniſche Schwertel		1	—
425	" graminea, grasblätterige		1	—
426	Lathyrus latifol., breitblätterige Bouquet-Wicke		1	—
427	Linaria alpina, Alpen-Frauenflachs		1	—
428	" repens, kriechender		1	—
429	Linum grandiflorum, großblühender Staudenlein		1	6
430	" narbonenſe		1	—
431	" perenne, ausdauernder		1	—
432	Lunaria rediviva, ausdauernde Mondviole		1	—
433	Lupinus variegatus, bunte Lupine		1	6
434	Lychnis carnea, fleiſchfarbige Lychnis		1	—
435	" chalcedonica, ſcharlachrothe Lychnis		1	—
436	" fulgens, feurigſte, ſchön		1	6
437	Malva moſchata, Biſam-Malve		1	—
438	Matricaria Parthenium fl. pl., gef. Mutterkraut		1	—
439	Mimulus guttatus, gefleckte Affenblumen		1	6
440	" littoralis, (rivularis) Bachaffenblume neu und ſchön		2	—
441	" luteus, gelbe Affenblume		1	6
442	" moſchatus, moſchusriechende		2	—
443	" parviflorus, kleinblüthige		1	6
444	" punctatus, gefleckte		1	6
445	" quinquevulnerus, fünffleck neue ſehr ſchöne		3	—
446	" ſpecioſus, prächtige		2	—
447	" variegatus, geſcheckte, ebenf. neu u. ſchön		3	—
448	Paeonia albiflor., weißblühende Pfingſtroſe		2	—
449	" anomala, unregelmäßige		2	—
450	" arietina, [illegible]		2	—
451	" humilis, niedrige		2	—
452	" pallida, blaſſe		2	—
453	" peregrina, fremde		2	—
454	Papaver bracteatum, großbl. deckblätteriger Mohn		2	—
455	" laevigatum, glatter		1	6
456	" orientale, morgenländiſcher		1	—
457	" nudicaule, nacktſtengeliger		1	6
458	Phytolacca decandra, Kermesbeere		1	—
459	Phlomis tuberoſa, knollige Phlomis		1	—
460	Podalyria auſtralis, neuholländiſche Podalyrie		2	—
461	Potentilla atroſanguin., dunkelblutrothes Fingerkr.		2	—
462	" erecta, aufrechtes Fingerkraut		1	—
463	" formoſa, ſchönes		2	—
464	Primula auricula, Aurikel in vielen ſchönen Farben		2	—
465	" cortuſoides, herzförmige Primel		2	—
466	" veris, engl. Frühl.-Primel in ſehr ſchönen Farben		1	6
467	Pupthalmum cordifolium, herzbl. Rindsauge		1	—
468	Rheum Rhaponticum, ächte Rhabarber		1	—
469	Rudbeckia hirta, rauhe Rudbeckie		1	—
470	" laciniata, ſchlitzbl. dergl.		1	6
471	Scabioſa auſtralis, ſüdliche Scabioſe		1	—
472	Statice latifol., breitblättrige Grasnelke		1	6
473	" ſpecioſa, prächtige Grasnelke		1	6
474	[illegible] variatum, geſcheckte [illegible]		1	—
475	Teucrium ſcorodonium, Gamander		1	—
476	Valeriana fl. alba, weißblühender Baldrian		1	6
477	" " incarnat., incarnatrother Baldrian		1	—
478	" " rubro, rother Baldrian		1	—
479	Verbaſcum Blattaria, veränderliche Königskerze		1	6
480	" phoeniceum, violette ſchöne		1	—
481	Veronica caneſcens, weißbl. Ehrenpreis		1	—
482	" crenulata, gekerbter dergl.		1	—
483	" fruticuloſa, buſchiger		1	—
484	" glabra, glatter		1	—
	Ein Sortim. ausdauernder Staudengewächsſaamen		4	—
485	von 50 Sorten		10	—
486	von 25 Sorten		6	—
487	von 12 Sorten			

8. Topf-Gewächs-Blumen-Saamen.

Die mit * bezeichneten ſind einjährige, R rankende, ** ſtrauch- oder baumartige, *** Stauden, W Warmhauspflanzen und K Glashauspflanzen.

No.		Priſe	gr	pf
488	**K Acacia alat., geflügelte Acacie	3 Korn	2	—
489	" " armata, bewaffnete Acacie	2 Korn	2	—
490	" " decipiens, falſche Acacie	3 Korn	3	—
491	" " floribunda, vielblüthige	3 Korn	3	—
492	" " Lophanta ſpecioſ., büſchelblüthige neuholländiſche	2 Korn	3	—
493	" " portoricenſis, portoricoiſche	3 Korn	3	—
494	" " proſtrata, ſchnabelförmige	2 Korn	3	—
495	" " verticillata, wirtelblätteriger	4 Korn	2	—
496	*W Aeſchynomene ſesban, ägypt. [illegible]		1	6
497	***K Agapanthus umbellat., doldenbl. Schmucklilie		1	6
498	*W Amaranthus bicolor, zweifarb. Amaranth		1	6
499	" " tricolor, dreifarbiger		1	6
500	* Amphicarpis intermedia, blaue Kragenblume, ſüdliche Topfpfl. aus Braſilien.	1 Priſe	2	—
501	**K Amyris polygama, vielehr. Balſambaum aus Chili		2	—
502	**W Ardiſia crenulata, korallen Spitzblume	3 K.	2	—
503	RW Aſclepias carnoſa, fleiſchfarb. Seidenpfl.	1 P.	1	—
504	**W " curaſſavica, curaſſaviſche Seidenpfl.		1	—
505	" " nivea, ſchneeweiße Seidenpflanze		2	—
506	**K Azalea pontica, pontiſcher Felſenſtrauch		3	—
507	" Banksia rubioides		1	
508	*W Begonia hirtella, rauhes Schiefblatt		1	
509	" " ſpathulacea	1 Korn	2	—
510	**W Billardiera purpur., purpurrothe	2 Korn	4	—
511	" Boronia [illegible]		1	6
512	*W Brownea grandis, große [illegible]			
513	***W Cactus mamill., Melonendiſtel mit rothen Stacheln		2	—
514	" " ſtellatus, ſternförm. m. weiß. Stach.		2	—
515	" Canna indica, indianiſches Blumenrohr	4 K.	1	—
516	" " limbata, geſäumtes dergl.	3 "	2	—
517	" " lutea, gelbes Blumenrohr	3 "	2	—
518	" " mexicana, mexikaniſches	3 "	2	—
519	" " rubricaulis, rothſtengliges	3 "	1	—
520	" " ſpecioſ., prächtiges	6 "	2	—
521	**K Calceolaria Alexandrina, Alexandria-Pantoffelblume	1 Priſe	4	—
522	" " integrifol., ganzblättrige		2	—
523	* " pinnata, gefiederte		1	6
524	**K " [illegible] aurantiaca, groß [illegible]		4	—
525	" " " purpur., groß rothbraune		4	—
526	" " ſanguinea, blutrothe		4	—
527	" " Taylori, [illegible]		6	—
528	" " tricolor, dreifarbige		4	—
529	RK Calampelis ſcabra, Gelbrothe, eine prächtige Rankpflanze aus Chili	à	3	—
530	**K Calliſtachys lanceolata, lanzettbl. Schönähre		3	—
531	" Callicoma ſerratifol., ſägenblättr. C[illegible]		3	—
532	* Calandrinia ſpecioſa, prächtige Cal[illegible]		2	—
533	**K Campanula pyramidalis, pyramidenförmige Glockenblume		2	—
534	*W Capſicum ceraſiforme, kirſchenf. ſpan. Pfeffer		1	6
535	" " fructu luteo, gelbe dergl.		2	—
536	" " nigrum, ſchwarzer Beißbeere		2	—
537	***K Celſia arcturus, rauhe Celſie		1	6
538	* Celoſia argentea, ſilberähriger Hahnenkamm		1	—
539	*W " [illegible], gekämmter Hahnenkamm		1	—
540	" " criſtata, extra engl. melirt	1 Loth 18 K.	1	6

oder in folgenden ſeparaten Sorten:
1. Amarantroth. 2. Zinnoberroth. 3. Dunkelorange. 4. Dunkel carmoiſin 5. Dunkelroth mit Silberrand. 6. Strohgelb. 7. Verſilbert Roſa. 8. Goldgelb. 9. Hellcarmoiſin roth. 10. Violett. 11. Braunroth. 12. Panaſchirt mit rothem Streif. 13. Fahlroth. 14. Päonienroth. 15. Feuerfarbe mit Silberſchatten. 16. Purpur.

No.		Priſe	gr	pf
541	Dieſes ganze Sortiment von 16 Sorten		12	—
542	* Celoſia pyramidalis, pyramidenförmiger Hahnenkamm, ſehr ſchön		2	—
543	***W Cleome uniglandulosa, [illegible] ſchöne [illegible] Cleome		2	—
544	**K Cobaea ſcandens, rankende Cobaea	2 K.	2	—
545	* Coix lacryma, Thränengras		2	—
546	**K Colutea [illegible], [illegible] Blaſenſtrauch		1	6
547	***W Commelina coeleſtis, himmelbl. Commeline		1	—
548	**K Coronilla glauca, graue Kronenwicke		1	6
549	" Cotyledon ſpuria, Nabelkraut		1	6
550	*W Datura ceratocaula, hornſtengl. Stechapfel		1	6
551	" " faſtuoſa fl. pl., gef. blaue, ſchön		1	6
552	" " " " albo, gef. weiß. wohlr.		1	6
553	*K Echium violaceum, violetter Natterkopf		1	6
554	" Elichryſum fulgidum, feuriger Strohblume		2	—
555	[illegible] pinnatifidum, gefiederte, ſchön	1 Korn	3	—
556	**K Eucalyptus piperita, pfefferartige Schönmütze		2	—
557	" " [illegible]		3	—
558	***K Ferraria tigrid., getigerte Pfauenlilie		1	6
559	**K Francoa ſonchifol., ſchöne Francoa neu		2	—
560	" Fuchſia arboreſcens, baumartige Fuchſie		2	—
561	" Gaura mutabilis, veränderliche Gaure	2 K.	3	—
562	**K Geranium moſchatum, wohlr. Storchſchnabel		1	6
563	***W Gloxinia formoſa, ſchöne Gloxinie		1	6
564	**K Globularia alypum, dreizähnige Kugelbl.		2	—
565	RW Glycine caribaea, weſtindiſche Glycine		2	—
566	" " coccin., ſcharlachrothe		2	—
567	" " precator., Paternoſterbohne		2	—
568	" " rubicund. dunkelrothe, Kennedyia		2	—
569	*K Gnaphalium foetidum, ſtarkriechendes Ruhrkraut		1	—
570	**K " grandiflorum, großblum. Immerſchön		2	—
571	*W Gomphrena glob. fl. albo, weiß. Kugelamaranth		1	—
572	" " " carneo, fleiſchfarbiger		1	—
573	" " " rubro, rother		1	—
574	**W Hedyſarum veſpertilionis, Fledermausklee		1	6
575	**K Heliotropium peruvianum, peruan. Sonnenwende		1	6
576	" Hemimeris urticaefol., neſſelbl. Halbblume		1	6
577	**W Hibiscus Abelmoschus, Biſam Hibiscus		1	—
578	" " Manihot, großer ſchwefelgelber		2	—
579	**K Hyoſcyamus aureus, goldgelbes Bilſenkraut		1	6
580	" Hypericum macrocarpum, großfr. Johanniskr.		1	6
581	" " balearicum, Majorkiſches		2	—
582	*W Indigofera tinctoria, färbender Indigo		1	6
583	" Ipomea coccin., hochrothe Trichterwinde		2	—
584	" " hederac., epheublätterige	4 K.	2	—
585	" " Nil, prächtige	6 K.	2	—
586	" " pes tigridis, tigerfußblätterige	6 K.	2	—
587	" " Quamoclit, gefiederte, ſehr ſchöne	6 K.	2	—
588	" " tuberoſa, knollige	4 K.	2	—
589	**W Lantana alb., weiße Lantane		1	6
590	" " camara, veränderliche		2	—
591	**K Leptoſpermum albiflorum, weißbl. [illegible]		2	—
592	" " juniperinum, Wachholder		2	—
593	" " lucidum, glänzende		2	—
594	" " myrtifolium, myrthenblättr.		2	—
595	" " pubeſcens, behaarte		2	—
596	" " ſcoparium, Beſen		1	6
597	**W Lippia purpur., purpurrothe Lippie, niedlich			
598	* Lobelia erinoides, ſchmalſtielige Lobelie, auch für's freie Land		2	—
599	" " ſecund., dunkelblaue Lobelie		2	—
600	* Martynia proboscid., Elephantenrüſſel		2	—
601	RK Maurandia antirrhiniifl., löwenmaulblüthige Maurandie		1	6
602	" " Barkleyan., [illegible]		6	—
	ſehr ſchön		1	6
603	" " ſemperflorens, immerblühende		3	—
604	**K Melaleuc. dioſmaefol., dioſmenbl. Cajaputbaum		2	—
605	" " ericifol., heidenblätterige		3	—
606	" " fulgens, feuriger		2	—
607	" " hypericifol., Johanniskrautblätteriger		1	6
608	* Meſembrianthemum cryſtallinum, Eiskraut		1	6
609	" " pinnatifidum, gefiedertes		2	—
610	" " pomeridianum, rauh letzet.		2	—
611	" " pugioniforme, dolchförmiges		2	—
612	**K Metroſideros anguſtifol., ſchmalbl. Eiſenmaaß		2	—
613	" " citrina, Citronen.		3	—
614	" " craſſifol., dickblätteriges		2	—
615	" " lanceolat., lanzettförmiges		2	—
616	" " linearis, ſchmalblätteriges		2	—
617	" " lophant., büſchelblüthiges		2	—
618	" " " anguſtifol. " ſchmalbl.		2	—
619	" " pinifol., kieferblätteriges		2	—
620	**W Mimoſ. pudic., ſchamhafte Sinnpfl.	6 K.	2	—
621	" " virgat., ruthenart., 100 K. 15 [illegible]	6 K.		
622	Moſcaria pinnatifid., gefiederte Moſcarie, neu aus Chili		4	—
623	**K Myrica cerif., [illegible] Wachsmyrthe		4	—
624	* Nemophila phacelioides, ſchöne blaue Liebe[illegible] neu		2	—
625	**K Nicotiana glauc., graue [illegible] Tabak aus Buenos Ayres		2	—
626	*W Ocymum maximum, großer Baſilikum		1	6
627	" " minimum, kleinſter Baſilikum		1	6
628	" " gratiſſimum, angenehmer Baſilik.		1	6
629	" " thyrſiflorum		1	6
630	" " polyſtachyon, Moluck. Baſilikum			
631	***K Ornithogalum arabicum, arabiſche [illegible] milch ſchön		1	6
632	RW Paſſiflor. alb., weiße Paſſionsblume	4 K.	2	—
633	" " anguſtifol., ſchmalbl.	6 "	1	6
634	*W " foetid., Kartoffelpaſſe mit eßbaren dem bewahrten Früchten	6 K.	2	—
635	RW " gracilis, ſchlanke	6 K.	2	—

No.	Preiſe	gr	pf
636	**K Pelargonium div. spec. grandifl., ſehr ſchöne Pelargonien .	2	—
637	Ein Sortim. ſchöner Pel. v. 12 Sort., 2–5 K. .	12	—
638	Ein Sortim. ſchöner Pel. v. 24 Sort., 2–5 K. 1 Thlr.	—	—
639	Ein Sortim. ſchöner Pel. v. 40 Sort., 2–5 K. 1 Thlr.	12	—
640	**K Pentstemon campanulat., glockenf. Bartfaden	1	6
641	" " diffusum	1	6
642	" " digitalis, fingerhutähnlicher	1	6
643	" " pulchellum, ſchöner . .	2	—
644	*W Pentapetes phoenicea, ſcharlachrothe Pentapetes, ſchön	1	6
645	**K Polygala myrtifol., myrtenbl. Polygala 4 K.	2	—
646	" " umbellata, doldenblüthige 3 K.	2	—
647	***K Primula chinensis, chineſiſche Primel, ſchön	2	—
648	**K Rhododendron catawbiense, ſchöne Alpenroſe	2	—
649	" " maximum, größte .	3	—
650	" " " album, größte weiße	4	—
651	" " ponticum, pontiſche .	2	—
652	" " " carneum, pont. fleiſchf.	3	—
653	" " " roseum, p. roſenrothe	3	—
654	**W Salvia coccinea, Scharlach-Salbey .	1	6
655	**K Sempervivum arbor., baumartige Hauswurz	1	6
656	" " glutinosum, klebrige .	1	6
657	**W Sida atropurpur., braunrothe Sida .	1	6
658	**K Stylidium fruticosum, ſtrauchart. Säulenbl.	3	—
659	*W Solanum melongena fructu albo, weiße Eierfrucht	1	6
660	" " " coerulea, blaue	1	6
661	**K " pseudo capsicum, Korallenkirſche	1	—
662	" Spartium junceum, ſpaniſche Pfriemen	1	—
663	***K Stachys poeppig. Zieſt aus Chili .	2	—
664	**W Streptocarpus Rexii, königliche, ſchön	2	—
665	***K Sisyrinchium bermudianum, bermudianiſche Schweinsrüſſelblume	1	6
666	***W Talinum purpureum, purpurrothe Taline	2	—
667	**K Teucrium massiliense, franzöſ. Gamander	1	6
668	**KW Thunbergia alata, geflügelte Thunbergie, ſehr ſchöne Schlingpflanze . 2 Korn	4	—
669	***K Trachelium coeruleum, blaues Halskraut	1	6
670	* Trachymene coerulea, ſchöne blaue Trachymene, neu 1 Pr.	3	—
671	***W Tradescantia crassifol., dickbl. Tradescantie	2	—
672	" " erecta ros., erhabene roſenroth.	2	—
673	" " " coerul., " blaue	2	—
674	*W " undata, ſchöne lilla . .	2	—
675	**K Verbena tryphylla, dreibl. Eiſenkraut	1	6
676	***K Scilla campanulata, glockenart. Meerzwiebel	1	6
677	Ein Sortim. von 15 S. ſchönen Topfblumen 1 Thlr.	—	—
678	Ein Sortim. von 20 S. ſchönen Topfblumen 1 Thlr.	2	—
679	Ein Sortim. von 50 S. ſchönen Topfblumen 2 Thlr.	—	—
680	Ein Sortim. von 100 S. ſchönen Topfblumen 4 Thlr.	—	—

XI. Einige Holz-Saamen.

No.	Preiſe	gr	pf
681	Aralia racemosa, traubige Aralie 1 Portion	2	—
682	Aristolochia sipho, amerikaniſche Ariſtolochia oder Rieſenwinde, trägt ſehr ſelten Saamen 1 Port.	2	—
683	Colutea arborescens, Blaſenſtrauch .	2	—
684	Crataegus crus galli, Hahnenſporn-Dorn 1 Loth	2	—
685	Cytisus alpinus, Alpen-Bohnenbaum (Goldregen) 1 Port.	2	—
686	" calycinus, großblumiger .	2	—
687	" capitatus, kopfförmiger .	2	—
688	" elongatus, langäſtiger .	2	—
689	" laburnum, baumartiger ſchöner 1 Loth	2	—
690	" nigricans, ſchwärzlicher . 1 Port.	2	—
691	" wolgaricus, wolgariſcher .	2	—
692	Fraxinus excelsior, gemeine Eſche 1 Pfund	3	—
693	" pendula, hängende oder Trauer- .	8	—
694	Liquidambar styraciflua, wohlr. Amberbaum 1 Pt.	2	—
695	Morus alba, weiße Maulbeere . . 1 Loth	6	—
696	Robinia pseudo acacia, weißbl. Akazie	2	—
697	" caragana, Erbſenbaum	4	—
698	Symphoricarpus racemosus, Schneebeerenſtrauch 1 Port.	2	—
699	Staphylea pinnata, Pimpernuß . . . 1 Loth	1	—

XII. Georginen oder Dahlia's.

(Die Verſendungs- und Pflanzzeit iſt in den Monaten April und Mai.)

No.	Preiſe	gr	pf
1	Georgina aurantiac. et rubr. major, große orangenfarbige mit Roth 1 Stück	6	—
2	" " maxima, größte orangenfarb.	6	—
3	" punicea et aurantiac. incomparabilis, unvergleichliche Goldlackmalve. Unter dieſen G. erhalten Freunde der Dahlien ganz etwas Neues; ſie iſt ohnſtreitig die ſchönſte und ſeltenſte unter den jetzt bekannten Arten, glüht rein wie eine Goldmalve und übertrifft Nr. 1 und 2 an Schönheit der Zeichnung.	8	—
4	Georgina amabilis nivea, ſchöne weiße	4	—
5	" lillacea ros., lilla mit Roſenſchein	3	—
6	" mutabilis ros. anemonafl., anemonenbl.	4	—
7	" agathe imperial, achatrothe . .	3	—
8	" rubra lut. striat., roth m. gelben Streifen	4	—
9	" coccinea superba major, große hochr.	4	—
10	" cinnabarina, zinnoberrothe . . .	3	—
11	" coccin. formos., ſchöne ſcharlachrothe	3	—
12	" vitellina rubr., braunroth mit gelb geſt.	2	—
13	" lillacina alb., blaßlilla . . .	3	—
14	" cuprea lucimar., hochkupferroth . .	3	—
15	" cinnabarin. lutescens, hochziegelr. m. gelb	3	—
16	" coccea rubr., dunkelſcharlachrothe .	3	—
17	" violacea purpur., violettpurpur .	6	—
18	" atrolillac., dunkellilla m. weiß. Blattſpitz.	3	—
19	" rubra dodonaea, hochkirſchroth .	3	—
20	" isabella lutea, iſabellgelb	3	—
21	" fuscata striat. lut., braunroth mit gelben Streifen	6	—
22	" phoenicea, hochpurpur	4	—
23	" atrococcinea formos., brennendſcharlach	4	—
24	" salmonea salmonissima, röthenaſchfarbige	6	—
25	" atroviolacea minor, kleine dunkelviol.	3	—
26	" rotundifl. lillacina, dunkellila .	3	—
27	" atropurpur. nigricans, ſchwarzpurpur	3	—
28	" cinnabarina lutescens, gelbröthlichzieg.	4	—
29	" crocea grandifl., großbl. ſafrangelbe	3	—
30	" atrorubens, dunkelrothe	3	—
31	" lillacina grandifl., g. großbl. lilla . .	3	—
32	" cuprea major, große kupferfarbige	3	—
33	" miniata lut., zinnoberroth mit gelb	3	—
34	" aurantiaca splendens, glänz. orangefarb.	6	—
35	" sulphurea lillacin., gelb mit Lillaſtrichen	3	—
36	" ranunculoides minor, kleine ranunkelf.	3	—
37	" magnifica major, hochr. m. gelb. Streif.	4	—
38	" pallida flavescens, blaßgelbe . .	4	—
39	" lillacina speciosa, ſchöne lillafarbige	3	—
40	" violacea, violette	3	—
41	" fuscata variegat., braunrothe buntbl.	3	—
42	" punicea, hochrothe	3	—
43	" elegans crimson, braunrothe . .	3	—
44	" rubra aur. striat., roth m. gelben Streif.	3	—
45	" xerampelina, rothbraun	3	—
46	" aurora fulgens, feuerrothgelb . .	4	—
47	" sulphurea lillacin., gelb mit Lillaſtrichen	3	—
48	" lillacina ros. striat., dunkellil. m. Roſaſtr.	4	—
49	" violacea pallid., blaßviolette . .	3	—
50	" punicea aur., hochr. mit goldf. Streifen	6	—
51	" belle Hollandina, ſchöngelb . . .	6	—

	gr	pf
10 Stück der allervorzüglichſten Sorten erlaſſe ich zu . . . 2 Thlr.	15	—
22 St. ſchöner gef. Georg. 1e Qualit. mit Namen 2 Thlr.	—	—
12 St. ſchöner gef. Georg. 2e Qualit. mit Namen 1 Thlr.	—	—
12 St. ſchöner gef. Georg. in Nummer m. Namen	12	—
Das ganze Sortiment von 50 Sorten . . . 6 Thlr.	—	—

XIII. Blumenzwiebeln und Knollen,

welche bis zum April trocken verſandt werden können.

	gr	pf
Amaryllis formosissima, hochrothe Iris . 1 Stück	1	6
" Reginae, Königs-Amaryllis	1	—
" vittata, verſchleierte	10	—
Begonia discolor, verſchiedenfarbiges Schiefblatt	3	—
Caladium esculentum, eßbares Calladium . .	5	—
Canna indica, indianiſches Blumenrohr . . .	3	—
" speciosa, prächtiges	4	—
Costus speciosus, ſchöner Coſtus	4	—
Commelina coelestis, himmelblaue Commeline .	2	—
Cyclamen europaeum, europäiſche Erdſcheibe (Alpenveilchen)	4	—
" persicum, perſiſche wohlriechende . .	6	—
Cyrylla pulchella, ſchöne Cyrylle . . . 6 Stück	3	—
Ferraria tigrida, getigerte Pfauenlilie . 1 Stück	1	6
Gloxinia formos., ſchöne Gloxinie . . .	1	—
" maculata, gefleckte	2	—
Ranunkeln, holländiſche, in vielen Farben 100 St. 1 Thlr.	—	—
Mandel-Kartoffeln, kleine, mit ganz feiner Schale, zum Schmoren, ſtatt der guten Kaſtanien, trägt 200fältig . . . . 25 Stück	4	—

XIV. Bäume und Sträucher.

	gr	pf
Acer campestre, kleiner Ahorn . . . 1 Stück	2	—
" laciniatum, ſchlitzblättriger Ahorn . . .	3	—
" Pseudo Platanus, gemeiner	2	—
" " foliis variegat., buntbl. 4 bis	8	—
Amygdalus communis, gemeine Mandel . .	2	—
" persica fl. pleno, gefüllte Pfirſche .	6	—
" pumila fl. pleno, gefüllte Mandel .	6	—
Aristolochia sipho, amerikaniſche Oſterluzei (Rieſenwinde) .	1	—
Berberis vulgaris, gemeiner Sauerdorn . . .	1	—
Bignonia catalpa, Trompetenbaum	4	—
Buxus arborescens, Buchsbaum	2	—
" " fol. variegat., buntblättriger	3	—
" balearicus, balearicher	4	—
Clematis vitalba, gemeine Waldrebe . . .	1	—
Colutea arborescens, Blaſenbaum	1	—
Corchorus japonicus, japaniſcher Corchorus . .	3	—
Cornus sanguinea, rother Hartriegel . . .	1	—
Crataegus crus galli, Hahnenſporndorn . . .	4	—
Cytisus laburnum, Bohnenbaum (Goldregen) 2 bis	4	—
" sessilifolius, ſtielloſblättriger . . .	1	—
" wolgaricus, wolgariſcher	4	—
Daphne mezereum, Seidelbaſt	[illegible]	—
Evonymus europaeus, europäiſcher Spindelbaum	[illegible]	—
Ficus carica, gewöhnlicher Feigenbaum . . .	[illegible]	—
Fraxinus excelsior, gemeine Eſche . . . 2 bis	[illegible]	—
Hamamelis virginiana, virginiſche Zaubernuß .	[illegible]	—
Hedera helix, Epheu	[illegible]	—
Hippophaë rhamnoides, [illegible] . . .	[illegible]	—
Juglans nigra, ſchwarze Wallnuß	[illegible]	—
Juniperus sabina, Sadebaum . . . . . . 2 bis	[illegible]	—
" " fol. variegat., buntblättriger 2 bis	[illegible]	—
Ligustrum vulgare, Rheinweide	[illegible]	—
Lonicera Periclymenum, Geisblatt	[illegible]	—
" " semperflorens, immerbl. Monats-	[illegible]	—
" tatarica fl. albo, weiße tatar. Heckenkirſche	[illegible]	—
" " fl. atrorubro, dunkelrothe ſchöne	1	—
Lycium europaeum, europäiſcher Bocksdorn .	1	—
Philadelphus coronarius, Jasmin	1	—
Populus alba, Silberpappel	2	—
" balsamifera, Balſampappel	3	—
Rhus cotinus, Perückenbaum	4	—
" typhinum, Hirſchkolben-Sumach	2	—
Robinia caragana, ſibiriſcher Erbſenbaum . .	3	—
" hispida, rothblühende Akazie . 6 bis	8	—
" Pseudoacacia, gewöhnl. weißblühende 2 bis	4	—
" pendula, hängende oder Trauer- . 12 bis	16	—
" viscosa, klebrige blaßrothblühende 6 bis	8	—
Rosa alba pleno, gefüllte weiße Roſe . .	2	—
" altissima hollandic., hohe holländiſche . .	4	—
" carnea altissima, hohe fleiſchfarbige . .	4	—
" centifol. major, große Centifolien-Roſe .	2	—
" " minor, kleine	2	—
" chinensis purpur., purpurfarbige . . .	8	—
" ranunculoides minor, kleine Ranunkel- .	2	—
" juglandifol. superba, prächtige nußblättrige	8	—
" lutea (sulphur.), einfache gelbe	1	—
" " plena, gefüllte gelbe	6	—
" " bicolor, zweifarbige	4	—
" muscosa coccin., ſcharlachrothe Mooßroſe	12	—
" provincialis, Provinzroſe	4	—
" inermis, unbewaffnete (Roſe ohne Dornen)	6	—
" gallica, Zuckerroſe	2	—
" " versicolor, geſtreifte	3	—
" turbinata, Tapetenroſe zu Roſenmänteln 12 Stück	4	—
Rubus odoratus, wohlriechende Himbeere . .	2	—
Salix annularis, gekräuſelte Ringweide . . .	6	—
" babylonica, Trauerweide . . . . . 4 bis	6	—
" caprea fol. variag., buntblättrige . .	2	—
" buxifol., buchsbaumblättrige	2	—
" nigricans, ſchwarze . . . . 2 bis	4	—
" phylicaefol., phylicablättrige	2	—
Sambucus racemosus, Trauben-Hollunder . .	3	—
Spartium junceum, ſpaniſche Pfriemen . . .	4	—
Spiraea alpin., Alpen-Spierſtaude	2	—
" chamaedrifol., gamanderblättrige . .	2	—
" corymbos., ſtraußförmige	2	—
" crenat., gekerbte	2	—
" obovat., ungariſche	3	—
" opulifol., ſchneeballblättrige	2	—
" salicifol., weidenblättrige	2	—
" sorbifol., vogelbeerblättrige	3	—
" thalictroides, thalictrumblättrige . .	2	—
Syringa chinensis, chineſiſcher Flieder (Sprene)	4	—
" persica, perſiſcher	2	—
" vulgaris, gewöhnlicher blauer . .	1	—
" " fl. alb., " weißer . .	2	—
Thuja occidentalis, abendländiſcher Lebensbaum 4 bis	12	—
Ulmus campestris, gewöhnliche Ulme 2 bis	4	—
" " foliis variegat., buntblättrige	6	—
Viburnum Opulus, gemeiner Schneeball . .	2	—
" roseum, gefüllter	4	—
Weinſtöcke, ſehr gut bewurzelte, in guten Sorten, 12 Stück	16	—
Desgl. mit Angabe der Sorten . . . 1 Stück	3	—

F. C. Brückner,
Kunſt- und Handelsgärtner in Arnſtadt.

Verzeichniß für das Jahr 1834

von

den ſchönſten und unentbehrlichſten

Gemüſe- und Blumen-Sämereien, gefüllten Georginen

und

mehreren anderen Pflanzen,

welche

ſo friſch und ächt als möglich um beigeſetzte Preiſe zu haben ſind

bei

Wilhelm Leser,

Handels-Gärtner in Erfurt.

Die Preiſe verſtehen ſich in Preußiſchem Courant, den Thaler zu 24 gute Groſchen gerechnet.

I. Kohl-Saamen.

№		à Loth	gr.	pf.
1	Blumenkohl, großer aſiatiſcher, beſter		7	—
2	„ cypriſcher, früheſter, beſter		7	—
3	„ holländiſcher, ſpäter		4	—
4	„ ſchwarzer, aus Sicilien, ſehr delikat, extra	à Priſe	3	—
5	Brockoli oder Spargelkohl, weißer	à Loth	2	—
6	„ „ violetter		2	—
7	„ „ grauer oder römiſcher		2	—
8	Meer- oder Seekohl (Crambe maritima)		8	—
9	Kraut- oder Kopfkohl, Erfurter, großes weißes		1	6
10	„ „ „ kleines frühes		1	6
11	„ „ „ rothes, frühes Salat-		1	6
12	„ „ Ulmer, großes weißes Frühkraut		2	—
13	„ „ Butter- oder Karminal-		2	—
14	„ „ holländiſches, frühes weißes		2	—
15	„ „ „ kleines, ſchwarzrothes, frühes extra		2	6
16	„ „ Braunſchweiger, größtes		2	—
17	„ „ engliſches, neues, allerfrüheſtes, Zucker- oder Mai-		4	—
18	„ „ neues Emperor		4	—
19	Wirſing oder Börskohl, Erfurter, großer, gelber Winter-		1	6
20	„ „ Ulmer, niedriger, früher, extra		2	—
21	„ „ „ größter, ſpäter		2	—
22	„ „ Wiener, niedriger, früher Treib-		2	—
23	„ „ früher, niedriger Kapuziner		1	—
24	„ Blumenthaler, gelber Savoyer-		2	—
25	Kohl, Brüßler, Sproſſen- oder Roſen-		2	—
26	„ franzöſiſcher, bunter Plumagen-		4	6
27	„ niedriger, brauner, krauſer Winter-		—	9
28	„ „ grüner „		—	9
29	„ Schnitt- oder Frühlings-		—	4
30	„ „ grüner, Blumenkohlblättriger		—	6
31	Glaskohlrabi, Wiener, kleinblättrige, niedrige, frühe, extra		2	6
32	„ „ „ „ blaue, „		2	6
33	„ engliſche, frühe, weiße		1	6
34	„ mittelfrühe, große, weiße		1	—
35	Oberkohlrabi, gewöhnliche, große, weiße, ſpäte		—	6
36	Kohlrüben oder Erdkohlrabi, große, weiße, runde		1	—
37	„ „ gelbe, runde, extra		1	6
38	Steckrüben, große, weiße, ſchwediſche (Rutabaga)		1	—
39	„ „ gelbe „		1	—

II. Wurzel- und Rüben-Saamen.

№		à Loth	gr.	pf.
40	Carotten od. Möhren, holländiſche, kurze, frühe, zum Treiben		1	—
41	„ „ Horniſche, ganz frühe, lange, rothe		1	—
42	„ „ Braunſchweiger, lange, rothe		—	9
43	„ „ Erfurter, lange, rothgelbe		—	9
44	„ „ Altringham, neue ſüße, ſehr wohlſchmeckend		3	—
45	„ „ neue, violette		3	—
46	Wurzeln, Cichorien-, beſte, glatte, kurze und lange		—	9
47	„ Haber-		1	—
48	„ Paſtinak-		—	6
49	„ Peterſilien-, lange		1	—
50	„ Rapontica-		1	—
51	„ Rapunzel-, kleine, weiße, neue (delikat)		4	—
52	„ Scorzoner-		1	—
53	„ Zucker-, feine		1	6
54	Sellerie, großer, holländiſcher Knoll-		1	6
55	„ weißer italieniſcher oder ächter engliſcher		3	—
56	„ violetter „ „ „		3	—
	(Beide Sorten werden in England zum Bleichen benutzt.)			
57	Rüben, holländiſche, Mai-		—	6
58	„ Teltauer oder Märkiſche		—	9
59	„ ſehr große, weiße engl. (Globe Turnips)		2	—
60	„ „ harte, gelbe engl. (vorzüglich)		2	—
61	„ weiße, lange Herbſt- oder Stückel-, à Pfund 10 gr.		—	6
62	„ blutrothe Salat-		—	6
63	Runkelrüben, lange, über ſich wachſende	à Pfd.	5	—
64	„ runde, gelbe	à Pfd.	6	—
65	„ weiße	à Pfd.	8	—
66	Beißkohl oder Mangold	à Loth	—	6

III. Salat-Saamen.

№		à Loth	gr.	pf.
67	Salat, Steinkopf-, früher, gelber, weiß Kern	à Loth	1	6
68	„ Schmalzkopf-, früher		1	6
69	„ arabiſcher, großer Kopf-, braun Kern		1	6
70	„ aſiatiſcher, großer, gelber, weiß Kern		2	—
71	„ Forellen-, großer, bunter, weiß Kern		1	6
72	„ „ engliſcher, kleiner Blutforellen-		2	6
73	„ Bologneſer, großer, krauſer		1	6
74	„ Mohrenkopf, brauner, braun Kern, extra		1	6
75	„ Prinzenkopf, gelber, braun Kern		1	6
76	„ „ „ weiß Kern		1	6
78	„ Berliner, großer, gelber, ſchwarz Kern		1	6
79	„ „ „ „ weiß Kern, extra		2	—
80	„ Winter-, beſter, dauernder		1	6
81	„ verſchiedene der beſten Sorten unter einander		1	—
82	Endivien, krauſe, gelbe, Sommer		1	6
83	„ „ Winter-		1	6
84	„ federkrauſe, Winter-, extra		2	—
85	Rapünzchen oder Feldſalat		—	6

IV. Zwiebel-Saamen.

№		à Loth	gr.	pf.
86	Zwiebeln, Erfurter, runde, harte, Kopf-		1	—
87	„ holländiſche, gelbe, ſüße, runde		2	—
88	„ Birn-, gelbe, längliche		2	—
89	„ holländiſche, blutrothe		2	—
90	„ „ ſilberweiße		2	—
91	„ ſpaniſche Pflanz-		2	—
92	„ Winter-, weiße		1	—
93	Porree oder Lauch, dicker Winter-		1	6

V. Radies- und Rettig-Saamen.

№		à Loth	gr.	pf.
94	Radies, holländiſche, weiße, runde Monats-		1	—
95	„ „ dunkelrothe, zart		1	—
96	„ „ roſenrothe		1	—
97	„ „ unter einander		—	9
98	„ lange, dunkelviolette, engliſche		1	—
99	Rettig, Erfurter, langer, ſchwarzer Winter-		1	—
100	„ „ runder		1	—
101	„ Wiener, gelber, früher Sommer		1	—
102	„ rothſchaliger Herbſt		1	—

VI. Küchenkräuter-Saamen.

№		à Loth	gr.	pf.
103	Stragel-Kaffee (Astragalus baeticus)	à Pfd.	5	—
104	Baſilikum, großes Küchen-	à Loth	1	—
105	„ kleines, feines		2	—
106	Bohnen- oder Pfefferkraut		1	—
107	Dill		—	6
108	Fenchel, gewöhnlicher		—	6
109	„ ſüßer Anies-		1	—
110	Gartenkreſſe, einfache		—	6
111	„ krauſe oder gefüllte		1	—
112	Kerbel, gewöhnlicher		—	6
113	„ krausblättriger		1	—
114	Yſop		1	—
115	Erdmandeln		1	—
116	Lavendel		1	—
117	Majoran, franzöſiſcher		1	6
118	Citronenmeliſſe, feine		2	—
119	Peterſilie, gewöhnliche		—	6
120	„ gefüllte oder krausblättrige		1	—
121	Pimpinell		1	—
122	Portulack, grüner		1	—
123	„ gelber		1	—
124	Rosmarin		3	—
125	Salbei		1	6
126	Sauerampfer, franzöſiſcher		1	—
127	Spinat, engliſcher Gemüß- (Rumex patientia)		—	8
128	„ „ größter	à Pfd.	6	—
129	„ rundblättriger	à Pfd.	5	—
130	„ Neuſeeländer (Tetragonia expansa)	à Loth	4	—
131	Thymian		1	6
132	Weinraute		2	—

VII. Kern-Sorten.

№		à Loth	gr.	pf.
133	Artiſchocken, große franzöſiſche		8	—
134	Cardy, ſpaniſche		1	6
135	Gurkenkern, Erfurter, mittellange		1	—
136	„ lange, grüne Schlangen-		2	—
137	„ Halliſche, mittellange grüne		1	6
138	„ größte, 18—20 Zoll lange grüne Schlangen-	à Priſe	2	—
139	„ „ „ weiße	à Priſe	2	—
140	„ allerfrüheſte, vollttragende, zum Treiben	à Priſe	1	6
	(Letztere 3 Sorten eignen ſich blos für Miſtbeete.)			
141	Spargelkern, weiße Darmſtädter	à Loth	1	—
142	Melonenkern, Cucumis Melo. deliciosus, kleine Tigermelone	à Priſe	1	6
143	„ „ „ serotinus, ſpäte, große	à Priſe	1	6
144	„ „ Dudaim, perſiſche Gurke		1	6
145	„ „ „ Ein Sortiment von 24 Sorten		16	—
146	Kürbiskern, großer Herkuleskeulen-	à Priſe	2	—
147	„ Flaſchen-		2	—
148	„ größter Melonen-, wiegt oft 180—200 Pfd.		1	—
149	„ kleinſter Stachelbeer-		1	—
150	„ „ Birn-		1	—
151	„ „ Apfelſinen-		1	—
152	„ Türkenbund-		1	—
153	„ Eier-		1	—
154	„ Apfel-		1	—
155	„ Sternkürbis (das Beßneck) hübſch		1	6
156	„ Gurken-		1	—
157	„ amerikaniſcher, kleiner, neuer, orange Feldflaſchen-, ſchön		2	—
158	„ Warzen-		1	—
159	„ neuer grüner Wirſing, ſchön		6	—
160	„ orange Champignon		4	—
161	„ amerikaniſcher, neuer orange Winterhorn		2	—
162	Ein Sortiment von 12 ſchönen Sorten nach meiner Wahl		12	—

VIII. Erbſen-Sorten.

№		à Loth	gr.	pf.
163	Zuckererbſen, engliſche, frühe, weißblühende	à Pfund	5	—
164	„ große weiße Schwert-		6	—
165	„ „ blaublühende graue Schwert-		4	—
166	„ früheſte, niedrige, 1 Fuß hoch		5	—
167	„ große ſchwarzkeimige		6	—
168	Kneifel- oder Ausmacherbſen, früheſte, niedrige Mai-		3	—
169	„ „ Erfurter, große frühe Klunker-		2	—
170	„ „ ſpäte Gelb- oder Wachs-		4	—
171	„ „ große grüne		2	6

IX. Bohnen-Sorten.

№		à Loth	gr.	pf.
172	Stangenbohnen, arabiſche oder Feuer-	à Pfund	8	—
173	„ lange, breite, weiße Schwert-		5	—
174	„ „ „ bunte		4	—
175	„ graue, weißſchalige		4	—
176	„ bunte Eier-		4	—
177	„ engliſche weiße Zucker-Brechbohnen		7	—
178	Buſchbohnen, früheſte, ſchwarze		8	—
179	„ frühe, blaßgelbe Zucker-		4	—
180	„ „ neue gelbe Pariſer, extra		6	—
181	„ weiße Schwert-		6	—
182	„ rothbunte Zucker-		1	—
183	„ gelbe Zucker-		3	—
184	„ Mailändiſche		6	—
185	„ ſchwarze, halbhohe, trägt reichlich		6	—
186	Puffbohnen, gewöhnliche, ſehr tragbar		1	6
187	„ große, weiße Windſor		4	—
188	„ grüne, Mailänder		4	—
189	„ amerikaniſche, rothblühende		10	—

X. Oekonomiſche Saamen.

№		à Loth	gr.	pf.
190	Apfelkern		16	—
192	[illegible]	à Loth	5	—
193	Taxbaum (Taxus baccata)		6	—
194	Roſe, [illegible]	à Pfd.	8	—
195	„ [illegible] oder ewige		6	—
196	„ ſpaniſche, rothblühender		6	—
197	Hafer ohne Hülſen, blos in ½ Pfd. abzugeben, à ½ Pfd. 4 gr.	à Loth	—	8

XI. Blumen-Saamen.

Sommergewächſe, oder einjährige, welche zur Zierde der Rabatten und dergleichen dienen.

№		à Loth	gr.	pf.
198	Adonis autumnalis, Herbſt-Adonis		1	—
199	Ageratum mexicanum, mexikaniſches Ageratum, ſchön		1	—
200	Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen		1	—
201	Amaranthus caudatus, geſchwänzter Fuchsſchwanz		1	—
202	„ sanguineus, blutrother		1	—
203	Anacyclus bicolor, zweifarbiger Anacyclus		1	—
204	Anagallis indica, indiſches Gauchheil		1	6
205	Anoda hastata, (Sida), blaue Anode		1	—
206	Anthemis arabica, arabiſche Kamille		1	6
207	Antirrhinum (Linaria) latifolia, breitblättriges		1	—
208	„ triphyllum, dreiblättriges		1	—
209	„ speciosum, ſchönes		1	—
210	„ versicolor, bunter		1	—
211	„ cristatum, traubiges, ſchön		2	—
212	Argemone grandiflora, großblumiger Stachelmohn		3	—
213	„ mexicana, mexikaniſcher		1	—
214	„ ochroleuca, bleichgelber		2	—
215	Aster chinensis, fl. pl., gefüllte Aſtern, verſch. Sorten,	à Loth	6	—
216	„ „ fistulosa, gefüllte Röhraſtern in folgenden ſchönen Sorten, als: Nr. 1. Fleiſchfarbe. 2 [illegible] 3 Silberweiß. 4. Blaßroth 5 Blaßblau. 6 Dunkelblau 7 Fleiſchfarbe, früh 8 Dunkelroth. 9 Blaßblau mit Weiß 10. Dunkelroth mit Weiß 11. Blaßroth mit Weiß 12 Dunkelblau mit Weiß 13 [illegible] 14. Blaßblau lila 15 Dunkelroth [illegible] 16. Dunkelblau lila 17. Amarant. 18 Karmoiſin 19 [illegible] 20. [illegible] mit Weiß, jede [illegible]	à 100 Körner	1	6
217	Das ganze Sortiment von jeder Sorte à 100 K.		20	—
218	Die Sorten unter einander à 100 K. 3 gr. 1000 K.		6	—
219	Aster chinensis, fl. pl. nana, ganz niedrige Zwergaſtern, in folgenden Sorten, als: Nr. 21 [illegible] 100 K. 1 gr. 6 pf. 25. Dunkelroth 100 K. 2 gr. 26. Blaßroth 100 K. 1 gr. 6 pf. 1000 K. 10 gr. 27. Dunkelroth mit Weiß 50 K. 1 gr. 6 pf. 28. [illegible] 50 K. 1 gr. 6 pf. 29 Blaßblau mit Weiß 50 K. 1 gr. 6 pf.			
220	Das ganze Sort. in dieſen angezeigten Sorten und Körnern		8	—
221	Aster tenellus, zarter Aſter		1	—
222	Athanasia annua, jährige Athanaſie, hübſch		1	—
223	Atropa physalodes, [illegible] Tollkraut		1	—

№		à Priſe gr.	pf.
223.	Beta brasiliensis, braſil. Mangold mit gefärbten Blattrippen	2	—
224.	· · · · mit karmoiſinr.	2	—
225.	· · · · mit ſcharlachr.	2	—
226.	· · · · mit ſilberweißen	2	—
227.	(Alle 4 Sorten eignen ſich auch als ſchöne Zierpflanzen für Töpfe)		
228.	Blitum capitatum, kopfförmiger Erdbeerſpinat	1	—
229.	· virgatum, ruthenförmiger	1	
230.	Briza maxima, größtes Zittergras	1	—
231.	Cacalia sonchifolia, gänſediſtelbl. Cacalie, ſchön	1	—
232.	Calandrinia adscendens, purpurrothe Calandrinie	1	—
233.	· grandiflora, großblumige, neu und ſehr ſchön	3	—
234.	· speciosa, ſchöne, ebenfalls prachtvoll	3	—
	(Beide ſind ebenfalls als ſchöne Topfpflanzen zu empfehlen.)		
235.	Calendula pluvialis, Regen-Ringelblume	1	—
236.	· hybrida, Baſtard-Ringelblume	1	—
237.	· officinalis fl. pl. ranunculoides, ranunkelartige	1	—
238.	Calliopsis bicolor, zweifarbiges Schöngeſicht	1	6
239.	Campanula speculum fl. albo, weißer Frauenſpiegel	1	6
240.	· · fl. violaceo, violetter	1	—
241.	· Lorei, Lorei'ſche, ſchön	2	—
242.	Capsicum annuum, ſpaniſcher Pfeffer	1	—
243.	Centaurea americana, amerikaniſche Flockenblume, ſehr ſchön	3	—
244.	· moschata fl. alba, weiße Moſchus-Flockenblume	1	—
245.	· · fl. rubro, rothe	1	—
246.	· suaveolens, wohlriechend gelbe	2	—
247.	Cerinthe major, große Wachsblume	1	—
248.	Cheiranthus annuus, Sommerlevkoyen in verſch. F. à Loth	12	—

Oder in folgenden, vorzüglich ins Gefüllte fallenden Sorten:

Engliſche Sorten:

249. Nr. 1. Blaßblau. 2 Blaßroth. 3. Violettbraun. 4. Dunkelaſchgrau. 5 Dunkelkarminroth 6 Dunkelſchwarzbraun. 7. Dunkelmordoree 8 Hellaſchgrau. 9 Hellviolett. 10. Kupferroth. 11. Karmoiſinroth. 12. Karminroth. 13. Roſenfarbe. 14. Blaßziegelroth. 15. Ziegelroth. 16. Rothbraun. 17. Schwarzbraun. 18 Violett. 19 Weiß. 20. Fleiſchfarbe. 21. Rothgrau. 22 Blaßlilla. 23. Zimmetbraun. 24. Apfelblüthe. 25. Hellmordoree. 27. Kaſtanienbraun. 29 Mohngrau.

Engliſche Sorten mit dem Lackblatt.

Nr. 33. Karminroth. 34 Weiß. 35. Zimmetbraun. 36. Rothgrau. 37. Fleiſchfarbe. 38. Ziegelroth. 39 Rothgrau. 40. Violett. 41 Aſchgrau. 42. Rothbraun. 43. Roſenfarbe. 46. Blaßblau. 47. Blaßlilla.

Halbengliſche Sorten.

Nr. 51. Weiß. 52 Kupferroth. 53. Karminroth. 54. Dunkelſchwarzbraun. 56. Ziegelroth. 57. Dunkelmordoree. 58. Aſchgrau. 59. Blaßroth. 60. Violett. 61. Blaßbraun. 62 Apfelblüthe. 63 Schwarzbraun. 65. Blaßblau. 66. Zimmetbraun. 67. Dunkelroſenfarbe. 70. Hellmordoree. 71. Fleiſchfarbe. 73. Dunkelkupferroth.

Halbengliſche mit dem Lackblatt.

Nr. 74. Karmoiſin.

№		gr.	pf.
	Von dieſen angegebenen Sorten à 100 Korn	1	3
	Von dieſen angegebenen Sorten ſind folgende Sortiments zu haben, als:		
250.	Ein Sort. von 12 ſchönen engliſchen Sorten	11	—
251.	· · · 25 · · und halbengl. Sorten	24	—
252.	· · · 36 · · · ·	36	—
253.	· · · 50 · · · ·	48	—
254.	Das ganze Sortiment Sommer- und Herbſt-	84	—

Herbſt- oder Baſtard-Levkoyen.

Engliſche Sorten.

255. Nr. 76. Karminroth. 77. Violett. 78. Mordoree. 81. Weiß. 83. Ziegelroth. 85 Dunkelbraun. 86. Karminroth mit dem Lackblatt.

Halbengliſche Sorten.

Nr. 90. Fleiſchfarbe. 92. Karmoiſinroth. 93. Blaßbraun. 95. Karminroth. 96. Hellblau. 99 Ziegelroth mit dem Lackblatt.

№		gr.	pf.
	Von dieſen angegebenen Sorten à 100 K.	1	6
256.	400 Körner in verſchiedenen Farben	4	—
257.	100 · blos engl. Sommerlevkoyen in verſch. Sorten	4	—
258.	1000 · engl. und halbengl. in verſchiedenen Sorten	8	—
259.	Cheiranthus incanus, Winterlevkoyen in folgenden, gleich den Sommerlevkoyen ins Gefüllte fallende Sorten, als: Lit. A. Fleiſchfarbe. B. Roſenfarbe. C. Karminroth. D. Hochroth. E. Mordoree. H. Violett. L. Weiß M. Weiß mit dem Lackblatt. N. Hochroth mit dem Lackblatt. O. Hellviolett. P. Rothe Baumlevkoye à 100 K.	1	3
260.	Das ganze Sortiment von 11 Sorten	12	—
261.	Verſchiedene Sorten unter einander, 400 Körner	4	—
262.	Cheiranthus cheiri fl. pl., gefüllter brauner Gelblack, à 100 K.	1	6
263.	· · extra gef. · Stangenlack ·	2	—
264.	· · fl. violaceo, violetter Buſchlack ·	1	6
265.	· maritimus, weiße und blaue Meerlevkoye	1	—
266.	Chenopodium ambrosioides, gewürzhaftes Gänſefuß	1	—
267.	· maritimus, Meer-Gänſefuß	1	—
268.	Chrysanthemum carinatum, gekielte Wucherblume	1	—
269.	· elegans, ſchöne gelbe, neu	1	6
270.	· coronarium fl. pl., gefüllte gekrönte	1	—
271.	· Sipthorpii, Sipthorpiſche	1	—
272.	· pectinatum, kammförmige.	1	—
273.	Clarkia pulchella, ſchöne Clarkie	1	—
274.	· · mit dunkeln Blumen	2	—
275.	· · fl. albo, ſchöne neue weiße	4	—
276.	Collinsia grandiflora, großblumige Collinſie, niedlich	2	—
277.	Collomia grandiflora, großblumige Collomie, neu	1	—
278.	Convolvulus bicolor, zweifarbige Winde à Loth	2	—
279.	· tricolor, dreifarbige Winde ·	2	—
280.	Coreopsis leucanthemum, leukantiſche Wanzenblume	1	—
281.	Cotula coronopifolia, ſchlitzblättrige Laugenblume	1	—
282.	Crepis barbata, bärtiger Pippau	1	—
283.	· Dioscoridis, dioskoriſcher Pippau	1	—
284.	· rubra et alba, rother und weißer Pippau à Loth 4 gr.	1	—
285.	Corydalis aurea, goldfarbener Erdrauch	1	—
286.	Cosmea bipinnata, doppelt gefiederte Cosmee	1	6
287.	Cynoglossum linifolium, weiß Vergißmeinnicht à Loth	3	—
288.	Datura Metel, weißer Stechapfel	1	
289.	Delphinium ajacis fl. pl. elatior, hohe gefüllte Ritterſporn in 6 Sorten, von jeder eine Priſe	6	—
290.	· ajacis fl. pl., gefüllte niedrige Ritterſporn in vielen Farben melirt à Loth	4	—
	Oder in folgenden Sorten:		
291.	Nr. 1. Weiß. 2 Blaßlilla. 3 Blaßziegelroth. 4. Violett. 5. Blaßblau. 6. Blaßbraun. 7. Dunkelziegelroth. 8. Aſchblau. ~~Sorten ſind [illegible]~~ abzugeben.		
292.	Alle 11 Sorten von jeder ½ Loth	18	—
293.	· · ¼ Loth	10	—
294.	Delphinium consolida fl. pl., gefüllte Levkoyen-Ritterſporn in 8 Farben melirt à Loth	5	—
	Oder in folgenden Sorten, als:		
295.	Nr 1. Roth. 2. Blaßblau. 3. Bunte. 4. Weiß. 5. Dunkelblau. 6. Fleiſchfarbe.		
296.	Alle 6 Sorten in ½ Lothen	10	—
297.	· · ¼ Lothen	6	—
298.	Dracocephalum Moldavicum, türkiſcher Drachenkopf	1	—
299.	Echium creticum, cretiſcher Natterkopf	1	—
300.	· grandiflorum, großblumiger	1	—
301.	Elychrysum bracteatum (lucidum), glänzende Strohblume	1	—
302.	· · fl. sulphureo, ſchwefelgelbe	1	6
303.	· · fl. albo, weiße, neue, ſchön	2	—
304.	Erodium gruinum, candiſcher Reiherſchnabel	1	—
305.	Elsholtzia cristata, kammförmige Elsholtie	1	—
306.	Eutoca multiflora, vielblumige Eutocie, neu	2	—
307.	Euphorbia cyathophora, gegenblättrige Euphorbie mit ſchönen rothen Blättern	3	—
308.	Galinsoga trilobata, dreilappige Galinſoge	1	—
309.	Gilia capitata, kopfförmige Gilie, ſchön	1	—
310.	· · fl. albo, neue weiße	3	—
311.	Glaucium phoeniceum, rother Hornmohn	1	
312.	Grahamia aromatica, wohlriechende Grahamie	1	6
313.	Hebenstreitia aurea, goldgelbe Hebenſtreitie	1	6
314.	· albiflora, weißblumige	2	—
315.	Hedysarum flexuosum, gebogener Hahnenkopf, neu u. ſchön	2	—
316.	Helenium quadridentatum, vierzähnige Helenie	1	6
317.	Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume à Loth	2	—
318.	· nanus, niedrige	1	—
319.	· lenticularis	1	—
320.	· fl. pl., gefüllte	1	6
321.	Hibiscus trionum, Stunden-Eibiſch	1	—
322.	· longifolius, langblättriger	1	—
323.	Iberis umbellata, doldenblüthige Schleifenblume	—	6
324.	· · fl. purpureo, purpurfarbige, ſchön	1	—
325.	Impatiens balsamina fl. pl., gefüllte Balſaminen, verſchiedene Farben 100 K.	2	—
326.	· · Ein Sortiment von 12 Sorten, à 8 bis 15 K.	8	—
327.	· · à Loth	12	—
328.	Neue engliſche rothe Zwerg-Balſamine	8	—
329.	Ipomea purpurea, purpurfarb. Trichterwinde in verſch. Farben à Loth	1	—
330.	· · Ein Sortiment von 8 Farben	6	—
331.	Ketmia vesicaria, aufgeblaſene Ketmie, ſchön	1	6
332.	Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken à Loth	2	—
333.	· · striata, geſtreifte rothe	1	—
334.	· · · blaue	1	—
335.	· magellanicus, magellan., ſchön dunkelbl. à Loth	4	—

№		à Loth gr.	pf.
336.	Lavatera trimestris fl. albo, weiße Lavatere	1	—
337.	· · rubra, rothe	1	—
338.	Linum grandiflorum, großblühender Lein	1	—
339.	Lopezia excellans, doldenblüthige Lopezie	1	—
340.	Lupinus albus, weiße Lupine à Loth	2	—
341.	· angustifolius, ſchmalblättrige	2	—
342.	· bicolor, zweifarbige à Priſe	2	—
343.	· canaliculatus, hohlblättrige	2	—
344.	· mutabilis, veränderliche, ſchöne neue	3	—
345.	· · Cruikshankii, eine ſchöne Var. à Loth	4	—
346.	· hirsutus, große blaue à Loth	2	—
347.	· luteus, gelbe	1	—
348.	Kaulfussia orientalis, orientaliſche Kaulfuſſie, ſchön auch für Töpfe	1	6
349.	Malope grandiflora, großblumige Malope, neu und prachtvoll	3	—
350.	· trifida, dreitheilige	1	—
351.	Madia elegans, ſchöne Madie, neu und ſehr ſchön	3	—
352.	Malva moreni, moreniſche Malve	1	—
353.	· miniata, mennigrothe, ſchön, auch paſſend für Töpfe	2	—
354.	Mirabilis jalappa, Jalappe, in verſchiedenen Farben, à Loth	4	—
355.	· longiflora, langblumige	1	—
356.	Ein Sortiment Jalappen in 9 Sorten	2	—
357.	Nemophila phacelioides, [illegible], ſchön u. neu	2	—
358.	Nicotiana nyctaginiflora, nächtlich blühender Tabak	1	—
359.	· vincaeflora, weißblühender, beide ſchön	1	—
360.	· sanguinea, blutrother, neu	1	—
361.	Nolana paradoxa, bewaffnete Nolane	1	—
362.	· prostrata, liegende	1	—
363.	· atriplicifolia, meldenblättrige, ſchön und neu	2	—
364.	Nigella coarctata (nana), niedriger Schwarzkümmel	1	—
365.	Oenothera acaulis (taraxaci fl.), ſtengelloſe Nachtkerze, ſchön, großblühend	3	—
366.	· amoena, angenehme, ſchön	1	—
367.	· cruciata, kreuzblättrige	1	—
368.	· grandiflora, großblumige	1	—
369.	· longiflora, langblumige	1	—
370.	· Lindleyana, Lindley's	1	—
371.	· mollissima, weiche	1	—
372.	· Romanzowii, Romanzowiſche	1	—
373.	· purpurea, purpurrothe	1	—
374.	· tetraptera, vierflüglige	1	—
375.	· tenella, zarte	1	—
376.	Papaver Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn	—	
377.	· somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn in verſchiedenen Farben à Loth	3	—
378.	· · · rothgetuſchter à Priſe	1	—
379.	· · · großblumiger rother	1	—
380.	· · · lilla	1	—
381.	· · · weißer mit dunkelroth. Rand	1	—
382.	· · · · rothen Spitzen	1	—
383.	Podolepis gracilis, ſchl. Podolepis, extra ſchön, auch für Töpfe	1	—
384.	Polygonum elegans, ſchöner Knöterich	2	—
385.	· orientale, orientaliſcher	1	—
386.	· · fl. albo, weißer	1	—
387.	Reseda odorata, wohlriechende Reſede à Loth	1	—
388.	Ricinus communis, gemeiner Wunderbaum	1	—
389.	Rudbeckia amplexicaulis, ſtengelumfaſſende Rudbeckie	1	—
390.	Salvia horminum, Scharlach-Salbei	1	—
391.	Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie hübſch zu Einf.	1	—
392.	Scabiosa atropurpurea major, große Garten-Scabioſe	1	—
393.	· · · Ein Sort. in 8 Farben	4	—
394.	Salpiglossis Barkleyana, Barkley's Salpigloſſe	1	—
395.	· · lilacina, lilla	4	—
396.	· intermedia	1	—
397.	· straminea, ſtrohfarbene	3	—
398.	· melirt, als: atrop., picta, Barkley, interm. etc.	2	—
399.	Scabiosa atropurpurea nana, niedrige neue Scabioſe	2	—
400.	Schizanthus pinnatus, gefiederter Schizanthe	1	—
401.	· porrigens, ausgebreiteter	2	—
402.	Senecio elegans fl. pl. albo, weißgefülltes Kreuzkraut	1	—
403.	· · · rubro, rothgefülltes	1	—
404.	· · · pallido, blaßrothes	1	—
405.	· · · atropurpureo, dunkelrothes	2	—
406.	Silene coarctata, zuſammengedrückte Silene	1	6
407.	· dianthoides, nelkenartige	1	6
408.	· linola, feinblättrige	1	6
409.	· incana, beſtäubte	1	3
410.	· orchidea (Atocion), regwurzblättrige	1	—
411.	· pendula, hängende, beide recht hübſch zu Einfaſſ.	1	—
412.	Solanum lycopersicum, Liebesapfel	1	—
413.	Sicyos angulata, eckige Haargurke, zur Bekleidung anwendb.	1	—
414.	Tagetes erecta, fl. pl. orange, orangegelbe gef. Sammtbl.	1	—
415.	· · · sulphureo, ſchwefelgelbe	1	—
416.	· patula fl. pl. ranunculoides, ranunkelartige, ſchön	1	—
417.	· · striata, geſtreifte, } eignen ſich zu ſchönen	1	—
418.	· · punctata, punktirte, } Einfaſſungen	1	—
419.	· · fistulosa, röhrige, ſehr ſchön	2	—
421.	Trachymene coerulea, blaue Trachymene, ſehr ſchön	3	—
422.	Trifolium incarnatum, ſchönrothes Dreiblatt	1	—
423.	· speciosum, ſchönſtes	2	—
424.	Tropaeolum hibridum, Baſtard-Kapuzinerkreſſe, gelbe	2	—
425.	· majus, große à Loth	2	—
426.	· · atropurpureo (fusca), braungelbes, neu und prachtvoll	3	—
427.	Valerianella congesta, ſchöne Valerianelle	1	—
428.	Verbena Aubletia, ſchönſtes Eiſenkraut, hübſch	1	6
429.	Viola tricolor grandifl. sulphurea, ſchwefelg. Stiefmütterchen	1	—
430.	· · · nigra, ſchwarzes	1	—
431.	Vicia atropurpurea, ſchwarzrothe Wicke	1	—
432.	Xeranthemum annuum, jährige Papierblume	1	—
433.	· · fl. pl. albo, weiße gefüllte	2	—
434.	· · · rubro, rothe gefüllte	2	—
435.	Ximenesia encelioides, geöhrte Ximeneſie	1	—
436.	Zinnia aurea, goldgelbe Zinnie	1	—
437.	· discolor, entfärbte, neu	1	6
438.	· elegans, ſchönſte Zinnie	1	—
439.	· · fl. albo, weiße	1	—
440.	· · · coccinea, ſcharlachrothe, prachtvoll	6	—
441.	· · · purpurea, purpurrothe, prachtvoll	8	—
442.	· · · grandiflora, großblumige	1	—
443.	· · · multiflora, vielblumige	1	—
444.	· · · verticillata, wirtelblättrige	1	6
445.	Zaegea Leptaurea, goldfarbene Zögea, neu und ſchön	3	—
446.	Ein Sortiment ſchöner Blumenſaamen von 100 Sorten 2 Rthlr.		
447.	· · · · 75 · 1 ·	12	—
448.	· · · · 50 · 1 ·	—	—
449.	· · · · 25 · — ·	14	—
451.	· von 12 der ſchönſten Sorten	15	—
	(Nach meiner Wahl.)		

XII. Stauden- oder perennirende Blumen-Saamen.

Von den mit * bezeichneten Arten liegen die Saamen oft 2 Jahre lang, ehe ſie keimen.

№		à Priſe gr.	pf.
452.	Achillea Eupatorium, Walddoſten-Garbe	1	—
453.	Aconitum Breitenianum. 454. A. cernuum. 455. A. compactum. 456. A. gracile. 457. A. hispidum. 458. A. laxifolium. 459. A. micans. 460. A. neomontanum. 461. A. pyrenaicum. 462. A. orientale. 463. A. squarrosum. einzeln die Priſe	1	—
464.	Ein Sortiment von 10 Sorten	6	—
465.	*Actaea brachypetala, Chriſtophskraut, neu	3	—
466.	* · racemosa, traubenblüthiges	3	—
467.	* · spicata rubra, rothbeeriges, hübſch	2	—
468.	Adenophora stylosa, Keulenglöckchen	2	—
469.	· denticulata, gezähntes	2	-
470.	· suaveolens, wohlriechendes	2	—
471.	Agrimonia taurica, tauriſcher Odermennig	1	—
472.	Althea rosea fl. pl., gefüllte Wintermalven	1	—
473.	· · Ein Sortiment von 20 Sorten	12	—
474.	· chinensis fl. pl., gefüllte chineſiſche Malve	1	—
475.	Ammobium alatum, geflügelte Ammobie, ſchöne Immortelle	1	6
476.	Amsonia latifolia, breitblättrige Amſonie	2	—
477.	· salicifolia, weidenblättrige	2	—
478.	Anchusa italica, italieniſche Ochſenzunge	1	—
479.	Anthericum Liliago, Zaunlilie	1	—
480.	Antirrhinum majus fl. albo, weißes Löwenmaul, ſchön	1	6
481.	· · bicolor, weiß mit rothen Lippen, ſchön	1	—
482.	Aquilegia atropurpurea, ſchwarzpurpurrothe Akelei	1	—
483.	· canadensis, kanadiſche	2	—
484.	· · elatior, hohe, neue	2	—
485.	· hybrida, Baſtard-	1	6
486.	· vulgaris fl. pl. gefülltes, in 6 Farben	1	—
487.	· · stellata rubra, rothes, ſternförmiges, ſchön	1	—
488.	· · · striata, ſchön geſtreiftes	1	—
489.	· sibirica, ſibiriſche	1	6
490.	· speciosa, ſchöne	1	6
491.	· viridiflora, grünblühendes	1	—
492.	Apocynum androsaemifolium, Mückenfänger	2	—
493.	*Aristolochia Sipho, nordamerikaniſche Oſterluzey, rankend	2	—
494.	Asclepias incarnata, fleiſchrothe Seidenpflanze	1	—
495.	Astragalus alopecuroides, fuchsſchw. Tragant, ſchön	1	6
496.	· maximus, größter	2	—
497.	*Baptisia australis, ſüdliche Baptiſie	1	—
498.	* · carnea, fleiſchfarbene	2	—
499.	* · exaltata, hohe, neue, ſchöne	1	—
500.	Bubon cuneifolium, Bubon	2	—
501.	Campanula glomerata, knaulblättrige Glockenblume	1	—

№			à Stück gr.	pf.
876.	♄ w.	Passiflora kermesina, karmoiſinrothe	3	—
877.	- -	racemosa, traubenblüthige	3	—
878.	- -	princeps-coerulea, blaue fürſtliche	3	—
879.	♄ k.	Hennemannia fumariaefolia, erdrauchbl. Hennemannie à 3 Körner	4	—
880.	♃ k.	Primula chinensis, chineſiſche Primel	2	—
881.	♄ k.	Psoralea bituminosa, harzige Pſoralea	2	—
882.	- -	pinnata, gefiederte	2	—
883.	- w.	Pavonia hastata, ſpießblättrige Pavonie	2	—
884.	- k.	Protea cordata, herzblättriger Silberbaum . 2 Korn	3	—
885.	- -	grandiflora, großblumiger	3	—
886.	♂ ⊙	Podolepis gracilis, ſchlanke Podolepis	4	—
887.	♄ w.	Phyllanthus juglandifolia, wallnußblättriges	2	—
888.	♄ k.	Rhododendron catawbiense, ſchöne Alpenroſe	3	—
889.	- -	„ ferrugineum, roſtfarbene	2	—
890.	- -	„ maximum, größte	2	—
891.	- -	„ ponticum, pontiſche	2	—
892.	- -	„ roseum, roſenfarbene	3	—
893.	♃ w.	Renealmia pulchella, ſchöne Renealmie	4	—
894.	♂ ⊙	Salpiglossis atropurpurea, ſchwarzrothe Salpigloſſe,	4	—
895.	- -	„ in 6 Farben unter einander	6	—
896.	⊙ w.	Solanum Melongena, eiförmiger Nachtſchatten	1	—
897.	- -	Spermacoce rubra, rother Zahnwirbel	1	—
898.	♃ -	Stapelia variegata, bunte Stapelie	1	6
899.	♄ k.	Thuja orientalis, morgenländiſcher Lebensbaum	2	—
900.	- w.	Thunbergia fragrans, wohlriechende Thunbergie, ſchöne Schlingpflanze . 1 K.	3	—
901.	♃ k.	Trachelium coeruleum, blaues Halskraut	1	6
902.	⊙ -	Trachymene coerulea, blaue Trachymene, prachtvoll	3	—
903.	♄ ⊙ k.	Verbena Aubletia, ſchönes Eiſenkraut	1	6
904.	- k. *	Yucca filamentosa, fädiger	2	—
905.		Ein Sortiment Topf-Blumenſaamen in 100 Sorten 3 Rthlr.	12	—
906.		„ „ „ „ 50 „ 1 „	18	—
907.		„ „ „ „ 25 „ 1 „	—	—
908.		„ „ „ „ 25 „ der ſchönſten 1 „	12	—
909.		„ „ „ „ 12 der ſchönſten S.	16	—

XIV. Blumenzwiebeln und Knollen.

910.	Amaryllis formosissima	1 Stück	2	—
911	„ vittata	1 „	16	—
912	Begonia discolor	1 „	8	—
913.	Cyclamen europaeum	1 Stück		
914	„ persicum	1 „		
915.	Cyrilla pulchella	6 „		
916.	Didymocarpus Rhexii	1 „		
917.	Ferraria tigridia	1 „		
918.	Gloxinia formosa	1 „		
919.	„ Schottii	1 „		
920.	Lachenalia luteola	1 „		
921.	„ tricolor	1 „		
922.	Tazetten, holländiſche gefüllte	100 Stück	2 Rthlr.	
923.	Ranunkeln, von allen Farben	100 „	1 „	
924.	„ gefüllte deutſche	100 „	— „	
925.	Tuberoſen, gefüllte tragbare à St. 1 gr. 3 pf.	12 Stück		
926.	Ananas-Kartoffeln	6 „		
927.	Mandel-Kartoffeln	25 „		
928.	Ein Sortiment Saat-Kartoffeln von 36 bis 40 Sorten mit Namen à 1 bis 6 Stück			

XV. Verſchiedene Pflanzen.

929.	12 Stück	ſchöne Luicker Aurikeln			
930.	12 „	ſchöne engliſche Primeln			
931.	12 „	ſehr ſchöne Topfnelken mit Namen		1 Rthlr.	
932.	12 „	Viola matronalis, weiß gefüllt		— „	
933.	12 „	„ „ blau gefüllte		— „	
934.	12 „	gefüllte Maßlieben, Bellis perennis		— „	
935.	12 „	gefüllte Leberblumen		— „	
936.	25 „	neue prachtv. Calceolarien in 25 Sorten		12 „	
937.	12 „	„ „ „	„ 12 „	4 „	
938.	6 „	gefüllte Camellien	„ 8 „	5 „	
939.	12 „	ſchöne Cactus-Arten	„ 12 „	8 „	
940.	8 „	ſchöne Fuchſien	„ 8 „	2 „	
941.	12 „	ſch. Pelargonien, großbl.	„ 12 „	2 „	
942.	25 „	„ „ „	„ 25 „	5 „	
943.	12 „	Rosa semperfl. Noiset & Thea in 12 S.		3 „	
944.	12 „	ſchöne Landroſen . . in 12 Sorten		4 „	
945.	12 „	„ „ Pimpinellbl. 12 „		2 „	12
946.	50 „	perennirende Landpflanzen in 50 ſchönen S.		4 „	
947.	25 „	ſchöne kalte Hauspflanzen	„ 25 „	4 „	
948.	25 „	„ warme „	„ 25 „	4 „	
949.	60 „	dreijährige Spargelpflanzen		— „	12
950.	12 „	gefüllte Landnelken		— „	

Verzeichniß

von

ſehr ſchönen und ſtarkgefüllten Georginen

welche

in den Monaten April und Mai in geſunden Knollen abgegeben werden.

A. Mittelhohe und hochwachſende.

№		à Stück gr.
1.	Eclipse, ſcharlachrothe, großblumige	6
2.	Rosea speciosa, ſchöne Roſe	8
3.	Comet, ſchwarzroth	16
4.	Comte de Bourroy, ſcharlachrothe, extra	24
5.	Aurea plenissima, goldgelb, ſchön	4
6.	rubra formosa, glänzendroth	6
7.	Zulme, roſa mit Purpur-Bandſtreifen	12
8.	Soulange Bodin, prachtvoll ſcharlach	8
9.	Soleil d'or, orange und gelb, ſchön	10
10.	Anna Maria, weiß mit lilla Spitzen	12
11.	Kitaibel, dunkelpurpur	10
12.	Sup. Rühr, violett-purpur, ſchön	6
13.	turpinoin nigra, ſchwarzbraun, extra	24
14.	Henriette Wilhelmine, Purpur mit weißen Streifen, ſchön	8
17.	Anna Paulowna, weiß mit lilla Streifen	12
18.	violacea speciosa, violett, ſchön	4
20.	la brunette noir, ſchöne Brunette	8
21.	Sublime, ſchön lilla	10
23.	Collinis perfecta, purpur-violett, ſchön	16
24.	aurantiaca rubra, feurig-roth	12
28.	Göthe, braun, ſchön	8
29.	Magnus, braungelb, großblumig	6
31.	sulphurea elegans, ſchön ſchwefelgelb	6
32.	Africana, braun-violett	8
33.	Clemens, lilla, ſchön	8
34.	sulphurea palida, blaßſchwefelgelb	6
35.	Coronado, braun, ſchön	16
36.	Charles Pienet, ponceau	8
38.	Maudurin, orangeroth	10
39.	Uhl, ſammetkarmeiſin, ſchön	12
40.	Diadem, ſchön	10
43.	Archiduc Louis, karmin-purpur	10
44.	Dorichen, chamois	10
45.	Schwan, weiß,	16
46.	Beauty of Hartford, ſammetroth	12
47.	Josephe, ponceau-karmin	12
48.	Nivalis, weiß mit lilla	12
50.	Mollis, weiß mit violett, extra	12
51.	Lindleyana, ſammetroth	12
52.	Bonum Lisetta, weiß	8
53.	Matador, purpur, ſchön	8
54.	Socrates, braunroth, großblumig	8
55.	atropurpurea multiflora, vielblumig	8
56.	Romeo, ſammetponceau	12
57.	Beauty of England, extra	1
58.	Villain, ſchwefelgelb	6
59.	Zamor, faſt ſchwarz	12
60.	conspicua	8
61.	Isabelle, hoch orangegelb	8
62.	d'or brillante, zitronengelb	6
63.	lilacina grandiflora	4
67.	Milynsky, roſenroth	4
68.	Royal sowereyn, karmoiſin	12
69,	Rosalinde, weiß, mit lilla umſchloſſen	10
70.	Duc d'Orléans	12
73.	Anna, rein weiß	8
74.	Martinet, ſchwefelgelb	8
75.	aurantiaca rubicunda, ſchön orangenroth	1
76.	Montain of Snow, ſchneeweiß, prachtvoll	18
77.	sulphurea unica, einzige ſchwefelgelb	8
79.	Leopard, ſcharlach mit goldfarbenen Streifen	18
80.	Violacea striata, violett, mit breiten weißen Streifen	18
81.	Chamaeleon, purpurfarbig, extra	24
82.	Duchesse of Kent, lilla, mit roſa und weiß, ſchön	24
83.	Turban scarlet, prächtig lebhaft ſcharlach	18
84.	Roi des blancs, rein weiß	24
85.	Rosalvira, ſchön roſa mit weiß	11
86.	Coelestis, prächtig roſa	16
87.	Langley's pourple, prächtig violett	11
88.	Sultan, karmoiſin, ſchön	16
89.	Cormenos, tief ſammetbraunroth, innen ſchwarzpurpur	11
90.	Schwetluna, prächtig lebhaft naſturzienfarbe	16
91.	Bijoux de Parade, prächtig dunkel chamois	12

B. Anemonenblüthige.

1.	Flammende Lachsfarbe, ſchön	16
2.	Globe, Blood red, blutrothe	12
3.	„ Crimson bonnet, ſchwarzpurpur	16
4.	dark red, ſchön blutrothe	20
5.	atrosanguinea, dunkelblutrothe	12
6.	fulgida, ſcharlachrothe	12
7.	tricuspidata, dunkelkarminroth	16
8.	Frühe Blutrothe	20
9.	Globe Crimson, hellſcharlach	16
10.	Bemalte Dame, lilla	20
11.	atropurpurea, ſchön	16
12.	Globe blood red tal., blutroth, heller	13
13.	monstrosa, ſchwärzlich	16
14.	feathered light crimson, gefiederte	16
15.	rosea, lilla-roſa	12
16.	Ariadne, helleiſenroth	12
18.	purpurea elegans, ſchön purpur	12
19.	Brown, karminbraune	12
20.	large Pink, große leuchtende	16
21.	spectabilis, große karminrothe	12

C. Niedrig wachſende oder Zwerg-Georginen.

1.	Airolna, hellroth	12
2.	Corina, granatbraun	8
3.	Buff dwarf, fleiſchfarben mit roth	8
5.	Thusnelde, lilla, vielblumig	12
6.	La vestale, rein weiß	24
7.	Selecta, ſchwarzpurpur	12
8.	pulchella, roth	8
9.	Manilula, karmoiſin in braun	16
10.	Vesuvius, faſt ſchwarz, ſchön	16
11.	pumila, lilla, ſchön	12
12.	Neue Roſe, purpur, ſchön	12
13.	mutabilis, dunkelpurpur	12
14.	Armula, ſchwarzbraun, extra	12
15.	sulphurea superbissima, ſchwefelgelb, ſchön	16
17.	„ minima, kleine ringelgelbe, extra	16
18.	Squibs, gelbe, ſchön	12
19.	Alexandria victoria, purpur	12
20.	fulgida nana, leuchtende	12
22.	Cardinal, ſammetkarmin	24
23.	Palla, purpurviolett	18
24.	Damus, violett, vielblumig	10
25.	orange multiflora, vielblumig	10
26.	Pygmaea, ſchön orangefarbig	16
27.	Marjolin, prächtig granatpurpur	16
28.	Albinia, weiß, vielblumig	16

Von verſchiedenen Georginen ſind folgende Sortimente nach meiner Wahl abzulaſſen, als:

	Rthlr.	gr.
Ein Sortiment gefüllte Georginen von 25 Sorten	6 Rthlr.	—
„ „ „ „ 12 „	2 „	—
„ „ „ „ 12 „ beſſere	3 „	—
„ „ „ „ 12 „ Prachtblumen	6 „	—
„ anemonenblüthige Georginen von 12 ſchönen Sorten	3 „	12
„ niedrig wachſende oder Zwerg	5 „	—

Blumen- und Gartenfreunde, welche mich auf dieſe hier vorkommende Gegenſtände mit Ihren ſchätzbaren Aufträgen beehren wollen, werden erſucht, Ihre gefälligen Beſtellungen baldmöglichſt eingehen zu laſſen, damit ich im Stande bin, jeden meiner reſpectiven Abnehmer nach Wunſch bedienen zu können.

Zugleich muß ich bitten, alle Briefe und den Betrag für das Verlangte franco einzuſenden. Aufträge ohne Rimeſſe oder baare Zahlung werden unausgeführt zurückgelegt: doch ſind hiervon meine alten bewährten Handelsfreunde billig ausgenommen.

Auch ſtehen über eine Auswahl ſchönblühender und mitunter neuer Staudengewächſe ſowohl, als über meine abzugebenden Topfpflanzen, worunter ſich ein Sortiment ganz neuer und prachtvoller Calceolarien und mehrere andere ſchöne Pflanzen auszeichnen, Verzeichniſſe auf portofreie Briefe zu Dienſten.

Erfurt, im December 1832.

Wilhelm Leſer.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben
von
Friedrich Häßler
in Weißenſee (Thüringen).

Stolzen biet' ich Hahnenkämme,
Armen biet' ich Münzen an,
Stachelbeer' den Rezenſenten,
Den Soldaten Löwenzahn,
Ringelblumen den Schmarotzern,
Tulpen jeden dummen Wicht,
Immortellen meinen Freunden,
Liebchen ein Vergißmeinnicht.

Caſtelli.

Siebenter Jahrgang.

1 8 3 4.

Weißenſee in Thüringen,
gedruckt und verlegt bei Fr. Häßler.

Inhalts-Verzeichniß
der
Blumen-Zeitung.

Siebenter Jahrgang. 1834.

I. Beſchriebene Pflanzen.

Acacia verniciflua. pag. 101.
Agrostemma pyrenaica. 117.
Alstroemeria aurantiaca. 133.
Amelanchier florida. 45.
Arabis rosea. 45.
Begonia sanguinea. 154.
Berberis buxifolia. 79.
Bletia hyacinthina. 141.
Budleya madagascarensis. 187.
Burtonia conferta. 46.
Caladium odoratum. 175.
Calampelis scaber. 71.
Calandrinia speciosa. 53.
Calceolaria. 147. 155. 163.
„ crenatiflora. 126.
„ elegans. 68.
„ viscosissima. 133.
Calliprora lutea. 85.
Camellia reticulata. 206.
Catasetum trifidum. 141.
Cereus lateritius. 45.
„ speciosissimus. 168.
Chorizema spartioides. 95.
Chrysanthemum carinatum flore luteo. 199.
Cirrhoea viridipurpurea. 151.
Clarkia elegans. 177.
„ pulchell. fl. albo. 175.
Costus pictus. 84.
Crocus lacteus. 85.
Cuphea silenoides. 162.
Cyrtanthus angustifolius. 26.
„ spiralis. 94.
Dracophyllum secundum. 117.
Dendrobium pulchellum. 85.
Eccremocarpus scaber. 71.
Elichrysum bracteatum fl. albo. 199.
Epacris campanulata et alba. 62.
„ ceraeflora. 62.
„ grandiflora. 153.
Erica canthariformis. 133.
„ quadrata. 53.
Geissomeria longiflora. 174.
Gesneria Douglasii. 63.
Gompholobium tenue. pag. 95.
Helianthemum vulg. fl. fusco pl. 58.
„ „ venustum. 50.
Heliophila araboides. 76.
Hibiscus mutabilis fl. pl. 190.
Hypoxis ramosa. 85.
Jasminum heterophyllum. 207.
Ismene calathinum. 137.
Justitia speciosa. 18.
Lebretonia coccinea. 182.
Leucopogon richei. 63.
Lilium speciosum. 159.
Limnocharis Humboldtii. 85.
Lobelia coronopifolia. 19.
Lonicera Goldii. 49.
Lophospermum Rhodochiton. 185.
„ scandens. 10.
Lupinus rivularis. 53.
Lychnis Flos cuculi, variegata nana plena. 190.
Magnolia Soulangeana. 141.
Malope grandiflora. 199.
Malva umbellata. 126.
Mimulus moschatus. 58.
„ quinquevulnerus. 154.
„ roseus. 68. 165.
„ variegatus. 3.
Nemophila aurita. 68.
Nicotiana persica. 79.
Oenothera densiflora. 45.
Opuntia aurantiaca. 94.
Orobus aureus. 95.
Oxalis brasiliensis. 101.
„ crenata. 101.
Oxilobium pultenaea. 46.
Paeonia papaveracea semiplena. 182.
Pancratium calathinum. 137.
Passiflora phoenicea. 109.
Pelargonien, die neueſten deutſchen Urſprungs. 17. 25. 33. 41. 49. 57. 196. 204.
Phlox crassifolia. 202.
Pimelia hispida. 141.
„ sylvestris. 151.
Platicodon grandiflorus. 126.
Platilobium Murrayanum. 95.
„ obtusangulum. 95.

Primula amoena. pag. 63.
Pultanaea subumbellata. 46.
Rhodochiton volubile. 185.
Rhododendron alta-clerense. 168.
„ campanulatum. 53.
Rosa Véléda. 1.
„ Brennus. 1.
„ belgiſche Violette. 1.
„ Victor Hugo. 9. 168.
„ Legouve. 9.
„ Francisca de Foix. 9.
„ mit mooſigen Zweigen. 19.
„ Nois. Desprez. 19. 141.
„ mit gebogenen Blumenſtielen. 19.
„ Le désespoir de amateurs. 38.
„ Angelina. 44.
„ Antoinette d'Orjo. 44.
„ Irma. 45.
„ Elvire. 45.
„ Victoire Girandon. 45.
„ Eponine. 45.
„ Etoile polaire. 94.
„ Eleonore Bouillard. 94.
„ stellaris. 94.
„ Eleonore Desmonts. 94.
„ Pauline Lesourt. 94.
„ Bengale Aine. 94.
„ Augustine Fauvel. 100.
„ „ Hersent. 101.
„ Clementine Wallet. 101.
„ Delphine Bernard. 101.
„ Madame Desmonts. 101.
„ „ Bureau. 108.
„ Julienne Lesourt. 108.
„ Emilie Lesourt. 108.
„ Grandidier. 109.
„ Eugène Pirolle. 117.
„ Aglae Loth. 118.
„ Dahlinghen. 118.
„ Adele Bernard. 118.
„ Astarode. 125.
„ Edouard van Rullen. 125.
„ General Christiani. 126.
„ mutabilis. 126.
„ microphylla alba odorata. 133.
„ Noisette Desprez. 141.
„ General Valazé. 159.
„ Iphigenia. 159.
„ hybride Dubourg. 159.
„ Imperatrice Josephine. 159.
„ Belle Marie. 159.
„ multiflora Laure Davoust. 162.
„ Noisette jaune mutabilis. 167.
„ Anthelmine. 167.
„ Carré de Boisgelin. 168.
„ Bouquet blanc. 168.
„ Helvetius. 175.
„ Belle d'Yèbles. 175.
„ cent-feuilles d'Yèbles. 175.
Rosa Noisette Lamarque. pag. 182.
„ „ la Biche. 182.
„ Hippocrate. 190.
„ Eugène Barbier. 191.
„ Daubenton. 191.
„ Newton. 199.
„ Lucie la Grange. 199.
„ la pourpre Romaine. 200.
„ Doct. Galès. 207.
„ Pauline la Grange. 207.
„ Felicie la Grange. 207.
Salpiglossis linearis. 117.
Schizanthus retusus. 193.
Solanum crispum. 101.
„ ligustrinum. 133.
Styphelia tubiflora. 62.
Trillium erectum viridiflorum. 85.
Tropaeolum maj. atrosanguineum. 151.

II. Culturangaben, Culturverſuche, Anfragen und Antworten im Bezug auf dieſen Gegenſtand.

Anfrage: den Enkianthus quinqueflorus zur Blüthe zu bringen. 5.
Beantwortet. 28.
Anfragen, drei, an Blumenfreunde. 22.
Anfrage: das Treiben der Hyazinthenzwiebeln auf ungelöſchtem Kalk. 173.
Beantwortet. 189.
Anfrage: Hortenſien blaublühend zu machen. 205.
Befruchtung, künſtliche, der Nelken in Töpfen. 171.
Bemerkungen über Lupinus mutabilis und Lupinus Cruickschankii. 6.
Bemerkungen über Rhododendrum arbor. und zwei neue Varietäten deſſelben. 67. 76. 109. 125.
Bemerkungen zu dem Aufſatze: Centifolien-Roſen bis in den Herbſt im Garten zu haben. 99.
Bemerkungen über Prunus Lauro-cerasus. 166. 193. 202.
Blumenbefruchtung, über. 2. 59.
Blumentreiberei, zur. 184.
Cacten, gegenſeitige Befruchtung derſelben. 166.
Camellien, Gedeihen und Pflege derſelben im freien Lande. 164. 171.
Chrysanthemum indicum, über die Pflege deſſelben. 156.
Cultur der Tulpenzwiebeln. 4.
Cultur ꝛc. der holzartigen Päonien zu Paris. 5. 13. 29. 52. 62. 67. 79.
Cultur der Camellien und ihrer Varietäten. 36. 42.
Cultur der Daphne odora. 65. 73. 81. 89.
Cultur des Cactus serpentinus. 198.
Cultur der Phaseolus Caracalla. 199.
Cultur exotiſcher Waſſerpflanzen im Freien. 208.
Erziehung der Eriken, Rhododendren, Melaleuken aus Samen. 3. 21. 27. 34. 51. 91. 150.

Gedeihen, das, der Topfgewächſe im freien Lande. pag. 140.
Georginen, Mittheilungen darüber, 37.
Houstonia coccin., über. 105.
Hyazinthen, über das mehrmalige Treiben derſelben zur Winterflor. 34.
Hyazinthen, Behandlung derſelben in Töpfen. 203.
Hyazinthen, deren Behandlung zum Treiben. Extrablatt zu Nr. 19.
Levkojenzucht, einiges über. 74.
Methode, die Mimulus-Arten leicht zu vermehren. 93.
Nelkenfreunde, für. 21.
Nelkenzucht, meine. 59. 66. 75. 82.
„ Beitrag zu den Erfahrungen darüber. 114.
Pelargonien, über das Pfropfen, Oculiren und Copuliren derſelben. 132.
Pfropfen, das, auf das grüne Holz. 22.
Roſen, blühende Centifolien-, bis in den Herbſt im Garten zu haben. 60.
Roſenflor, Centifolen-, über die künſtliche Verſpätung derſelben. 116.
Roſen, das Beſchneiden derſelben. 189.
Sträucher, zärtliche, gegen das Erfrieren zu ſchützen. 208.
Umſetzen, über das, der Topfgewächſe. 12. 20. 27.
Verfahren bei der künſtlichen Befruchtung der Pelargonien. 97. 106.
Verfahren, ſicheres, im Juli, Auguſt und September noch blühende Roſen zu haben. 100.
Verſuche, zwei, über die Wirkung des Knochenmehls. 11.

III. Allgemeine Gegenſtände für Blumiſtik und Gartenweſen.

Anfragen und Antworten, blauen Oleander betrffd. 100. 151. 173. 198. 205.
Anfragen. 179. 188. 195. 201.
Anſichten eines deutſchen Botanikers über die Syſteme. 140. 150.
Antworten auf die Anfragen in Nr. 23 d. Blztg. 1823. 21. 28. 60. 61. 78. 84.
Aufforderung zu einer Actien-Geſellſchaft, die Cultur der Roſen betreffend. 35.
Aurikel. 167. 174. 181. 191.
Befruchtung der Pflanzen, Verſuche darüber. 206.
Beitrag zur Kenntniß der Spielarten des Rhododendrum indicum. 161. 169.
Bekleidung der Lauben mit Epheu. 100.
Blumenbeete, Einfaſſung derſelben mit Primula farinosa. 52.
Cacten, Beſtimmung und Anordnung derſelben. 121. 129. 138.
Cacten, über. 145.
Eintheilung, neue, der chineſiſchen Chryſanthemen-Arten. 180. 187. 197. 204.
Erwiederung auf eine Anfrage. pag. 50.
Georginen, Claſſification der. 93.
Merkwürdige Erſcheinung an einem Roſenſtocke. 178.
Mittel gegen Mehlthau. 48.
Mittel, über angeprieſene, zur Vertilgung des Unkrauts. 83.
Namenhölzer, über die. 36. 43.
Namen, ſyſtematiſche, der merkwürdigſten Pflanzen ꝛc. (Fortſetzung.) 13. 22. 61. 77. 92. 110. 158. 172. von Ammi bis Anona.
Oxalis crenata, Nachricht über. 194.
Pelargonien, über die Benennung der. 90. 107.
Pflanzen-Etiquetts. 77.
Roſinen als Mittel zur Erhaltung der Keimkraft der Samen. 136.
Skizze von einigen engliſchen Gärten. 46. 54. 63. 68. 79. 85. 102.
Strohdecken, vom Verfertigen derſelben. Beilage zu Nr. 25.
Tauſchanerbieten. 179. 188. 195. 201.
Vegetation, merkwürdige, im vergangenen Winter. 43.
Wie befriedigt man ſeinen Bedarf an Blumenſamen? 115. 123. 131. 139.

IV. Varietäten.

Abſtammung einiger Blumen. 64.
Antheum, das, zu Brigthon. 32.
Aurikelflor in Weißenſee. 70.
Beitrag zur Pflanzen-Geographie. 88.
Bemerkungen, blumiſtiſche. 4. 108. 122. 130. 148. 157. 165. 205.
Bemerkungen über Hibisc. rosa sinensis. 37.
Bemerkungen über einen Roſenſämling. 91.
Bekanntmachung der Levkojen-Caſtration in Frankreich. 208.
Berichtigungen. 32. 48. 72. 88. 176. 200.
Blick in den Jardin des Plantes zu Paris. 197.
Camellien-Verkauf in Petersburg. 200.
Compoſition des Herrn Cantor Schüler in Suhl. 32.
Curioſum. 8.
Einiges über Dresden's Gärten. 116. 124. 131. 138. 149.
Electriſches Leuchten mehrerer Blumenarten. Extra blatt zu Nr. 19.
Entſtehung der königlichen Orangerie im Zwinger zu Dresden. 88.
Friede in der Blumenwelt. 120.
Gartenbau in Nordamerika. 48.
Gartenbau-Geſellſchaft zu Birmingham. 72.
Geſuch und Empfehlung. 15.
Lophospermum scandens. 172.
Nachricht für Blumenfreunde. 166.

Notizen, blumiſtiſche, aus
- Antwerpen. 127. 142. Extrablatt zu Nr. 19.
- Augsburg. 8.
- Berlin. In allen Numern.
- Bibra. 32. 48.
- Bollwiller. 112. 183.
- Brüſſel. 7. 14. 96. 135.
- Cölleda. 8.
- Dresden. 7. 47. 183.
- Duisburg. 23. 31. 98. 120.
- Eliſens-Ruhe bei Dresden. 70.
- Erfurt. 136. 184.
- Frankfurt a. M. 152. 192.
- Gattendorf bei Hof. 56.
- Gent. 103. 134. 143. Extrabl. zu Nr. 19. 191.
- Gotha. 88. 104. 128. 135. 143.
- Italien. 15.
- Langenſalza. 88.
- Leipzig. 104. 112.
- Lille. 135. Extrablatt zu Nr. 19.
- Löwen. 15. 32.
- London. 7. 14. 23. 39. 71. 120.
- München. 7. 14. 32. 40. 71. 104.
- Nancy. 119.
- Oldenburg. 8. 23. 143. 200.
- Paris. 7. 96. 118.
- Petersburg. 6. 22. 80.
- Poſen. 31. 39.
- Tonndorf. 15. 200.
- Torgau. 31.
- Weimar. 8. 47. 69. 88. 120. 208.
- Wien. 7. 30. 55. 71. 80. 87. 112. 134. 139. 152. 183.

Pflanzenhändler, über herumziehende: 28. 173. 181.
Rosa perpetuosissima, über. 182.
Schizanthus humilis, über. 172.
Temperatur-Veränderungen. 175.
Tod des Herrn Beyrich. 192.
Ueberwinterung von Eccremocarp. scab. im Freien. 200.
Vermehrung der Amaryll. form. 206.
Verzeichniß mehrerer immer grün bleibenden Pflanzen. 64.
Zoophyt in Granada. 176.

V. Bibliographie über Blumiſtik.

Booth, James, und Söhne, gegen Prof. Lehmann. 40.
" " Erwiederungen. 48.
Dietrich, Dr. F. G., neuer Nachtrag zum vollſtändigen Lexikon der Gärtnerei ꝛc. 16.
Dietrich, Dr. F. G., Lexikon der Gärtnerei und Botanik. 16.
Gerhard, W., zur Geſchichte, Cultur und Claſſification der Georginen oder Dahlien. 184.
Klier und Trattinnick, neue Arten Pelargonien deutſchen Urſprungs. 24.
Reider, J. E. v., Annalen der Blumiſterei 9r Jahrgang. 104.
Reider, J. E. v., vollſtändige Anleitung zur Erziehung, Wartung und Vermehrung des Oleanders ꝛc. ꝛc. 176.
Reider, J. E. v., der ſchnell unterrichtende Botaniker und Blumiſt. 192.
Ritter, T., die künſtliche Treiberei der Früchte, Gemüſe und Blumen ꝛc. 160.
Rupprecht, J. B., über das *Chrysanthemum indicum* ꝛc. 143.

Der jährliche Pränumerationspreis der Blumenzeitung iſt 1 Thlr. 5 Sgr. 9 Pf. Alle Wohllöbl. Poſt-Aemter, Zeitungs-Exped. und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen darauf an. Für Letztere hat die Eupel'ſche Hofbuchhandlung zu Sondershauſen die Commiſſion ubernommen.

Der Porto-Anſatz für die Blumenzeitung beträgt jährlich nur 5 Sgr. 9 Pf. (4 gGr. 6 Pf.), und wird dieſelbe daher für 1 Thlr. 5 Sgr. 9 Pf. (4 gGr. 6 Pf.) jährlich mittelſt Reitpoſt in poſttäglicher Lieferung frei durch ganz Preußen verſendet.

Blumen-Zeitung.

Herausgegeben und verlegt von Friedrich Häßler.

No. I. Weißenſee, (in Thüringen). Januar 1834. VII. Jahrg.

Beſchreibung neuer Roſen.

(Mitgetheilt von Hrn. **Wilhelm Keller** in **Duisburg** am Rhein, woher ſolche auch zu beſtimmten Preiſen, welche auf portofreie Briefe angezeigt werden, zu beziehen ſind.)

Véléda. Roſe von der Inſel Bourbon, ſie iſt perpetuell. Holz, Stacheln und Blätter wie die mehrſten Varietäten ihrer Art. Blumenſtiele rauh drüſig, faſt immer einzelnſtehend, wenigſtens auf den ſchwachen Zweigen; nur auf der Spitze der kräftigen Zweige befinden ſie ſich zu zwei bis zehn vereinigt wie bei dem Typus der Art. Fruchtknoten glatt, länglich kreiſelförmig. Kelchſpitzen pfriemenförmig oder beblättert, mit rauhen Erhabenheiten und geſtielten Drüſen ſtark beſetzt. Ovale, kegelförmige, anfangs dunkelrothe, nachher roſenrothe Knospen. Die Blumen 27 bis 36 Linien breit, gefüllt oder beinahe gefüllt, ziemlich regelmäßig, ſind anfangs blaßroſenroth, nachher fleiſchfarbig, beſonders in der Umgebung. Aeußere Blumenblätter groß, breit, zugerundet, ganz oder ein wenig an der Spitze ausgeſchweift; anfangs hohl, nachher hocherhaben durch das Zurückbiegen des obern Randes. Die innern ſind kleiner, ganz, eiförmig; jene des Centrums ſind oft in der Länge gefaltet. Kurze weiße Staubfäden mit gelben Staubbeuteln. Zahlreiche hervorſtehende Griffel von der Länge der Staubfäden. Die Blumen dieſer Roſe haben nicht die Vollkommenheit der neuen Varietät, genannt Madame Desprez, aber ſie blühen leichter fortwährend.

Brennus. Bengaliſche Hybride. Kräftiger Strauch von einem ſchönen Anſehn. Große Blätter von einem angenehmen Grün. Dicke, aufrechtſtehende mit Drüſen beſäete Blumenſtiele. Glatter, kurzer, ovaler, an der Baſis birnförmiger Fruchtknoten. Glatte Kelchſpitzen, drei haben Anſätze und ſind mit Drüſen beſetzt. Knospe oval. Blume 3 bis 4 1/4 Zoll breit, gefüllt, regelmäßig, wenig gewölbt; lebhaft und ſehr glänzend carmin- oder carmoiſinroth, von einer ganz gleichen Farbe über die ganze Oberfläche der Blumenkrone, 90 bis 130 große, dicke, ganze Blumenblätter.

Dieſe prächtige Varietät hat einen kräftigen Wuchs, bringt eine Menge Blumen hervor, die ſich leicht öffnen, und deren glänzendes Colorit ſeinen Glanz in der Sonne behält.

Es iſt eine von den koſtbaren Eroberungen, welche das Privilegium haben, viele bis jetzt für ſchön gehaltene Varietäten verſchwinden zu machen.

Die belgische Violette. Bengaliſche Hybride. Ein ſchöner, viele Blumen tragender, mit zahlreichen Stacheln, Borſten und Drüſen beſetzter Strauch. Fünf dunkelgrüne, ovale, lanzettförmige Blättchen. Drüſige Blumenſtiele. Kleiner, ovalkreiſelförmiger, ganz oder nur an ſeiner Baſis drüſiger Fruchtknoten. Drüſige Kelchſpitze, drei haben Anſätze. Prächtige gefüllte, gewölbte, ſehr regelmäßige, drei bis vier Zoll breite, violett ſchieferfarbige, gemiſchte, nachher lilafarbige Blumen. 140 bis 150 flache, am Nagel weiße, in der Mitte roſa purpurröthliche, an der Spitze purpurviolett ſchieferfarbige Blumenblätter. Alle liegen vollkommen dachziegelförmig übereinander.

Dieſe ſchöne Roſe hat die angenehme Form der Rubierin (eine bekannte ſchöne bengaliſche Hybride), wovon ſie ſich durch ihr Colorit und ihre Blätter unterſcheidet.

(Fortſetzung folgt.)

Ueber Blumen-Befruchtung.

(Mitgetheilt von W. **Steiger** aus S.)

Ein in früherer Zeit in der Blumenzeitung erſchienener Aufſatz: „Blumiſtenleid und Troſt" überſchrieben, hat zu manchen Erörterungen geführt, die dem Blumenfreunde höchſt belehrend ſein müſſen, und es iſt zu wünſchen, daß recht oft ſolche Gegenſtände abgehandelt werden möchten. Unter das „Blumiſtenleid" ſei es mir vergönnt, auch ein Vorkommniß zu zählen, welches manchem Freunde der ſchönſten Kinder der Natur oft ſeine aufgewendete Mühe verleidet, und ihn manche ſchöne Pflanze aufzugeben veranlaßt, deren fortgeſetzte Cultur ihm ſpäterhin erſt Genuß gewährt haben würde.

Oft verſchreibt man ſich Samen ſchönblühender, neuer Gewächſe. Die daraus erzogenen Pflanzen geben aber entweder keine Stecklinge, oder tragen ſelten oder gar keinen Samen. So gieng es mir mit der fremdartigen und ausgezeichnet blühenden Thunbergia alata, die in keiner Sammlung fehlen ſollte, da ihre Blume in ihrem Schlunde dem Auge, — freilich nur ſcheinbar — das glänzendſte Sammetſchwarz zeigt, die Pflanze auch ſehr leicht zu ziehen iſt, und fünf bis ſechs Monate lang ſich mit Blüthen bedeckt.

Alle Verſuche, im Stubenfenſter Samen von ihr zu gewinnen, blieben fruchtlos, bis die Natur, die ſicherſte Führerin, mir dazu Anleitung gab.

In vielen Blumen, namentlich in den großblumigen Pelargonien, findet man häufig eine kleine, ſchmale Weſpe (Vespa florisomnis Linn.), welche gewöhnlich ihr Nachtlager in ihnen aufſchlägt. Sie iſt am Abend ſehr träge und läßt ſich regungslos an andere Orte tragen. Dieſer Weſpe bediente ich mich, ſchob die Schlaftrunkene in den Schlund der Blume und verſtopfte dieſen mit etwas Baumwolle oder einer andern leichten Subſtanz. Erſt am folgenden

Morgen, wenn ſchon lange die Sonne auf meine Pflanzen ſchien, befreite ich die Gefangene aus ihrem dunkeln Kerker, und der ſchönſte Erfolg krönte die kleine Mühe. Ich erhielt verſchiedene Samenkapſeln, und brauchte nun für die Erhaltung der alten Stöcke nicht mehr ängſtlich beſorgt zu ſeyn, da die aus Samen erzogenen ſehr bald nach der Ausſaat blühen. (Beſchluß folgt.)

Beſchreibung und Cultur einiger ausgezeichneten neuern Zierpflanzen.

(Mitgetheilt vom Herzogl. Hofgärtner Hrn. J. W. Boſſe in Oldenburg).

(Fortſetzung.)

Mimulus variegatus. *Hort. Paris.* ♃. Buntblumiger Gaukler. Eine ſchöne, neue Art aus Mexiko (?). Die ganze Pflanze iſt glatt, 1 Fuß hoch. Die untern Aeſte liegen auf der Erde und treiben Wurzeln, die blühenden aber ſtehen aufrecht. Die Blätter ſind eirund, ſpitz, ungleich gezähnt, 3- — 5rippig, die untern kurz geſtielt, die obern ſtiellos, und die oberſten ſtengelumfaſſend. Die Blumen erſcheinen zahlreich, ſie ſtehen einzeln in den Blattwinkeln, und ſind ſehr zierlich; die Corolle iſt etwa 1 Zoll lang, eben ſo breit am Saume, die Röhre weiß, und die Randeinſchnitte mit großen violett purpurrothen Flecken geziert, der Schlund und der gelbe, bebartete Gaumen ſind purpurroth punctirt. — Dieſe Art blühet gleich der Mimulus rivularis und auch den ganzen Sommer hindurch, und wird wie die andern perennirenden Arten dieſer Gattung behandelt. Der feine Samen wird im März oder April in einen Topf geſäet, nicht mit Erde bedeckt, ſondern nur ſanft angedrückt und befeuchtet, entweder in ein lauwarmes Miſtbeet, oder auch in ein Glashaus oder Zimmer geſtellt. Die zur Ueberwinterung beſtimmten Pflanzen kann man gleich in lockere, fette Erde in Töpfe ſetzen, die übrigen aber an eine warme Stelle in's Land pflanzen, woſelbſt man ſie jedoch gegen etwa eintretende ſpäte Frühlings-Nachtfröſte durch des Abends übergeſtellte Blumentöpfe ſchützen muß. Die jungen Pflanzen in den Töpfen kann man anfänglich in ein abgetriebenes Miſtbeet unter Fenſter ſtellen, ſie hier reichlich lüften, und wenn ſie blühen, in's Zimmer, in's offene Glashaus oder in's Freie ſtellen. Im Winter bedürfen ſie nur 1° bis 3° Wärme, wenig Waſſer, aber auch einen trocknen, luftigen Standort. (Fortſ. f.)

Ueber die Erziehung der Eriken, Rhododendren, Melaleuken, Metroſideren, u. ſ. w. aus Samen.

Mitgetheilt von P. aus W. (Fortſetzung.)

§. 9. Von großem Intereſſe für den Blumenfreund iſt die Veredlung der Azaleen, Rhododendren und Camellien. Sie gewährt nicht nur großen Vortheil in Hinſicht der Vermehrung und Fortpflanzung dieſer Pflanzen, ſondern ſie verſchafft auch durch das Gedeihen der veredelten Pflänzchen ungemeines Vergnügen. Die Veredlung der Azaleen, Rhododendren und Camellien beſchleunigt deren Blüthe und die Vervollkommnung derſelben.

Zur Veredlung der Rhododendren wähle man als Unterſtämmchen: 1) Rh. ponticum, auf dieſe veredle man ſämmtliche Spielarten deſſelben, als: Rh. pont. album, coccineum, odorum, roseum, carneum ꝛc. ferner Rh. azaloides, catawbiense, dauricum, hybridum ꝛc. 2) Auf Rh. maximum ſämmtliche Spielarten deſſelben, auch Rh. punctatum.

Zur Veredlung der Azaleen nehme man als Unterſtämme A. pontica; auf dieſe laſſen ſich alle Azaleen mit ſehr glücklichem Erfolge veredeln.

Die Veredlung der Camellien geſchieht im Monat März durch Copulation. Zur Unterlage nehme man C. jap. fl. rubr. simp. Die Dicke eines ſchwachen Federkiels iſt für die Unterlagen hinlänglich. Den Schnitt mache man nicht zu lang, 1/2 Zoll iſt hinreichend. Zum Verband nehme man leinenes Band, welches mit Baumwachs getränkt iſt und zwar nur ſo viel, daß die Veredlungsſtelle damit bedeckt iſt; das Band umwickle man alsdann mit Baſt ſo gleichmäßig als möglich. Die veredelten Camellien placire man hierauf in ein Treibbeet, welches nicht mehr warm iſt, ſtelle die Töpfchen auf die Lohe des Beetes und füttere die Zwiſchenräume mit Moos aus. Unumgänglich nöthig ſind zum Gedeihen der veredelten Camellien Decken von Rohr, mit welchen die Fenſter des Beetes ſo lange, bis die Stämmchen treiben, bedeckt werden. Unterläßt man dieſes und ſchützt das Beet nicht vor der Sonne, ſo iſt alle Mühe und Arbeit vergebens. Ich habe dieſes Frühjahr 56 Camellien auf die hier angegebene Weiſe veredelt, welche nicht nur bis auf 4 vollkommen angewachſen ſind, ſondern von denen auch 2, C. pomponica plena und C. alba plena, noch geblüht haben. Sämmtliche Stämmchen haben 6 — 10 Zoll getrieben. Der Verband wird gelüftet, ſobald die Edelreiſer in ſtarkem Triebe ſtehen.

(Fortſetzung folgt.)

Nachträgliches über die Kultur der Tulpenzwiebeln.

Die bereits in Nr. 23, Jahrgang 1832, der Blumen-Zeitung bekannt gemachte Erfahrung in Benutzung der Blumenzwiebeln zum Winterflor auf zwei hinter einander folgende Jahre hat ſich nun auch in dieſem Jahre bei mir bewährt. Ich ließ alle im vorigen Winter angetriebenen Zwiebeln in Töpfen und ohne Anwendung irgend einer Sorgfalt, an einem ſchattigen Winkel des Gartens aufgeſtellt. Zwei Drittel derſelben fingen in den erſten Tagen des Oktober an, wie dies unabgetriebene Zwiebeln thun, Trieb zu zeigen. Nun gab ich ihnen friſche Erde und einen beſſern Standort im Garten. Sie hatten, als ich ſie zu dem erwähnten Zwecke aus den Töpfen nahm, ſchon ſtarke friſche Wurzeln. Die am meiſten verſprechende Zwiebel ſtellte ich, die übrigen kalt ſtehen laſſend, in den erſten Tagen des November im Zimmer am Fenſter auf und am 15. Dezember blühte ſie; es war Bouquet tendre mit zwei vollſtändigen Blüthenſtengeln, ſo ſchön, wie ſie ſich nur im vorigen Jahre gezeigt hatte. — Die übrigen Zwiebeln haben bei einer Temperatur von etwa 3 — 5 Grad Reaumur ſich gleich günſtig entwickelt und ſind, darunter mehrere gefüllte Sorten, gegenwärtig, ohne ſie nur leicht angetrieben zu haben, ſo weit vorgeſchritten, daß ſie in dieſen Tagen zur Blüthe gelangen werden. Nach dieſer Erfahrung glaubt Referent, daß bei einer aufmerkſamen Behandlung der zur Winterflor benutzten Zwiebeln eine nochmalige Flor derſelben ganz allgemein zu erreichen ſteht. Es wäre zu wünſchen, daß auch Andere ſich in dieſer Hinſicht verſuchten und ihre Erfahrungen mittheilen wollten.

Poſen, im Jan. 1834. B.

Blumiſtiſche Bemerkungen.

Wie ſchnell doch manche, kaum erſt nach Europa angelangte Pflanze gemein, ja ſogar zum läſtigen Unkraute wird.

Calandrina adscendens und Collomia grandiflora habe ich zu Tauſenden in meinem Garten ausraufen laſſen müſſen, weil ſie ganze Strecken wie mit einem Pelze überdeckten. Clarkia pulchella ſteht auch ſchon häufig da, wo ſie nicht ſtehen ſoll, d. h. ſie figurirt als Unkraut. Nehme mir die ſchöne Pflanze dieſen fatalen Titel, eine Sonderbarkeit unſerer Sprache — (gleich dem Worte Unkoſten, was eigentlich keine Koſten bedeuten ſollte) — nicht übel!

S... △.

Mit der Befruchtung des gelben oder nacktſtieligen Mohns, Papaver nudicaule mit Papaver Rhoeas, oder ſehr dunkelrothem, ſogenanntem Ranunkelmohn, habe ich ſeit mehreren Jahren vielfältige Verſuche angeſtellt, denſelben theils noch vor dem freiwilligen Aufblühen, (bei dem Gelbwerden der Kelchblätter, bevor deren Trennung erfolgte), theils durch ſehr vorſichtige und genaue Caſtration vorbereitend, befruchtet, aber durchaus ohne Erfolg. Bei einigen aus dem Samen gezogenen Pflanzen ſchien man zwar, beſonders wenn die Blume einige Tage alt war, bei dem einen oder andern Blumenblatte einen verwaſchenen röthlichen Farbenſtreifen wahrzunehmen, allein das Zweifelhafte über dieſe Farbe, ob dieſe mittelſt des Windes, durch Reibung oder Quetſchung hervorgebracht? war nicht zufriedenſtellend.

Schweidnitz, im Dez. 1833. G. A. B.

Anfrage.

Welches iſt die angemeſſenſte Behandlung, den Enkianthus quinqueflorus zur Blüthe zu bringen?

In Belgien und den Niederlanden wird dieſer ſchöne Strauch ſchon längſt mit Glück kultivirt, während ſolcher erſt in der neueſten Zeit im botaniſchen Garten zu Berlin und in dem Gewächshauſe des Hof- und Medizinal-Raths Dr. Kreyſig zu Dresden geblüht hat. Die Pflanze des Hrn. Hofr. Dr. Kreiſig hatte bereits eine Höhe von vier Ellen erreicht, ehe ſie zum erſtenmale blühete. Hiernach ſcheint es, daß erſt vieljährige Pflanzen den Genuß der Flor verſprechen. Steht die Pflanze aber lieber warm, als kalt? — Die Hrn. Booth in Hamburg kultiviren ſie, wie ihr Pflanzenkatalog beweiſt, bei 12 — 15 Grad Wärme; während in Nro. 34 der allgem. Gartenzeitung der Hrn. Otto und Dietrich geſagt iſt, daß ſie in einem Winterkaſten, ohne alle Heizung, ſehr wohl fortkommen dürfte. Ferner: blüht ſie auch ſchon in kleinern Exemplaren?

Poſen im Jan. 1834. B.

Ueber den wirklichen Beſtand, die Cultur und Vermehrung der holzartigen Päonien zu Paris. *)

Von Poiteau.

Bevor ich zur Abhandlung dieſes Gegenſtandes ſelbſt übergehe, muß ich erſt erinnern, daß der franzöſiſche Name, Pivoine, nur ein verändertes Wort von Paeonia iſt. Der letztere Name ſoll, wie Plinius ſagt, von einem Arzte, Namens Paeon, der dieſe Pflanze zuerſt gebrauchte, abſtammen. Indeſſen, da die älteſte uns bekannte Art der Paeonia, urſprünglich in den Gebirgen von Päonien, im nördlichen Macedonien wächſt, ſo iſt es nach Hrn. De Theis Meinung, wahrſcheinlich, daß ſie davon ihren Namen bekommen hat. Hr. Loudon läßt die erſtere Abſtammung gelten, der Bon Jardinier zieht die letztere vor. Der Hortus britannicus von Loudon zählt gegenwärtig 40 Arten oder Spielarten von Päonien mit krautartigem Stengel auf, die ſämmtlich zur Zierde der Gärten dienen. Der Fürſt von Salm-Dyck kultivirt ſie in Dyck bei Cöln alle; er hat in den letzteren Jahren mehrere davon an verſchiedene Gärtnereien in Paris geſchickt. Hr. Soulange Bodin hat vorzüglich eine reichhaltige Sammlung davon bekommen, die er in dem Garten-Inſtitute zu Fromont kultivirt und für den Handel vermehrt, und deren Namen und Beſchreibung bekannt zu machen er ſich vorgenommen hat. Allein mit den krautartigen Päonien will ich mich hier nicht beſchäftigen, meine Abſicht iſt, mich hier nur auf die holzartigen zu beſchränken. (Fortſetzung folgt.)

---

*) Aus der Revue horticole.

Nachträgliche Bemerkungen über Lupinus mutabilis und Lupinus Cruickschanki. *)

Auch der Herr Prof. Hornſchuch, Vorſteher des botaniſchen Gartens zu Greifswald, hält dieſe beiden Lupinen nur für Spielarten einer und derſelben Art, indem im daſigen Garten beide zu wiederholten Malen aus dem Samen von L. mutabilis gezogen wurden. Ganz derſelbe Fall iſt es, ſagt Hr. Prof. Hornſchuch (in Nr. 43 der Berliner allgem. Gartenzeitung), mit Papaver orientale L. und Papaver bracteatum Lindl.; Samen des letztern lieferte Pflanzen, welche in jeder Hinſicht alle Uebergänge von P. bracteatum bis zu P. orientale darſtellten.

---

*) Siehe Nr. 5 und Nr. 22 der Blumenzeitung 1833.

Varietäten.

Berlin. Im Monat November v. J. blühten im hieſigen botaniſchen Garten folgende bemerkenswerthe Pflanzen: Amaryllis psittacina Ker. Aus Braſilien. Crinum amabile Don. Aus Oſtindien. Strumaria filifol. Jacq. Vom Vorgebirg d. g. Hoffn. Chrysiphiala pauciflor. Lindl. Aus Peru. Ornithidium coccineum Salisb. Aus Weſtindien. Angraecum maculatum Lindl. Aus Afrika. Epidendrum fuscatum Swartz. Aus Weſtindien. Cypripedium venustum Wallich. Aus Nepaul. Urtica biloba ex Hort. Lugdun. Batav. Gnidia imberbis Dryand. Vom Vorgeb. d. g. Hoffn. Protea mellifera Thunb. Vom Vorgeb. der guten Hoffn. Clerodendrum floribundum Lindl. Aus Weſtindien. Coleus aromaticus Bot. Reg. Aus Abyſſinien. Justicia speciosa Roxb. Aus Oſtindien. J. oblongata Lk. et O. Aus Braſilien. J. amoena Mart. Aus Braſilien. Thunbergia coccinea Wall. Aus Nepaul. Lipostoma campanuliflor. Don. (Aeginetia capitata Graham.) Aus Braſilien. Vernonia centiflor. Lk. und V. exaltata Hort. Monac. Aus Braſilien. Cacalia Kleinia L. Von den canariſchen Inſeln. Othonna filicaulis Jacq. Vom Vorgeb. d. g. Hoffn. Calendula nudicaulis L. Vom Vorg. d. g. Hoffn. Trixis divaricata Spreng. Aus Braſilien. Unxia anemonifol. Kunth. Aus Mexiko. Eupatorium iresinoides Kunth. Aus Mexiko. Crassula pertussula Haw. und Cr. corymbulosa Lk. Vom Vorgeb. d. g. Hoffn. Deutzia scabra Thunb. Aus Japan. Brexia madagascariensis Pers. Colletia serratifol. Vent. Aus Peru. Acacia suaveolens Willd. Aus Neuholland. Limonia citrifolia Willd. Aus China.

Petersburg. Am 28ten September 1833 kam die große Pflanzen-Sammlung aus Braſilien, welche der Reiſende Herr Riedel beſorgt hatte, mit dem kaiſ. ruſſ. Compagnieſchiff, Amerika, hier an. Widrige Winde hatten das Schiff lange aufgehalten u. der auffallende Wechſel der climatiſchen Verhältniſſe hatte ſehr nachtheilig auf die Pflanzenſammlung gewirkt, die wahrſcheinlich die größte Sendung lebender Pflanzen war, die auf einmal nach Europa verſchifft worden iſt. Der dem Herrn Riedel als Gehilfe zugetheilte Gärtner Hr. Luſchnath hatte ſich bereits den 29. Mai mit 101 Kiſten lebender Pflanzen eingeſchifft. Es waren etwa 1000 Arten in ungefähr 10,000 Exemplaren, welche aber leider durch die lange Reiſe um mehr als zwei Drittheile vermindert worden ſind. Ein Herbarium, das Reſultat von zwei Jahren, welches gegen 2500 Arten enthält, in ungefähr 70,000 Exemplaren, wovon aber noch der dritte Theil in Rio-Janeiro zurückblieb, füllte mehrere große Kiſten. Umſtände verhinderten Hrn. Riedel, eine Reiſe in das Innere des Landes zu unternehmen, wo die Ausbeute durch neuere Gegenſtände reichhaltiger und intereſſanter hätte ausfallen dürfen. Indeſſen ſammelte derſelbe in der Umgebung Rio's eine große Menge intereſſanter phyſiologiſcher Gegenſtände, worunter ſich beſonders viele ſchöne Epiphyten, Früchte, Palmblüthen, ſo wie die Langsdorfia janeirensis (die bekannte Schmarotzerpflanze) auszeichnen.

Brüſſel. Am 14ten, 15ten und 16ten Juli 1833 fand die von der Königl. Gartenbaugeſellſchaft zu Brüſſel veranſtaltete öffentliche Ausſtellung ſtatt.

Einen Preis, beſtehend in einer ſilbernen vergoldeten Denkmünze, für die in der neueſten Zeit eingeführte, ausgezeichnetſte Pflanze erhielt Hr. P. Verleuven aus Gent, für die zur Ausſtellung gebrachte Thibaudea setigera. Das Acceſſit dieſes Preiſes wurde getheilt, zwiſchen einer dem Hrn. Parthon de Von gehörigen, noch nicht beſchriebenen Pflanze aus Braſilien, und einer Escallonia coccinea aus der Sammlung der Mad. Meeus-Wouters.

Der Preis für die durch ihre Auswahl, Anzahl und ſchöne Cultur der Pflanzen bemerkenswertheſte Sammlung, wurde Hrn. A. Verſchaffelt zu Theil. Das Acceſſit erhielt die Sammlung der Mad. Meeus-Wouters aus Brüſſel. (Beſchluß folgt.)

Paris. In den Gärten des Hrn. Ledru, Maire zu Fontenay-aux-Roſes (bei Paris) ſieht man ſogenannte Laurus Tinus (Viburnum Tinus), welche in einer Höhe von 10 Fuß auf den Mehlbeerbaum (Viburnum Lantana), gepfropft ſind; ebenſo die Beſenpfriemen, (Sparcium scoparicum), in die Krone gepfropft auf den gemeinen Bohnenbaum (Cytissus Laburnum), ein weißer Ginſter (Genista alba) auf ebendenſelben. Merkwürdig iſt es, daß dieſe in einer Höhe von 5 und 10 Fuß gepfropften Sträucher nichts von der Kälte leiden, während ſie ungepfropft, frei aus der Wurzel gewachſen, oft von Fröſten beſchädigt werden. Dieſen Beiſpielen zufolge ließe ſich vermuthen, daß der ſpaniſche Ginſter (Sparcium junceum) ebenfalls gedeihen würde, wenn man ihn auf den Bohnenbaum in die Krone pflanzte.

London. Herr Maund hieſelbſt ſetzte im Mai des vorigen Jahres eine Nierembergia phoenicea, welche damals blühte, jedoch erſt einen Fuß hoch war, in ein offnes Blumenbeet und brachte ſie ſpäter an das Spalier. So hat er ſich eine Pflanze gezogen, die 8 Fuß hoch und 10 Fuß breit iſt, und während der ganzen Dauer ihres Wachsthums waren ſämmtliche Zweige mit Blüthen bedeckt, deren Zahl ſich jetzt auf 1200 beläuft, und die in reicher Purpurpracht ſchimmern.

Dresden. Im Dezember 1833 blühten in den Gewächshäuſern des Unterzeichneten folgende Gewächſe: Lupinus mutabilis — Dianthus arboreus — Rosa semperfl. Camellia — Daphne Dauphin — Jasminum triumphans — Arbutus Andrachne — Erica hybrida — Passiflora coerulea — Passiflora racemos. — Thea bohea — Heliotropium peruvianum — Verbena chamaedrifol. — Crataegus glabra — Camellia pomponic. pl. — C. paeoniflor. pl. — C. alba pl. — C. buff pl. — Citrus Limonum dolce, große, ſüße Limone — C., kleine, ſüße Limone — C. Lima aranciata — Cedrato volgare solcato, großer, wulſtförmiger Cedrat. — **Orangen:** Arangio a mazzetto — A. stellato — A. coronato — A. corauto e incanellato — A. a fior doppio — A. fino della China — A. di Sugorosso, Sanguino — A. listato — A. rigato confogl. stretta. **Gottlob Friedr. Seidel.**

München. (Fortſetzung.) Tauſch-Anerbieten des Herrn Collegialraths von Gemünden.

Pelargonium:

Rudland Duc of
reformatum
regium purp.
rodrigue
royale
Robinsoni
rutilum striat.
Rose des Dames.
raphanosmum
ramigerum
rubrum striat.
ruberrimum
robustum
Reichstadt
saepeflorens
sagittafol.
sanguineum
scutatum
Schmidia
Smits invincibile
Sckelii
Schirideum
solubile
sororeum
Souverain
spectabile
— azureum
— purpur.
— recurv.
— striatum
— elegans
splendens
Sultan grand.
supremum
senescens
smyrnifol.
— madophyllum
speciosissimum
superb. viol.
Stamford Lord
striatum purp.
Scheba Queen
Saba roi de
Shakespear
stricturum.

(Fortſetzung folgt.)

Wien. In den Gewächshäuſern des k. k. Hofgartens zu Schönbrunn blühten am 14. Dezember 1833 folgende Gewächſe: Aloe (Pachidendron) africana. (Haworth.) Vom Vorgeb. d. g. Hoffn. Hemerocallideae. Hexandr., Monogyn. — Antholyza aethiopica. (Linné.) Vom Vorgeb. d. g. Hoffn. Irideae. Triandria, Monogyn. — Begonia incarnata. (Hort.) Aus Braſilien. Begoniaceae. Monoecia, Polyandria. — Begon. pauciflor. (Lindl.) Aus Weſtindien. Begoniaceae. Monoec., Polyandr. — Chrysophyllum glabrum. (Jacq.) Von Martinique. Sapoteae. Pentandr. Monogyn. — Lobelia surinamensis. (Lin.) Aus Weſtindien. Lobeliaceae. Pentandr., Monogyn. — Rhodochiton volubile. (Mart.) Aus Mexiko. Scrofularinae. Didynamia, Angiospermia. — Sida obliqua. (Hort.) Aus Mexiko. Malvaceae. Monadelphia, Polyandria.

Cölleda. In dem ſehr im Schutze liegenden Garten der Frau Freifrau von Grothe blühten am 12. Januar d. J. nicht nur mehrere noch im freien Lande ſtehende Levkojen- und Lackſtöcke, Reſeda und Ringelblumen, ſo ſchön wie im Herbſte, ſondern auch einige auf den Beeten ſtehende blaue Hyazinthen entfalteten auf niedrigen Blüthenſtengeln ihre Blüthen.

Augsburg im Dezember 1833. In dem Treibhauſe des Hrn. Agathius Remmele*) hierſelbſt blühte in dieſen Tagen zum erſten Male in hieſ. Stadt die ſeltene Astrapaea Wallichii.

Oldenburg. Ankündigung für Blumenfreunde. Meine neuen Pflanzen- und Blumen-Samen-Verzeichniſſe für 1834, die viele neue und ſchöne Arten (vorzüglich das Neueſte und Schönſte an Blumenſämereien) enthalten, werden nächſtens fertig, und ſind dann gratis bei mir zu haben. Die Preiſe ſind möglichſt billig geſtellt. Briefe und Aufträge erbitte ich franco. **J. Boſſe,** Großherzogl. Hofgärtner.

Weimar, d. 2. Januar 1834. Den verehrlichen Leſern der Weißenſeer Blumenzeitung erlaubt der Unterzeichnete ſein in Nr. III. v. J. bekannt gemachtes Verzeichniß über Stauden, Roſen und Georginen, hiermit in freundliches Andenken zu bringen, mit der ergebenſten Bemerkung, daß dieſes Verzeichniß auch für das laufende Jahr ſeine Gültigkeit behält.

W. Kirſcht, Gartenbeſitzer auf der Altenburg in Weimar.

(**Für Garten- und Blumenfreunde.**) Zu bevorſtehendem Frühjahre empfehle ich meine Sammlungen von im Freien ausdauernden Bäumen und Sträuchern, hochſtämmigen, Strauch- und Topf-Roſen, gefüllten Georginen, Staudengewächſen, Beerenobſt, Gemüſe- und Blumen-Samen, in welchen ich alles Neue und Schöne zu vereinigen geſucht habe. Das Georginen-Sortiment enthält die vorzüglichſten dieſer Modeblumen der größten Floren von England und Frankreich. Preisverzeichniſſe werden auf portofreie Briefe gratis ausgegeben von

C. W. Wagner, Handelsgärtner in Dresden.

(**Curioſum.**) Es iſt neulich der Vorſchlag gemacht worden, die Gärten mit den Larven des Glühwurms (Lampyris noctiluca) zu bevölkern, und ſolchergeſtalt mit dem Schönen, nemlich dem zauberiſchen Anblick, welchen das Inſekt Abends und Nachts darbietet, wenn die Beete und Gebüſche mit dieſen ewig beweglichen Schimmern geſtickt ſind, das Nützliche zu verbinden, weil die Larve hauptſächlich den Schnecken, und insbeſondere dem, jungen Pflanzen ſo ſchädlichen, Helix aspersa nachſtellt, und ſelbe mit unglaublicher Begierde verzehrt. Ein Verlaſſen der Orte, wo ſich der Glühwurm einmal befindet, ſey deßhalb nicht zu beſorgen, weil das Weibchen flügellos iſt, und mithin auch das Männchen zum Bleiben gezwungen iſt.

In **Neu-York** ſind die Camellien ſo ſelten, daß eine einzige Camellienblüthe mit 1 Dollar bezahlt wird, während die Ananas dort für 7 — 8 Sous, das Stück, verkauft werden. Nur bei den Pflanzenhändlern Herren **Thorburns,** kann man abgeſchnittene Camellienblüthen zu kaufen bekommen, und die Nachfrage iſt ſo ſtark, daß immer eine große Liſte von den Perſonen, welche ſolche Blüthen wünſchen, geführt wird, und dieſe nur der Reihe nach befriedigt werden. Die jungen Damen bedienen ſich hier derſelben zur Ausſchmückung ihres Kopfputzes.

Ein Seitenſtück der ſchwebenden Gärten der Königin **Semiramis** hat ein reicher Irländer, Namens **W. Roche,** mit einem Koſtenaufwande von 375000 Frks. hergeſtellt, indem er auf einem gewölbten Magazine, welches 2000 Faß Wein aufnehmen kann, einen ſchönen Garten mit Gewächshäuſern angelegt hat.

(Hierbei drei Beilagen.)

---

*) Möchte doch unſer langjähriger Freund uns hierüber einen ausführlichern Bericht mittheilen. d. Redakteur.

Verzeichniſs für 1834

von

Garten-, Blumen-, Feld- und andern Sämereien, Obſtbäumen, Zwiebeln, Pflanzen und in- und ausländiſchen Bäumen und Sträuchern,

welche

in der Königl. Preuß. privilegirten Saamen-Handlung

bei

Carl Platz in Erfurt

zu haben ſind.

Die Bezahlung geſchieht nach preußiſchem Courant, der Thaler zu 24 gute Groſchen gerechnet, und muß jedesmal der Beſtellung beigelegt und frei eingeſendet werden; auch kann die Bezahlung durch Wechſel, zahlbar in Frankfurt a. M., Leipzig, Berlin, Nürnberg, Augsburg, Wien, Hamburg, Paris oder Lyon übermacht, oder ein gutes Haus in dieſen Orten angezeigt werden, welches meine Anweiſung bezahlt.

Die Preiſe ſind ſowohl in Pfunden, als auch in Lothen geſtellt; wenn weniger als ¼ Pfund genommen wird, ſo werden die Sämereien nach dem Lothpreiſe berechnet.

Fäſſer und Emballage werden beſonders in Rechnung gebracht und alle Briefe frei erbeten.

Küchenkräuter-Saamen.

Nr.		à Loth. gr.	à Loth. pf.	à Pfd. thlr.	à Pfd. gr.
1.	Baſilikum, großes Küchen-	1	—	—	18
2.	— ganz feines krauſes	2	—	1	12
3.	Cardobenedikten	—	9	—	12
4.	Dill	—	3	—	8
5.	Fenchel, ſüßer Bologneſer	1	—	—	—
6.	Gartenkreſſe	—	6	—	6
7.	Körbel	—	6	—	6
8.	— gefüllter, ſehr ſchön	1	—	—	16
9.	Löffelkraut	1	6	1	—
10.	Majoran, ächter franzöſiſcher	1	6	1	12
11.	Portulack, grüner	1	—	—	16
12.	— ganz gelber	1	6	1	—
13.	Pimpinelle	1	—	—	16
14.	Peterſilie, zum Schneiden	—	6	—	4
15.	— krausgefüllte, ſehr ſchön	1	—	—	12
16.	Pfeffer- oder Bohnenkraut	1	—	—	10
17.	Rosmarin	2	—	1	12
18.	Salbei	[illegible]			[illegible]
19.	Spinat, langblättriger	—	8	—	3
20.	— rundblättriger	—	6	—	5
21.	— ganz großer engliſcher	—	9	—	8
22.	— engl. Winter-, Rumex patientia	1	—	—	16
23.	Tobak, ungariſcher rundblättriger	1	—	—	12
24.	— virginiſcher langblättriger	1	—	—	16
25.	Thymian	1	6	1	12
26.	Weinraute	1	6	1	—
27.	Sauerampfer	—	9	—	16
28.	Lavendel	—	9	—	16
29.	Yſop	1	—	1	—

Kohlſaamen.

Nr.		à Loth. gr.	à Loth. pf.	à Pfd. thlr.	à Pfd. gr.
	Blumenkohl, großer kapiſcher ſpäter beſter	7	—	7	—
	— früher cypriſcher	6	—	6	—
	— ordinärer ſpäter holländiſcher	4	—	4	—
	— neuer ſchwarzer aus Sicilien, extra . . . à Priſe	2	—	—	—
34.	Broccoli oder Spargelkohl, weißer	2	—	2	—
35.	— — violetter	2	—	2	—
36.	Kopfkohl oder Cappus, ordinärer weißer	1	—	1	—
37.	— großer weißer Erfurter	1	6	1	12
38.	— ganz früher kleiner Erfurter weißer	1	—	1	12
39.	— — — blutrother	1	—	1	—
40.	Kleines blutrothes Salatkraut	1	6	1	12
41.	Strunkkraut für gebirgige und kalte Gegenden, iſt auch ein gutes Winterfutter fürs Rindvieh	1	—	—	20
42.	Wirſingkohl od. Savoyer, ordinärer grüner	1	—	1	—
43.	— Ulmer früher	2	—	2	—
44.	— — ſpäter	1	6	1	12
45.	Winterkohl, krauſer blauer niedriger	1	—	—	20
46.	— grüner niedriger	1	—	—	16
47.	— mit bunten Blättern	2	—	1	12
48.	— Brüſſeler oder Roſenkohl	2	—	2	—
49.	Schnittkohl, ordinärer	—	6	—	6
50.	— mit dem Blumenkohlblatte	1	—	—	16
51.	Kohlrabi, große weiße aufs Feld	1	—	1	—
52.	— weiße engliſche frühe Glas-	1	—	1	16
53.	— große blaue ſpäte	1	—	1	—
54.	— — — frühe	2	—	1	12
55.	— Wiener, kleinblättrige ganz frühe	2	6	2	12
56.	Unterkohlrabi oder Kohlrüben, große weiße	—	6	—	8
57.	— gelbe oder Rutabago	1	6	—	16
58.	Meer- oder Seekohl, Crambe maritima	8	—	—	—

Wurzeln und Rüben.

Nr.		à Loth. gr.	à Loth. pf.	à Pfd. thlr.	à Pfd. gr.
59.	Carotten oder Möhren, lange rothe	—	9	—	10
60.	— gelbe desgl.	—	8	—	6
61.	— kurze weiße	—	8	—	8
62.	— ganz kleine frühe rothe	1	—	—	16
63.	Wurzeln, lange Peterſilien-	—	6	—	8
64.	— Cichorien-	1	—	—	12
	— Paſtinak-	1	—	—	7
	— Scorzoner-	1	—	—	18
	— Rhapontica, zum Salat	1	—	—	16
	Zuckerwurzeln	1	—	—	16
	Sellerie, großer Knollen-	1	—	—	18
	Rüben, lange weiße Herbſt- oder Feld-	—	6	—	7
	— holländiſche Mairüben	1	—	—	14
	— kleine Teltower	1	—	—	16
	— blutrothe Salatrüben	—	6	—	6
	— Runkel- oder Dickrüben, rothe	—	8	—	8
	— gelbe Zucker-	—	6	—	8
77.	— über die Erde wachſende, 100 Pfd. 12 thlr.	—	3	—	4

Salat- oder Kopflattich.

Nr.		à Loth. gr.	à Loth. pf.	à Pfd. thlr.	à Pfd. gr.
78.	Kopfſalat, guter mit weißem Saamen	1	—	—	16
79.	— mit ſchwarzem Saamen	1	—	—	18
80.	— großer aſiatiſcher, weiß Korn	1	6	1	—
81.	— — — ſchwarz Korn	2	—	—	—
82.	— Prinzenkopf	1	—	—	18
83.	— Winterſalat	1	—	—	18
84.	— großer Schwedenkopf	1	—	1	—
85.	— Forellen, weiß Korn	2	—	—	—
86.	— blutrother, ſchwarz Korn	2	—	2	—
87.	— Mailänder, gelb Korn	1	—	1	—
88.	— Früh-Wirſing-Sal., aufs Miſtbeet	1	—	—	20
89.	— gemiſchter Saamen	—	9	—	14
90	Endivienſalat, krausblättriger	1	—	—	16
91.	— breitblättriger	1	—	—	16
92.	Rapunzel- oder Feldſalat	—	6	—	8

Zwiebeln.

Nr.		à Loth. gr.	à Loth. pf.	à Pfd. thlr.	à Pfd. gr.
93.	Zwiebeln, große rothe harte Erfurter	1	—	1	—
94.	— ſpaniſche rothe	1	—	1	—
95.	— — weiße	2	—	2	—
96.	Zwiebeln, ächte längliche ſüße Birn-	2	—	1	12
97.	— im Winter ſtehende	1	—	1	—
98.	Porree oder ſpaniſcher Lauch	1	—	1	—
99.	— ganz großer Stangen-	1	—	1	—
100.	Zwiebeln, kleine Erfurter, Steck-, 100 St.	2	—	—	—
101.	Knoblauch . . . 100 St.	3	—	—	—
102.	Rocambol od. Schlangenknoblauch, 100 St.	4	—	—	—

Radiesgen und Rettige.

Nr.		à Loth. gr.	à Loth. pf.	à Pfd. thlr.	à Pfd. gr.
103.	Radies, runde u. lange, weiße u. rothe	1	—	—	16
104.	Rettige, lange ſchwarze Erfurter, um Johannis zu legen	1	—	—	16
105.	— Sommer-	—	9	—	12

Verſchiedene Kernſorten.

Nr.		à Loth. gr.	à Loth. pf.	à Pfd. thlr.	à Pfd. gr.
106.	Gurken, ordinäre, zum Einmachen	1	6	1	12
107.	— lange grüne, ditto	2	—	1	18
108.	— extra Schlangen-, 12 — 18 Zoll lang	2	—	2	—
109.	[illegible]	[illegible]			[illegible]
110.	Melonen, mehrere Sorten	6	—	—	—
111.	Artiſchocken, große rothe	2	6	2	12
112.	Cardikern, ſpaniſche	2	—	1	6
113.	Spargel, großer weißer Darmſtädter	—	6	—	6
114.	Saflor	—	6	—	6
115.	Sonnenblumen	—	6	—	8
116.	Kürbiſſe, ganz große, aufs Feld	—	6	—	8

Erbſen.

Nr.		à Loth. gr.	à Loth. pf.	à Pfd. thlr.	à Pfd. gr.
117.	Zuckererbſen, engliſche frühe weißblühende	—	—	—	5
118.	— ganz große graue Säbel-	—	—	—	4
119.	— Zwerg-, ganz niedrige	—	—	—	6
120.	Ausmacherbſen, ganz frühe Mai-, 100 Pfd. 12 thlr.	—	—	—	3
121.	— Erfurter, frühe, 100 Pfd. 4 thlr.	—	—	—	1
122.	— große frühe Klunker-, 100 Pfd. 4 thlr.	—	—	—	1½
123.	— grün bleibende ſpäte, 100 Pfd. 5 thlr.	—	—	—	1½
124.	— Kronerbſen	—	6	—	—
125.	— Spargelerbſen	—	6	—	12

Bohnen.

Nr.		à Loth. gr.	à Loth. pf.	à Pfd. thlr.	à Pfd. gr.
126.	Stangenbohnen, arabiſche oder Feuer-	—	—	—	3
127.	— Schwert- oder Säbel-	—	—	—	4
128.	— mit weißer Schale	—	—	—	4
129.	— mit rother Schale	—	—	—	4
130.	— kleine runde Perl-Zuckerbohnen, auch ohne Stangen	—	—	—	4
131.	Zwergbohnen, rothbunte	—	—	—	3
132.	— ſchwarze frühe	—	—	—	3
133.	— franz. Schwert-, 100 Pfd. 6 thlr.	—	—	—	2
134.	— eine neue gelbe Sorte	—	—	—	4
135.	— kleine runde Erdbohnen, 100 Pfd. 4 thlr.	—	—	—	1½
136.	Garten- od. Puffbohnen, 100 Pfd. 4 thlr.	—	—	—	1½
137.	— ganz große Windſor-	—	—	—	3
138.	— niedrige zum Einfaſſen	—	—	—	5

Oekonomiſche Saamen.

Nr.		à Pfd. gr.	pf.
139.	Anis	6	—
140.	Bilſenkraut	12	—
141	Canarienſaamen	2	—
142.	Coriander	3	—
143.	Hanfſaamen	3	—
144.	Mohn, blauer	3	—
145.	— weißer, in Schalen 2 gr., rein	4	—
146.	Siebenzeiten, Foenum graecum	4	—
147.	Ackerſpergel, Spergula arvensis	5	—
148.	Kardendiſtel, Dipsacus fullonum	6	—
149.	Waid zum Indigo, Isatis tinctoria, 100 Pfd. 20 thlr.	6	—
150.	Wau, Reseda luteola . . . à Pfd.	16	—
151.	Hellerlinſen	2	—

Die vorzüglichſten Futtergräſer zum Anlegen der Kunſtwieſen.

Nr.		à Pfd. gr.	pf.
152.	Agrostis capill., Haarſtraußgras, wächſt in den dürreſten Gegenden und macht den ſchönſten Raſen, 100 Pfd. 12 thlr.	4	—
153.	— stolonifera, Fioringras, 100 Pfd. 16 thlr.	5	—
154.	Aira caespitosa, Raſenſchmiele, für ſumpfige Brüche und waldige feuchte Orte, 100 Pfd. 12 thlr.	4	—
155.	Avena elatior, franz. Raygras, 100 Pfd. 16 thlr.	4	—
156.	— flavescens, Goldhafer	6	—
157.	Bromus sterilis, Futtertrespe	5	—
158.	Dactylis glomerata, Knaulgras, ein ſehr einträgliches Futtergras für alles Vieh, beſonders für die Pferde, welche es ſehr lieben; es iſt leicht anzubauen und ſehr ergiebig 100 Pfd. 16 thlr.	4	—
159.	Festuca elatior, Wieſenſchwingel	4	—
160.	— fluitans, Manna- oder Schwadegras	8	—
161.	— ovina, Schaafſchwingel	7	—
162.	— rubra, rother Schwingel	6	—
163.	Hedysar. Onobrychis, Esparſett-Klee, 100 Pfd. 12 thlr.	3	—
164.	Holcus lanatus, Honiggras, 100 Pfd. 16 thlr.	4	—
165.	Lolium perenne, engl. Raygras, 100 Pfd. 18 thlr.	5	—
166.	Medicago falcata alba, weißer Wunderklee	8	—
167.	— sativa, Luzerner oder ewiger Klee	7	—
168.	— lupulina, Hopfenklee	10	—
169.	Phleum pratense, Timothiengras	8	—
170.	Phalaris canariensis, Canariengras, 100 Pfd. 6 thlr.	2	—
171.	Poa pratensis, Wieſenriſpengras	10	—
172.	Urtica dioica, große Brenneſſeln	5	—
173.	Trifolium Melilotus officinalis, gelber Steinklee	3	—
174.	— pratense, rother ſpaniſcher Klee	5	—
175.	Eine Miſchung der vorzüglichſten Futtergräſer für Hornvieh . . 100 Pfd. 10 thlr.	3	—
176.	Eine dergl. für Pferde . . . 100 Pfd. 10 thlr.	3	—
177.	Eine dergl. für Schaafe . . 100 Pfd. 12 thlr.	3	—
178.	Eine dergl. ordinäre zum Verbeſſern der Wieſen, 100 Pfd. 9 thlr.	2	6

Inländiſche Wald- und Holzſaamen.

Nr.		à Pfd. gr.	pf.
179.	Acer campestre, gemeiner Ahorn	3	—
180.	— platan., Spitzahorn	4	—
181.	Amygdalus dulcis, gute Mandeln, 4 St. 1 gr., 100 St.	16	—
182.	Betula alba, weiße Birke	2	—
183.	— Alnus, Erle	6	—
184.	Carpinus Betulus, Hainbuche	4	—
185.	Cornus mascula, Cornelkirſche	6	—
186.	Evonymus europaeus, Spindelbaum à Loth	2	—
187.	Fraxinus excelsior, gemeine Eſche	2	—
188.	Pinus abies, weiße Tanne	3	—
189.	— Picea, gemeine Fichte	6	—
190.	— sylvestris, gemeine Kiefer	12	—
191.	Prunus avium, wilde Süßkirſche	3	—
192.	— Cerasus, gute Kirſchkerne	3	—
193.	Pyrus communis, Birnkerne	10	—
194.	— Malus, Apfelkerne	8	—
195.	Rhamnus catharticus, Kreuzdorn	14	—
196.	Robinia Pseudo acacia, Acacien	10	—
197.	Sambucus Ebulus, Zwerg-Hollunder	12	—
198.	Sorbus aucuparia, Vogelbeerbaum	10	—
199.	Tilia europaea, Linde	12	—

Amerikaniſcher Holzſaamen, der jedoch in unſerer Gegend gewachſen und ganz friſch geſammelt worden iſt.

1) Immergrüne Bäume.

Nr.		à Loth gr.	pf.	à Pfd. thlr.	gr.
200.	Cupressus thyoides, weiße Ceder	12	—	12	—
201.	Juniperus virginiana, rothe Ceder	1	—	—	16
202.	— bermudiana, bermud. Ceder	2	—	1	8
203.	— horizontalis, horizont. Ceder	2	—	1	16
204.	— communis, Wachholder	—	6	—	2
205.	— suecia, ſchwediſcher Wachholder	1	—	—	16
206.	Pinus strobus, Weihmuthsfichte	2	—	1	8
207.	— virginiana, Jerſeyföhre	8	—	8	—
208.	— taeda, Weihrauchsbaum	8	—	8	—
209.	— cembra, Zirbelnuß	2	—	1	8
210.	— larix, Lerchenbaum	1	—	—	20
211.	— americana, amerikaniſche Tanne	2	—	1	12
212.	— alba, Weißtanne	2	—	1	4
213.	— balsamea, Balſamtanne	8	—	8	—
214.	— canadensis, Hemlocktanne	2	—	2	—
215.	— picea, rothe Tanne	—	6	—	6
216.	— tenuifolia, mit den größten Zapfen	2	—	2	—
217.	Thuja occidentalis, Lebensbaum	1	6	1	—

2) Immergrüne Sträucher.

Nr.		à Loth gr.	pf.	à Pfd. thlr.	gr.
218.	Daphne laureola, immergrüner Kellerhals	2	—	2	—
219.	Juniperus sabina, Sadebaum	1	—	—	16
220.	Mespilus pyracantha, immergrüner Hagedorn	3	—	2	6
221.	Myrica cerifera, Wachsbaum	2	—	2	—
222.	Pinus montana, Krummholzbaum	2	—	1	8
223.	Taxus baccata, beerentragender Taxus	2	—	1	6
224.	— [illegible] Taxus	4	—	4	[illegible]

3) Blattbäume.

Nr.		à Loth gr.	pf.	à Pfd. thlr.	gr.
225.	Acer negundo, virginiſcher Ahorn	2	—	1	8
226.	— saccharinum, Zucker-Ahorn	2	—	1	12
227.	— pseudo-platanus, gemeiner Ahorn	—	6	—	4
228.	— striatum, geſtreifter Ahorn	2	—	2	—
229.	— tartaricum, tartariſcher Ahorn	2	—	2	4
230.	Celtis occidentalis, abendl. Neſſelbaum	2	—	1	12
231.	Crataegus coccinea, amerik. Hagedorn	1	—	—	12
232.	— caroliniana, gelbblüh. Hagedorn	1	—	—	16
233.	— edulus, mit eßbaren Beeren	2	—	1	8
234.	— oxyacantha fl. rubro, rothblühender Weißdorn	2	—	1	8
235.	— oxyacantha fl. carneo, fleiſchfarbenblühender Weißdorn	2	—	1	8
236.	— aria, Atlasbaum	1	—	1	—
237.	— lucidum, glänzend. Pflaumenbaum	2	—	1	8
238.	Cytisus laburnum, gemeiner Bohnenbaum	1	—	—	16
239.	— latifolius, ſchottiſcher Bohnenbaum	1	—	1	—
240.	Fraxinus excelsior americana, größte amerikaniſche Eſche	1	—	—	20
241.	— pendulus, hängende Eſche	1	—	1	—
242.	Hippophaea rhamnoides, Seegolddorn	2	—	1	8
243.	Lyriodendron tulipifera, Tulpenbaum	2	—	2	—
244.	Platanus hispanica, ſpan. Kleiderbaum	2	—	2	—
245.	Ptelea trifoliata, Kleebaum	2	—	1	16
246.	Pinus sibirica, [illegible]	2	—	2	—
247.	Quercus coccinea, Scharlacheiche	2	—	2	—
248.	Sorbus hybrida, Baſtard-Ebereſche	1	—	—	16
249.	Ulmus campestris, gemeine Rüſter	—	6	—	12

Blattſträucher.

Nr.		à Loth gr.	pf.	à Pfd. thlr.	gr.
250.	Amorpha fruticosa, Baſtard-Indigo	4	—	4	—
251.	Berberis vulgaris, gemeiner Berberisbaum	—	6	—	12
252.	Colutea americana, amerik. Blaſenſtrauch	1	—	1	—
253.	Evonymus latifolia americana, amerikan. breitblättriger Pfaffenhut	2	—	1	12
254.	— europaeum, gemeiner Pfaffenhut	1	—	—	16
255.	Ligustrum vulgare, gem. Rheinweide	1	6	—	12
256.	Mespilus amelanchier, Quändelbeere	2	—	1	8
257.	— sibirica, ſibiriſche Mispel	2	—	2	—

Blumenſaamen.

Die mit * bezeichneten müſſen anfänglich warm ſtehen.

Nr.		à Priſe gr.	pf.
258.	Adonis aestivalis, Sommer-Adonis, à Loth 4 gr.	—	6
259.	Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen	1	—
260.	— coronaria, Vexirnelke	1	—
261.	Alcea, Malven in allen Farben . à Loth 6 gr.	—	6
262.	Ammobium alatum, geflügelte Amobie, neue Immortelle	2	—
263.	*Amaranthus bicolor, zweifarbiger Amaranth	1	—
264.	— caudatus, Fuchsſchwanz, à Loth 4 gr.	—	6
265.	— hypochondriacus, trauriger, à Loth 6 gr.	—	6
266.	— viridis, grüner . . . à Loth 4 gr.	—	6
267.	* — sanguineus, blutrother	2	—
268.	* — tricolor, dreifarbiger à Loth 12 gr.	1	—
269.	Anacyclus bicolor, zweifarbiger	2	—
270.	Anoda Dillmiana, blaue Anode	1	—
271.	Antirrhinum bicolor, zweifarbiges Löwenmaul	1	—
272.	— linifolium, leinblättriges	1	—
273.	— triphyllum, dreiblättriges	1	—
274.	— majus, großes . . . à Loth 4 gr.	—	6
275.	Aquilegia, gefülltes Akelei, alle Sorten gemiſcht, à Loth	2	—
276.	8 Sorten, von jeder eine Priſe	6	—
277.	Argemone ochroleuca, ockergelber Stachelmohn	2	—
278.	Aſtern in ausgezeichnet ſchönen Sorten, als:		
279.	Aster fistulosus, Röhren-Aſtern: 1) dunkelroth. 2) aſchgrau. 3) himmelblau. 4) blaßcarmin. 5) blaßfleiſchfarbig. 6) ſilberweiß. 7) hellviolett. 8) roſenfarbig. 9) lederfarbig. 10) gelblichweiß.		
280.	Röhren-Aſtern mit Weiß: 11) blaßroth. 12) dunkelviolett. 13) carminroth. 14) blaßfleiſchfarbig.		
281.	Band-Aſtern: 15) ſilberweiß. 16) apfelblüth. 17) carmoiſin. 18) himmelblau. 19) dunkelviolett. 20) blaßcarmin.		
282.	Band-Aſtern mit Weiß: 21) blaßcarmin. 22) blaßhimmelblau. 23) dunkelviolett. 24) blaßroth.		
283.	Obige Sorten durch einander gemiſcht, à Loth 6 gr.	1	—
284.	Jede Sorte allein . . . à Loth	16	—
285.	Das ganze Sortiment in 24 verſchiedenen Sorten, von jeder Sorte 100 Körner . . . 1 Thlr.	—	—
286.	Zwerg-Aſtern, 1 Fuß hoch, neue Sorten:		
	1) roſenfarbige Band-Aſter . . . 100 K.	2	—
	2) roſenfarbig mit Weiß, Band-Aſter . 100 K.	2	—
	3) blaßroth mit Weiß geſtreift, Band-Aſter, 100 K.	2	—
	4) ſilberweiß, Band-Aſter . . . 100 K.	2	—
287.	Aster tenellus, zarte kleine hellblaue Aſter	1	—
288.	Astragalus baeticus, ſchwediſche Kaffeewicke	—	6
289.	— galegaeformis, Canarienvogelſtaude, à Loth 2 gr.	—	6
290.	Atriplex hortensis, Gartenmelde . . à Loth 2 gr.	—	6
291.	Atropa physaloides, jähriges Tollkraut, à Loth 4 gr.	—	6
292.	Blitum capitatum, Erdbeerſpinat . à Loth 3 gr.	1	—
293.	Borrago officinalis, gemeiner Borretſch	1	—
294.	Briza maxima, großes Zittergras . à Loth 4 gr.	1	—
295.	*Browallia elata, Browallie	1	—
296.	*Cacalia sonchifolia, ſcharlachrothe Cacalie, à Loth 8 gr.	1	—
297.	Calandrinia adscendens, purpurrothe Calandrinie	1	—
298.	Calendula hybrida, Baſtard-Ringelblume	1	—
299.	— hortensis fl. pl., gef. Ringelbl., à Loth 4 gr.	1	—
300.	Calliopsis bicolor, das ſchöne Geſicht, à Loth 4 gr.	1	—
301.	Campanula medium, große Glockenbl., à Loth 4 gr.	1	—
302.	— fl. pl., gefüllte blaue . . à Loth 8 gr.	1	—
303.	— fl. pl. lilacina, lilla . . à Loth 8 gr.	1	—
304.	— speculum, Frauenſpiegel	1	—
305.	*Capsicum annuum, ſpaniſcher Pfeffer, à Loth 4 gr.	1	—
306.	Carduus marianus, Marientiſtel	1	—
307.	Catananche coerulea, blaue Roſſelblume	1	—
308.	*Celosia cristata, Hahnkamm, weißer, rother, gelber und fleiſchfarbiger, à Loth 1 thlr.	1	—
309.	— pyramidalis, neu und ſchön	3	—
310.	Centaurea Cyanus, Garten-Kornblume, alle Sorten gefüllt	1	—
311.	— moschata rubra, Biſam-Flockenblume	1	—
312.	— — fl. albo, weiße	1	—
313.	— pallata, ſchwarzgeränderte	1	—
314.	— sicula, kleinkörnigte	1	—
315.	— suaveolens, ſtarkriechende	1	—
316.	Cerinthe major, große Wachsblume	1	—
317.	Cheiranthus annuus, engliſche u. halbengl. Sommerlevkojen. Davon habe ich ein ſchönes Sortiment, die außerordentlich ins Gefüllte fallen, und die ich der Aechtheit willen in Töpfen ziehen laſſe, und deswegen auch nicht in Lothen, ſondern nur in Priſen von 100 Körnern abgeben kann, als:		
318.	Engliſche Sommerlevkojen, welche ihre Blumen gedrückt an einander ſetzen: 1) blaßlilla. 2) hellmordoree. 3) kupferbraun. 4) blaßroth. 5) metzgerbraun. 6) dunkelaſchgrau. 7) blaßziegelroth. 8) roſenfarbig. 9) blaßfleiſchfarbig. 10) dunkelmordoree. 11) blaßblau. 12) carminroth. 13) hellſchwarzbraun. 14) fleiſchfarbig, früh. 15) rothgrau. 16) hellaſchgrau. 17) violett. 18) weiß. 19) dunkelziegelroth. 20) carmoiſin. 21) hellviolett. 22) blaßbraun. 23) zimmtbraun. 24) kaſtanienbraun. 25) iſabellfarbig. 26) pfirſichblüth. 27) dunkelſchwarzbraun.		
319.	Engliſche Sommerlevkojen mit dem Lackblatt: 28) weiß. 29) carminroth. 30) zimmtbraun. 31) violett. 32) fleiſchfarbig. 33) dunkelaſchgrau. 34) blaßbraun. 35) dunkelziegelroth. 36) dunkelſchwarzbraun. 37) blaßroth. 38) metzgerbraun. 39) rothgrau. 40) blaßblau. 41) blaßzimmtbraun.		
320.	Halbengliſche Sommerlevkojen mit dem gewöhnlichen Blatt: 42) weiß. 43) blaßblau. 44) carminroth. 45) pfirſichblüth. 46) blaßziegelroth. 47) blaßbraun. 48) zimmtbraun. 49) hellaſchgrau. 50) dunkelziegelroth. 51) blaßroth. 52) hellſchwarzbraun. 53) hellmordoree. 54) violett. 55) carmoiſin, kleine Stöcke. 56) metzgerbraun. 57) dunkelſchwarzbraun. 58) dunkelaſchgrau. 59) fleiſchfarb.		
321.	Halbengliſche Sommerlevkojen mit dem Lackblatt: 60) weiß. 61) blaßblau. 62) violett.		
322.	Engliſche Herbſt- oder Baſtardlevkojen: 63) weiß. 64) violett. 65) blaßroth. 66) dunkelcarmin. 67) carminroth. 68) hellmordoree. 69) carminroth mit Lackblatt.		
323.	Halbengliſche Herbſtlevkojen: 70) weiß. 71) carminroth. 72) blaßbraun. 73) carmoiſin. 74) dunkelziegelroth. 75) blaßblau. 76) blaßziegelroth. 77) fleiſchfarbig. 78) hellmordoree. 79) violett. 80) apfelblüth. 81) blaßroth. 82) weiß mit Lackbl. 83) dunkelziegelroth m. Lackbl. 84) violett m. Lackbl.		
	Jede einzelne Priſe von 100 vollkomm. Körnern koſtet	1	6
	(Halbe Priſen werden nicht abgegeben.)		
	Davon erlaſſe ich auch ein Sortiment		
324.	von 12 Sorten, jede in 100 Körnern, zu . . .	18	—
325.	· 16 — . . . . 1 thlr.	—	—
326.	· 24 — . . . . 1 —	12	—
327.	· 36 — . . . . 2 —	6	—
328.	· 60 — . . . . 3 —	18	—
329.	· 74 — . . . . 4 —	8	—
330.	Das ganze Sortiment in 84 Sorten . . 5 —	6	—
331.	Alle Sorten durch einander gemiſcht, 400 Körner	4	—
332.	24 Sorten, jede beſonders, das 1/4 Loth . . .	16	—
333.	24 Sorten durch einander gemiſcht, à Loth 2 thlr.	—	—
334.	Engliſche u. halbengliſche Sommerlevkojen, im Lande gezogen, jede Sorte allein, à Loth	16	—
335.	Dieſelben durch einander gemiſcht . . . à Loth	8	—
336.	Cheiranthus incanus, Winterlevkojen in 10 Sorten: 1) weiß. 2) blaßroth. 3) blaßblau. 4) pfirſichblüth. 5) carminroth. 6) kaſtanienbraun. 7) violett. 8) carmoiſin. 9) violett, Baumlevkoje. 10) roſenfarbig.		
337.	Jede Sorte beſonders, von jeder 100 Körner .	15	—
338.	Durch einander gemiſcht, das Loth	12	—
339.	Cheiranthus maritimus, Meerlevkoje	1	—
340.	— Cheiri, einfacher brauner Lack, à Loth 8 gr.	1	—
341.	— fl. pl., extra gefüllter . . 100 Körner	2	—
342.	— Lack, blauer einfacher . . 100 Körner	1	6
343.	Chenopodium, Kräutlein Geduld	1	—
344.	— maritimum	1	—
345.	Chrysanthemum carinatum, prachtvolle Wucherblume	1	—
346.	— fl. pl., gelbgefüllte Wucherblume	1	—
347.	— fl. pl., weißgefüllte . à Loth 4 gr.	1	—
348.	*Cineraria amelloides, Aſchenpflanze	1	—
349.	Commelina coelestis, himmliſche Comeline	1	—
350.	Convolvulus tricolor, dreifarb. Winde, à Loth 2 gr.	—	6
351.	Corydalis sempervirens, immergrüne Kappenmohne	1	—
352.	Cotula [illegible]	1	—
353.	Crepis hispida, ſtachliger Pippau	1	—
354.	— Dioscoridis, dioscoridiſcher gelber Pippau	1	—
355.	— rubra, rothe Grundfeſte	1	—
356.	Cucumis prophetarum, Prophetengurke	1	—
357.	*Cucurbita, 1) ganz großer Centnerkürbis, 150 Pfd. ſchwer . . . . . à Loth	4	—
358.	2) Herkuleskeulenkürbis. 3) Flaſchenkürbis. 4) großer und 5) kleiner Apfelkürbis. 6) großer und 7) kleiner Birnkürbis. 8) Türkenbund. 9) grüner u. 10) weißer Warzenkürbis. 11) ganz kleiner Stachelbeerkürbis. 12) Apfelſinenkürbis. 13) ſehr langer Schlangenkürbis. 14) Wiederbornkürbis. 15) gelber Paraplukürbis. 16) gelber Zwiebelkürbis. 17) Sternkürbis. 18) Gurkenkürbis. 19) Herkuleskeulenkürbis ohne Ranken. 20) derſelbe mit gezackten Blättern. Von jeder Sorte das Loth .	8	—
359.	Alle Sorten zuſammen, von jeder Sorte 4 Körner	16	—
360.	Durch einander gemiſcht, das Loth	4	—
361.	Cynoglossum linifolium, weißes Vergißmeinnicht, ſehr ſchön zum Einfaſſen, à Loth	3	—
362.	Cysticapnos africanus, Blaſenraute	1	—
363.	Datura, Stechapfel, giftiger . . . à Loth 2 gr.	—	6
364.	— Metel, weißer	1	—
365.	Delphinium humile, neue punktirte Ritterſporn	2	—
366.	— — niedrige gefüllte Ritterſporn, in 10 Sorten gemiſcht, à Loth 4 gr.	—	6
367.	Jede Sorte allein, das 1/4 Loth	2	—
368.	Delphinium Ajacis, fl. pl., hohe gef. Levkojen-Ritterſporn, in 8 Sorten gemiſcht, à Loth 4 gr.	—	6
369.	— perenne, immerwährende hohe, à Loth 6 gr.	—	6
370.	Digitalis alba, weißer Fingerhut	1	—
371.	— lutea, gelber	1	—
372.	— rubra, rother . . . . . à Loth 4 gr.	1	—
373.	Dracocephalum Moldavica, türk. Meliſſe, à Loth 4 gr.	1	—
374.	— peltatum, ſchildförmige	1	—

Nr.	à Priſe	gr.	pf.
	Dianthus caryophillus, arbin. Gartennelke, à Loth 4 gr.	1	—
	— von gefüllten Landſaamen, 100 Körner	2	—
	— von Nummerblumen geſammelt, 100 Körner	3	—
	— von Bandblumen . . . 100 Körner	16	—
	— chinensis, Chineſernelke, à Loth 6 gr.	1	—
	— bunte Buſchnelke . . . à Loth	2	—
	Dictamnus, Diptam, rother u. weißer, à Loth 4 gr.	1	—
82.	Echium grandiflorum, großblumiger Natterkopf	1	—
	Erodium gruinum, Reiherſchnabel	1	—
	*Elychrysum lucidum, glänz. Strohblume, à Loth 6 gr.	1	—
	— — blaßgelb, neue Sorte	1	6
	— bracteatum, fl. albo, weiß, ganz neu	2	—
87.	Eschholzia californica, Eſchholzie, prächtig	2	—
	Fedia Cornucopiae, Schmalzkraut	1	—
89.	*Gossypium, Baumwollenbaum . . . 2 Korn	1	—
	Georgina, die ſchönſten Sorten	1	—
91.	— von lauter ganz gefüllten Blumen, à Loth 6 gr.	1	6
92.	— ditto ditto in Sorten	2	—
93.	Galinsoga trilobata, dreilappige Galinſonge	1	—
94.	Gomphrena globosa, Kugelamaranth, rother, weißer u. fleiſchfarbiger, à Loth 12 gr.	1	—
395.	Gilia capitata, kopfförmige Gilie, ſchön	1	—
396.	Grahamia aromatica, riecht ſehr angenehm	1	—
397.	Hesperis matronalis, Frauen-Nachtviole, à Loth 2 gr.	—	6
398.	— tristis, wohlriechende Nachtviole, à Loth 4 gr.	—	6
399.	*Hedysarum gyrans, beweglicher Klee . . 1 Korn	2	—
400.	Hibiscus trionum, Stundenblume	1	—
401.	Helianthus annuus, gefüllte Sonnenblume, à Loth 2 gr.	—	6
402.	— — ſchwefelgelbe	—	6
403.	— nanus, niedrige, 1 Fuß hoch, à Loth 6 gr.	1	—
404.	Hippocrepis multisiliquosa, vielhülſiges Hufeiſenkraut	1	—
405.	Iberis amara, weiße Schleifenblume, à Loth 2 gr.	—	6
406.	— coerulea, blaue	1	—
407.	— purpurea, dunkelrothe	1	6
408.	*Impatiens Balsamina, gefüllte Balſaminen, als: 1) kupferfarbig. 2) dunkelroth. 3) violett. 4) roſenroth. 5) blaßblau. 6) violett mit Weiß. 7) dunkelroth mit Weiß. 8) blaßfleiſchfarbig. 9) weiß. 10) Lyoner. 11) hochroth mit Weiß. 12) hochroth. Jede Sorte beſonders, 100 Körner	2	—
409.	Alle Sorten durch einander, à Loth 16 gr., 100 K.	1	—
410.	Impatiens Balsamina, ordinäre, gefüllte u. einfache, à Pfd. 2 thlr, à Loth	2	—
411.	Inula oculus Christi, Auge Chriſti	1	—
412.	Ipomea, Winden, mehrere Sorten, als: 1) lila. 2) blaßroſenroth. 3) hellviolett. 4) weiß. 5) violett mit Weiß. 6) roſenroth. 7) violett. 8) zweifarbig. 9) ſcharlachroth. Von jeder Sorte eine Priſe	8	—
413.	Obige Sorten durch einander gemiſcht, das Loth	4	—
414.	Klarkia pulchella, ſchöne Klarkie	2	—
415.	— — mit ganz dunkeln Blumen	2	—
416.	Lathyrus odoratus, wohlriechende Sommerwicke, à Loth 2 gr.	—	6
417.	— latifolius perennis, Packelwicke, à Loth 6 gr.	1	—
418.	— nova species ex Mexico, neu, ſchönroth	3	—
419.	Lavatera trimestris, Sommerpappelmalve	1	—
420.	Lilium tigrinum, Tigerlilie	1	—
421.	Linum perenne, immerwährender Staudenlein	1	—
422.	Lupinus, rothe, weiße, gelbe, blaue, à Loth 1 gr.	—	6
423.	Lychnis, hellrothes Lichtröschen . . à Loth 4 gr.	—	6
424.	Madia elegans, ſchöne Madie, ganz neu	4	—
425.	Malva mauritiana, weiß- und rothbunte Malve	1	—
426.	Malope trifida, dreitheilige Malope, ſehr ſchön	1	—
427.	— grandiflora, ſchön, ganz neu	4	—
428.	*Maurandia semperflor., immerblühende Maurandie	2	—
429.	*Mesembrianthemum cristall., das wahre Eiskraut	2	—
430.	*Mimosa pudica, Sinnpflanze . . . 2 Korn	1	—
431.	Mirabilis Jalappa, als: 1) weiße. 2) goldgelbe. 3) blaßgelbe. 4) carmoiſin und 5) carminrothe; von jeder Sorte eine Priſe	6	—
432.	Obige Sorten durch einander gemiſcht, das Loth 4 gr.	—	6
433.	Medicago intertexta, Dornkronenklee, à Loth 6 gr.	—	6
434.	*Momordica . . . 3 Körner	1	—
435.	Nicotiana acuminata, zugeſpitzter Tabak, aus Chili	1	6
436.	— glutinosa, gelbblühender, à Loth 4 gr.	1	—
437.	— Langsdorfii, grünblühender	1	—
438.	— paniculata, Jungfern-Tabak	1	—
439.	— octovalvis, achttheiliger	1	—
440.	— sanguinea, blutrother	2	—
441.	— virginiana, rothblühender, à Loth 4 gr.	—	6
442.	— vincaeflora, weißblühender, ſehr ſchön	1	—
443.	Nigella damascena, Jungfer in Haaren	—	6
444.	— coarctata, niedrig gefüllte	1	—
445.	Ocymum maximum, ſehr großblättriges Stuben-Baſilikum . . . 4 Körner	1	—
446.	— minimum, ganz klein krauſes, à Loth 2 gr.	—	6
447.	Oenothera decumbens, liegende Nachtkerze, ganz neu	2	—
448.	— grandiflora, großblühende	1	—
449.	— purpurea, purpurrothe	1	—
450.	— rosea, roſenrothe	1	—
451.	— tetraptera, vierflügelige	1	—
452.	— tenella, feinblaue	1	—
453.	— amoena, angenehme Nachtkerze	1	6
454.	— longifolia, langblättrige	1	—
455.	— Romanzowii, blaublühende	1	6
456.	— taraxacifolia, die größtblühende, prächtig	3	—
457.	Papaver, gefüllte große Gartenmohne, à Loth 2 gr.	—	6
458.	— kleine Ranunkelmohne . . à Loth 4 gr.	—	6
459.	— perenne, immerwährende hochrothe	1	—
460.	Paeonia, rothe einfache . . . à Loth 4 gr.	—	6
461.	*Pelargonium, Storchſchnabel, in vielen Sorten	1	—
462.	Pisum umbellatum, doldenförmige Erbſen, à Loth 2 gr.	—	6
463.	Polygonum orientale, weißes indian. Pfirſichenkraut	1	—
464.	— — rothes . . à Loth 3 gr.	—	6
465.	Potentilla formosa, ſchönes Fingerkraut	1	6
466.	Primula acaulis, Primelſaamen, extra, à Loth 16 gr.	1	—
467.	— Auricula, Aurikelſaamen, extra, à Loth 16 gr.	1	—
468.	Reseda alba, weiße Reſede	1	—
469.	— odorata, wohlriechende, à Pfd. 2 thlr., à Lth. 2 gr.	—	6
470.	— fruticulosa, ſtrauchartige	1	—
471.	Ricinus communis, Wunderbaum . à Loth 4 gr.	1	—
472.	* — ruber, rother . . . 4 Körner	2	—
473.	Rudbeckia laciniata, zerſchliſſene Rudbeckie	1	—
474.	— amplexicaulis, ſtängelumfaſſende	1	—
475.	— alata, geflügelte	1	—
476.	Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie, ſchön	1	—
477.	Scabiosa atropurpurea, ſchwarze Scabioſe, à Loth 4 gr.	—	6
478.	— major, von dieſer Prachtblume habe ich 8 verſchiedene Sorten, jede Sorte beſonders das Loth 8 gr., die Priſe	1	—
479.	Das ganze Sortiment in Priſen	8	—
480.	Alle Sorten durch einander gemiſcht, à Loth 4 gr.	—	6
481.	Scabiosa stellata, Sternſcabioſe . à Loth 4 gr.	—	6
482.	Schyzanthus pinnatus, gefiederte Schizanthe	1	6
483.	Scorpiurus vermiculata, Raupenklee, à Loth 4 gr.	—	6
484.	*Senecio elegans fl. pl., rothe gefüllte Kreuzblume	1	—
485.	— — — — weißgefüllte	1	—
486.	— — — — atropurp., dunkelroth, ſchön	2	—
487.	Silene Armeria, rothe Silene . . à Loth 4 gr.	—	6
488.	— alba, weiße	1	—
489.	*Spilanthus oleraceus, [illegible]	1	—
490.	Solanum Lycopersicum, rother u. gelber Liebesapfel	1	—
491.	* — Melongena alba, weißes Eiergewächs	1	—
492.	* — — violacea, blaues Eiergewächs	1	—
493.	— Pseudocapsicum, Korallenkirſchen	1	—
494.	Tagetes erecta, ſchwefelgelbe Sammtblume, à Loth 4 gr.	—	6
495.	— — fistulosa, röhrige	1	—
496.	— — orange, gelbe	—	6
497.	— patula, hochrothe . . . à Loth 4 gr.	—	6
498.	— — ranunculoides, ſehr ſchön	1	—
99.	— striata, ſchön geſtreift	2	—
00.	Alle Sorten gemiſcht . . . à Loth	6	—
Nr.	à Priſe	gr.	pf.
501.	Tolpis barbata, bärtiger Pippau	1	—
502.	*Trachelium coeruleum, blaues Halskraut	1	—
503.	Tradescantia erecta, erhabene Tradeskantie	1	—
504.	Tropaeolum majus, indianiſche Kreſſe, à Loth 2 gr.	—	6
505.	— — nan., neue, dunkelfarbige, ſchön	2	—
506.	— minus, kleine	1	—
507.	Trifolium elegans, ſchönblühender Klee	1	—
508.	— incarnatum, ſchönrother	1	—
509.	Valeriana rubra, rother Baldrian	1	—
510.	Veronica longiflora, Ehrenpreis	1	—
511.	Viburnum tinus, Laurustinus	1	—
512.	Vicia faba fl. rubr., rothblühende neue amerikaniſche Puffbohne, ſehr ſchön, à Loth	1	—
513.	Viola tricolor, Dreifaltigkeitsblume	1	—
514.	Verbascum Thapsus, gemeine Königskerze, à Loth 2 gr.	—	6
515.	— Blattaria, veränderliche, à Loth 4 gr.	—	6
516.	Xeranthemum annuum, rothe Strohblume, à Lth. 6 gr.	1	—
517.	— — weißgefüllte	1	—
518.	— — purpureum, ganz neu	2	—
519.	— inapertum, kleinblumige	1	—
520.	Ximenesia encelioides, geöhrte Ximeneſie	1	—
521.	Zinnia ambigua, zweifelhafte Zinnie	1	6
522.	— aurea, goldgelbe	1	—
523.	* — elegans, ſchöne	1	6
524.	— — mit dunkelrothen Blumen	2	—
525.	— — alba, ſchönblühende weiße	4	—
526.	— — purpur. grandifl., ganz neu	4	—
527.	— multiflora, blaß- und hochgelb	1	—
528.	* — tenuiflora, ſchmalblüthige	1	—
529.	— verticillata, wirtelblüthige	1	—
530.	Alle Sorten gemiſcht, das Loth	6	—

Blumenſaamen in Packeten.

Nr.		gr.	pf.
531.	100 Sorten ſchönblühende Sommerblumenſaamen auf Rabatten . . 2 thlr.	—	—
532.	50 dergl. . . . 1 —	—	—
533.	30 dergl. in Miſtbeete, mit Namen	16	—
534.	24 dergl. ins freie Land, mit Namen	14	—
535.	12 Sorten ſchöne gefüllte Malven	12	—
536.	10 — hohe gef. Ritterſporn, von jeder eine Priſe	8	—
537.	12 — niedrige gefüllte Ritterſporn	8	—

Schönblühende perennirende Pflanzen, in- und ausländiſche Bäume und Sträucher zu Bosquets und engliſchen Anlagen.

Erklärung der vorkommenden Zeichen:

1) Die mit T bezeichneten ſind Topfpflanzen, die man in einer luftigen Stube oder Kammer, worin es ſelten oder doch nicht gar ſtark friert, durchwintern kann.
2) Die mit B bezeichneten ſind Bäume und Sträucher zu Bosquets und engliſchen Anlagen.
3) Die mit R bezeichneten ſind hochlaufende, mit rankenden und klimmenden Aeſten, zur Bekleidung an Wände, Häuſer und Lauben.
4) Die nicht bezeichneten ſind perennirende, im freien Lande ausdauernde Pflanzen.

Nr.	à Stück	gr.	pf.
538.	Achillea magna, große gelbe Schafgarbe	2	—
539.	— speciosa, prächtige	2	—
540.	Aconitum variegatum, bunter Eiſenhut	4	—
541.	Agapanthus umbellatus T, Liebesblume	8	—
542.	Aloë margaritifera T, Perlen-Aloe	6	—
543.	Amaryllis formosissima, ſchöne Amaryllis	2	—
544.	Anemone, in ſchönen Sorten	1	—
545.	Amygdalus nana fl. simpl. B, Zwergmandelbaum	2	—
546.	Antirrhinum linifolium, flachsblättriges Löwenmaul	2	—
547.	— großes in vielen Sorten	1	—
548.	Aristolochia Sipho R, nordamerikaniſche Oſterluzei	8	—
549.	Artemisia Dracunculus, Dragun, Eſtragun, Kaiſerſalat	2	—
550.	Asclepias carnosa T	6	—
551.	Aster bicolor, zweifarbige Sternblume	2	—
552.	— cordifolius, herzblättrige	2	—
553.	— elegans, zierliche	2	—
554.	— spectabilis, prachtvolle	2	—
555.	Aucuba japonica T, japaniſche Aukube	6	—
556.	Aepfelbäume, veredelte, an Spaliere u. in Töpfe B	4	—
557.	— hochſtämmige B	6	—
558.	Aprikoſen, hochſtämmige B	8	—
559.	— an Spaliere und in Töpfe	8	—
560.	Birnen, veredelte, in Töpfe, an Spaliere u. Pyramiden	4	—
561.	— — hochſtämmige B	6	—
562.	Cactus alatus T, geflügelte Fackeldiſtel	4	—
563.	— flagelliformis T, ſchlangenförmige	4	—
564.	— speciosus T, ſchöne	12 bis 16	—
565.	Campanula medium, große Glockenblume	1	—
566.	— persicifolia, fl. pl., gefüllte	2	—
567.	— coerulea, fl. pl., blaue gefüllte	2	—
568.	— pyramidalis, pyramidenförmige	4	—
569.	Camellien B T, lauter gefüllte ſchöne Sorten von 1 thlr. 12 gr. bis 2 thlr. das Stück.		
570.	Cineraria amelloides R, amellenartige Aſchenpflanze	4	—
571.	Citrus aurantium T, Pomeranzen- u. Citronen-Bäumchen mit u. ohne Früchte von 12 gr. bis zu 2 thlr.		
572.	Clematis vitalba R, gemeine Waldrebe	4	—
573.	Cobaea scandens R T, klimmende	8	—
574.	Convallaria fl. pl., gefüllte Maiblumen	2	—
575.	— multiflora fl. pl., vielblumige	2	—
576.	Corchorus japonicus B, japaniſche Nußpflanze	4	—
577.	Corylus maxima, große Lamperts- und Zellernüſſe	4	—
578.	Cornus mascula B, Cornelkirſche	1	—
579.	— alba B, mit weißer Frucht	1	6
580.	Crataegus oxyacantha B, rothblühender Weißdorn, ſehr ſchön	4 bis 6	—
581.	Daphne Mezereum B, Kellerhals	2	—
582.	Delphinium americanum, amerikaniſche Ritterſporn	2	—
583.	Dianthus caryophyllus, gefüllte Gartennelken ins Land	1	—
584.	— — in Töpfe, alle gefüllt	1	—
585.	Ein kleines aber ſchönes Sortiment in 25 Sorten mit Namen, von jeder Sorte 1 Stück . 8 thlr.	12	—
586.	25 Stück nach meiner Wahl, mit Namen 3 —	12	—
587.	12 Stück dergl., extra ſchön . . 2 —	—	—
588.	Dianthus arboreus T, Baumnelken, einige Sorten	4	—
589.	— anglicus, gefüllte engliſche Pinknelken	2	—
590.	— carthusianorum, Karthäuſernelken	1	6
591.	— chinensis, Chineſernelken	1	—
592.	Dictamnus ruber, rother Diptam	4	—
593.	Ficus carica T B, Feigenbaum	4	—
594.	Fragaria fl. pl., gefüllte Erdbeere	—	6
595.	— — [illegible] ohne Ranken	1	—
596.	Fraxinus pendula B, Trauer-Eſche	6	—
597.	— aurea B, goldgelbe	6	—
598.	Fritillaria imperialis, rothe Kaiſerkrone	1	—
599.	Geranium sanguineum, blutiger Storchſchnabel	2	—
600.	Georginen od. Dahlien. Ein kleines aber ſehr ſchönes, von mehr als 100 Sorten ausgeſuchtes Sortiment ganz gefüllte Georginen in 31 Sorten:		
1)	Kochanka alba, ganz ſchöne weißgefüllte	6	—
2)	Coccinea, feuerroth, ſehr ſchön	5	—
3)	Helianth. lutea et lutescens, ſehr große gelbe, extra	4	—
4.	Aurea magna, goldgelbe, prächtig	5	—
5	Incomparabile, [illegible]	4	—
6)	Vega minuta, fleiſchfarbige niedrige, ſehr ſchön	6	—
7,	Venus, hellviolett	5	—
8)	Lady, Herzogin von Parma, hochroth, ſchön	6	—
9)	M[illegible] purpurea, ſehr ſchön purpurroth, extra	7	—
10	[illegible], ſehr ſchön, 4 Fuß hoch	6	—
11,	[illegible] aurea et aurora, 3 Fuß hoch, extra ſchön	6	—
12	St. von Harlem, carmoiſin, großblumig	5	—
13)	v. Göthe, [illegible], purpurroth, ſehr ſchön	6	—
14	Atrococcinea, ſehr ſchöne granatrothe	5	—
15.	Lygnus alba, [illegible], herrlich	6	—
16)	Maria rubra, roth mit aſchgrau	6	—

Nr.		à Stück gr.	pf.
17)	Gräfin v. Schalenberg, hellroth, ſchön	6	—
18)	Großherz. v. Weimar, hochroth, ſehr groß u. ſchön	5	—
19)	Clemens rosea, roſenroth	4	—
20)	Nanquin, nanquinfarbig, ſchön	6	—
21)	Thetis violacea, violett	4	—
22)	Göthe, purpurroth, extra ſchön	6	—
23)	Frau v. Fatelmann, purpurroth, ſehr ſchön	6	—
24)	Amalatia lilacina, lillafarbig, ſchön	5	—
25)	Belladonna sang. splendens, ſchön hochroth	6	—
26)	König Aja, braunroth mit Gelb, klein gefüllt	6	—
27)	Xerampelina multiflora, blaßroth	4	—
28)	Sirius aurea et aurora, ſehr ſchön	6	—
29)	Heroine, ſilberweiß, ſchön	6	—
30)	Atropurpurea, purpurroth	5	—
31)	Biedemaier orange major	6	—
601.	Das ganze Sortiment erlaſſe ich zu	6 thlr. —	—
602.	12 Stück nach meiner Wahl, mit Namen	2 — —	—
603.	6 Stück von Hauptblumen	1 — 6	—
604.	6 Stück in Rommel, ohne Namen	18	—
605.	Einfache und gefüllte durch einander	2	—
606.	Hedera Helix R, Epheu	1	—
607.	— quinquefolia R, Jungfernwein	2	—
608.	Helleborus niger, ſchwärzliche Nießwurz	2	6
609.	Helianthus multiflorus, gefüllte vielblumige Sonnenblume, die allerſchönſte	2	—
610.	Hemerocallis coerulea, blaublühende Taglilie	6	—
611.	— japonica alba, japaniſche weiße	4	—
612.	— fulva, braunrothe	1	—
613.	Hieracium aureum, goldgelbes Habichtskraut	1	—
614.	Hesperis matron. fl. alb., weiße gefüllte Matronalis	1	6
615.	Hyacinthus racemosus, Trauben-Hyacinthe	1	—
616.	Hydrangea hortensis T, Hortenſien	4 bis 8	—
617.	Iris germanica flava, deutſche gelbe Schwertlilie	2	—
618.	— pumila lutea, niedrige gelbe	2	—
619.	— — fl. coeruleo, niedrige blaue	2	—
620.	— susiana, prächtige	8	—
621.	Juniperus fol. variegatis B, buntblättr. Wachholder	8	—
622.	Laurocerasus T B, Kirſchlorbeerbaum	4 bis 8	—
623.	Leucojum vernum fl. pl., gefülltes Schneeglöckchen	1	—
624.	Lilium bulbiferum, ordinäre Feuerlilie	—	6
625.	— — simplex, einfache weiße	1	—
626.	— variegatum, buntblättrige	4	—
627.	— Martagon, Türkenbund	1	—
628.	— sinense tigrinum, chineſiſche Tigerlilie	4	—
629.	Lobelia fulgens T, ſtrahlende Lobelie, ſehr ſchön	4	—
630.	Lonicera Caprifolium album R, durchwachſender weißer Jelängerjelieber	2	—
631.	— rubrum R, rother	2	—
632.	— coerulea, blaufrüchtiger	4	—
633.	— foliis variegatis R, buntblättriger	3	—
634.	— sempervirens R, zinnoberrother Alpen-	3	—
635.	— tatarica, tatariſcher	4	—
636.	Mehrere Sorten durch einander . . . 12 Stück	16	—
637.	Lychnis chalcedon. fl. pl., gef. rothe brennende Liebe	6	—
638.	— dioica fl. pl., Bauernroſe	2	—
639.	— viscaria, Pechnelke	2	—
640.	Mespilus Cotoneaster R, Quittenmiſpel	5	—
641.	— pyracantha B, Feuerbuſch	6	—
642.	Menispermum canadense R, canadiſcher Mondſaamen	4	—
643.	Morus alba B, weißer Maulbeerbaum	3 bis 4	—
644.	Myrtus communis macrophyll. T, breitblättr. Myrte	6	—
645.	— — microphylla T, kleinblättrige	6	—
646.	— — fol. variegat. T, buntblättrige	6	—
647.	Narciſſen-Zwiebeln	—	6
648.	Nerium Oleander T, rother einfacher Oleander,	6 bis 8	—
649.	— fl. pl. T, rother gefüllter	8 bis 12	—
650.	— fl. alb. simpl. T, einfacher weißer	8	—
651.	Paeonia hybrida, Baſtard-Päonie	4	—
652.	— officinalis carnea, fleiſchfarbige	4	—
653.	— fl. simplex, einfache rothe	3	—
654.	— pleno rubro, rothe gefüllte	2	—
655.	Passiflora coerulea T R, Paſſionsblume	6	—
656.	Pelargonium T, in 20 Sorten, das Stück	4 bis 8	—
657.	— das ganze Sortiment	4 thlr. —	—
658.	— in Stecklingen	2 —	—
659.	Pfirſichen B, ans Spalier und in Töpfe	10 bis 12	—
660.	Pflaumen B, veredelte hochſtämmige, ans Spalier und in Töpfe	4 bis 6	—
661.	Phlox glaberrima, glatte Flammenblume	4	—
662.	— paniculata, riſpenblüthige	2	—
663.	— — alba, weiße	4	—
664.	Philadelphus coronarius B, wilder Jasmin	1	—
665.	— inodorus, geruchloſer	1	—
666.	Pyrus malus baccata B, der kleine rothe Kirſchapfel	6	—
667.	— — striata B, der geſtreifte Apfel	6	—
668.	Polyanthes Tuberosa, gefüllte Tuberoſen	1	—
669.	Primeln in vielen ſchönen Sorten	1	—
670.	Primula chinensis T, rothblühende	4	—
671.	— — alba, weißblühende	8	—
672.	Prunus Mahaleb B, Mahalebkirſche	4	—
673.	— Padus B, Traubenkirſche	4	—
674.	Punica Granatum fl. pl. T B, gefüllte Granaten, die im erſten oder zweiten Jahre blühen,	8 bis 12	—
675.	Ranunculus acris, ſcharfer Hahnenfuß	2	—
676.	Ranunkeln in Rommel, in vielen Sort., 100 St.	16 bis 20	—
627.	— 50 St. in 50 verſchiedenen Sorten	1 thlr. 12	—
678.	Rhus typhinum B, Eſſigbaum	1	6
679.	Ribes floridum B, ſchönblühende Johannisbeere	4	—
680.	— fol. var. B, buntblättrige	4	—
681.	Robinia hispida B, rothblühende Acacie	6	—
682.	— pendula B, hängende	8	—
683.	— Pseudo acacia B, gemeine, 8 Fuß hohe	3	—
684.	— spectabilis B, prächtige, neue	10	—
685.	— viscosa B, klebrige, ſehr ſchön	6	—
686.	Rosa alba plena, weißgefüllte Roſe	3	—
687.	— amabilis cuprea, kupferfarbige	4	—
688.	— atropurpurea, ſchwarze	4	—
689.	— belgica, große niederländiſche	5	—
690.	— bicolor simpl., Feuerroſe	2	—
691.	— carnea altissima, hohe Perlroſe	4	—
692.	— — humilis, niedrige fleiſchfarbige	3	—
693.	— carolina, caroliniſche	3	—
694.	— centifolia, große Centifolie	1	—
695.	— — minima, allerkleinſte	4	—
696.	— — pallida, blaßrothe	4	—
697.	— de Dijon, ſehr gut zum Treiben	4	—
698.	— Eglanteria, Weinroſe	2	—
699.	— gallica, Zuckerroſe	2	—
700.	— — cinerea, aſchgraue	4	—
701.	— — micans, ſchimmernde, gefüllt	4	—
702.	— — papaverina, Mohnkopfroſe	4	—
703.	— — spectabile, prachtvolle	4	—
704	— — versicolor, geſtreifte	4	—
705.	— — violacea, violette, gefüllt	4	—
706.	Rosa holosericea atrocinerea, dunkelſcharlachrothe Roſe	1	—
707.	— — regalis, königliche, ſchwarze	4	—
708.	— lutea, gelbe einfache	2	—
709.	— marmorea, marmorirte	2	—
710.	— — massiliensis, Marſeiller	4	—
711.	— monstrosa, monſtröſe	1	—
712.	— muscosa rubra pl., rothe gefüllte Moosroſe	6	—
713.	— multiflora T, vielblühende	12	—
714.	— plicata, einwärts gekrümmte	6	—
715.	— provincialis, Provence-Roſe	4	—
716.	— — pulchella, ſchöne	4	—
717.	— Rosamundi, Ranunkelroſe	2	—
718.	— — minima, kleine	5	—
719.	— turbinata, Tapetenroſe	3	—
720.	— semperflorens, immerblühende Topfroſe, 12 St. in 12 Sorten mit Namen	3 thlr.	—
721.	Nach meiner Wahl, das Stück	4	—
722.	— sulphurea, gelbgefüllte Roſe	5	—
723.	— vix spinosa, Roſe mit wenig Dornen	5	—
724.	— scandens B, kletternde Roſe, 16—20 Fuß hoch	1	—
	Wenn man mir die Wahl der Sorten überläßt, ſo gebe ich:		
725.	12 Stück in 12 Sorten zu	1 thlr. —	—
726.	24 — in 24 — zu	3 — —	—
727.	Rubus canadensis R, canadiſche Himbeere	4	—
728.	Scilla T, Meerzwiebel	1	—
729.	Salix babylonica B, Trauerweide	6	—
730.	Sambucus laciniata B, peterſilienblättr. Hollunder	4	—
731.	— alba variegata B, weißbunter	6	—
732.	Saponaria officinalis fl. pl., gefülltes Seifenkraut	1	—
733.	Saxifraga crassifolia, dickblättriger Steinbrech	2	—
734.	Sedum album, weißes Sedum	—	6
735.	— hybridum roseum, gamanderblättr., roſenrothes	—	6
736.	— reflexum, zurückgebogenes	—	6
737.	— Telephium purpureum, fette Henne	—	6
738.	Sempervivum arboreum T, baumartige Hauswurz	6	—
739.	Solanum Dulcamara R, kletternder Nachtſchatten	1	—
740.	— fol. variegat., mit bunten Blättern	3	—
741.	— Pseudo-capsicum T B, Korallenkirſchbaum	3	—
742.	Solidago canadensis, canadiſche Goldruthe	3	—
743.	Spargelpflanzen, dreijährige . . . . 60 Stück	16	—
744.	Spiraea Aruncus B, Geisblatt-Spierſtaude	4	—
745.	— filipendula, Steinbrech	3	—
746.	— hypericifolia, johanniskrautblättrige	4	—
747.	— opulifolia, ſchneeballenblättrige	3	—
748.	— salicifolia, weidenblättrige	2	—
749.	— Ulmaria, ulmenblättrige	2	—
750.	Syringa alba B, weißer Flieder	1	6
751.	— indica B, indiſcher, allergrößter	6	—
752.	— persica B, perſiſcher	4	—
753.	Trachelium coeruleum T, blaues Halskraut	4	—
754.	Tropaeolum fl. pl., gefüllte Kapuzinerkreſſe	4 bis 6	—
755.	Veratrum nigrum, ſchwarze Nießwurzel	3	—
766.	Verbena melindres coccinea T	6	—
757.	Viburnum Opulus B, gefüllter Schneeballen	4	—
758.	— Tinus T B, Laurustinus	4 bis 6	—
759.	Vinca minor, kleines Sinngrün	—	6
760.	Viola rubra plena, rothes gefülltes Veilchen	2	—
761.	Weinreben in 40 der beſten Sorten mit Namen,	2, 4 u. 6	—
762.	— nach meiner Wahl, das Stück	2	—
763.	— ohne Namen in Rommel 100 St.	4 thlr. —	—
	Wenn mir die Wahl der Sorten ſchön blühender Staudengewächſe und perennirender Landpflanzen überlaſſen bleibt, ſo gebe ich		
764.	25 Stück in 12 Sorten für	1 thlr. —	—
765.	50 — in 25 —	3 — —	—
766.	100 — in 50 —	7 — —	—
767.	100 — in Rommel ohne Namen	3 — —	—
768.	Bäume und Sträucher zu Bosquets in 12 Sorten, mit Namen, nach meiner Wahl	— — 18	—
769.	24 Stück desgl. in 24 Sorten, mit Namen,	2 — —	—
770.	50 — desgl. in 50 Sorten	6 — —	—
771.	25 — ſchön blühende Topfpflanzen in 25 Sorten, mit Namen	3 — —	—
772.	50 — desgl. in 50 Sorten	8 — —	—

Pflanzen, die in Quantitäten, doch nicht unter 50 Stück zu haben ſind.

		100 St. thlr.	gr.
773.	Allium schoenoprasum, Schnittlauch	—	6
774.	— ascalonicum, Schalotten	—	5
775.	Amaryllis formosissima, ſchöne Amaryllis	8	—
776.	Bellis perennis, gefüllte Maßlieben	—	12
777.	Berberis communis, Berberitzen, junge Sämlinge	2	—
778.	Campanula, mehrere Sorten	—	18
779.	Cornus mascula, Corneliuskirſche, 4—5 Fuß hoch	3	—
780.	Corylus avellana, Haſelnüſſe	2	—
781.	Cynoglossum omphal., Garten-Vergißmeinnicht	—	16
782.	Convallaria, Garten-Maiblumen	—	16
783.	Fragaria elatior, Garten-Erdbeere	—	8
784.	— grandiflora, ganz große Ananas-Erdbeere	—	16
785.	Hedera Helix, Epheu	2	—
786.	Hesperis matronalis fl. pl. alb., weißgefüllt	4	—
787.	Hemerocallis, Taglilie, mehrere Sorten	3	—
788.	Hieracium aureum, hochrothes Habichtskraut	1	12
789.	Hyacinthus racemosus, Trauben-Hyazinthe	2	—
790.	Iris pumila, niedrige blaue Iris	2	—
791.	— in vielen Sorten durch einander	1	—
792.	Lilium bulbiferum, Feuerlilie	1	—
793.	Leucojum vernum, Schneeglöckchen	1	—
794.	Lonicera, Jelängerjelieber in mehreren Sorten	4	—
795.	Mentha crispa, Krauſemünze und Pfeffermünze	—	16
796.	Primula Auricula, engliſche und Luicker-Aurickel	4	—
797.	— elatior, ſehr ſchöne Garten-Primeln	8	—
798.	Philadelphus coronarius, wilder Jasmin	3	—
799.	Pyrus Malus frutescens, Johannesäpfel	2	—
800.	Populus italica, italieniſche Pappeln, 12 Fuß hoch	8	—
801.	Rumex acetosa, Sauerampfer	—	8
802.	Robinia Pseudo acacia, gemeine Acacie	6	—
803.	Rosa centifolia, Centifolien	2	—
804.	— Gefüllte Roſen in Rommel	1	12
805.	Rubus idaeus, rothe und gelbe Himbeere	1	6
806.	Sedum, alle Sorten durch einander	—	10
807.	Solanum Dulcamara, kletternder Nachtſchatten	4	—
808.	— Kleine Mandel-Kartoffeln, wohlſchmeckend und ſehr ergiebig	—	4
809.	— Ananas-Kartoffeln, 4 Stück 1 gr.	—	16
810.	Spiraea, Spierſtaude, mehrere Sorten	3	—
811.	Statice armeria, Grasnelke	—	8
812.	Syringa coerulea, blauer Flieder	1	12
813.	— vulgaris, weißer	3	—
814.	Tulipa, ſchöne einfache Garten-Tulpen	1	—
815.	— fl. pl. lauter ſchöne gefüllte durch einander	2	—
816.	Vinca, Sinngrün, mit u. ohne vergoldeten Blättern	—	16

* * *

Die Auszeichnungs- oder Beſtellungs-Note erbitte ich mir auf ein beſonderes Blatt und nicht in den Brief zu ſchreiben, damit ich es als Beleg wieder zurückſenden kann. Auch kann bei Verſchreibung nur der Jahrgang des Katalogs und die Nummer des Verlangten und das Quantum angegeben werden. Uebrigens werden Beſtellungen auf Alles, was nur auf Oekonomie- und Gärtnerei Bezug hat, angenommen, und ſchnell und pünktlich beſorgt. Wer ſich nicht unmittelbar an mich wenden will und ſeine Beſtellungen zeitig macht, kann auch die Buchhändler-Gelegenheit dazu benutzen. In Deutſchland nehmen größtentheils alle guten Buchhandlungen für mich Beſtellungen an.

Auch bin ich erbötig Herrſchaften, die geſchickte und gute Leute zu Gärtnern brauchen, damit zu dienen; doch muß ich dabei Folgendes feſtſetzen: Wer einen Gärtner von mir recommandirt zu haben wünſcht, ſendet zugleich für meine Bemühung und Beſtreitung des Briefporto's einen Louisd'or ein, und legt alle Bedingungen und Verhältniſſe des Gärtners bei.

Wer nicht zu weit von mir entfernt wohnt, dem kann ich auch recht billig mit feinem und ordinärem Tafelglaſe zu Miſtbeetfenſtern und zu Glas- und Gewächshäuſern dienen, indem ich davon immer ein vollſtändiges Lager habe und den Quadratfuß zu 1', bis 1', gGr. und im Ganzen noch billiger ablaſſe.

Erfurt, im November 1833.

Carl Platz,
mehrerer ökonomiſchen u. d. Gartenbau-Geſellſchaft Mitglied.

Verzeichniss
von
schönblühenden perennirenden
Stauden, Sträuchern, Rosen und Pelargonien,
welche
für beistehende Preise zu haben sind
bei dem
Hofgärtner J. Mootz in Weimar.

	gGr.
Achillea ageratum	2
— magna	2
— mongolica	2
— millifolia aurea	3
— — purpurea	2
— speciosa	3
— ptarmica fl. pl.	2
— tomentosa	2
Aconitum album	4
— variegatum	3
— humile	3
— Napellus	2
— Willdenowianum	4
Actea racemosa	4
Agrostema coron. fl. albo	2
— - - rubro	2
— - - - pl.	4
Allium narcissiflorum	3
— odoratum	2
Althea rosea fl. pl div. C.	2
— ficifolia pleniss.	3
Anemone hepatica fl. rubro	1
— - - - pl.	3
— - - coeruleo	1
— - - - pl.	4
— nemorosa albo pl.	3
Antirrhinum majus div. Coul.	1
— - bicolor	3
Anthericum racemosum	3
— liliago	2
Amobium alatum	3
Aquilegia canadensis	3
— vulgaris fl. pl. div.	2
Aristolochia clematidis	4
— mycrophylla	3
Asclepias incarnata	3
— syriaca	2
Asperula odorata	2
Aster acris	2
— amellus	4
— alpinus	3
— canus	4
— concinnus	3
— elegans	4
— glaucus	4
— grandiflorus	3
— - roseus	4
— linifolius	2
— multiflorus	2
— nemoralis	2
— obliquus	3
— novi Belgii	2
— praecox	3
— puniceus	3
— punctatus	3
— spectabilis	4
— umbellatus	2
— undulatus	2
— versicolor	3
— virgatus	2
Asarum europaeum	2
Astrantia major	3
Balsamita vulgaris	2
Bellis perennis albo pleno	1
-- - rubro -	1
Betonica hirsuta	4
— incana	3
Bryonia alba	3
Brachysandra procumbens	3
Buphthalmum cordatum	4
-- grandiflorum	4
— scabrum	2
Campanula fragilis	4
— persicifolia albo pl.	3
— - coeruleo pl	2
— - pallido pl.	3
— medium	2
— nitida	2
— pyramidalis	3

	Gr.
Centaurea montana	2
— seusana	2
Clematis integrifolia	3
— flammea	2
— viticella	2
— - flore pleno	4
Colinsonia canadensis	3
Corydalis speciosa	3
Chelone obliqua	3
Coronilla coronata	4
Chrysanthemum alligenosum	3
Delphinium ambiguum fl. pleno	8
— azureum	6
— exaltatum	6
— grandiflorum	3
— hirsutum	4
— intermedium	4
— maccoratum	4
Dianthus barbatus	1
— - fl. pleno	2
— carthusianorum pl.	4
— japonicus	3
— superbus	2
Dictamnus fraxill. albo	6
— - rubro	4
Digitalis alba	2
— ambigua	2
— ferruginea	2
— grandiflora	3
— purpurea	2
Dodecatheon meadia	4
Doronycum cordifolium	2
— lucidum	2
— macrophyllum	2
— scorpioides	2
— - variegatum	3
Epilobium angustifolium	2
— hirsutum	2
Eupatorium ageratoides	4
— caucasicum	4
— purpureum	4
— trifoliatum	4
Euphorbia palustris	4
Fritillaria imperialis	3
— -- fl. luteo	4
Galega officinalis	2
Gentiana acaulis	2
Geum macrophyllum	2
— coccineum	3
Geranium macrorrhizum	3
— phaeum	3
— tuberosum	2
Gladiolus com. major	1
Glaucium fulvum	2
Glycine Apios	4
Hedysarum canadense	4
— coronarium	3
Helleborus niger	2
— viridis	2
Helianthus diffusus	3
— giganteus	2
— multiflorus fl. pleno	4
Hemerocallis jap. fl. albo	4
— - - coeruleo	3
— flava	2
— fulva	2
Hesperis matronalis	2
— - fl. pl. albo	2
— - - - violaceo	3
Hirstium aurantiacum	2
Iris azurea	3
— aphylla	3
— austriaca	3
— biflora	3
— byzantina	3
— chamecris	2
— -- coeruleo	2
— -- [illegible]	2
— -- purpureo	4

	Gr.
Iris dalmatica	3
— damascena	3
— . alba	4
— flavescens	3
— germanica	2
— holophylla	3
— lucida	3
— Lobelii	4
— pallida	3
— plicata	3
— sambucina	2
— spatulata	3
— spuria	8
— Susiana	4
— striata	3
— virescens	3
Lactuca perennis	1
Lamium orvala	3
Lathyrus latifolius	3
Lavendula multifida	3
Leucojum aestivum	3
Lilium candidum	2
— bulbiferum	2
— martagon. fl. albo	4
— - - pleno	4
— - superbum	6
— tigrinum	3
Linaria linifol.	2
— vulgaris	2
Linum perenne	2
— - multicaule	2
— - grandiflorum	2
Lychnis chalcedonica	2
— - fl. albo	4
— - - carneo	3
— - - ferugineo	3
— - - pleno	4
— dioica albo pleno	8
— - rubro pleno	3
— viscaria	2
— - fl. pleno	2
— fulgens	4
Lysimachia punctata	2
— thyrsiflora	2
— vulgaris	2
Lythrum acuminatum	2
Matricaria parthenium fl. pleno	2
— grandiflor.	10
Melites melissophylla	4
— grandiflor.	3
Mimulus luteus	3
Monarda didyma	3
— fistulosa	2
— rugosa	2
— violacea	3
Orobus lathyroides	2
Paeonia albiflora	8
— aritina carnea	10
— coralifera	6
— daurica	8
— decora elatior	16
— humilis	6
— laciniata	6
— officinalis rubro pl.	3
— - carneo pl.	4
— peregrina	8
— - variegata	10
— tenuifolia	6
Papaver bracteatum	4
— croceum	4
— nudicaule	3
— orientale	3
Penstemon rubescens	3
Phlox acuminata	4
— decussata	4
— divaricata	3
— maculata	3
— panniculata	3
— - fl. albo	4

	Gr.
Phlox pannicul. fl. roseo	4
— parviflora	4
— rubricaule	4
— subulata	4
— suaveolens	4
— repens	3
— undulata	3
Podalyria australis	4
Polemonium coeruleum	2
— fl. albo	3
Polygonum Bystorta	2
Potentilla atrosanguinea	4
— aurea	3
— canescens	3
— diffusa	2
— hirta	2
— nepalensis	3
— obscura	2
— recta	2
— speciosa	3
Primula cortusoides	4
Pyrethrum pinatifidum	3
Ranunculus acris fl. pl.	2
— aconitifolius	4
Rhodiola rosea	4
Rheum compactum	4
— rhaponticum	3
— undulatum	3
Rudbeckia hirta	4
— laciniata	3
— purpurea	6
Salvia affinis	2
Sambucus Ebulus	3
Saponaria officinalis	2
— - fl. pl.	2
Saxifraga crassifol.	2
— longiflor.	2
— umbrosa	2
— punctata	2
Scrophularia aquatica	2
Scutellaria lateriflor.	2
— alpina	2
Senecio saracenica	3
Sylphium perfoliatum	2
Solidago arguta	2
— bicolor	4
— canadensis	2
— lanceolata	2
— reflexa	2
— ulmifol.	2
— virga aurea	2
Spiraea aruncus	2
— filipendula	3
— trifoliata	4
Stachys lanata	3
Statice armeria, 4 Stück	1
— - nana	1
— Limonium	8
Stellaria nemoros.	2
Thalictrum aquilegifol.	3
— cinereum	3
— purpureum	8
— speciosum	4
Trollius aconitifolius	4
— europaeus	4
Tussilago alba	2
— suaveolens	3
Valeriana rubr.	2
— Phu	2
Verbascum Thapsus	2
— phöniceum	4
Veratrum nigrum	4
Veronica arguta	3
— canescens	3
— longifol.	3
— multicaulis	3
— pinnata	3
— virginica	3
Vinca minor fl. pleno	2
Viola odorata fl. pl. albo	2
— - - - rubro	3
— - - - coerul.	1
Waldsteinia geoides	3

Sträucher.

Amorpha fruticosa	3
Amygdalus communis	2
Aristolochia sipho	6
Berberis vulgaris	2
Clematis vitalba	3
Colutea arborescens	2
Corchorus japonicus	4
Coronilla Emerus	3
Crataeg. oxiacanth. fl. rubr.	4
Cytisus laburnum	4

	Gr.
Cytisus elongatus	6
— nigricans	3
Elaeagnus macrophyllus	8
Evonymus europaeus	3
Genista canariensis	4
Hypericum Androsaemum	3
Ligustrum vulgaris	2
Lonicera semperflorens	2
— sibirica	4
— tatarica	2
Mespilus pyracantha	5
Morus papyrifera	6
Myrica cerifera	2
Philadelphus coronarius	2
— nanus	4
Pyrus japonicus	14
— - fl. albo	16
Potentilla fruticosa	4
Prunus mahaleb	2
Ptelea trifoliata	3
Robinia Caragana	3
— hispida	6
— viscosa	4
Rubus fruticosus fl. pl.	4
odoratus	1
Rhus cotinus	4
— typhinum	2
Ribes alpinum	2
palmatum	3
Spiraea actaeifolia	3
— crenata	2
— opulifolia	2
— salicifolia	1
— tomentosa	4
— ulmifolia	2
Staphylea pinnata	4
Symphoricarpus racemosa	4
Syringa persica	2
— - laciniata	3
— chinensis	6
— vulgaris alba	2
— - coeruleo	2
Salix babylonica	4
Viburnum lantana	3
— opulus	2
— - fl. pl.	4
Vitis vulpina	2
— quinquefolia	2

Rosen in gefüllt. Sorten.

Rosa alba pleua	3
— belgica humifusa	6
— - minor	4
— belle aimable	6
— bipunctata	12
— burgundica	2
— capitata	6
— carnea humilis	6
— - media	4
— cuprea	4
— elegans	6
— galanthe	6
— centifolia	1
— - maxima	3
— - hollandica	8
— - saturata	8
— - batavica	6
— cinnamomea	1
— de Dijon	4
— de Meaux	6
— de Perle	6
— de Vilmorin	12
— damascena anglica	6
— - coccinea	4
— eglanteria	2
— francisca rubella	6
— fulgens	4
— gallica	3
— - regalis	4
— - versicolor	4
— gloria mundi	8
— holosericea	3
— - fulgens	6
— - maxima	4
— - ranunculoides	6
— inermis	3
— lactea	6
— lucida	4
— lusitanica	4
— lugdunensis	6
— malum punicum	8
— moschata	4
— mignon	6
— multifolia	3
— - carnea	6

	Gr.
R. multif. coccinea	4
— - incarnata	4
— - purpur. (marmor)	4
— - violacea	6
— muscosa rubra	6
— - fl. albo	28
— omnium calendarum	3
— - - fl. albo	6
— papaverina	8
— pomponica maxima	6
— pulchra fastuosa	6
— provincialis major	4
— purpurea	3
— pimpinellifolia alba	4
— - bicolor	6
— - lactea	8
— - marmorea	6
— - purpurea	4
— - pallida	4
— - regalis	6
— - rubra	4
— Schoenbrunniensis	4

Einfache Rosen.

Rosa bicolor	3
— lucida	2
— lutea	2
— muscosa	12
— pendulina	1
— pimpinellifol. alba	2
— - multiflora	3
— scandens	3
— scotica	2

Topf- od. Monatsrosen.

Rosa semperflorens alba	6
R. semperfl. anemoneflora	6
— - atropurpurea	8
- - banksiana	6
- - buchonia	4
- - centifolia	4
- - diademe de flora	8
- - caroliniana	4
- - furiosa	6
- - linifer blanc	6
- - liginisflora	8
- - marylandica	6
- - marmorea	8
- - monstrosa	6
- - moschata varieg.	4
- - Noisettiana	6
- - - coccinea	8
- - - violacea	8
- - - odorata	6
- - parviflora	6
- - pallida	4
- - petit carmoisin	4
- - pumila	6
- - purpurea	4
- - - minor	6
- - sinensis nova	8
- - speciosa	8
- - Thea carnea	12
- - - lutescens	16
- - - od. pallida	8
- - - - purpurea	8
- sempervirens Banksia	8
- - bracteata	6
- - multifl. japonica	6
- - - jap. purpur.	8
- - - - violacea	8

Chrysanthem. indicum.

Chrysanthemum indicum alba fistulosa	3
Chr. ind. alb. speciosa	4
- - aurea grandifl.	4
- - bicolor	4
- - carnea fistulosa	6
- - fuscat. fist. superb.	6
- - - pallida	6
- - lillacina	6
- - nivea major	6
- - purpurea	3
- - rosea	4
- - sulphurea fistul.	6
- - lutea speciosa	6
- - flavescens	4
- - fuscata ranunc.	6
- - variegata	4

Einige Pelargonien in den schönsten Sorten.

	Gr.
Pelargonium acutilobum	4
P. amplissimum	6
P. Antonianum	10
- Augustum	6
- Augustum coccineum	8
- adulterin. fol. varieg.	6
- alatum	6
- atrofuscum	8
- Bailianum	10
- Baringtonii	6
- Belladonna	6
- bethelinum	6
- bicolor	4
- carnescens	4
- Chandlers purpureum	6
- Clintoniae	10
- Clueni	6
- Commandeur en Chef	8
- coronation	8
- defience	6
- Davianum	6
- de Vere	10
- Dobrianum	8
- Duc Cloncester	6
- Eleonore	6
- Emilie	6
- eximium	4
- expansum	4
- fagri	8
- flagrant	10
- fulgidum	6
- formosum	4
- — rubrum	4
- gloriosum	6
- Gothanum	8
- gratum	6
- grand Usurpateur	8
- Herzog v. Oldenburg	6
- Humei	10
- illustre	4
- inexprimable	6
- Iphigenia	6
- Lady Brouglan	6
- — Morgan	4
- Lamptoni	4
- la Janette	6
- la Valette	4
- le Grand	4
- Lord Compermere	12
- — Whitworths	4
- Ludovicianum	6
- macranthon sup.	6
- magnificum maj.	4
- melachrifolium	10
- Megalanthon	12
- Mungo Park	8
- Naerni	6
- nervosum	8
- nobile	4
- pavoniam	6
- princeps	6
- Prinz. d'Orange	8
- pulcherissimum	12
- Prinz Regent	6
- — — der Neue	6
- — Leopold	4
- — — der Neue	8
- Prinzess. Charlotte	4
- reniforme	4
- Roi George	6
- — de Saube	8
- Rose Mathilde	8
- Rowanii	6
- rubescens	6
- Schmidts invincibile	6
- scutatum superbum	6
- schwarze Prinz	6
- spectabile azureum	6
- splendens	4
- supremum	8
- tinctum	10
- translucens	12
- triumphans	4
- Watsoni	4
- Waterloo	6
- woot magestum	4

Einige Calceolarien.

Calceolaria arachnoides	6
C. crenatiflora	12
- integrifolia	6
- Presti	8
- punctata nova	10
- plantaginea	8
- sanguinea	10
- tricolor	12
- salicifolia	8

Die Zahlung geschieht in preuss. Courant und wird diese oder sichere Anweisung mit der Bestellung erwartet. Briefe und Gelder werden portofrei erbeten, sowie eine verhältnissmässige Vergütung für Kiste und Emballage der Bestellung beizulegen ist.

Alle Bestellungen werden der Reihe nach, sowie es die Witterung zulässt, besorgt und sind dergleichen Erinnerungen unnöthig.

J. [illegible]

PREISS-VERZEICHNISS
FÜR DAS JAHR 1834
von verſchiedenen
Gemüſe-, Feld- und Blumen-Saamen,
welche
beſonders ächt und friſch zu nachſtehend billigen Preiſen zu haben ſind
bei
Friedrich Wilhelm Wendel,
Kunſt- und Handelsgärtner in Erfurt.

Dieſes Verzeichniß, welches ich mich beehre, Garten-Beſitzern und Blumenfreunden vorzulegen, enthält auch Sortiments von Levkojen, Aſtern, Balſaminen und Ritterſporn-Saamen, womit ich einen jeden reſpektiven Abnehmer verſichern kann, beſonders meine Levkojen, die ſtark ins Gefüllte fallen, ſind ſehr zu empfehlen, da ich ſie mit der größten Mühe und Sorgfalt ſelbſt erzeugte.

Die Preiſe ſind nach Preußiſchem Courant, den Thaler zu 30 Silbergroſchen gerechnet.

Kohl- und Kraut-Saamen.

		Sgr.	₰
Blumenkohl, ſchwarzer, aus Sicilien	à Priſe	5	—
- großer, ſpäter, kapiſcher	à Lth.	8	9
- - - holländ.	-	5	—
- - früher, engliſcher	-	7	6
- - - cypriſcher	-	8	9
Meer- oder Seekohl, Crambe maritima, ſehr delikat	-	4	5
Kraut oder Kopfkohl, Erfurter großes, weißes	-	2	—
- Erfurter, frühes, rothes	-	2	—
- - kleines, frühes, feſtes	-	1	3
- - groß., früh, Braunſchw.	-	2	6
- Zuckerhut, großes	-	2	6
- Erfurter, blutrothes, niedriges, frühes, Salat-, extra	-	2	—
Kraut oder Kopfkohl, holländiſch., blutrothes, großes, ſpätes	-	2	6
Wirſing oder Börekohl, Erfurter, großer, ſpäter	-	2	6
- grüner, kleiner, ſpäter	-	1	3
- Ulmer, ganz früher, niedriger	-	2	6
- - halbfrüher	-	2	—
- - ſpäter, großer	-	2	—
- Wiener, ganz früher, extra	-	2	6
- Brüßler, Sproſſen- oder Roſenkohl	-	2	6
Krauskohl oder Blaukohl, grüner niedriger, Winter	-	1	3
Krauskohl oder Blaukohl, brauner Winter	-	1	—
- - grüner u. blauer, melirt	-	—	8
- - dunkelbrauner, niedriger, Bartowicker	-	1	3
Schnitt- oder Frühlingsblattkohl		—	8
- engl., blumenkohlblätteriger	-	—	8
Glaskohlrabi, Wiener, kleinlaubige, niedrige, frühe	-	2	6
- weiße	-	2	6
- Wiener, kleinlaubige, blaue	-	3	2
- engliſche, frühe, weiße	-	1	3
- - - blaue	-	2	—
Unterkohlrüben, große, weiße	-	—	8
- gelbe, ſchwediſche, extra	-	2	—

Küchen-Kräuter.

		Sgr.	₰
Anethum, Dill	-	—	4
Baſilikum, großer	-	1	3
- kleiner, krausblätteriger	-	2	6
Bohnenkraut oder Saturei	-	1	3
Gartenkreſſe, gefüllte, krausblätterige	-	—	8
- ordinaire	-	—	5
Kerbel	-	—	8
Lavendel oder Spicke	-	1	3
Löffelkraut	-	2	—
Majoran, franzöſiſcher, buſchigter		2	—
Meliſſe, Zitronen	-	2	6
Peterſilie, einfache, Schnitt-	-	—	8
- krausblätterige, gefüllte	-	1	3
Portulak, gelber	-	2	—
- grüner	-	1	3
Salbey	-	1	3
Spinat, breitblätteriger, rundkörniger à ℔ 5 Sgr.	-	—	4
- langblätteriger, ſtachelkörniger à ℔ 5 Sgr.	-	—	4
- engl., breitblättr. à ℔ 10 Sgr.	-	1	—
Thymian	-	2	—
Weinraute	-	2	—

Wurzel- und Rüben-Saamen.

		Sgr.	₰
Carotten oder Möhren, holländ. frühe, kurzſchwänzige	à Lth. -	1	3
- lange, dunkelrothe, Feld- à ℔ 15 Sgr.	-	1	3
- Erf., lange, rothgelbe à ℔ 15 Sgr.	-	2	—
- Saalf. blaßgelbe à ℔ 12 Sgr. 6 ₰	-	—	8
Peterſilienwurzel, Erfurter, lange	-	1	3
Sellerie, großer, holländiſcher, Knoll-	-	1	3
Wurzel, große Paſtinak-	-	1	3
- Scorzoner- oder Schwarz-		1	3
- Rapontica-	-	1	3
- Cichorien-, lange, glatte	-	1	3
Rüben, lange, weiße, Herbſt- oder Guckel-		—	8
- holländiſche, runde, weiße, Mai-	-	1	3
- holländiſche, runde, gelbe	-	1	3
- Teltauer oder Märkſche	-	1	3
- blutrothe Salat- oder Beeten	-	—	8
Runkel- oder Dickrüben, große rothe	à ℔	3	9
- gelbe Zucker-, zu Kaffee anſtatt Möhren	-	10	—

Salat-Sorten.

		Sgr.	₰
Salat, aſiatiſcher Kopf-, braun Korn	à Lth.	2	6
- großer, arabiſcher, gelber, Kopf-, braun Korn	-	2	6
- aſiatiſcher, gelber Kopf-, weiß Korn	-	2	—
- großer, bunter Forellen-, weiß Korn	-	2	—
- engl., kleiner Blutforellen, extra, braun Korn	-	2	6
- Schwedenkopf, weiß Korn	-	2	6
- - extra, braun Korn	-	2	6
- engl. Prinzenkopf, weiß Korn	-	2	6
- ordin. Prinzenkopf, braun Korn	-	2	—
- brauner Mohrenkopf, braun Korn	-	2	—
- brauner Mailänder, gelb Korn	-	1	3
- früher, gelber Stech- oder Wirſing-	-	1	3
- rothbrauner Prahl-	-	2	—
- großer Forellen-, braun Korn	-	2	6
- - Mongole, weiß Korn	-	2	—
Winter-Endivien, glattblätterige	-	2	—
- - krausblätterige	-	2	—
Sommer-Endivien, glattblätterige	-	1	3
- - krausblätterige	-	2	—

Zwiebel-Sorten.

		Sgr.	₰
Zwiebel, Erfurter, runde, rothe, harte Kopf-	à Lth. -	1	3
- lange, gelbe Birn-	-	2	6
- runde, gelbe, holländiſche		3	2
- - blutrothe	-	2	6
- - ſilberweiße	-	3	2
Porree, dicker Winter-	-	1	3

Steckzwiebeln.

		Sgr.	₰
Steckzwiebeln, mehrere Sorten	à 100 St.	3	9
Steckzwiebeln, Rokambol	à 100 St.	5	—
- Schalotten, gewöhnliche	-	5	—
- - große, däniſche,	à 10 St.	4	
Steckzwiebeln, Knoblauch	à 100 Stück	5	—
- egyptiſche, über ſich tragend ſehr gut im Geſchmack	à 10 -	5	—

Radies und Rettig.

		Sgr.	₰
Radies, weiße, runde, holländiſche, kurzlaubige	à Lth. -	1	3
- rothe	-	1	3
- roſenrothe, runde, extra	-	2	6
- lange, weiße, Glas-	-	2	6
- - rothe, Glas-	-	2	6
- - roſenrothe	-	1	3
Rettig, Erfurter, große, lange, ſchwarze, Winter-	-	2	—
- Erfurter, runde, ſchwarze	-	2	—

Kern-Sorten.

		Sgr.	₰
Gurkenkern, Erfurter, mittellange, grüne, volltragende	à Lth. -	2	—
- lange, grüne, Schlangen-	-	3	9
- - weiße	-	7	6
- Halliſche, lange, grüne	-	2	6
Melonenkern, große, ſchwarze, Kantelupe	à Priſe		
- große Silber-	-		
- graue Serepta-Melone	-		
- Bouillac, ſehr delikat	-		
- ganz frühe Traubenmelone	-		
- Aſtraganer Melone, vorzügl.	-		
Ein Sortiment von 16 der beſten Sorten	-	15	—
Von dieſen Sorten die Priſe		5	—
Spargelkern, Darmſtädter	à Lth.	2	—

Kürbiskern-Sorten.

1) Herkuleskeule. 2) Flaſchenkürbis. 3) Sternk. 4) Eckiger Gurkenk. 5) Bunter Apfelk. 6) Türkenbundk., großer. 7) Zuckerhut. 8) Citronenk. 9) Runder goldfarbiger Kürbis. 10) Weißer Apfelk. 11) Kleiner, warziger Walzenk. 12) Citronengelber. 13) Gelber Apfelk. 14) Weißer Birnk. 15) Orangenk. 16) Bunter Birnk. 17) Straußk. 18) Großer Pommeranzenk. 19) Länglicher Warzk. 20) Walzenk. 21) Cylinderförmiger Höckerk. 22) Bemalter Warzenk. 23) Halb orangen und halb ſchwarzgrüner Birnk. 24) Hieroglyphenk. 25) Glockenk. 26) Paſtetenk. 27) Brillanter Türkenbundk. 28) Bunter Beutelkürbis. 29) Chineſer-Mütze. 30) Fünfſtreifiger Marmorkürbis. 31) Zentnerkürbis.

	Sgr.	₰
Die Priſe, zu 4 bis 6 Kern, à Sorte	2	—
Das ganze Sortim. in 31 Sort. 1 Thlr.	20	—
- - - - 15 - 1 Thlr.	—	—
- - - - 10 -	20	—

Erbſen-Sorten.

		Sgr.	₰
Zuckererbſen, engl., frühe, weißblühende	à ℔ -	6	3
- große, weiße, Nonpareille, extra	-	7	6
- grüne, blaublühende Säbel	-	5	—
- frühe, niedrige, Zwerg-	-	7	6
Kneifel- oder Pahlerbſen, frühe, niedrige Mai-	-	6	3

		Sgr.	₰
Kneifel- oder Pahlerbſen, Erfurter, große, frühe, Klunker . . .	à ℔	2	6
– ſpäte Geld- oder Wachs-	–	3	9

Bohnen-Sorten.

		Sgr.	₰
Stangenbohnen, arabiſche, große, bunte oder Feuer .	–	5	—
– arabiſche, weiße Feuer . . .	–	5	—
– lange, breite oder Schwert-	–	6	3
– graue, weißſchalige . .	–	5	—
– weiße, engl., extra . .	–	7	6

		Sgr.	₰
Stangenbohnen, kleine, weiße, Perl- oder Salat- .	à ℔ –	5	—
Buſch- oder Stammbohnen, frühe, runde, gelbe . .	–	5	—
– gelbe Zucker- . . .	–	5	—
– ſchwarze, früheſte . .	–	3	9
– ſchwarzbunte Zucker .	–	5	—
Buſch- oder Stammbohnen, weiße Schwert- . . .	–	5	—
– kleine, weiße, Feld- .	–	2	6
Puffbohnen, große, engl. Windſor		3	9
– ordinaire, große Garten- .	–	2	—
– rothblühende . . .	–	10	—
– niedrige Magazan- ..	–	7	6

Oekonomische Saamen.

		Sgr.	₰
Aepfelkern, Pyrus malus .	à ℔	11	9
Birnkern, Pyrus communis .	–	17	6
Maulbeere, weiße, à Lth. 3 Sgr. 9 ₰ u.	à ℔. 2 Rth.	15	—
– ſchwarze . . .	à Lth.	3	9
– rothe	à Lth.	3	9
Klee, Esparcette . . .	à ℔	3	9
– Luzerner . . .	–	7	6
– ſpaniſcher, rother, Kopf-	–	7	6
Raigras, engliſches . . .	–	7	6
– franzöſiſches . . .	–	8	9
Weberkarden, große, franzöſiſche	–	15	—

Saamen von einigen exotischen Pflanzen.

		Sgr.	₰
Acacia lophantha . .	à Prise	2	6
– *verticillata* . . .	–	1	3
Agapanthus umbellatus . .	–	2	6
Blumenbachia insignis . .	–	3	9
Canna coccinea . . .	–	2	6
– *indica*	–	1	3
– *mexicana* . . .	–	2	6
– *limbata*	–	2	6
– *patens*	–	2	6
– *speciosa*	–	2	6
Cassinia spectabilis . . .	–	2	6
Celsia grandiflora . . .	–	2	6
Colutea frutescens . . .	–	2	6
Cytisus argenteus . . .	–	2	6

		Sgr.	₰
Didymocarpus Rhexii .	à Prise	7	6
Gloxinia formosa . . .	–	2	6
Gossipium vitifolium . .	–	2	6
Hemimeris urticaefolia . .	–	2	6
Iberis Gibraltarica . .	–	5	—
Leptospermum attenuata . .	–	5	—
– *baccatum* . .	–	2	6
– *grandiflorum* . .	–	2	6
– *juniperinum* . .	–	2	6
– *myrtifolium* . .	–	2	6
– *scoparium* . .	–	2	6
Maurandya anthirrhinifl. . .	–	2	6
– *Barcleyana* . .	–	3	9
– *semperflorens* :	–	2	6

		Sgr.	₰
Metrosideros angustifolia .	à Prise	2	6
– *angulosa* . .	–	2	9
– *glandulosa* . .	–	3	9
– *lanceolata* . .	–	2	6
– *lophantha* . .	–	2	6
– *saligna* . . .	–	2	9
Myrsinia africana . . .	–	1	3
Passiflora alba . . .	–	3	9
Phyllis nobla	–	2	6
Plumbago zeylanica . .	–	2	6
Primula chinensis . . .	–	5	—
Sisyrinchium Bermudiana .	–		
– *striatum* . .	–	2	6
Trachelium coeruleum . .	–	2	6
Xeranthemum fulgidum . .	–	2	6

Verschiedene Blumenzwiebeln und Knollen, die bis Ende April zu haben sind.

		Rth.	Sgr.	₰
Amaryllis formosissima .	à Stück	—	5	—
– *vittata* . . .	–	—	22	6
Amomum zerumbet . .	–	—	5	—
– *zingiber* . . .	–			
Anredera spicata . :	6 Stück	—	7	6
Begonia discolor . . .	–	—	5	—
Canna angustifolia . . .	–	—	7	6
– *chinensis* . . .	–	—	16	—
– *coccinea* . . .	–	—	7	6
– *compacta* . . .	–	—	10	—
– *glauca*	–	—	15	—
– *indica*	–	—	7	6
– *lagunensis* . . .	–	—	10	—
– *limbata* . . .	–	—	5	—
– *lutea*	–	—	7	6
– *mexicana* . . .	–	—	7	6
– *occidentalis* . . .	–	—	7	6
– *pallida*	–	—	10	—

		Rth.	Sgr.	₰
Canna speciosa . :	6 Stück	—	12	6
Commelina coelestis . .	–	—	2	6
Cyclamen europaeum . .	–	—	6	—
– *persicum* . . .	–	—	7	6
Cyrilla pulchella . .	6 Stück	—	2	6
Ferraria tygridia . . .	–	—	2	6
Gloxinia formosa . . .	–	—	5	—
– *speciosa* . . .	–	—	7	6
– – *albo* . .	–	—	10	—
Kaempferia longa . . .	–	—	7	6
Lachenalia tricolor . . .	–	—	2	6
– *quadricolor* . .	–	—	5	—
Lilium tigrinum . . .	–	—	2	6
Tradescantia Selloviana . .	–	—	2	6
Anemonen, gefüllte, in Rommel holl. .	100 Stück	2	18	—
Ranunkeln, deutsche, in vielen Farben .	100 Stück	—	22	6

		Rth.	Sgr.	₰
Ranunkeln, rothe, türkische, zum Treiben .	12 Stück	—	10	—
Tuberosen, einfache, blühbare Zwiebeln .	12 Stück	—	15	—
– gefüllte . . .	12 Stück	—	22	6
Ananas-Kartoffeln .	12 Stück	—	3	9
Mandel-Kartoffeln, ganz kleine sehr gut im Geschmack	100 Stück	—	10	—
25 Sorten Kartoffeln mit Namen, à Sorte zu 2, 3, 4	Stück	—	20	—
Gefüllte Georginen in 50 Sorten	50 Stück	9	—	—
dº . .	25 –	6		—
dº . .	12 –	3	15	—
dº . .	6 –	2		—
Anemonenblüthige Georginen, 8 Stück in 8 Sorten .		4	—	—
4 Stück		2	—	—

In diversen Pflanzen sind abzugeben.

	Rth.	Sgr.	₰
Aurikel, Luiker, 12 Stück in 12 der besten Sorten . .	—	22	6
– englische, 12 St in 12 Sorten	3	—	—
Primel, engl., 12 Stück in 12 Sorten	—	15	—
– chinesische, rothe, 12 Stück	1	—	—
– weisse, 12 Stück . .	2	—	—

	Rth.	Sgr.	₰
Nelken, Hauptblumen mit Namen 12 Stück	2	15	—
Chrysanthemum in 16 Sorten .			
Erdbeeren, Monats-, ohne Ranken	1	10	—
12 Stück	—	3	9
– Zimmt-, vorzüglich, 12 Stück	—	7	6

	Rth.	Sgr.	₰
Erdbeeren, Ananas-, vorzügl, 12 Stück	—	3	9
– virginische – 12 –	—	5	—
Spargelpflanzen, 3jährige, 100 –	1	5	—
Centifolien-Rosen, . 100 –	1	15	—
Kleine Centifolien-Rosen 12 Stück	1	15	—
Damenröschen, sehr schön 12 –	1	—	—

Sommer-Gewächse, welche nur ein Jahr ausdauern.

		Sgr.	₰
Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen	à Prise	1	3
- *autumnalis*, Herbst-Adonisröschen	-	1	3
Ageratum mexicanum, blaues Ageratum, neu u. schön	-	3	0
Agrostemma coelirosa, glattblättrige Rade	-	1	3
Amaranthus cruentus, dunkelrother Amaranth	-	1	3
- *tricolor*, dreifarbiger	-	1	3
- *viridis*, grüner	-	2	—
Anoda dillenia, blaue Anoda	-	1	3
Anthemis arabica, arabische Kamille	-	2	—
Antirrhinum tryphyllum, dreiblättriges Löwenmaul	-	1	3
Argemone Barkleyana, Barkleys Stachelmohn	-	2	6
- *mexicana*, mexicanischer	-	1	3
- *ochroleuca*, ockerfarbiger	-	2	6
Blitum capitatum, Erdbeerspinat	-	1	3
- *virgatum*, ruthenförmig	-	1	3
Briza maxima, grösstes Zittergras	-	1	3
Cacalia sonchifolia, scharlachrothe Cacalie	-	2	—
Calandrinia ulsreudens, purpurrothe Calandrinie	-	2	—
Calendula pluvialis, Regen-Ringelblume	-	1	3
- *hybrida*, Bastard-Ringelblume	-	2	—
- *officinalis*, gefüllte, gemeine	-	1	3
Campanula speculum, Venusspiegel	-	1	3
- *fl. roseo*, rosenrother	-	2	—
- *fl. albo*, weisser	-	2	—
Capsicum annuum, rother und gelber spanisch. Pfeffer	-	1	3
Carthamus tinctorius, Saflor	à Lth.	2	6
Catananche coerulea, blaue Rasselblume	-	2	—
- *lutea*, gelbe	-	1	3
Centaurea cyanus, Gartenkornblume in vielen Farben	-	1	3
- *crocodylium*, Krokodillblume	-	1	3
- *moschata, fl. albo*, weisse Bisam-Flockenblume	-	1	3
- *mosch. coerulea*, blaue	-	1	8
- *suaveolens*, gelbe Kornblume	-	2	—
Cerinthe major, grosse Wachsblume	-	1	3
Cheiranthus maritimus, Meerstrands-Levcoje	-	1	3
- *marit. fl. albo*, weisse	-		
Chrysanthemum carinatum, Goldwucherblume, weiss	-	2	—
- *carinat. fl. luteo*, gelbe	-	2	6
- *coronarium*, gefüllte gelbe und weisse gekrönte	-	1	3
Clarkia pulchella, schöne Klarkie	-	2	6
Collinsia grandiflora, grossblumige Collinsie	-	3	
Collomia grandiflora, grossblumige Collomie	-	2	—
- *pinnatifida*, gefiederte	-	1	3
Convolvulus tricolor, dreifarbige Winde à Lth. 3 Sgr. 9 ₰	-	—	8
Crepis rubra, rother Pippau	-	1	3
Corydalis aurea, goldfarbiger Erdrauch	-	1	3
Cuphea viscosissima, klebrige Cuphee	-	1	3
Cynoglossum linifolium, weisses Vergissmeinnicht	à Lth.	3	9
Cystirapnos africana, afrikanische Blasenraute	à Prise	1	3
Dracocephalum Moldavicum, blaue und weisse türkische Melisse	-	1	3
Echium creticum, braunrother Natterkopf	-	1	3
- *grandiflorum*, grossblumiger	-	2	—
Elychrisum bracteatum, glänzende gelbe Strohblume	-	1	3
- *bracteatum fl. albo*, glänzende weisse	-	5	—
Erodium gruinum, Reiherschnabel	-	1	3
- *moschatum*, Bisam-Reiherschnabel	à Prise	1	3
Galiopsis bicolor, das schöne Gesicht	-	2	—

		Sgr.	₰
Galinsogea trilobata, dreilappige Galinsoga	-	2	—
Gilia capitata, kopfförmige Gilie	-	2	6
Glaucium phoeniceum, rother Hornmohn	-	2	—
Grahamia aromatica, gewürzhafte Grahemie	-	2	—
Hebenstreitia aurea, goldfarbige Hebenstreitie	-	2	—
Helianthus annuus fl. pl. aurea, goldgelbe Sonnenblume	à Lth.	5	—
- *annuus fl. pl. sulphurea*, gefüllte schwefelgelbe	-	1	3
- *nanus*, niedrige 1 Fuss hoch	-	2	—
- *lenticularis*	-	1	3
Hibiscus Trionum, Stunden-Hibiskus	-	1	3
- *vesicarius*, Blasen-Hibiscus	-	1	3
Iberis amara, weisse bittre Schleifenblume	-	2	—
- *pinnata*, gefiederte	-	2	—
- *umbellata*, doldentragende	-	1	3
- *umbellata fl. purpureo*, purpurrothe	-	2	—
- - *fl. roseo*, rosenfarbige	-	2	—
Ipomea purpurea, diverse Sorten, verschiedenartige Trichterwinden	à Lth.	3	9
Ketmia vesicaria, grossblumige Ketmie	à Prise	2	6
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke	à Lth.	2	6
- *striatus*, gestreifte	-	2	6
- *articulatus*, gegliederte Platterbse	-	1	3
- *sativus*, himmelblau	-	1	3
- *tingitanus*, afrikanische	-	1	3
Lavatera trimestris, dreimonatliche Lavatere	-	1	3
Leonurus nepalensis, Nepalische Mutterwurz	-	1	3
Linaria bipartita, zweitheiliger Frauenflachs	-	2	—
Lapecia excellaris, doldenblüthige Lopezie	-	1	3
Lupinus albus, weisse Lupine	-	2	—
- *angustifolius coeruleus*, schmalblättrige blaue d°	-	1	3
- *micranthus*, kleiner	4 Korn	2	6
Malopa trifida, dreitheilige Malope	-	2	—
Malva mauritiana, mauritianische Malve, weiss und roth	-	1	3
Medicago christa galli, Schneckenklee	-	2	—
- *variegata*, bunter	-	1	3
Mirabilis Jalappa, gemeine Jalappe, in 8 verschiedene Farben gemischt: weisse, gelbe, rothe, weiss mit gelb, gelb mit roth, carmoisin mit scharlach, und dreifarbige; diese 8 Sorten, jede Sorte besonders	-	10	—
Mirabilis longiflora, langblüthige, wohlriechende Jalappe	-	1	3
Momordica Balsamina, gemeiner Balsamapfel	-	1	3
- *elaterium*, Springgurke	-	1	3
Nicotiana Langsdorfii, gelbblühender Tabak	-	1	3
- *nyctaginiflora*, Jalappenblüthiger	-	2	—
Nigella damascena, damaszener Schwarzkümmel	-	1	3
Nolana prostrata, liegende Nolane	-	1	3
Oenothera amoena, angenehme Nachtkerze	-	2	—
- *grandiflora*, grossblumige	-	1	3
- *Lindleyana*, Lindleys	-	2	-
- *macrocarpa*, grossfrüchtige	-	1	3
- *odorata*, wohlriechende	-	2	
- *purpurea*, purpurrothe	-	1	3
- *Romanzowii*, blaue	-	1	3
- *tetraptera*, vierflügeliche	-	2	

		Sgr.	₰
Papaver Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn in mehreren schönen Sort	à Lth.	3	
- *somniferum*, vorzüglich schöner Gartenmohn	-	3	
Polygonum orientale, morgenländischer Knoterich	à Prise	1	
- *orientale fl. albo*, weisser	-	1	
Reseda alba, weisse Resede	-	1	
- *odorata*, wohlriechende	à Lth.	5	
Ricinus africanus, afrikanischer Wunderbaum	-	1	
- *communis*, gemeiner	-	1	
- *inermis*, glatter	-	2	
- *lividus*, rothblättriger	-	1	
- *viridis*, grüner	-	1	
Salvia Horminum, Scharlach-Salbey, blau- und rothfarbige	-	1	
Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie	-	2	
Scabiosa atropurpurea, dunkelpurpurrothe Scabiose	-	1	
- *grandifl.*, grossblumige	-	2	
- *stellata*, sternförmige	-	1	
Schizanthus pinnatus, gefiederte Schizanthe	-	2	
Senecio elegans fl. plena albo, weissgefüllt. Kreuzkraut	-	2	
- *eleg. fl. pl. rubro*, roth	-	1	
Silene Armeria, Gartensilene	à Prise	1	
- *Atocion*, schöne	-	1	
- *pendula*, hängende	-	1	
- *quinquevulnera*, fünffleckige	-	1	
- *vespertina*, Abend-Silene	-	1	
Solanum Lycopersicum, hochrother Liebesapfel	-	1	
- *Lycopersicum fructo luteo*, mit gelben Früchten	-	1	
Sicyos angulata, eckige Haargurke	-	2	
Tagetes cuminifolia, starkriechende Sammtblume	-	1	
- *erecta*, orangengelb, gef.	-	2	
- - schwefelgelb	-	2	
- - zitronengelb	-	2	
- *fistulosa*, röhrige, in 3 Farb.	-	2	6
- *minima, fl. pl.*, kleinste gefüllte d°	-	2	—
- *patula, fl. pl.*, ausgebreitet gefüllte	-	1	
- *striata*, gestreifte	-	2	—
Tolpis barbata, bärtiger Pippau	-	1	
Trifolium coeruleum, blaublühender Klee	-	1	
Tropaeolum majus, grosse indianische Kresse	à Lth.	2	
Vicia faba atropurpurea, dunkelrothe Puffbohne	-	1	
Viola tricolor grandifl., grossblumig. Stiefmütterchen	-	1	
- *nigra*, schwarzes	-	2	—
- - *et lutea*, schwarzblau mit gelb	-	1	
Xeranthemum annuum, weissgefüllte Papierblume	-	2	—
- *annuum rubrum*, rothe gefüllte	-	2	
Ximenesia encelioides, geöhrte Ximenesie	-	1	
Zea Mais, türkischer Weizen in verschiedenen Farben	-	2	
Zinnia aurea, goldgelbfarbene Zinnia	-	1	
- *ambigua*	-	2	—
- *elegans*, schöne blassrothe	-	2	
- - dunkelrothe	-	2	
- - *coccinea*, brennendscharlachrothe	-	7	
- *grandiflora*, grossblüthige	-	1	
- *multiflora rubro*, vielblühende rothe	-	1	
- - *lutea*, gelbe	-	1	
- *tenuiflora*, schmalblüth.	-	1	
- *verticillata*, quirlförmige	-	2	-
Ein Sortim. schön blühender Blumensaamen von 100 Sorten	2 Rt.	—	—
Eins dergl. von 75 Sorten	1 Rt.	15	—
- - - 50 -		25	—
- - - 30 -		20	—
- - - 25 -		15	—
Ein Sortim. von 22 Sorten schön blühender Blumensaamen		10	—

Saamen von Stauden- oder perennirenden Gewächsen.

	Sgr.	₰
Aconitum Anthora, feinblättriger Sturmhut à Prise	2	6
- *barbatum*, bärtiger -	2	6
- *napellus* -	2	6
- *volubile*, windender -	2	6
Achillea Ageratum, gewürzhafte Balsamgarbe -	2	6
- *grandifl.*, grossblumige -		
- *speciosa*, ansehnliche -		
- *tanacetifolia* -	2	6
- *tomentosa*, filzige -	2	6
Agrimonia odorata, wohlriechender Adermennig -		
Agrostemma coronaria, Garten-Rade -		
- *flos Jovis*, doldentraubige -	2	6
Allium odorum, wohlriechender Lauch -	2	6
- *roseum*, rosenfarbenes -	2	6
Althaea rosea fl. pl. diversa, gefüllte Winter Malve in vielen Farben à Dtz.	1	6
Ein Sortiment in 25 schönen Farben zu 25 Prisen	2	6
Ammobium alatum à Prise	2	6
Anchusa capensis, capische Ochsenzunge -	2	6
Aquilegia atropurpurea, schwarzrothe Ackelei -	2	6
- *canadensis*, canadische -	2	6
- *grandifl.*, grossblumige -	2	6
Arabis collina -		
Astragalus alopecuroides, fuchsschwanzartiger Tragant -	2	6
- *galegiformis*, geisrautenartiger -	2	6
- *Laxmanni* -		
- *monspessulanus*, französ. -	2	6
Astrantia heterophylla, verschiedenblättrige Astrantia -	3	9
Betonica grandiflora, grossblumige Betonike -	2	6
Buphtalmum speciosum -		
Campanula Medium fl. albo pl. gefüllte weisse Marienglockenblume -	2	6
- *Medium fl. coeruleo pl.*, gefüllte blaue -	2	6
- *Medium fl. lilac. pl.*, gefüllte lila -	2	6
- *pyramidalis*, pyramidenförmige -	3	9
- *speciosa*, ansehnliche -	3	9
- *suaveolens* -	2	6
- *trachelioides* -		
Chelone barbata, bärtige Schildblume -	2	6
- *obliqua*, schiefe -	2	6
- - *fl. albo*, schiefe weissblühende -	3	9
Coreopsis undulata -	2	6
- *verticillata*, quirlförmige -	2	6
- *Atkinsonii* -	2	6
Cynoglossum pictum -		
Dianthus Carthusianorum, carthäuser Nelke -		
- *caryophyllus fl. pl.*, schöne gefüllte Topfnelke 100 K.	15	—
- *chinensis*, chinesische -	2	6
- *plumarius fl. pl.*, gefüllte Federnelke -		
Digitalis ambigua, zweifelhafter Fingerhut -		

	Sgr.	₰
Digitalis ferruginea, rostfarbiger à Prise		
- *fuscescens*, bräunlicher -		
- *grandiflora*, grossblumiger -		
- *hybrida* -		
- *laevigata*, glatter -		
- *lanata*, wolliger -	2	6
- *purpurascens*, purpurrother -	2	6
Dracocephalum peregrinum, fremder Drachenkopf -	2	6
Echinops paniculatus -	2	6
- *Ritro*, glattblättrige -	2	—
Epilobium angustifol. fl. albo, schmalblättriges Weidenröschen -		
Eschscholzia californica, Eschscholzie aus Californien, sehr schön -	2	6
Francoa sonchifolia -	2	6
Gaillardia aristata -	3	9
Galium purpureum -	2	6
- *verum fl. luteum* -	2	6
Gentiana cruciata, Kreuz Enzian -	2	6
Geranium phaeum, rothbrauner Storchschnabel -		
Geum chilense -	3	9
- *coccineum*, scharlachrothes -	2	6
Hedysarum canadense, kanadischer Hahnenkopf -	2	6
- *coronarium* italienischer -	2	
Hesperis matronalis, rothe Nachtviole -		
Hieracium aurantiacum, pomeranzenfarbiges Habichtskraut -		
- *speciosum* -		
Hypericum androsaemifolium -		
- *Ascyron*, Johanniskraut -		
- *Gebleri* -		
- *pyramidalis* -	2	6
Iris sibirica fl. albo, sibirischer Schwertel -		
- *Lasiopetalum*, *radiat* -		
Lathyrus heterophyllus, verschiedenbl. Platterbse -		
- *latifolius*, breitblättrige -		
Lavatera [illegible] -	3	9
- *thuringiaca*, thüringische -		
Linum flavum, gelber Flachs -	3	9
Lobelia fulgens, leuchtende Lobelie -		
syphilitica, blaue -	2	6
Lunaria annua, stumpffrüchtige Mondviole -		
Lupinus perennis, ausdauernde Wolfsbohne -	2	6
- *polyphyllus*, schöne -	3	9
Lysimachia punctata, punktirte Lysimachie -		
- *verticillata* -		
Mimulus luteus, gelbe Gauklerblume -		
- *floribundus* -	2	6
- *moschatus* -	2	6
- *rivularis*, Bach- -		
- *ringens* -	2	6
Monarda didyma, scharlachrothe Monarde -	2	6
Moraea chinensis, bunte Moräe -	3	9
Oenothera Fraseri -	2	6
- *minima* -	2	6
- *splendens* -	3	9

	Sgr.	₰
Paeonia albiflora odorata, weissblühende wohlriechende Pfingstrose à Prise	3	9
- *officinalis*, gemeine -	2	6
- *paradoxa*, bewaffnete -	2	6
Papaver caucasica, caucasischer Mohn -	2	6
- *crocea* -	2	6
- *bracteata*, beblätterter Mohn -	2	6
- *nudicaule* -	2	6
- *orientalis* -		
Penstemon campanulata -	2	6
Podalyria australis, südliche Podalirie -	2	6
Potentilla atrosanguinea, dunkelblutrothes Fingerkraut -	2	6
- *formosa* -	2	6
- *obscura*, dunkles -	2	6
- *recta*, gerades -	2	6
- *rupestris*, Felsen -	2	6
- *splendens*, leuchtendes -	2	6
Polemonium coeruleum, blaues Sperrkraut -		
- *coeruleum fl. albo*, weisses -		
- *lacteum* -	2	6
- *sibiricum* -		
Bupleurum aureum -		
Rudbeckia fulgida, leuchtende Rudbeckie -	2	6
- *hirta*, rauhe -		
- *speciosa* -	2	6
- *triloba*, dreilappige -	2	6
Salvia [illegible] -		
- *grandiflora*, grossblum. -	2	6
- *pratensis*, Wiesen -		
- - *fl. alba*, weissblühende -	2	6
Scabiosa caucasica, caucasische Scabiose -	2	6
Scutellaria lateriflora -		
- *peregrina* -		
Thalictrum [illegible] -	3	9
- *nigricans* -		
- *speciosum*, schöne -	2	6
Trollius asiaticus, asiatische Trollblume -		
- *europaeus*, europäische do		
- *laxus* -	2	6
Valeriana rubra, rother Baldrian -	2	6
- *fl. albo*, weisser -	2	6
Veratrum nigrum, schwarzer Germer -		
Verbascum blattaria, veränderliche Königskerze -	2	—
- *speciosum*, prächtige -	2	6
- *Thapsus* -		
Verbena bonariensis, südamerikanisches Eisenkraut -	2	6
- *hastata*, spontonblättr. -		
- *paniculata* -		
- *stricta*, steifes -		
Veronica gentianoides, enzianartiger Ehrenpreis -		
- [illegible] -	2	6
- *incana*, grauer -	2	6
- *longifol.*, langblättriger -		
- *sibirica*, sibirischer -		
Viola tricolor, dreifarbiges Veilchen -	2	6

Von diesen Staudengewächsen werden die Saamen in folgenden Parthieen abgegeben, als: Von 18 Sorten 15 *Sgr.* Von 36 Sorten 1 *Rthl.* Von 50 Sorten 1 *Rthl.* 7 *Sgr.* 6 ₰. Von 100 Sorten 2 *Rthl.* 7 *Sgr.* 6 ₰. — Wo kein Preis angezeigt ist, kostet die Prise 1 *Sgr.* 3 ₰.

Stauden-Gewächse, welche als Pflanzen abgegeben werden.

		Sgr	₰
Acaena adscendens	à Stück	3	—
Acanthus carduifolius	-	5	8
Achillea Ageratum	-	3	—
- *compacta*	-	2	6
- *Eupatorium*	-	2	6
- *filipendulina*	-	2	6
- *grandiflora*	-	2	6
- *impatiens*	-	2	6
- *setacea*	-	2	6
Adonis vernalis	-	3	—
Agrimonia odorata	-	2	—
- *pilosa*	-	3	—
Alchemilla alpina	-	2	6
- *pubescens*	-	2	6
Allium atropurpureum	-	5	8
- *glaucum*	-	2	—
- *Moly*	-	3	—
- *odorum*	-	2	—
- [illegible]	-	2	6
Althaea leucantha	-	7	6
Anacyclus aureus	-	2	6
Anemone silvestris	-	2	—
- *virginiana*	-	2	—
Anisodus luridus	-	7	6
Aquilegia atropurpurea	-	2	6
- *canadensis*	-	3	—
- *Gebleri*	-	7	6
- *viscosa*	-	5	—
- *vulgaris*	-	2	—
- - *fl. pl.*	-	2	—
Armeria dianthoides	-	7	6
- *latifolia*	-	3	9
Arum italicum	-	7	6
Arundo Donax	-	5	—
Asclepias incarnata	-	3	9
Aster elegans	-	3	—
- *grandiflorus*	-	5	—
- *hyssopifolius*	-	2	6
- *laevis*	-	5	8
- *laxus*	-	2	6
- *macrophyllus*	-	2	6
- *multiflorus*	-	2	6
- *novae Angliae*	-	3	—
- *polyphyllus*	-	3	—
- *virginicus*	-	3	—
Astragalus galegiformis	-	3	—
- *monspessulanus*	-	6	—
Betonica grandiflora	-	2	6
Boltonia glastifolia	-	2	6
Buphthalmum cordifolium	-	2	6
Cacalia hastata	-	4	8
Campanula grandiflora	-	5	8
- *gummifera*	-	3	—
- *marsupiiflora*	-	5	—
- *pyramidalis*	-	4	3
Catananche coerulea	-	2	6
Chaptalia Anandria	-	2	6
Coreopsis auriculata	-	2	6
- *tripteris*	-	2	6
- *verticillata*	-	2	6
Cyclamen europaeum	-	5	8
Delphinium altaicum	-	4	3
- *grandiflorum*	-	3	—
- *hybridum*	-	3	—
- *intermedium*	-	4	3
- *montanum*	-	2	6
- *palmatifidum*	-	2	6
- *speciosum*	-	2	6
Digitalis ambigua	-	5	—
- *lutea*	-	2	—
Doronicum caucasicum	-	6	3
Echinops bannaticus	-	5	—
- *exaltatus*	-	5	—
Epimedium alpinum	-	2	—
Erigeron bellidifolius	-	5	—

		Sgr	₰
Erodium serotinum	à Stück	5	—
Eryngium giganteum	-	3	—
- *planum*	-	2	—
Gaillardia aristata	-	7	6
Geum album	-	2	6
- *coccineum*	-	10	—
Globularia cordifolia	-	5	—
Helianthus exaltatus	-	5	—
- *multiflorus*	-	5	—
Helleborus foetidus	-	4	—
- *niger*	-	2	—
- *praecox*	-	2	—
Hemerocallis flava	-	2	6
- *minor*	-	3	—
Hieracium alpestre	-	4	—
- *canadense*	-	2	6
- *elegans*	-	2	6
- *grandiflorum*	-	2	6
- *undulatum*	-	2	6
Hypericum crispum	-	7	6
- *elegans*	-	2	6
Iris arenaria	-	5	—
- *dichotoma*	-	4	3
- - *foetidissima*	-	4	3
- - - *fol. varieg.*	-	5	—
- *haematophylla*	-	4	3
- *notha*	-	3	—
- *ochroleuca*	-	2	6
- *Pallasii*	-	4	3
- *pumila*	-	2	—
- - *lutea*	-	2	—
- *ruthenica*	-	4	3
- *sibirica fl. albo*	-	3	—
- *susiana*	-	5	—
- *tenuifolia*	-	3	—
Lathyrus latifolius	-	2	6
Lilium bulbiferum	-	2	—
- *candidum*	-	2	6
- *Martagon*	-	2	6
- *tigrinum*	-	2	6
Lobelia fulgens	-	5	—
- *syphilitica*	-	2	6
Lychnis chalcedonica	-	2	—
- - *fl. pl.*	-	7	6
- *splendens*	-	10	—
- *viscaria fl. pl.*	-	2	—
Lysimachia Ephemerum	-	3	—
Lythrum alatum	-	4	3
Malva moschata	-	2	6
Mentha citrata	-	2	—
- *crispata*	-	2	—
- *piperita*	-	3	—
- *Pulegium*	-	2	—
- *serotina*	-	2	6
- *viridis*	-	2	6
Mimulus luteus	-	2	—
Monarda altissima	-	2	6
- *didyma*	-	3	—
- *purpurea*	-	2	6
- *rugosa*	-	2	6
Muscari ciliatum	-	5	8
- *moschatum*	-	2	6
- *racemosum*	-	2	—
Oenothera corymbosa	-	4	3
- *Fraseri*	-	5	—
- *pumila*	-	4	3
- *speciosa*	-	10	—
- *tetragona*	-	5	—
Ononis hircina	-	2	6
- *rotundifolia*	-	10	—
Paeonia albiflora	-	5	—
- *corallina*	-	3	—
- *officin. fl. pl purpureo*	-	2	6
- - - *carneo*	-	3	—
- *tatarica*	-	10	—

		Sgr	₰
Paeonia tenuifolia	à Stück	5	—
- *villosa*	-	5	—
Papaver bracteatum	-	5	—
Pentstemon campanulatus	-	5	—
Phlox decussata	-	5	—
- *divaricata*	-	3	—
- *maculata*	-	3	—
- *paniculata*	-	2	[illegible]
- - *fl. albo*	-	4	[illegible]
- *reptans*	-	5	—
Polemonium coeruleum	-	3	[illegible]
- - *fl. albo*	-	2	[illegible]
Potentilla atrosanguinea	-	10	—
- *bifurca*	-	7	[illegible]
- *formosa*	-	10	—
- *ornithopoda*	-	7	[illegible]
- *Salesovii*	-	10	—
Primula acaulis	-	2	[illegible]
- *farinosa*	-	5	—
- *villosa*	-	5	—
Pulsatilla intermedia	-	5	—
Ranunculus aconitifolius	-	3	—
- *acris fl. pl.*	-	5	—
Rudbeckia aspera	-	5	—
- *fulgida*	-	5	—
- *triloba*	-	5	—
Salvia amplexicaulis	-	5	—
- *grandiflora*	-	2	[illegible]
- *officinalis*	-	3	[illegible]
- *verticillata*	-	2	—
Saxifraga Aizoon	-	2	[illegible]
- *crassifolia*	-	2	[illegible]
- *dentata*	-	5	—
- *intacta*	-	3	—
- *laevis*	-	5	—
- *polita*	-	8	—
- *sarmentosa*	-	3	—
- *serrata*	-	5	—
- *villosa*	-	2	[illegible]
Scabiosa alpina	-	4	[illegible]
- *cornuta*	-	5	[illegible]
- *rigida*	-	5	[illegible]
Scilla amoena	-	4	[illegible]
- *autumnalis*	-	3	[illegible]
Senecio creticus	-	3	[illegible]
- *umbrosus*	-	3	—
Silene infracta	-	2	—
- *multiflora*	-	3	—
- *ornata*	-	5	—
Sisyrinchium convolutum	-	4	[illegible]
Solidago arguta	-	2	[illegible]
- *gigantea*	-	2	6
- *mexicana*	-	3	—
- *villosa*	-	3	—
Spiraea Aruncus	-	3	—
- *filipendula*	-	2	6
- - *fl. pl.*	-	4	3
- *Ulmaria*	-	2	6
- - *fl. pl.*	-	3	—
Symphytum cordatum	-	5	—
Thalictrum aquilegifolium	-	2	6
- *saxatile*	-	2	6
Trollius americanus	-	5	—
- *humilis*	-	4	3
Tussilago alba	-	2	6
- *fragrans*	-	2	6
Valeriana alba	-	2	6
- *rubra*	-	2	6
Veratrum nigrum	-	5	—
Verbena stricta	-	3	—
Veronica amethystina	-	2	6
- *cristata*	-	3	—
- *Hostii*	-	3	—
- *leucanthera*	-	3	—
- *multicaulis*	-	3	—

Bemerkung. 1) Die reſpektiven Beſteller muß ich bitten, mir Ihre gütigen Aufträge mit dem Betrage franco einzuſenden, oder ſonſtigen Sicherheit zu begleiten. 2) Kleine Aufträge werden nur gegen gleich eingeſandeten Betrag ausgeführt. 3) Die Beſtellung bitte ich auf ein beſonderes Blatt zu zeichnen. 4) Für Emballage, welche bei Verpackung der auswärtigen Beſtellung erforderlich iſt, bitte ich nach Verhältniß etwas hinzuzufügen. 5) Muß ich um genaue Angabe des Wohnorts, und deutliche Namens-Unterſchrift bitten, welches zur ſchnellen Bedienung nothwendig iſt. Schließlich füge ich die ergebene Bitte hinzu, meine Saamen-Verzeichniſſe möglichſt zu verbreiten, um dadurch weiter empfohlen zu werden.

Erfurt, im December 1853.

Friedrich Wilhelm Wendel.

Verzeichniß für das Jahr 1834

von

vielen Arten Gemüße-, Feld- und Blumen-Saamen,

die man um nebenstehende billige Preiſe ganz echt und friſch bekommt

bei

Carl Appelius.

Kunſt- und Handelsgärtner in Erfurt.

Die Preiſe ſind nach Preußiſchem Courant geſtellt, den Thaler zu 24 gute Groſchen.

Nr.	Kohl-Saamen.	à Priſe gr.	pf.
1.	Blumenkohl, ſchwarzer, ganz neu aus Sicilien, ſehr delikat	3	—
2.	„ großer kapiſcher, beſter . à Loth	7	—
3.	„ „ früher cypriſcher, beſter	7	—
4.	„ „ engliſcher mittelfrüher	6	—
5.	„ „ holländiſcher ſpäter	4	—
6.	Brockoli oder Spargelkohl, weißer	2	—
7.	„ „ „ violetter	2	—
8.	Meer- oder Seekohl, Crambe maritima	3	—
9.	Kraut- oder Kopfkohl, Erfurter, großes, weißes	1	6
10.	„ „ „ „ kleines frühes, feſtes	1	—
11.	„ Winnigſtädter, großes, weißes, ſpitziges	1	6
12.	„ Ulmer, kleines, weißes, frühes, extra	1	6
13.	„ „ großes, ſpätes, Zentner-	2	—
14.	„ „ „ blutrothes frühes Salat-	1	6
15.	„ „ „ weißes, breites, frühes	2	—
16.	„ Yorkſches, allerfrüheſtes, weißes, ſpitziges	2	—
17.	„ holländiſches, kleines, ſchwarzrothes, rundes, frühes	2	—
18.	„ „ blutrothes, frühes Salat-	2	—
19.	„ Braunſchweiger, größtes, weißes	1	6
20.	Wirſing oder Börskohl, Erfurter, großer, gelber Winter-	1	6
21.	„ Ulmer, niedriger, früher, extra	2	—
22.	„ „ größter, ſpäter	1	6
23.	„ Wiener, niedriger, früher Treib-	2	—
24.	„ früher, niedriger, Kapuziner	1	—
25.	„ Blumenthaler, gelber, Savoyer	1	6
26.	Kohl, Brüſſeler, Sproſſen- oder Roſen-	2	—
27.	„ franzöſiſcher, bunter, Plumage-	1	6
28.	„ niedriger, grüner, krauſer, Winter-	—	9
29.	„ „ brauner	—	9
30.	„ Schnitt- oder Frühlings-, engl., grüner, blumenkohlbl.	—	6
31.	Glaskohlrabi, Wiener, kleinblättrige, niedrige, frühe, weiße	2	—
32.	„ „ „ „ „ blaue	2	—
33.	„ engliſche, frühe, weiße	1	6
34.	„ mittelfrühe, große, weiße	1	—
35.	Oberkohlrabi, gewöhnliche, große, weiße, ſpäte	—	6
36.	Kohlrüben oder Erdkohlrabi, große, weiße, runde	1	—
37.	„ „ „ gelbe, runde, extra	1	6

Wurzel- und Rüben-Sorten.

38.	Carotten oder Möhren, holländiſche, kurze, frühe, zum Treiben	1	—
39.	„ Hornſche, ganz frühe, lange, rothe	1	—
40.	„ Frankfurter, dunkelrothe, lange	1	6
41.	„ Braunſchweiger, lange, rothe	—	9
42.	„ Erfurter, lange, rothgelbe	—	9
43.	Wurzeln, Haber-	1	—
44.	„ Paſtinak-	—	6
45.	„ Peterſilien-, lange, extra	1	—
46.	„ Scorzoner-	1	—
47.	„ Sellerie, großer, holländiſcher, Knoll-, extra	1	6
48.	„ Rapunzel-, feine, weiße, ſehr delikat	2	—
49.	„ Zucker-, feine	1	6
50.	Rüben, holländiſche, weiße, runde Mai-	—	9
51.	„ Teltower oder Märkiſche	1	—
52.	„ weiße, lange, Herbſt- oder Guckel-	—	6
53.	„ blutrothe, Salat-	—	6
54.	„ Kerbel-, Scandix bulbosum, extra	4	—
55.	„ Runkel-, lange, über ſich wachſende rothe, à Pfd.	6	—
56.	„ „ „ „ gelbe	8	—
57.	„ „ runde gelbe	8	—
58.	Mangold oder Beißkohl . à Loth	—	6

Salat-Sorten.

59.	Salat, Steinkopf, gelber, früher, feſter, weiß Korn	2	—
60.	„ arabiſcher, großer, gelber, braun Korn	1	6
61.	„ aſiatiſcher, großer, gelber, weiß Korn, extra	2	—
62.	„ Bologneſer, gekrauſter, weiß Korn	2	—
63.	„ gelber Prinzenkopf, braun Korn, extra	2	—
64	„ „ „ weiß Korn	2	—
65.	„ Schwedenkopf, röthlicher, weiß Korn	1	6
66.	„ Mohrenkopf, brauner, braun Korn	1	6
67.	„ Forellen-, großer, bunter, weiß Korn	1	6
68.	„ „ engliſcher blutrother, extra	2	—
69.	„ Berliner, großer, gelber, braun Korn	2	
70.	„ Mailänder, brauner, gelb Korn	1	6
71.	„ Mogol-, großer, gelber, weiß Korn, extra	2	6
72	„ Winter-, beſter dauernder, weiß Korn	1	—
73.	Endivien, engl. Sommer-, von Natur gelb	2	—
74.	„ Winter-, krausblättriger	1	6
76.	Rabinschen oder Feldſalat	—	6

Zwiebel-Sorten.

76.	Zwiebel, Erfurter, runde, blaßrothe, harte Kopf-	1	—
77.	„ Birn-, gelbe, ſüße	1	6
78.	„ holländiſche, gelbe, ſüße, runde	2	—
79.	„ „ blutrothe, runde, harte	2	—
80.	„ ſpaniſche, rothe Pflanz-	2	—
81.	„ „ weiße	2	—
82.	„ Winter-, feine, weiße	1	6
83.	Porree oder Lauch, Sommer-	1	6
84.	„ „ „ Winter-	1	6

Steckzwiebeln.

85.	Steckzwiebeln, Rokambol . 100 Stück	3	—
86.	„ Knoblauch . 100 „	6	—
87.	„ Schalotten, gewöhnliche . 100 „	6	—
88.	„ „ große, däniſche . 10 „	4	—

Radies- und Rettig-Sorten.

89.	Radies, holländiſche, runde, weiße Monats-	1	—
90.	„ „ „ dunkelrothe	1	—
91	„ „ roſinrothe	1	—
92.	Rettig, Erfurter, langer, ſchwarzer Winter-	1	6
93	„ „ runder	1	6
94.	„ Wiener, gelber, früher, delikat	2	—
95.	„ ſchwarzer, runder, Sommer-	1	—
96.	„ weißer, Sommer-	1	—

Küchenkräuter.

97.	Baſilicum, großes	1	6
98.	„ fein gekrauſter	2	6
99.	Bohnenkraut oder Saturei	1	—
100.	Erdmandeln	1	—
101.	Gartenkreſſe, krausblättrige oder gefüllte	1	—
102.	Kerbel-, gewöhnlicher	—	6
103.	„ krausblättriger	1	—
104.	Löffelkraut	1	6
105.	Majoran, franzöſiſcher	2	—
106.	Peterſilie, einfache	—	6
107.	„ krauſe oder gefüllte	1	—
108.	Pimpinell	—	9
109.	Portulack, gelber	1	6
110.	„ grüner	1	6
111.	Salbei	1	6
112.	Sauerampfer, franzöſiſcher, ſehr gut zu Salat	2	—
113.	Spinat, engliſcher, größter . à Pfund	6	—
114.	„ rundblättriger	2	—
115.	„ langblättriger	3	—
116.	Thymian . à Loth	2	—
117.	Weinraute	2	—

Kern-Sorten.

118.	Artiſchocken, franzöſiſche	3	—
119.	Kardi, ſpaniſche	2	—
120.	Gurkenkern, Erfurter, mittellange, grüne, volltragend	1	6
121.	„ lange, grüne, Schlangen-	3	—
122.	„ „ weiße, holländiſche	3	—
123.	„ Halliſche, lange, grüne	1	6
124.	„ allerfrüheſte, volltragende, zum Treiben à Priſe	2	—
125.	Spargelkern, Darmſtädter, weiße . à Loth	1	—
126.	Melonenkern, große ſchwarze Kantelupe . à Priſe	1	6
127.	„ „ Silber	1	6
128.	„ grüne [illegible]-Melone, extra	2	—
129.	„ Bonillac, ſehr delikat	1	6
130.	„ ganz frühe Trauben-Melone	1	6
131.	„ Muskatnuß-Melone, ganz neu und vorzüglich	4	—
132a.	„ Melone aus Malaga, ebenfalls neu und vorzüglich	4	—
132b.	„ Aſtrachaner Melone, vorzüglich	2	—
133.	„ ein Sortiment von 16 der beſten Sorten	12	—

Eßbare Kürbiſſe.

134.	Benincasa cerifera	2	—
135.	Cucurbita melopepo reticulata, wird gegen 200 Pfd. ſchwer	2	—
136.	„ ceratocreas, Wachsfleiſch-Kürbis	2	—
137.	„ vegetable Marrow, engl. Schmeer-Kürbis	2	—

Nr.	Zierkürbiſſe.	à Priſe gr.	pf.
138.	Kürbis, großer Herkuleskeulen-	1	—
139.	„ Flaſchen-	1	6
140.	„ Türkenbund-	1	—
141.	„ gelber Apfelſinen-	1	—
142.	„ kleiner, geſtreifter Apfel-, niedlich	1	6
143.	„ gelber Birn-	1	—
144.	„ weißer „	1	—
145.	„ gelb und grün geſtreifter Birn-	1	—
146.	„ weißer Apfel-	1	—
147.	„ ſchwarzgrüner mit großen Warzen, ſehr ſchön	2	—
148.	„ Gurken-	1	6
149.	„ amerikaniſcher, neuer, orange Feldflaſchen-	2	—
150.	„ Regenſchirm-, ſehr ſchön	2	—
151.	langer, orange, warziger Widderhorn-, ganz neu aus Amerika	3	—
152.	„ neuer, orange, warziger Keulen-	2	—
153.	„ orange Kegel-	1	—
154.	„ kleinſter Stachelbeer-, muß im Topf gezogen werden, ſehr niedlich	1	6

Erbſen-Sorten.

155.	Zuckererbſen, engliſche, frühe, weißblühende . à Pfd.	3	—
156.	„ große, blaublühende, graue Schwert-	4	—
157.	„ „ weiße nonpareille, extra	6	—
158.	„ früheſte, niedrigſte, 1 Fuß hoch	5	—
159.	Kneifel-, Pahl- oder Läufer-Erbſen, früheſte, niedrige, Mai-	4	—
160.	„ „ „ Erfurter, große, frühe, Klunker-	2	6
161.	„ „ „ ſpäte Gold- oder Wachs-	4	—
162.	Spargelerbſen . à Loth	—	6

Bohnen-Sorten.

163.	Stangenbohnen, arabiſche, bunte oder Feuer- . à Pfd.	3	—
164.	„ lange, breite, weiße, Schwert	6	—
165.	„ graue, weißſchalige Spargel-	5	—
166.	„ engliſche weiße Zucker-, extro	7	—
167.	„ „ gelbe	8	—
168.	Buſchbohnen, früheſte, ſchwarze	5	—
169.	„ weiße Schwert-, zum Treiben	4	—
170.	„ rothbunte Zucker- oder Speck-	4	—
171.	„ gelbe Zucker-, delikat	5	—
172.	Puffbohnen, gewöhnliche ſehr tragbar	1	6
173.	„ niedrige, frühe, Mazagan, zur Einfaſſung	4	—
174.	„ amerikaniſche, rothblühende, ſehr hübſch	12	—

Oekonomiſche Saamen.

175.	Maulbeere, weiße . à Loth	3	—
176.	„ ſchwarze	8	—
177.	Klee, Eſparſette . à Pfund	4	—
178.	„ Luzerner oder ewiger	8	—
179.	„ ſpaniſcher, rother Kopf-	6	—
180.	Hafer ohne Hülſen, eine ganz neue vorzügliche Getraideart, ſehr ergiebig . à Loth	8	—
181	Raigras, engliſches	6	—
182.	„ franzöſiſches	7	—
183.	Weberkarden, große franzöſiſche	12	—

Blumen-Saamen.

und zwar Sommergewächſe, die nur 1 Jahr dauern.

184.	Adlumia scandens, rankende Adlumie . à Loth 12 gr.	1	6
185.	Adonis aestivalis, Dukatenröschen . à Loth 6 gr.	1	—
186.	„ autumnalis, Feuerröschen . à Loth 6 gr.	1	—
187.	Ageratum coeruleum, ſehr ſchönes blaublühend. Ageratum	1	6
	à Loth	18	—
188.	Agrostemma coelirosa, Himmelsröschen, ſehr niedlich zu Einfaſſungen	1	—
189	„ flos Iovis, Jupiters	1	—
190.	Amaranthus	1	—
191.	„ giganteus, ſehr großer	1	
192.	„ hypochondriacus, trauriger	1	
193.	„ sanguineus, blutrothe	1	6
194.	Anacyclus bicolor, zweifarbiger Anacyclus	1	—
195.	Anagallis indica, indiſcher Gauchheil	1	—
196.	„ latifolia, breitblättriger	1	—
197.	Anoda dillenia, ſchöne blaue Anoda	1	—
198.	Anthemis arabica, arabiſche Kamille, hübſch	1	—
199.	Antirrhinum tryphillum, dreiblättriges Löwenmaul	1	—
200.	„ versicolor, buntes	1	—
201.	Arctotis calendulacea, ringelblumenblättriges Bärenohr	2	—
202.	Argemone grandiflora, neuer großblühender Stachelmohn	1	—
203.	„ mexicana, mexicaniſcher	1	6
204.	„ ochroleuca, ockerfarbiger		
205.	Aster chinensis fl. pl., verſchiedene Farben, Röhren-Aſtern gemiſcht à Loth 8 gr.	1	—

206. Sehr ſchöne gefüllte Feder- oder Röhren-Aſtern in folgenden Sorten. Nr. 1. ſilberweiß. Nr. 2. dunkelroth. Nr. 3. dunkelblau. Nr. 4. blaßroth. Nr. 5. dunkelblau mit weiß. Nr. 6. Fleiſchfarbe, früh. Nr 7. dunkelroth mit weiß. Nr. 8. Fleiſchfarbe. Nr. 9. blaßblau Nr. 10. gelblichweiß. Nr. 11. aſchgrau. Nr 12. blaßroth mit weiß. Nr. 13. dunkelblaue Band-Aſter. Nr. 14. blaßrothe, ditto. Nr. 15. blaßblaue, ditto. Nr. 16. dunkelrothe, ditto. Nr. 17. hellblau mit weiß Nr 18. dunkelcarmoiſin. Nr. 19. weiß mit dunkelroth geſprengt. Nr. 20. niedrige türkiſche rothe,

	Jede Sorte einzeln zu 100 Körner koſtet	1	3
207.	Das ganze Sortiment in 20 Priſen . 100 Körner	20	—
208.	„ . 50 Körner	12	—
209.	Zwergaſter, fleiſchfarbene . 100 Körner	2	—
210.	„ „ dunkelblau mit weiß . 100 Körner	2	—
211.	„ „ dunkelroth mit weiß . 100 Körner	2	—

Dieſe 3 Sorten werden nur ½ Fuß hoch und zeichnen ſich ſehr aus, ſind auch eben ſo gefüllt als die Hohen.

212.	Aster tenellus, niedrige hellblaue Aſter, paſſend für Einfaſſung . ½ Loth 4 gr.	1	—
213.	Atropa physaloides, ſchlutterartiges Tollkraut, ſchön	1	6
214.	Blitum capitatum, kopfförmiger Erdbeerſpinat	1	—
215.	„ virgatum, ruthenförmiger	1	—
216.	Briza maxima, größtes Zittergras	1	—
217.	„ minima, kleinſtes	1	—
218.	Cacalia sonchifolia, ſchön rothe Cacalie, recht hübſch	1	—
	à Loth	10	—
219.	Calandrinia compressa, hochrothe Calendrine, à Loth 8 gr.	1	—
220.	„ grandiflora, großblüh., ganz neu und ſehr ſchön	3	—
221.	„ speciosa, ſchönſte Calendrine, ganz neu, übertrifft in Vielheit ſowohl, als Schönheit der Blumen vorhergehende	3	—
222.	Calendula hybrida, Baſtard-Ringelblume	1	—
223.	„ pluvialis, Regen-	1	—
224.	„ officinalis fl. pl. ranunculoides	1	6
225.	Calliopsis bicolor, das ſchöne Geſicht, hübſch	1	6
226.	Calyxhimenia chilensis, chiliſche Hochzeitblume	2	—
227.	„ glabriifolia, glatte	2	—
228.	Campanula Lorei fl. albo, weiße Lorei'ſche Glockenblume, neu und ſchön	1	6
229.	„ „ fl. corulea, blaue	1	6
230.	„ speculum, Venusſpiegel	1	—
231.	„ „ fl. albo, weißer	1	6
232.	„ „ fl. rosea, roſenrother	1	6
233.	Capsicum annuum, rother und gelber ſpaniſcher Pfeffer	1	—
234.	„ „ majus, mit 5 bis 6 Zoll langen Früchten	3	—
235.	Carduus lanatus, wolliger Diſtel	1	—
236.	„ marianus, Mariendiſtel	1	—
237.	Carthamus tinctorius, Saflor	—	6
238.	Catananche lutea, gelbe Raſſelblume	1	—
239.	Celsia incarnata, ſchöne fleiſchfarbene Celſie	1	6
240.	Centaurea americana, amerikaniſche Flockenblume, neu und prächtig	3	—
241.	Centaurea cyanus, Kornblumen in vielen Farben à L. 8 gr.	1	—
242.	„ moschata fl. albo, weiße Biſamblume	1	—
243.	„ „ fl. coeruleo, blaue	1	—
244.	„ suaveolens, [illegible] Biſamblume	1	6
245.	Centrospermum [illegible], goldfarbenes Centroſpermum	1	—
	à Loth	10	—
246.	Cerinthe major, große Wachsblume	1	—
247.	Cheiranthus annuus, Sommerlevkoyen in vielen Farben gemiſcht . à Loth	12	—
	Und von folgenden [illegible] gefüllte [illegible] Sorten koſtet jede Priſe von 100 Körnern einzeln	1	3

Engliſche Sorten

248. Nr. 1. weiß, 2. [illegible], 3. [illegible], 4. [illegible], 5. dunkelaſchgrau, 6. [illegible], 7. [illegible], 8. [illegible]

Nr.		à Priſe gr.	pf.
	ſcarminroth, 9. fleiſchfarbe, 10 violett, 11. carmoiſin, 12. blaßblau, 13. kupferroth, 14. blaßfleiſchfarbe, 15. hellviolett, 16. rothgrau, 17. blaßbraun, 18. blaßlila, 19. ziegelroth, ganz blaß, 20. zimmtbraun, 21. roſenfarbe, 22. rothbraun, 23. hellaſchgrau, 24 dunkelſchwarzbraun, 25. karminroth.		
	Engliſche Sorten mit dem Lackblatt.		
249.	Nr. 30. weiß, 31. blaßbraun, 32. carminroth, 33. violett, 34. zimmtbraun, 35. aſchgrau, 36. ziegelroth, 37. ſchwarzbraun, 38. fleiſchfarbe, 39. rothbraun.		
	Halbengliſche Sorten.		
250.	Nr. 41. weiß. 42. violett, 43. dunkelmorderothe, 44 apfelblüthe, 45 zimmtbraun, 46. hellaſchgrau, 47. carminroth, 48. dunkelaſchgrau, 49. blaßblau, 50 fleiſchfarbe, 51 blaßbraun, 52. blaßroth, 53. kupferroth, 54. dunkelſchwarzbraun.		
	Herbſt-Levkoyen.		
251.	Nr. 60. weiß, engliſch, 61. carminroth, engl., 62. violett, engl., 63. roſenfarbe, engl., 64. ziegelroth, engl., 66. dunkelbraun, engl., extra, 67. weiß, halbengl., 69. hellblau, halbengl., 71. fleiſchfarbe, halbengl., 72. karmin, halbengl. 74 ziegelroth mit dem Lackblatt, halbengl., 76. carminroth mit dem Lackblatt, engl., 80. caſtanienbraun, halbengl. 83. blaßroth, halbengl., 86. ſchwarzbraun, halbengl.		
	Von obigen Sorten ſind folgende Sortiments zu haben:		
252.	Ein Sortiment von 12 ſchönen Sorten à Priſe zu 100 Körnern	15	—
253.	" " " 18 " " " "	22	—
254.	" " " 24 " " " "	1 Thlr 6	—
255.	" " " 36 " " " "	1 " 21	—
256.	" " " 48 " " " "	2 " 12	—
257.	Das ganze Sortiment von 64 Sorten koſtet . 3 "	—	—
	Unter 100 Körnern kann nicht abgegeben werden.		
258.	Cheiranthus cheiri fl. pl., extra ſchöner Stangen-Lack à 100 K.	3	—
259.	" " fl. pl., geringere Sorte à Loth 12 gr.	1	6
260.	" " fl. pl., Zwerg-Lack, neu und ſchön	4	—
261.	" " fl. violacea, violetter, einfacher	1	6
262.	" incanus, Winterlevcoyen, mehrere Sorten gem. à L.	12	—
	Und von folgenden extra Sorten jede Priſe von 100 Körnern	1	8
	Nro. I. weiß, II. violett, III. weiß mit dem Lackblatt, IV. hellviolett, V. carminroth, VI. weiß, baumartig, X. fleiſchfarbe, XIII. ziegelroth, XIV. carmoiſin, XV. carminroth, baumartig.		
263.	Dieſe 10 Sorten zuſammen, jede Farbe einzeln zu 100 K.	10	—
264.	Cheiranthus fenestralis, Zwerg-Levcoye	1	6
265.	" tricuspidatus, dreiſpitzige	1	6
266.	" maritimus, Meerlevcoye à Loth 10 gr.	1	—
267.	" " fl. albo, weiße	1	6
	Dieſe letzten zwei Arten ſind niedlich zu Einfaſſungen.		
268.	Chenopodium maritimum, Meerſtrands-Gänſefuß	1	6
269.	Chrysanthemum carinatum, Goldwucher-Blume à L. 8 gr.	1	—
270.	" coronarium fl. pl. albo, weiße gekrönte	1	—
	à Loth	8	—
271.	" " fl. pl. luteo, gelbe à L. 8 gr.	1	—
272.	" hybridum, Baſtard à Loth 10 gr.	1	6
273.	" pectinatum, kammartige à Loth 10 gr.	1	—
274.	" Sipthorpii, ſipthorpiſche à Loth 12 gr.	1	6
275.	" speciosum, ſchönſte	2	—
276.	Clarkia pulchella, ſchöne Clarkia, ſehr ſchön	1	6
277.	" " mit dunkeln Blumen	1	6
278.	" " fl. albo, weiße, ganz neu und ſehr ſchön	3	—
279.	Collinsia grandiflora, großblumige Collinſie, neu und ſchön	2	—
280.	Collomia grandiflora, großblumige Collomie, hübſch	1	6
281.	Coreopsis leucantha, Wanzenblume à Loth 10 gr.	1	—
282.	Convolvulus bicolor, zweifarbige Winde à Loth 3 gr.	1	—
283.	" tricolor, dreifarbige, ſchön à Loth 3 gr.	1	—
284.	Cosmea bipinnata, doppeltgefiederte Cosmea	1	6
285.	" " fl. purpurea, purpurrothe neu und prachtv.	4	—
286.	Cotula coronopifolia, ſehr paſſend zur Einfaſſung à L. 12 gr.	1	6
287.	Crepis barbata, bärtiger Pipau à Loth 10 gr.	1	—
288.	" " fl. pallido, ganz blaßgelber, ſchön à L. 14 gr.	1	6
289.	" rubra, rother à Loth 8 gr.	1	—
290.	" " fl. albo, weißer à Loth 12 gr.	1	6
291.	" dioscorides, dioscoriſcher, ſchöner	1	—
292.	Cuphea procumbens, liegende Cuphea	1	—
293.	" viscosissima, klebrige	1	—
294.	Cynoglossum linifolium, weißes Vergißmeinnicht, zur Einfaſſung à Loth	3	—
295.	Datura metel, weißer Stechapfel, hübſch	1	6
296.	Delphinium ajacis fl. pl., niedrige extra gefüllte Ritterſporn, in folgenden 10 Farben gemiſcht à Loth	6	—
297.	Nr. 1. weiß. 2. aſchblau, 3. blaßziegelroth, 4. violett, 5. blaßlila, [illegible] 7. dunkelziegelroth. 8. lederfarbe, 9. blaß-		
298.	Das ganze Sortiment in halben Lothen . 1 Thlr.	12	—
299.	" " " viertel	20	—
300.	" " " achtel	12	—
301.	Delphinium consolida fl. pl., gefüllte Levcoyen-Ritterſporn in folgenden 5 Farben gemiſcht à Loth	5	—
302.	Nr. 1. weiß, 2. blaßbl., 3. roſenroth, 4. dunkelblau, 5. bunte.		
303	Das Sortiment in dieſen 6 Farben, jede zu halben Lothen	16	—
604.	" " " " " viertel Lothen	8	—
305.	" " " " " achtel	6	—
306.	Delphinium elatior fl. pl., in folgenden 6 Farben: 1 roſa, 2. dunkelblau, 3. fleiſchfarbe, 4. blaßbraun, 5. ziegelroth, 6. aſchblau, von jeder Sorte eine Priſe	8	—
307.	Dracocephalum moldavicum, blau und weiße türkiſche Meliſſe à Loth 6 gr.	1	—
308.	Echium creticum, cretiſcher Natterkopf, hübſch	1	—
309.	Elychrysum bracteatum, glänzende Strohblume	1	6
310.	" " fl. albo, ganz neue, ſehr ſchöne	3	—
311.	" " fl. pallido, ganz blaßgelbe neu und ſchön	3	—
312.	Euphorbia litterata, rothfleckige Wolfsmilch à Loth 6 gr.	1	—
313.	Galega officinalis alba et coerulea, weiße und blaue Geißraute, ſchön	1	6
314.	Galinsoga trilobata, dreilappige Galinſoge, ſchön	1	6
315.	Gilia capitata, kopfförmige Gilia, ſchön	1	6
316.	Glaucium fulvum, braunrother Hornmohn	1	6
317.	" luteum, gelber	2	—
318.	" phoeniceum, ſchöner rother	1	6
319.	" violaceum, violetter neuer	2	—
320.	Grahamia aromatica, wohlriechende Grahamia	1	—
321.	Hebenstreitia aurea, goldfarbene Hebenſtreitie	1	—
322.	" dentata, gezähnte	1	6
323.	" tenuifolia, ſchmalblättrige	1	6
324.	Helenium quadridentatum, vierzähnige Helenie	1	—
325.	Helianthus annuus fl. pl., extra ſchöne gef. Sonnenblume	1	—
325b.	" " fl. pl. sulphureus, ſchwefelgelbe	1	—
325c.	" " nanus, niedrige, 1 Fuß hohe	1	—
326.	" lenticularis fl. pl., linſenartige	2	—
327.	" petiolaris	1	—
328.	Hibiscus africanus, africaniſcher Eibiſch à Loth 14 gr.	1	6
329.	" longifolius, langblättriger	1	—
330.	" trionum, Stunden- à Loth 10 gr.	1	—
331.	" vesicarius, Blaſen- à Loth 12 gr.	1	6
332.	" Humboldtii, Eibiſch, neuer	2	—
333.	Hyoscyamus pictus, gemahltes Bilſenkraut	1	6
334.	Iberis amara, weiße bittere Schleifenblume à Loth	2	—
335.	" pinnata, gefiederte à Loth	4	—
336.	" umbellata, doldentragende à Loth	4	—
337.	" " superba, ſehr ſchön	1	—
	Dieſe Schleifenblumen eignen ſich ſämmtlich zu Einfaſſungen der Rabatten.		
338.	Impatiens Balsamina fl. pl., gefüllte Balſaminen in folgenden Sorten gemiſcht	2	—
339.	Nr. 1. rein weiß, 2. weiß mit ſcharlach, 3. weiß mit kupferfarbe, 4. blau mit weiß, 5 kupferfarbe, 6 carmoiſin, 7. lila, 8. ſcharlach, 10. roſenfarbe oder [illegible], 11. weiß, 12 dunkelcarmoiſin, 15 blaßlila, 17. fleiſchfarbe, 18. purpur.		
340.	Ein Sortiment von 10 Sorten zu 25 Korn	12	—
341.	Ein dergl. " 12 " "	8	—
342.	Impatiens Balsamina fl. pl. nana, Zwerg-Balſamine, ſcharlachrothe, ausgezeichnet ſchön	8	—
343	Ipomaea Michauxii, geſtreifte Trichterwinde, ſehr ſchön	2	—
344.	" purpurea, diverſe Farben à Loth 2 gr.	1	—
345.	Kaulfussia amelloides, amellenblättrige Kaulfuſſia	1	6
346.	" orientalis, morgenländiſche, ſchöne	1	6
347.	Ketmia vesicaria, großblumige Ketmia, ſehr ſchön à L. 12 gr.	1	6
348.	Lathyrus hirsutus, Wicke	1	—
349.	" magellanicus, Lord Anſons, in mehreren Farben, hübſch à Loth 4 gr.	1	—
350	" odoratus, wohlriechende à Loth	2	—
351.	" " striata, geſtreift, ſchön	1	—
352	" purpureus, rothe à Loth 3 gr.	1	—
353.	" speciosus, ſchönſte	2	—
354.	Lavatera punctata, punktirte Sommerpappel à Loth 3 gr.	1	6
355.	" trimestris, rothe	1	—
356.	" " fl. albo, weiße	1	—
357.	" Wiesmanniana, [illegible] à Lth. 6 gr.	1	—
358.	Leonurus [illegible], [illegible] à Lth. 6 gr.	1	—
359.	Linaria bipartita, zweitheiliges Leinkraut	1	6
360.	[illegible] inodora, [illegible], ſchön	1	6
361.	[illegible] mexicana, mexicaniſche [illegible]	1	—
362.	Lunaria annua, [illegible] Mondviole	1	—
363.	Lupinus albus, weiße [illegible] à Loth	1	6
364.	" angustifolius coeruleus, [illegible] à Loth	1	6
365.	Lupinus angustifolius luteus, gelbe à Loth	1	6
366.	" cannabinus, hanfartiger	1	6
367.	" pilosus, fleiſchfarbene, ſchön	1	—
368.	" hirsutus, blaue	1	—
369.	" bicolor, zweifarbige, hübſch	1	6
370.	" micranthus, kleine	1	6
371.	" mutabilis, veränderliche, neu und ſehr ſchön, wird gegen 5 Fuß hoch	3	—
372.	Lychnis laeta, Lychnis, niedlich zu Einfaſſungen à L. 6 gr.	1	—
373.	Lycopersicum esculentum, gelbfrüchtiger Liebesapfel	1	—
374.	" " kleiner, runder rother	1	—
375.	" " großer, rother	1	—
376.	" " birnförmiger	1	—
377.	" " kirſchenartiger	1	—
378.	Madia elegans, elegante Madie, ganz neu und prachtvoll	3	—
379.	Malope trifida, dreitheilige Malope, ſchön à Loth 8 gr.	1	6
380.	" grandiflora, großblühende, ungemein ſchön und neu	3	—
381.	Malva mauritiana, mauritianiſche à Loth 6 gr.	1	—
382.	" fragrans, wohlriechende	1	6
383.	" miniata, kleine, niedliche Malve, neu	3	—
384.	" Moreni, moreniſche, ſchön à Loth 10 gr.	1	6
385.	Mirabilis jalappa, gewöhnliche Jalappe, in mehreren Farben gemiſcht à Loth 4 gr.	1	—
	oder dieſelben in folgenden 8 Farben:		
386.	Nr 1. carmoiſin mit ſcharlach, 2. gelb mit roth, 3. weiß, 4. gelb, 5. weiß mit roth, 6. dreifarbig, 7. weiß mit gelb, 8. roth, jede beſonders in Priſen	3	—
387.	" longiflora, ſchöne wohlriechende Jalappe à Lth. 4 gr.	1	—
388.	Momordica elaterium, Spritz-Gurke	1	—
389.	Nicotiana acuminata, langzugeſpitzter Tabak. à Lth. 10 gr.	1	6
390.	" glutinosa, roth blühender, neuer ſchöner	1	6
391.	" nyctaginiflora, nächtlichblüh. ſchöner à Lth. 8 gr.	1	—
392.	" Langsdorfii, gelbblühender	1	—
393.	" octovalvis, achttheiliger à Loth 6 gr.	1	—
394.	" plumbaginifolia, Bleiwurzblättrige	1	6
395.	" quadrivalvis, niedrige, ſchöne	2	—
396.	" sanguinea, blutrothe, neu und ſchön	2	—
397.	" undulata, wellenförmiger	1	—
398.	" vincaeflora, weißblühender, ſchön	1	6
399.	Nigella coarctata, gedrängter Schwarzkümmel, neu u. ſchön	1	6
400.	" damascena, gefüllter à Loth 6 gr.	1	—
401.	" hispanica, ſpaniſcher	1	—
402.	Nemophylla phacelioides, neue, blaue, ſchöne Liebeshainblume	3	—
403	Nolana atriplicifolia, meldenblättrige Zimpelblume, ganz neu und ſehr ſchön	3	—
404.	" paradoxa, bewaffnete ebenfalls ſchön	1	6
405.	" prostrata, liegende	1	—
406.	Nonnea rosea, roſenfarbene Nonnea	2	—
407	Oenothera amoena, liebliche Nachtkerze, ſehr ſchön	1	6
408.	" amoena fl. striata, geſtreifte, ſchön	2	—
409.	" Lindleyana, Lindley's, ſchön	1	6
410.	" " fl. striata, geſtreifte, ſchön	2	—
411.	" grandiflora, großblumige und ſehr wohlriechend à Loth 6 gr.	1	—
412.	" longiflora, langblüthige	1	—
413.	" purpurea, purpurrothe	1	—
414.	" Rhyzocarpa, ſtengelloſe	1	6
415.	" Romanzowii, Romanzowiſche	1	—
416	" rosea, roſenrothe	1	—
417.	" speciosa, ſehr ſchön und neu	3	—
418.	" suaveolens, wohlriechende	1	—
419.	" taraxacifolia, mit 3 Zoll im Durchmeſſer haltenden Blumen, ſehr ſchön und ganz neu	3	—
420.	" tenella, zierliche	1	6
421.	" tetraptera, dreiflügliche	1	—
422.	" mollissima, weichſte	1	—
423.	" villosa, wollige	1	—
424.	Ein Sortiment von 12 verſchiedenen Sorten und Priſen	12	—
425.	Papaver rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, in den ſchönſten Farben gemiſcht à Loth	8	—
426.	" somniferum fl. pl., vorzüglich ſchöner Gartenmohn à Loth 3 gr.	1	—
427.	Polygonum orientale, morgenländiſcher Knöterich	1	—
428.	Reseda odorata, wohlriechende Reſeda à Loth	4	—
429.	" albo, weiße	1	—
430.	Ricinus communis, gemeiner	1	—
431.	Rudbeckia amplexicaulis, ſtengelumfaſſende Rudbeckie, ſchön		
432	Salvia horminum, blauährige Salbei	1	—
433.	" " rothährige	1	—
434	Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie, ſehr niedlich, vorzüglich zu Einfaſſungen geeignet	2	—
435.	Scabiosa africana, africaniſche Scabioſa	1	6
436.	" atropurpurea, dunkelpurpurrothe	1	—
437.	" " major, großblühende, ſehr ſchön	1	6
438.	" transylvanica	1	—
439.	" stellata, ſternförmige	1	—
440.	Schizanthus pinnatus, gefiederte Schizanthe, ſehr ſchön à Loth 8 gr.	1	—
441.	" porrigens, ausgebreitete, ebenfalls ſchön	1	6
442.	Senecio elegans fl. pl. albo, weißgefülltes Kreuzkraut à Loth 10 gr.	1	6
443.	" " fl. pl. rubro, rothgefülltes à Loth 10 gr.	1	6
444.	" " fl. pl. atropurpurea, dunkelpurpurrothes, ausgezeichnet ſchön und neu	2	—
445a.	Silene armeria, Garten-Silene	1	—
445b.	" amoena, liebliche	2	—
446.	" Atocion, ſehr ſchöne	1	—
447.	" cerastoides	1	6
448.	" coarctata, gedrängte	1	6
449.	" dianthoides, nelkenartige	2	—
450.	" noctiflora, nächtlichblühende	1	—
451.	" pendula, hängende, ſchön	1	—
452.	" picta, gemahlte	2	—
453.	" quinquevulnera, fünffleckige	1	—
454.	" stricta, ſteife	1	6
455.	" bifida, hübſche	1	—
456.	" ornata, prächtige dunkelrothe	2	—
457.	" [illegible], ſehr hübſch	2	—
458.	Sorghum bicolor, zweifarbige	1	6
459.	Sphenogyne anthemoides, Anthemisblättrige, niedlich zur Einfaſſung	1	6
460.	Stipa pennata, eine ſehr hübſche Grasart	2	—
461.	Sycios angulata, eckige Haargurke, dient zur ſchnellen Bekleidung von Lauben	1	—
462.	Tagetes erecta fl. pl., orange, gefüllte à Loth 8 gr.	1	—
463.	" " fl. pl., ſchwefelgelbe à Loth 10 gr.	1	6
464.	" " fl. pl. fistul., röhrenförmige, ſehr ſchön	2	—
465.	" " nana fl. pl., niedrige gefüllte, wird höchſtens 1' hoch, ſehr ſchön und neu à Loth 14 gr.	2	—
466.	" minimum fl. pl., kleine	1	—
467.	" patula fl. pl., ausgebreitete	1	—
468.	" " fl. pl. ranunculoides, prächtig à Loth 10 gr.	1	6
469a.	" " fl. pl. fistulosa nana, prachtvolle, niedrige, röhrenförmige, ranunkelblüthige und gefüllte Sammtblume, ganz neu	2	—
469b.	" patula fl. pl. nana, punktirte, niedrige ſchön u. neu	2	—
470.	Trachymene coerulea, prächt. blaubl. Trachymene, ganz neu	3	—
471.	Trifolium coeruleum, blaublühender Klee	1	—
472.	" incarnatum, rother, ſchön	1	—
473.	Tropaeolum majus, große indianiſche Kreſſe à Loth	2	—
474.	" " fl. atropurpurea, prachtvolle dunkelpurpurrothe Kreſſe, ganz neu	3	—
475.	" minus, kleine	1	—
476.	" hybridum, neue ſchöne	2	—
477.	Verbena aubletia, Eiſenkraut, ſehr ſchön	2	—
478.	Vicia faba fl. atropurpurea, dunkelpurpurrothe Puffbohne à Loth	2	—
479.	Viola tricolor grandiflora, Stiefmütterchen, extra ſchön	2	—
480.	" " nigra, großes ſchwarzes	1	—
481.	" nigra et lutea, dunkelblau mit gelb	1	—
482.	Xeranthemum annuum fl. pl. rubro, rothgefüllte	1	6
483.	" " fl. pl. albo, weißgefüllte	1	6
484.	Ximenesia encelioides, geöhrte Ximeneſie	1	—
485.	Zinnia aurea, goldfarbene Zinnie	1	—
486.	" ambigua, zweifelhafte	1	6
487.	" discolor, entfärbte, neu	2	—
488.	" elegans, ſchönſte à Loth 1 Thlr.	1	6
489.	" " mit dunkeln Blumen	1	6
490.	" " alba, ſchönſte, [illegible], neu	2	—
491.	" " coccinea, prachtvolle, brennend ſcharlachrothe, ganz neu	4	—
492.	" " grandiflora, großblühende, ſehr ſchön	2	—
493.	" " violacea, violette, neu und ſchön	2	—
494.	" " mit ziegelrothen Blumen, prachtvoll u. ganz neu	4	—
495.	" grandiflora, großblühende	1	—
496.	" multiflora rubra, vielblühende rothe	1	—
497.	" " lutea, gelbe	1	—
498.	" tenuiflora, ſchmalblättrige	1	—
499.	" verticillata, quirlförmige à Loth 16 gr.	1	—
500.	Folgende Sortimente ſchöner Sommerblumen-Samen erlaſſe ich zu beiſtehenden billigen Preiſen:		
501.	Eins von 150 Sorten . 3 Thlr	—	—
502.	" " 100 " . 2 "	—	—

1 Thlr. 6 —
503. [illegible] von 75 Sorten 20 —
504. , , 50 12 —
505. , , 25 8 —
506. , , 12

Perennirende Blumen-Saamen.

Die mit einem * bezeichneten Sorten können als Sommergewächſe behandelt werden, da ſie, bei zeitiger Ausſaat, im erſten Jahre blühen.

507. Aconitum anthora, feinblätteriger Sturmhut 2 —
508. , gracile, ſchlanker 2 —
509. , ochroleucum, ockerfarbiger 2 —
510. , orientale, morgenländiſcher 2 —
511. Actea spicata, ährenförmige Schwarzwurzel 1 6
512. , rubra, rothe neue 2 —
513. , racemosa, traubenblüthige 2 —
514. Agrostemma coronaria, gekrönte Rade 1 —
515. Althea Frolowiana, Stockroſe oder Malve 2 —
516. , rosea fl. pl., ſehr ſchön gefüllte Winterroſen, in vielen Farben gemiſcht à Loth 6 gr. 1 —
517. Ein Sortiment in 18 prächtigen Sorten und Priſen 14 —
518. , , 12 , 9 —
519. * Amobium alatum, geflügelte Amobie, neu und ſchön 2 —
520. * Althea chinensis, chineſiſche Malve, ſchön 1 6
521. Amsonia salicifolia, weidenblättrige 1 6
522. * Antirrhinum majus, mehrere Sorten Löwenmaul 1 —
523. , , fl. albo, weißes, neues 2 —
524. * , , bicolor, zweifarbiges, ſchönes 1 6
525. * , , monteridense, weißes 1 —
526. Anchusa sempervirens, immergrüne Ochſenzunge 1 —
527. Anacyclus aureus, goldfarbene 1 6
528. Aquilegia atropurpurea, dunkelpurpurrothe 1 —
529. , canadensis, canadiſcher Akelei 2 —
530. , canadensis elatior, hoher, ſehr ſchön und neu 3 —
531. , speciosa, ſchönſter 1 6
532. , vulgaris fl. pl., gemeine, in vielen Farben gemiſcht 1 —
533. , , fl. pl. albo, weißgefüllte 1 —
534. , , striata, ſchöne geſtreifte 1 —
535. , viridiflora, grünblühende 1 —
536. Aristolochia Sipho, ſchönſter Oſterluzei 2 —
537. Asclepias incarnata, ſchöne rothe Seidenpflanze 1 6
538. , latifolia, breitblättrige 2 —
539. , sibirica, ſibiriſche 2 —
540. , tuberosa, knollige, beſonders ſchöne 3 —
541. Astragalus galegiformis, Kanarienvogel-Staude 1 —
542. , alopecuroides, wieſenfuchsſchwanzartige 1 —
543. , maximus, größte 1 6
544. Astrantia major, große Aſtrantia 1 —
545. Beta brasiliensis fol. aureo, goldfarbige Beta 2 —
546. , , cermesino, carmoiſinfarbige 2 —
547. , , coccineo, ſcharlachrothe 2 —
ſehr imponirend, ſowohl im Lande als in Töpfen.
548. Campanula carpathica, karpathiſche Glockenblume 1 6
549. , cervicaria, natterkopfblättrige 1 —
550. , grandiflora, großblumige 1 6
551. , crenulata, körnige 1 —
552. , macrocephala, großköpfige 1 —
553. , pulcherrima, weiß und blaue 1 6
554. , Trachelium, halskrautartige 1 —
555. * Catananche coerulea, blaue Raſſelblume, ſchön 1 6
556. Centaurea atropurpurea, dunkelpurpurrothe Flockenblume 1 6
557. , phrygia, phrygiſche 1 —
558. , scabiosa, ſcabioſenartige 1 —
559. * Cerinthe minor, kleine Wachsblume 1 —
560. Coreopsis Atkinsonii, neue vielblühende Wanzenblume 2 —
561. , tripteris, dreiblättrige 1 —
562. Corydalis eximea, ſchöner Erdrauch 1 6
563. , aurea, goldfarbener 1 6
564 Delphinium amoenum, lieblicher Ritterſporn 1 —
565. , azureum, azurblauer, prachtvoll und neu 3 —
566. , chinense, chineſiſcher, ſchön 2 —
567. , dyctiocarpum 1 —
568. , floribundum, blumenreicher 1 —
569. , grandiflorum, großblumiger 1 —
570. , , lilacina, lilafarben, neu 2 —
571. , intermedium, mittlerer 1 —
572. , ochroleucum, ockerfarbiger, ſchön 1 6
573. , pulchellum, ſchöner 1 —
574. , requienii, zweijähriger 1 6
575. , speciosum, prächtiger 1 —
576. , velutinum, ſammtartiger 1 6
577. Dianthus barbatus, verſchiedenfarbige Bartnelke à Lth. 3 gr. 1 —
578. , , fl. pl. extra, ſchöne gefüllte à 100 K. 2 —
579. , caryophyllus, gefüllte [illegible]
580. , , Topfnelke, ſchöne à 100 Körner 8 —
581. , chinensis fl. pl., extra ſchöne Chineſernelke, in vielen Farben gemiſcht 2 —
1 —
583. * , plumaris fl. pl., gefüllte Federnelken 1 6
584. Dictamnus albus fl. albo, weißblühender Diptam 1 —
585. , , fl. rubro, rother 3 —
586. , dahuricus, neuer 1 —
587. Digitalis ambigua, zweifelhafter Fingerhut 1 —
588. , aurea, goldgelber 3 —
589. , eriostachys, neuer, ſchöner 1 —
590. , ferruginea, roſtfarbener 1 6
591. , fuscescens, bräunlicher 1 6
592. , grandiflora, großblüthiger 1 —
593. , hybridum, Baſtard 1 6
594. , laevigata, glatter 1 —
595. , lanata, wolliger 1 —
596. , purpurea, rother 1 —
597. , , fl. albo, weißer 2 —
598. , Winterii, ſehr ſchöner 2 —
599. * Dracocephalum Ruyschiana, Drachenkopf 1 6
600. , virginiacum, virginiſcher 1 6
601. Echinops bannaticus, ſchöne Kugeldiſtel 1 —
602. Epilobium virgatum, ruthenförmiges Weidenröschen 1 —
603. Eryngium planum, Männertreu 1 —
604. , amethistinum, blaue 2 —
605. * Eschholtzia californica, californiſche Eſchholzie, prächtig u. neu 1 6
606. Eupatorium ageratoides, Alpkraut 1 6
607. , coelestis, blaues, ſehr ſchön
608. * Georgina variabilis fl. pl., veränderliche Georginen, von Blumen erſten Ranges geſammelt, 100 K. 6 gr. 50 K. 3 —
10 K. 4 —
609. , , anemonenblüthige 25 Körner 4 —
610. , , Zwerggeorginen 1 —
611. Gentiana cruciata, Kreuz-Enzian 2 —
612. , asclepiada, Seidenpflanzenartiger 2 —
613. , lutea, gelbe 2 —
614. , macrophylla, großblättriger 2 —
615. , septemfida, ſiebenſpaltiger 2 —
616. Geum Atlandicum, Geum, neues 1 6
617. , coccineum, ſcharlachrothes, ſehr ſchön und neu 1 —
618. Hedysarum coronarium, rother Hahnenkopfklee 1 6
619. , , fl. albo, weißer 1 6
620. Helenium mexicanum, mexikaniſche Helenie 1 —
621. Heliopsis scabra, ſcharfe Heliopſis 1 —
622. Hemerocallis japonica, japaniſche Taglilie 1 —
623. Hesperis tristis, Nachtviole, hat einen herrlichen Geruch 1 6
624. Hieracium pulmonarioides, Habichtskraut 1 6
625. , aurantiacum, goldfarbiges 1 6
626. , grandiflorum, großblühendes 1 —
627. Hypericum Ascyron, Johanniskraut 1 6
628. , androsaemum, Mannsblut 1 6
629. , barbatum, bärtiges 1 6
630. , pulchellum, ſchönes 1 —
631. Lathyrus latifolius, breitblättrige Bouquetwicke 1 6
632. Iris foetidissima, ſtinkende Schwertlilie 1 6
633. , odorata, wohlriechende 1 6
634. Kitaibelia vitifolia, weinblättrige 1 —
635. Linaria genistaefolia, ginſterblättriges Leinkraut 1 —
636. * Linum narbonense, Lein oder Flachs 1 —
637. , grandiflorum, großblühender 1 —
638. , perenne, Stauden- 1 —
639. Lunaria biennis, zweijährige Mondviole 3 —
640. Lupinus polyphyllus, prächtige neue Lupine à 100 K. 18 gr. 3 —
641. , , pallida, blaſſe, neu 3 —
642. , , fl. albo, weißblühende, ganz neu
643. , marschallianus, Marſchall's, neue, ſchön in vielen Farben, 100 K. 18 gr. 3 —
3 —
644. , mexicanus, mexikaniſche 2 —
645. , nootkatensis, Nootkaſundiſche 3 —
646. , ornatus, ſchöner neuer 3 —
647. , tomentosus, wollige 1 —
648. Lychnis chalcedonica, weiße und rothe Lychnis 1 —
649. , fulgens, leuchtende, ſehr ſchön 1 —
650. Malva moschata, Biſammalve 1 —
651. * Mimulus guttatus, gefleckte Affenblume 1 —
652. * , luteus, gelbe 1 6
653. * , littoralis, Strand-, ſehr ſchön und neu
654. Nymphea alba, weiße, ſehr wohlriechende Seeroſe, ſehr ſchön, vorzüglich zum Beſetzen der Weiher oder Teiche in engliſchen Anlagen, wo ſie das Auge den ganzen Sommer mit ihren ſchönen Blättern und Blumen erfreuen 3 —
1 —
655 * Oenothera rosea, roſenfarbene Nachtkerze 1 —
656. , odorata, wohlriechende

657. * Oenothera tenella, zierliche 1 —
658. * , tetraptera, vierflügelige 3 —
659. * , speciosa, ſehr ſchön, neu 1 6
660. * , spectabilis, anſehnliche, ſchön 1 6
661. Ononis rotundifolia, Hauhechel, ſchön 1 6
662. Orobus Fischeri 2 —
663. Paeonia albiflora, weißblühende Pfingſtroſe 4 —
664. , arborea, baumartige, prachtvoll 1 —
665. , corallina, [illegible] 2 —
666. , paradoxa, [illegible] 1 6
667. , pilosa, behaarte 1 6
668. Papaver bracteatum, beblätterter Mohn, ſchön 1 —
669. , cambricum, engliſcher 1 6
670. , caucasicum, caucaſiſcher 2 —
671. , floribundum, blumenreicher 1 —
672. * , nudicaule, nacktſtengeliger 1 —
673. , orientale, morgenländiſcher 2 —
674. , tauricum, tauriſcher
675. * Pentstemon atropurpureum, dunkelpurpurner Bartfaden, neu und ſchön 1 6
1 6
676. , barbatum, bärtiger 1 6
677. , campanulata, glockenblumenförmiger 2 —
678. , confertum, [illegible] 1 6
679. , digitalis, fingerhutförmiger, ſchön 1 6
680. , laevigatum, glattblättriger 1 6
681. , pubescens, weichhaariger 1 6
682. * , pulchellum, ſchöner, neuer 2 —
683. Phlox Siemsseni, Flammenblume 1 6
684. , amplexicaulis, ſtängelumfaſſende 1 —
685. , paniculata, riſpenartige 1 6
686. , , alba, weiße 2 —
687. , suaveolens, [illegible] 2 —
688. , undulata, wellenförmige 2 —
689. , Wheleri, Wheler's 1 —
690. Podaliria australis, auſtraliſche Podalirie 1 —
691. Polemonium coeruleum, blaues Sperrkraut 1 —
692. , gracile, ſchlankes 1 —
693. , mexicanum, mexicaniſches 1 6
694. , pulchellum, ſchönes 1 6
695. Potentilla atrosanguinea, dunkelblutrothes Fingerkraut 1 —
696. * , formosa, ſchönes 1 —
697. , grandiflora, großblühendes 2 —
698. , splendens, ſehr ſchön 4 —
699. Primula auricula, engliſche Aurikel von den beſten Sorten 2 —
700. , , Luiker 2 —
701. * , cortusoides, ſchöne Primel 3 —
702 * , veris, ſehr ſchöne engliſche 1 6
703. Rudbeckia hirta, rauhe, ſchöne Rudbeckie 1 6
704. , pinnata, gefiederte 2 —
705. Salvia pendula, hängende Salbei, ſehr ſchön 1 6
706. Scilla campanulata, glockenförmige Meerzwiebel 1 6
707. Serratula alata, geflügelte, ſchön 2 —
708. Statice platifolia, breitblättrige 2 —
709. , taimacis, ſchöne 2 —
710. , tartarica, tartariſche 2 —
711. * Silene compacta, Silene, ſehr ſchöne 2 —
712. * , ornata, prächtig dunkelrothe 1 6
713. * Stevia purpurea, purpurrothe Stevie, ſchön 1 6
714. * , lanceolata, lanzettblättrige 1 6
715. Sylphium erithrocaulon, Sylphie 1 6
716. , Hornemanni, Hornemanniſche 1 —
717. Thalictrum flavum, Wieſenraute 1 —
718. , aquilegifolium, akeleiblättrige 2 —
719. , alpinum, Alpen- 1 —
720. , elatum, hohe 1 6
721. , flexuosum, gekrümmte 2 —
722. , nigricans, ſchwärzliche 1 6
723. , purpurascens, purpurröthliche 2 —
724. , speciosum, ſchönſte 1 —
725. * Valeriana rubra, rothe Valeriane 1 —
726. * , alba, weiße 1 —
727. * , rosea, roſenfarbene 1 6
728. Veratrum nigrum, ſchwarze Nießwurz
729. Taxus baccatus, (Baum) mit rothen Beeren à Loth 3 —
730. Verbascum niveum, ſchneeweiße Königskerze 2 —
731. , phoeniceum 1 6
732. Veronica acuta, ſcharfer Ehrenpreis 1 —
733. , australis, auſtraliſcher 1 —
734. , azurea, azurblauer 1 —
735. , canescens, weißlicher 1 6
736. , carnea, fleiſchfarbener 1 —
737. , dentata, gezähnter 1 —
739. , gentianoides, gentianartige 1 —
740. , glabra, glatter 1 —
741. , crenulata, körniger 1 —
742. , hybrida, Baſtard 1 —
743. , incana, beſtäubter 1 —
744. , laciniata, ſchlitzblättriger 1 —
745. , longebracteata, langbeblätterter 1 —
746. , longiflora fl. albo, langblüthiger, weißer 1 —
747. , longifolia, langblättriger 1 —
748. , maritima, Meerſtrands- 1 —
749. , media, mittlerer 1 —
750. , polymorpha 1 —
751. , spicata, ährenförmiger 1 —
752. , verticillata, quirlſtändiger 1 —
753. , villosa, wolliger
754 Das ganze Sortiment von 22 Sorten in 22 Priſen 16 —
755. Viola odorata semperflorens, immerbl. wohlr. Veilchen 2 —

Folgende Sortiments perennirender Blumenſaamen erlaſſe ich zu beiſtehenden billigen Preiſen.

756. 100 Sorten in 100 Priſen 2 Thlr. — —
757. 50 , , 50 1 Thlr. — —
758. 25 , , 25 16 —
759. 12 , , 12 8 —

Topf-Blumen-Saamen.

Mit ⊙ bezeichneten ſind Sommergewächſe, ♂ zweijährige, ♃ Stauden, ♄ ſtrauch- oder baumartige, w warme und K kalte Hauspflanzen. Wo kein Zeichen bemerkt iſt, gilt das nächſt vorderſtehende.

760 ♄K Acacia armata, bewaffnete Acacie . 2 K. 4 —
761. , caffra, neue ſchöne . 2 K. 4 —
762. , dealbata, weißliche . 6 K. 9 —
763. , latifolia, breitblättrige . 6 K. 3 —
764. , lophanta, neuholländiſche . 3 K. 9 —
765. , , speciosa, gedrängte . 6 K. 3 —
766. , stricta, ſteife . 6 K. 2 —
767. , verticillata, wirbelblättrige 3 —
768. ♃w Amarillis vittata, ſehr ſchön 1 —
769. ♃K Agapanthus umbellatus, doldenblüthige Schmucklilie 2 —
770. Alstroemeria pelegrina, bunte Alſtromeria 1 6
771. ⊙w Amaranthus bicolor, zweifarbiger Fuchsſchwanz 1 6
772. , tricolor, dreifarbiger, ſchöner
773. ♄K Andromeda buxifolia, buchsbaumblättrige Andromeda, neu und prächtig 4 —
774. ♄w Ardisia crenulata, körnige Spitzblume . 6 K. 2 —
775. Asclepias curassavica, ſchöne Seidenpflanze 1 6
776. , , fl. albo, weiße, neu u. ſehr ſchön 6 K. 3 —
777. ♄K Azalea pontica, pontiſcher Felſenſtrauch 2 —
778. Banksia praemorsa, abgebiſſene Bankſie 3 —
779. Begonia semperflorens, immerblühendes Schiefblatt 2 —
780. , spatulata, ſpatelförmiges 1 6
781. Billardiera scandens, kletternde 2 —
782. ♄w Blumenbachia insignis, merkwürdige . 6 K. 2 —
783 ⊙w Browallia elata fl. albo, weiße aufrechte Browallie 1 6
784. , , fl. coeruleo, blaue 1 6
785. ♄K Calceolaria arachnoidea, ſpinnwebene Pantoffelblume 3 —
786. , Alexandria, ganz neu und ſchön 6 —
787. , corymbosa, doldenblüthige, ſchön 3 —
788. , crenatiflora suberecta, die ſchönſte aller Pantoffelblumen 6 —
789. , Gilsai, ganz neu und ſchön 9 —
790. ⊙w , pinnata, gefiederte 1 6
790b. , scabiosaefolia, ſcabioſenblättrige 1 6
790c. , tricolor, dreifarbige, prächtig 4 —
791. , , picta, gemalte, prächtige 8 —
792. 12 neue Sorten gemiſcht, ſämmtlich ſchön blühender Sorten 12 —
793. ♃w Cactus Echinocactus Ottonis, ſchöner Igelkaktus 6 K. 4 —
794. , , Sellowianus, Sellow's neuer ſchöner 3 K. 6 —
795. , mammillaris nova species Mexico, mit weißen langen Stacheln . 6 K. 12 —
796. , , n. sp. M., mit weißlichen Stacheln und weißer Wolle . 6 K. 12 —
797. ♄K Callistachis lanceolata, lanzettblättrige 2 —
798. Calothamnus quatrifidus, vierfach gefiederter 3 —
799. ♃K. Campanula pyramidalis, pyramidenförmige Glockenblume 3 —
800. ♃w Canna carnea, fleiſchfarbenes Blumenrohr . 3 K. 3 —
801. , coccinea, ſcharlachrothes . 3 K. 3 —
802. , chinensis, chineſiſches . 3 K. 3 —
803. , gigantea, Rieſen- . 3 K. 3 —
804. , limbata, gelbrandiges . 3 K. 2 —
805. , latifolia, breitblättriges 3 K. 3 —
806. , mexicana, mexicaniſches

Nr.		à Priſe	gr.	pf.
807.	♃w Canna sanguinea, Blutrothe	2 K.	4	—
808.	„ speciosa, prächtiges	3 K.	1	—
809.	☉w Capsicum baccatum, beerentragende Beißbeere		2	—
810.	„ cerasiforme, kirſchenartige		2	—
811.	„ conicum, koniſche		1	6
812.	♄w „ nigrum, ſchwarze, ſelten		4	—
813.	☉w Cardiospermum halicacabum, Herzſaame		1	6
814.	♄K Cassia ligustrina, Kaſſie, ſchöne	3 K.	3	—
815.	Casuarina stricta, ſteife Caſuarine		4	—
816.	♃K Celsia arcturus, geſtielte Celſie		1	6
817.	„ australis, auſtraliſche		1	6
818.	☉w Celosia christata, Hahnenkamm, in folgend. Farb. gemiſcht		1	6
819.	Nr. 1. ſilberroth mit roſa Rand, extra. 2. rothgelb mit Goldrand. 3. lila. 4. fleiſchfarbe, niedrig, extra. 5. braunroth. 6. roſa mit Silberſchimmer und Goldrand, ſehr ſchön. 7. karmoiſinroth. 8. hellcarmoiſin, ganz niedrig, extra. 9. dunkelpurpur. 10. rein gelb. 11. goldgelb. 12. dunkelroth mit Goldrand. 13. ſchwefelgelb mit Goldrand. 14. purpur mit Goldrand. 15. dunkelroſa, niedrig, extra. 16. weißgelb, ganz niedrig, neu, ſehr ſchön. Jede Priſe einzeln		1	6
820.	Das ganze Sortiment in 16 Priſen		18	—
821.	Celosia argentea, ſilberährige		1	—
822.	„ pyramidalis, pyramidenförmiger, neuer, ſehr ſchön		3	—
823.	„ sanguinea, blutrothe		1	—
824.	♃K Chironia coelesta, [illegible] Chironie		2	—
825.	♄K Cineraria amelloides, amellenartige Aſchenpflanze		1	6
826.	„ maritima, Meerſtrands-		1	6
827.	♄w Cleome gigantea, Rieſen-Cleome		2	—
828.	„ canadensis, canadiſche		2	—
829.	Cobea scandens, kletternde Kobea	6 K.	4	—
830.	☉w Coix lacryma, Thränengras		2	—
831.	♃w Comelina angustifolia, ſchmalblättrige Comeline		1	6
832.	„ coelestis, himmelblaue, ſchöne		1	6
833.	♄K Chorizema Rhombei, rautenblättrige		2	—
834.	Colutea frutescens, caspiſcher Blaſenſtrauch		2	—
835.	Coriaria myrthifolia, myrthenblättriger		2	—
836.	Coronilla glauca, graugrüne Peltſchen		1	—
837.	„ valentina, valentiniſche		1	—
838.	☉w Crotolaria capensis, kapiſche		2	—
838b.	„ incana, beſtäubte		2	—
838c.	„ retusa, abgeſtumpfte		2	—
839.	Cupressus pyramidalis, Pyramiden-Cypreſſe		1	6
840.	„ sempervirens, immergrüne		1	6
841.	♃K Cyclamen persicum, perſiſche Erdſcheibe		2	—
842.	♃w Cyperus papyrus, Papierſtaude		6	—
843.	☉w Datura fastuosa fl. pl., blaugefüllter Stechapfel		2	—
844.	„ „ fl. pl. albo, weißgefüllter, beide ſchön		2	—
845.	„ metel, weißer, hübſcher		1	6
846.	„ quercifolia, eichenblättriger		1	6
847.	♄w Desmanthus virgatus, ruthenförmige Mimoſa		1	—
848.	♃w Didymocarpus Rhexii od. Streptocarpus Rhexii, ſehr ſchön		2	—
849.	♄K Eccremocarpus scaber, ſcharfer Eccremocarpus, ſehr ſchön und neu, blüht im erſten Jahre		3	—
850.	Elychrisum fulgidum, leuchtende Strohblume		1	6
851.	Erica baccans, beerenartige Haide		2	—
852.	♃K Erythrolaena conspicua, ſchöne, neue rothe merik. Diſtel		4	—
853.	Frankoa sonchifolia, gänſediſtelblättrige, neu und ſchön		2	—
854.	„ appendiculata, ganz neu und prächtig		4	—
855.	♄K Fuchsia arborea, baumartige Fuchſia		2	—
856.	Genista canariensis, canariſcher Ginſter		2	—
857.	Glycine coccinea, ſcharlachrothe Glycine	6 K.	3	—
858.	„ comptoniana, prächtigſte	4 K.	4	—
859.	„ rubicunda, dunkelrothe	4 K.	2	—
860.	„ purpurea, purpurrothe, ſehr ſchön	3 K.	6	—
861.	„ ciribaea,	4 K.	3	—
862.	♃w Gloxinia formosa, ſchöne Gloxinie		2	—
863.	☉w Gomphrena globosa fl. albo, weißer Kugelamaranth		1	6
864.	„ „ fl. carneo, blaßrother		1	6
865.	„ „ fl. rubro, dunkelrother		1	6
866.	♄w. Gossipium arboreum, baumartige Baumwolle	3 K.	3	—
867.	„ herbaceum, krautartige	8 K.	1	6
868.	„ religiosum, heilige	2 K.	3	—
869.	Harrachia speciosa, prächtige Harrachia		3	—
870.	Hedysarum gyrans, bewegl. Süßklee, ſehr intereſſant	3 K.	3	—
871.	„ vespertilionis, fledermausartiger		2	—
872.	♄K Heliotropium peruvianum, peruaniſche Sonnenwende		2	—
873.	Hemimeris urticifolia, neſſelblättrige Halbblume		1	6
874.	♄w Hibiscus Abelmoschus, Biſam-Hibiscus		2	—
875.	„ Manihot, [illegible]		1	6
877.	„ palmatus, handförmiger		2	—
878.	„ speciosus, ſchönſter		2	—
879.	♄K Hyoscyamus aureus, goldfarbenes Bilſenkraut, ſchön		1	—
880.	♄w Indigofera australis, neuholländiſcher Indigo, hübſch		2	—
881.	☉w Ipomea coccinea, ſcharlachrothe Trichterwinde		1	6
882.	„ hepaticifolia, leberkrautblättrige		1	6
883.	„ Nil, prächtige		2	—
884.	„ pes tigridis, tigerfußblättrige		2	—
885.	„ quamoclit, gefiederte, ſchön		2	—
886.	♄w Lantana sellovii, Sellow's neue ſchöne Lantane		3	—
887.	♄K Lavatera arborea, baumartige Malve		1	—
888.	Lassiopetalum purpureum, purpurfarbige		3	—
889.	Leptospermum Thea, Teemyrthe		2	—
890.	„ myrthifolium, myrthenblättrige		2	—
891.	☉K Lobelia erinoides, ſchmalſtielige Lobelie, ſehr niedlich		1	6
892.	♄K „ coronopifolia, ſehr ſchöne		2	—
893.	„ triquetra, dreitheilige		1	—
894.	☉w Loasa tricolor, dreifarbige Loaſe, ſchön		1	6
895.	♃K Lotus jacobaeus, ſchöner brauner Jakobsklee		1	6
896.	☉K Martinia annua, Gemſenhorn, ſchön		1	6
897.	♃K Maurandia antirrhiniflora, löwenmaulblüth. Maurandie		1	6
898.	„ Barclayana, Barclay's, ſehr ſchön		2	—
899.	„ semperflorens, immerblühende		1	6
900.	♄K Melaleuca armillaris, Cajaputbaum		3	—
901.	„ decussata, gekreuzter		3	—
902.	„ hypericifolia, johanniskrautblättriger		1	6
903.	Melia Azederach, glatter Zedrach		2	—
904.	Metrosideros crassifolia, dickblättriges Eiſenmaß		4	—
905.	„ lanceolata, lanzettblättriges		2	—
906.	„ linearis, feinblättriges		2	—
907a.	„ lophanta, büſchelblüthiges		2	—
907b.	„ glauca, graugrünes		3	—
908.	„ marginata, gerändertes		3	—
909.	„ saligna, weidenblättriges		2	—
910.	„ speciosa, ſchönſtes		4	—
911.	☉w Mesembrianthemum cristallinum, Kriſtallkraut		1	6
912.	„ pomeridianum, Nachmittag blühendes		2	—
913	♂K Mimosa pudica, ſchamhafte Sinnpflanze 100 K. 16 gr.		2	—
914.	♃K Mimulus floribundus, vielblumige Affenblume		1	6
915.	„ moschatus, Moſchus-		2	—
916.	„ anticolor, neue blaßgelbe		8	—
917.	„ propinquus, großblumige		2	—
918.	„ quinquevulnerus, ganz neue prachtvolle, 5fleckige		4	—
919.	„ speciosus, ſchönſte		3	—
920.	„ variegatus, weiß mit purpurnen Flecken, ganz neu und prachtvoll		4	—
921.	☉w Momordica Balsamina, Balſam-Apfel		2	—
922.	♄K Lophospermum scandens, kletternde, neue prächtige		4	—
923.	♂K Nicotiana glauca, graugrüner Taback, neu und ſchön		2	—
924.	☉w Ocimum maximum, größtes Baſilicum		1	6
925.	„ minimum, kleinſtes		1	—
926.	„ nigrum, ſchwarzes		1	—
927.	„ polystachium, moſchusduftendes		2	—
928.	♄w Passiflora edulis, eßbare Paſſionsblume		4	—
929.	„ capsularis, kapſelartige		2	—
930.	„ foetida, mit in Moos hängenden Früchten		2	—
931.	„ gracilis, ſchlanke		2	—
932.	„ Raddiana, ſchöne		3	—

Nr.		à Priſe	gr.	pf.
933.	♄K Pelargonien, die beſten Sorten gemiſcht		2	—
934.	☉w Pentapetes phoenicea, ſcharlachr. Pentapetes, ſehr ſchön		2	—
935.	♄w Phyllanthus juglandifolius, wallnußblättr. Phyllanthe		3	—
936.	♄K Pittosporum undulatum, wellenförm. Klebſaame		2	—
937.	♃K Primula chinensis, chineſiſche Primel		2	—
938.	„ „ fl. albo, weiße		6	—
939.	♄K Psoralea bituminosa, Pſoralie		2	—
940.	„ argentea, ſilberfarbene		6	—
941	„ coerulea, blaue		2	—
942.	„ hirta, rauhe		2	—
943.	„ glandulosa, drüſige		2	—
944.	„ pinnata, gefiederte		2	—
945.	Pultenea stricta, ſteife		3	—
946.	Rhododendron catabiense, Alpenroſe		3	—
947.	„ ponticum fl. albo, weißblühende pontiſche		3	—
948.	„ maximum, größte		3	—
949.	♂K Salpiglossis straminea fl. albo, weißblühende Salpiglossis		2	—
950.	„ „ fl. atropurpureo, dunkelpurpurrothe		4	—
951.	„ „ fl. picta, gemahlte		4	—
952.	„ Barcleyana, Barclay's, neue		4	—
953.	„ „ lilacina, lilafarbene		4	—
954.	„ „ speciosa, ſchönſte		6	—
955.	„ intermedia, mittlere		4	—
956.	„ „ variegata, bunte		6	—

Dieſe Species ſind wirkliche Prachtpflanzen, und ſollten in keinem Garten fehlen. Da ſie im erſten Jahre ſehr reich blühen, ſo kann man ſie auch ganz wie Sommergewächſe behandeln.

957.	♄K Salvia coccinea, ſchönrothe Salbei		1	—
958.	♄w „ splendens, leuchtende		2	—
959.	♄K Senecio venusta, Kreuzkraut, neu und ſchön		2	—
960.	Selago capitata, kopfförmige		4	—
961.	„ diffusa, ausgebreitete		3	—
962.	☉K Sideritis elegans, ſchöne Sideritis		2	—
963.	☉w Solanum melongena fructo albo, weiße Eierfrucht		1	6
964.	„ „ „ coeruleo, blaue		1	1
965.	„ „ „ luteo, gelbe		2	—
966.	♄K „ pseudo capsicum, Korallenkirſche		1	—
967.	☉w Spermacoce rubra, rothe		2	—
968.	♄K Sphaerolobium vimineum, ſehr hübſch		3	—
969.	☉K Spilanthus oleracea, Huſarenknopf		1	1
970.	♄K Staurocanthus aphyllus		3	—
971.	♃w Stapelia grandiflora, großblühende Aasblume		2	—
972.	„ reticulata, überſtrickte		3	—
973.	♄w Thunbergia capensis, kapiſche Thunbergia	1 K.	3	—
975.	„ alata, geflügelte	1 K.	3	—
974.	Trachelium coeruleum, blaue Halskraufel		3	—
976	☉K Trachymene coerulea, blaue Trachymene, ſehr ſchön u. neu		3	—
977.	Ein Sort. v. 30 Sorten Topf-Sommergew. in 30 Priſ.	2 Thlr.		
978.	„ „ 15 „ „ 15 „		18	—
979.	„ „ 50 „ Topfpflanzen 50 „	2 Thlr.	18	—
980.	„ „ 25 „ „ 25 „	1 „		

Verſchiedene Blumenzwiebeln und Knollen, die meiſtens bis Ende April im trockenen Zuſtande zu haben ſind.

981.	Amaryllis formosissima	12 St.	1 Thlr.	—	—
982.	„ Belladonna	1 St.		12	—
983.	„ crispa	1 St.		1	—
984.	„ ornata	1 St.		16	—
985.	„ flexuosa	1 St.		8	—
986.	„ Johnsonii	1 St.	1 Thlr.	6	—
987.	„ purpurea	1 St.		12	—
988.	„ recurvata	1 St.		12	—
989.	„ rutila	1 St.		8	—
991.	„ vittata	1 St.		16	—
992	Begonia discolor	3 St.		2	—
993.	„ semperflorens	1 St.		1	—
994.	„ spatulata	1 St.		6	—
995.	Canna flaccida, ſchönſtes	1 St.		6	—
996.	„ gigantea	1 St.		4	—
997.	„ glauca	1 St.		6	—
998.	„ limbata	1 St.		4	—
999.	Comelina coelestis	1 St.		2	—
1001.	Cyclamen europaeum	1 St.		6	—
1002.	„ persicum	1 St.		6	—
1003.	Cyrilla pulchella	6 St.		2	—
1004.	Ferraria tigrida	1 St.		2	—
1005.	Gloxinia caulescens	1 St.		8	—
1006.	„ formosa	1 St.		4	—
1007.	„ „ fl. albo	1 St.		8	—
1008.	Schelii	1 St.		8	—
1009.	Lachenalia tricolor	6 St.		8	—
1010.	Lilium tigrinum	1 St.		2	—
1011.	Anemone, holländ. gefüllte in vielen Farb.	100 St.	2 Thlr.	12	—
1012.	Ranunkeln, deutſche in vielen Farben	100 St.		18	—
1013.	„ rothe türkiſche zum Treiben	12 St.		8	—
1014.	Tuberoſen, gefüllte tragbare	12 St.		18	—
1015.	Ananas-Kartoffeln	12 St.		3	—
1016.	Mandel- „ ganz klein zum Schmoren	25 St.		2	—
1017.	30 Sorten Kartoffeln mit Namen	30 St.		18	—
1018.	Georginen, in 50 Sorten	50 St.	12 Thlr.	—	—
	(Hierunter ſind Zwerg- und anemonenblüthige.)				
1019.	25 Sorten in	25 St.	6 Thlr	—	—
1020.	12 „	12 St.	3 Thlr.	12	—
1021.	6 „ (die ſchönſten)	6 St.	2 Thlr.	—	—
1022.	Georginen, Zwerg-, prachtvoll, zum Theil werden ſie nicht höher als 1 Fuß, 8 Sorten in	8 St.	5 Thlr.	—	—
1023.	„ anemonenblüthige, ebenfalls ſehr ſchön 8 Sorten	in 8 Stück	4 Thlr.	—	—

Verſchiedene Pflanzen.

		à Stück Thlr.	gr.	pf.
1024.	Camelien, 6 St. in 6 gefüllten Sort. 3- bis 4jährig	8	—	—
1025.	Calceolarien, 30 Stück in 30 Sorten	15	—	—
1026.	„ 15 „ 15 „	8	—	—
1027.	Cactus, 30 St. 30 Sorten, wobei Melocactus Sellovianus, Cereus Scopa u. a. ſchöne Sorten	12	—	—
1028.	„ 12 Stück in 12 Sorten, blos Cereus-Arten	3	—	—
1029.	„ 6 „ 6 Sorten, blos Mammilarien	2	—	—
1030.	Fuchsien, 6 Stück in 6 Sorten	2	—	—
1031.	Nerium Oleander, 6 Stück in 6 Sorten	2	—	—
1032.	Pelargonien, 30 Stück in 30 Sorten, blos neu	12	—	—
1033.	„ 15 „ 15	6	—	—
1034.	Roſen, immerblühende, wobei Thea und Noisette, 50 Stück in 50 Sorten	20	—	—
1035.	„ immerblühende 25 Stück in 25 Sorten	8	—	—
1036.	Aurikel, Luickes, 12 Stück in 12 Sorten	—	18	—
1037.	„ engliſche 12 St. in 12 S. mit Namen, extra	3	—	—
1038.	Primeln, engliſche 12 Stück in 12 Sorten	—	8	—
1039.	„ chineſiſche rothe 12 Stück	1	—	—
1040.	„ „ weiße 12 Stück	2	12	—
1041.	Chrysanthemum, in 16 Sorten	1	12	—
1042.	Erdbeere, Monats-, ohne Ranken 12 St.	—	4	—
1043.	„ Zimmt-, vorzüglich 12 St.	—	6	—
1044.	„ Ananas-, 12 St.	—	3	—
1045.	Nelken, 12 Stück Hauptblumen mit Namen	2	12	—
1046.	„ Land-, 12 Stück	—	12	—
1047.	„ Feder-, Wiener, große 1 St.	—	1	6
1048.	Spargelpflanzen, 3 jährige 100 St	1	4	—
1049.	Centifolien-Roſen, ächte große 100 St.	1	12	—
1050.	„ „ „ kleine 12 St.	1	12	—
1051.	Damen-Röschen, ſehr niedlich 12 St.	1	—	—
1052.	Moos-Roſen 1 St.	—	6	—
1053.	Rosa pimpinellifolia, pimpinellblättrige Roſe 24 Stück in 24 Sorten	4 Thlr.	—	—
	12 Stück in 12 Sorten	2 „	—	—
1054.	Verſchied. Sorten Land-Roſen untereinander 100 St.		20	—
	1000 Stück	7 Thlr.	—	—

Folgende Bemerkungen ſind gefälligſt zu beachten:

1) Bitte ich, die verehrlichen Aufträge nebſt Betrag franco einzuſenden; 2) um deutliche Unterzeichnung der Namen und des Wohnortes; 3) die Beſtellung auf ein beſonderes Blatt zu notiren, wobei noch bemerke, daß zur Vereinfachung derſelben bloß die laufende Nummer richtig anzugeben iſt; 4) für Emballage und Kiſten, wo ſolche nothwendig ſind, etwas nach Verhältniß der Beſtellung dafür behalten; 5) erſuche die verehrlichen Blumenfreunde, mir jetzt die Beſtellungen einzuſenden, indem ſie ſich im Monat Februar und März ſonſt zu ſehr häufen, als daß ich ſie nach Wunſch ſchnell genug expediren könnte; 6) bemerke, daß halbe Priſen nicht abgegeben werden.

[illegible] jederzeit pünktlich und reell zu bedienen, ſo wie ich auch keine Koſten ſcheue, um jederzeit mit dem Neueſten und Schönſten aufzuwarten, was man aus dieſem meinem zweiten Verzeichniſſe erſehen wird.

Erfurt, im Dezember 1833.

Carl Appelius,
jetzt am Andreas-Thor, früher hinter Weißfrauen.